


INTRA

C. 9.







Book 214

n 29



PARTE PRÁCTICA DE BOTÁNICA

DEL CABALLERO

CARLOS LINNEO.

TOMO IV.



PARTE PRÁCTICA DE BOTÁNICA
DEL CABALLERO
CÁRLOS LINNEO,

QUE COMPREHENDE

LAS CLASES, ÓRDENES, GÉNEROS, ESPECIES
Y VARIETADES DE LAS PLANTAS,
CON SUS

Caracteres genéricos y específicos, Sinónimos mas selectos,
Nombres triviales, Lugares donde nacen,
y Propiedades.

TRADUCIDA DEL LATIN EN CASTELLANO É ILUSTRADA

POR

DON ANTONIO PALÁU Y VERDÉRA,
*Segundo Catedrático de Botánica por S. M., Academico
de las Reales Academias Médica Matritense y de Ciencias
y Artes de Barcelona, Sócio honorario de las Reales Socie-
dades Médica de Sevilla, de Agricultura de Paris,
é Individuo de merito de la Real Económica
de los Amigos del país en esta Corte.*

TOMO IV.

DE ORDEN SUPERIOR.

MADRID: EN LA IMPRENTA REAL.

MDCCCLXXXVI.



PORTE PRÁCTICA DE BOTÁNICA

DEL CABALLERO

CÁRLOS LINNEO,

QUE COMPRENDE

LAS CLASES, ÓRDENES, GÉNEROS, ESPECIES

Y VARIETADES DE LAS PLANTAS,

CON SUS

Caracteres genéricos y específicos, distinciones más selectas,

Noticias triviales, lugares donde nacen,

y Propiedades,

TRADUCIDA POR DON ANTONIO DE VILLALBA

POR

DOM ANTONIO PABLO Y VILLALBA,

agente facultativo de Botánica por S. M. Católica

de las Reales Academias Médica y Matemática y de Ciencias

de la Corte Real de Madrid, de la Real Academia de Ciencias

de San Carlos de Barcelona, de la Real Academia de Ciencias

y Artes de Valencia, de la Real Academia de Ciencias y Artes

de San Fernando de Madrid, de la Real Academia de Ciencias y Artes

de San Carlos de Valencia, de la Real Academia de Ciencias y Artes

de San Carlos de Valencia, de la Real Academia de Ciencias y Artes

de San Carlos de Valencia, de la Real Academia de Ciencias y Artes

de San Carlos de Valencia, de la Real Academia de Ciencias y Artes

de San Carlos de Valencia, de la Real Academia de Ciencias y Artes

de San Carlos de Valencia, de la Real Academia de Ciencias y Artes

de San Carlos de Valencia, de la Real Academia de Ciencias y Artes

de San Carlos de Valencia, de la Real Academia de Ciencias y Artes

de San Carlos de Valencia, de la Real Academia de Ciencias y Artes

de San Carlos de Valencia, de la Real Academia de Ciencias y Artes

de San Carlos de Valencia, de la Real Academia de Ciencias y Artes

TOMO IV

DE ORDEN SUPERIOR

MADRID EN LA TIPOGRAFIA DE

LA VENTA DE



CLASE XI.

DODECANDRIA. DE LAS FLORES HERMAFRODITAS DE ONCE
HASTA DIEZ Y NUEVE ESTAMBRES
INCLUSIVE.

ORDEN I.

MONOGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO.



Géneros.

Caracteres sobresalientes.

- 718 ASARUM. CALIZ hendido en tres ó quatro lacinas, y sentado en el germen: *corola* ninguna: *capsula* correosa y coronada.
- 719 BOCCONIA. CALIZ de dos hojuelas: *corola* ninguna: *estilo* hendido en dos partes: *baya* muy seca, y con una semilla.
- 720 GETHYLLIS. ESPATA. *Corola* hendida en seis partes: *estambres* insertos en seis órdenes: y *capsula* de tres celdillas.
- 721 BASSIA. CALIZ de quatro hojuelas: *corola* hendida en ocho lacinas, con el tubo inflado: *estambres* diez y seis: y *drupa* de cinco semillas.
- 722 RHIZOPHORA. CALIZ dividido en quatro partes: *corola* partida en quatro lacinas: *semilla* una, larguísima y carnosa por su base.
- 723 BLAKEA. CALIZ el uno baxo del germen, de seis hojuelas; y el otro encima y entero: *petalos* seis: *capsula* de seis celdillas, y con muchas *simientes*.
- 724 BEFARIA. CALIZ hendido en siete lacinas;

FLORES HERMAFRODITAS

- petalos siete : estambres ca-
torce : baya de siete celdillas y
con muchas simientes.*
- 725 VATICA. CALIZ hendido en cinco lacinias :
*petalos cinco : anteras quince,
sentadas y de quatro celdi-
llas.*
- 726 GARCINIA. CALIZ de quatro hojuelas , baxo
del germen : *petalos quatro :
baya con ocho semillas , y co-
ronada con el estigma abro-
quelado.*
- 727 HALÉSIA. CALIZ de quatro dientes , encima
del germen : *corola hendida en
quatro lacinias : nuez de qua-
tro ángulos y de dos simien-
tes.*
- 728 DECUMARIA. CALIZ de diez hojuelas , encima
del germen : *petalos diez : y
fruto hasta hoy desconocido.*
- 729 WINTERANIA. CALIZ de tres lóbulos : *petalos*
*cinco : anteras diez y seis ,
prendidas al nectario como jar-
rito : baya de tres celdillas ; y
con dos simientes.*
- 730 CRATÆVA. CALIZ hendido en quatro partes :
*corola de quatro petalos : y
baya de una celdilla , con mu-
chas simientes.*
- 731 TRIUMFETTA. CALIZ de cinco hojuelas : *corola*
*de cinco petalos : capsula eri-
zada y que se abre en quatro
celdillas.*
- 732 PEGANUM. CALIZ de cinco hojuelas , ó nin-
guno : *corola de cinco petalos :
capsula de tres celdillas , de
tres ventallas ; y con muchas
simientes.*
- 733 HUDSONIA. CALIZ de tres hojuelas , tubuloso :
*corola ninguna : estambres
quince : capsula de una celdi-
lla ,*

lla , de tres ventallas y tres *simientes*.

- 734 NITRARIA. CALIZ hendido en cinco partes : *corola* de cinco petalos , arqueados por su remate : *estambres* quince : y *drupa* con una semilla.
- 735 PORTULACA. CALIZ hendido en dos partes : *corola* de cinco petalos : *capsula* de una celdilla , que se abre al través , ó de tres ventallas.
- 736 LYTHRUM. CALIZ de doce hojuelas : *petalos* seis , insertos en el caliz : y *capsula* de dos celdillas , con muchas *simientes*.
- 737 GINORA. CALIZ hendido en seis partes : *petalos* seis : *capsula* de color , de una celdilla , de quatro ventallas , y con muchas *simientes*.
- 738 DODECAS. *Suppl. p. 36.* CALIZ medio hendido en quatro partes , que lleva la *corola* , y encima del germen : *corola* de cinco petalos : *capsula* de una celdilla , y unida con el caliz.

Tienen Estambres. . . y pertenecen á las clases:

La Clome <i>viscosa dodecandra.</i>	15.
La Samyda <i>pubescens</i> y <i>serratula.</i>	12. 10.
La Rivina <i>octandra</i> ó <i>dodecandra.</i>	4.
La Passerina <i>capitata.</i>	12. 8.

ORDEN II.

DIGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOS PISTILOS.

- 739 HELIOCARPUS. . CALIZ de quatro hojuelas: *petalos* quatro: *estilos* sencillos: *capsula* de dos celdillas, comprimida y radiada longitudinalmente por una y otra parte.
- 740 AGRIMONIA. . . . CALIZ de cinco dientes y cercado con otro: *petalos* cinco: y *semillas* dos, puestas en el fondo del caliz.

ORDEN III.

TRIGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON TRES PISTILOS.

- 741 RESEDA. CALIZ de una pieza, partido: *petalos* laciniados: *capsula* que se abre por su boca y de una celdilla.
- 742 EUPHORBIA. . . . CALIZ de una pieza, ventricoso: *corola* de quatro ó cinco *petalos*, sentada en el caliz: y *capsula* de tres frutos.
- 743 VISNEA. *Suppl. p. 36.* CALIZ de cinco hojuelas, baxo del germen: *corola* de cinco *petalos*: *estigmas* tres: *nuez* de dos, ó tres celdillas, y la mitad debaxo del caliz.
- 744 TACCA. *Suppl. p. 37.* CALIZ de seis hojuelas: *corola* de seis *petalos*, arqueada, encima del germen; *baya* seca, angulada y de tres celdillas.
- 745 PALLASIA. *Suppl. p. 37.* CALIZ ninguno: *corola* de cinco *petalos*: *nuez* con quatro ángulos, membranosos y hendidos en dos partes.

OR.

ORDEN IV.

PENTAGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON CINCO PISTILOS.

746 GLINUS. CALIZ de cinco hojuelas : corola
ninguna : *nectarios* de cerdas
hendidias en dos partes : *cap-*
sula con cinco ángulos, de cin-
co celdillas y cinco ventallas,
con muchas *simientes*.

ORDEN V.

POLYGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON MAS DE CINCO
PISTILOS.

747 SEMPERVIVUM. . CALIZ dividido en doce partes :
petalos doce : *capsulas* doce ;
y con muchas *semillas*.

CLASE XI.

DODECANDRIA. DE LAS FLORES HERMAFRODITAS DE ONCE
HASTA DIEZ Y NUEVE ESTAMBRES
INCLUSIVE.

ORDEN I.

MONOGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO.

718. Género ASARUM. * *Tourn. t. 286.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , á manera de campana , cor-
reoso , de color, persistente , hendido en tres ó quatro
lacinias , derechas y redobladas ácia dentro por su
ápice.

COR. ninguna.

ESTAMB. *Filamentos* doce , alesnados , la mitad mas cortos
que el caliz : con las *anteras* oblongas y pegadas en
medio de los filamentos.

PIST. *Germen* baxo de la flor , ó recogido dentro de la
substancia del caliz : *estilo* cilindráceo , de la longi-
tud de los estambres : con el *estigma* estrellado y
partido en seis lacinias redobladas.

PERIC. *Capsula* correosa , puesta dentro de la substancia
del caliz , y de seis celdillas poco mas ó menos.

SEM. muchas , y aovadas.

CHARACT. GENER. DE TOURN. p. 501.

La *flor* es estambrosa , ó que consta de muchos estam-
bres , que salen del caliz dividido en tres partes ; la parte
de mas abaxo del mismo caliz , pasa á fruto angulado , re-
partido en seis celdillas y lleno de simientes oblongas.

ESPECIES.

- Euro-
pæum. 1. ASARUM foliis reni-
formibus obtusis binis. Mill. de riñon, obtusas y de dos
ic. t. 53. Flor. dan. t. 633. en dos.
Mat. Med. p. 137.
- Asarum foliis reniformi-
bus, subhirsutis.* Hall. helv. Asaro de hojas en forma
de riñon, y con algun pelo
n. 1547. áspero.
- Asarum foliis subcorda-
tis petiolatis.* Hort. Cliff. Asaro con hojas casi de fi-
gura de corazon y peciola-
178. das.
- Asarum.* C. B. P. 197. Asaro.
Cam. epit. 19. Dod. pempt.
358. Bauh. hist. 3. p. 548.
Tourn. p. 501.

Cast. Asaro de Europa.

Habita en los bosques de Europa: en Cataluña: montes
de Burgos, Lievana, Asturias y otras partes de Espa-
ña. ¶

PROPIED. La raiz es algo amarga, acre y nauseosa: exce-
lente vomitiva y purgante, diurética, diaforética,
emenagoga, errina: y se usa en la melancolía y co-
ryza.

- Can-
dense. 2. ASARUM foliis reni-
formibus mucronatis. Asaro con hojas en forma
de riñon, y que rematan en
punta rígida.
- Asarum foliis subcorda-
tis petiolatis.* Gron. virg. 52. Asaro de hojas casi de fi-
gura de corazon y con pe-
ciolo.
- Asarum Canadense, mu-
cronato folio.* Moris. hist. 3. Asaro del Canadá, con
hoja que remata en punta rí-
p. 511. sect. 13. t. 7. f. 4. gida.
- Asarum Canadense.* Corn. Asaro del Canadá.
Canad. 24. t. 25.
- Asarum Americanum,*
majus. Tourn. p. 501. Asaro mayor, de Ameri-
ca.

Cast. Asaro del Canadá.

Ha-

Habita en el Canadá. 24

Acaso es variedad de la antecedente?

Virgi-
nicum.

3. ASARUM *foliis cor-*
datis obtusis glabris petio-
latis. Asaro con hojas de figura
de corazon, obtusas, lampi-
ñas y pecioladas.

Asarum Virginianum, Asaro de Virginia, con
Pistolochie foliis subrotun-
dis, Cyclaminis more macu-
latis. Pluk. Alm. 53. t. 78. hojas como las de la Pistolo-
chia, casi redondas y man-
chadas al modo que las del
f. 2. Moris. hist. 3. p. 511. Cyclamen ó sea Panporci-
sect. 17. t. 7. f. 3. Tourn. no.
p. 501.

Cast. Asaro de Virginia.

Habita en la Virginia: tierra Mariana y Carolina.

719. Género BOCCONIA. † *Plum.* 25.

Jacq. Amer. 146.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de dos hojuelas, aovado, obtuso, cóncavo y que se cae al abrirse la flor.

COR. ninguna,

ESTAMB. *Filamentos* doce, cortísimos: con las *anteras* lineares, muy grandes y de la longitud del caliz.

PIST. *Germen* casi redondo, encogido por una y otra parte, grande y con piececito: *estilo* uno, hendido en dos lacinias: con los *estigmas* sencillos y redoblados.

PERIC. casi aovado, adelgazado por ambas partes, alargado y ensanchado, comprimido, de una celdilla y lleno de pulpa.

SEM. una sola y globosa.

ESPECIE.

Frutes
cens.

1. BOCCONIA. Hort. Boconia frutescente.

Bocconia ramosa, Sphon-
dy i folio tomentoso. Plum. Boconia ramosa, con hoja
gen. 55. Trew. ehr. t. 4. como la del Esphondilio y
tomentosa.

Boc-

DE XI. HASTA XIX. ESTAMB. Y I. PIST. 9

Bocconia ramosa, foliis majoribus, sinuatis, racemis terminalibus. Brown. jam. 244. *Boconia ramosa*, con hojas mayores, sinuosas; y racimos terminales.

Chelidonium majus, arboreum, foliis Quercinis. Sloan. jam. 82. hist. 1. p. 195. t. 125. *Celidonia mayor*, arborea; con hojas como las de la Encina.

Cocoxihvitl. Hern. Mex. 158. *Cocoxihvitl*.

Cast. *Boconia frutescente*.

Habita en las Islas de Santo Domingo, Jamaica, Cuba y México. $\frac{h}{2}$

Varía con seis estambres. *Willich*.

720. Género GETHYLLIS. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. Espata lanceolada, de una pieza, inflada, con una flor y membranosa.

CÓR. de un petalo, encima del germen: tubo filiforme, larguísimo: borde plano, igual, tres veces mas corto que el tubo, partido en seis lacinias, lanceoladas é iguales.

ESTAMB. Filamentos de doce hasta diez y ocho, setáceos, sentados en el tubo, cortos, derechos, los cuales se hallan acercados por su base, de dos en dos, ó de tres en tres, de manera que están insertos en seis series: con las anteras oblongas.

PIST. Germen oblongo, sentado, dentro de la espata, baxo del receptáculo de la corola: estilo filiforme, del largo de los estambres: con el estigma hendido en tres partes y obtuso.

PERIC. Capsula oblonga, ventricosa, de tres ángulos, y de tres celdillas.

SEM. numerosas.

Vease el género 541. baxo el mismo nombre *Gethyllis*.

E S P E C I E .

Afra. 1. GETHYLLIS. Hort. \times Gethyllis Africana.
Cliff. 493. \times

Cast. Gethyllis de Africa.

Habita en Africa.

Su estatura es como la del *Azafran*.

721. Género BASSIA. *Autore D. Koenig.*

C A R . G E N . N A T .

CAL. *Periantio* de quatro hojuelas , correosas , aovadas y persistentes.

COR. de un *petalo* , á manera de campana : *tubo* inflado , aovado , carnoso : *borde* mas corto que el tubo , partido en ocho lacinias , aovadas y derechitas.

ESTAMB. *Filamentos* diez y seis , ocho sobre la garganta y ocho dentro del tubo : con las *anteras* entre lineares y á manera de saeta , agudas , vellosas ácia dentro y mas cortas que la corola.

PIST. *Germen* encima de la flor , aovado : *estilo* alesnado , y al doble mas largo que la corola : con el *estigma* agudo.

PERIC. *Drupa* carnosa y lactescente.

SEM. *Nueces* cinco , oblongas y de tres lados.

E S P E C I E .

Longi-
folia. 1. BASSIA. \times Bassia con hoja larga.
*Ilippe Malabar*s. Koenig. \times *Ilippe* , llamada asi por los
mss. \times de Malabár.

Cast. Bassia de hoja larga.

Habita en Malabár. $\frac{h}{2}$

Es *arbol* muy alto , con sus ultimas ramas encorvadas ácia atrás , gruesecitas y con vello de color gris. Echa las *hojas* en las ultimas ramitas , alternas , acercadas , con *peciolo* , entre aovadas y lanceoladas , enterisimas , agudas , venosas , desnudas , del largo de medio pie , y que se caen facilmente : los *peciolos* algo rollizos y cortos :
uno

DE XI. HASTA XIX. ESTAMB. Y I. PIST. 11

uno hasta cinco *pedunculos* axilares, sencillos, filiformes, de una flor, derechos, y despues de haber florecido alargados y pendulos.

722. Género RHIZOPHORA. † Mangles. Plum. 15.

CAR. GEN. NAT.

- CAL. *Periantio* abierto, partido en quatro lacinias oblongas, puntiagudas y persistentes.
- COR. *Petalos* quatro, oblongos y mucho mas cortos que el caliz.
- ESTAMB. *Filamentos* muy cortos (*quatro, ocho, hasta doce*), alternadamente mas baxos: con las *anteras* pequeñas y puntiagudas.
- PIST. *Germen* dentro de la flor, casi redondo: *estilo* alesnado, medio hendido en dos partes, señalado en una y otra parte con un surco: y los *estigmas* agudos.
- PERIC. carnososo, casi aovado, y que encierra solamente la base de la semilla.
- SEM. una sola, entre de figura de masa y oblonga, puntiaguda y carnosa por su base.
- OBS. 1.^a Los *estambres* y *petalos* varían en el número; como igualmente las *lacinias* del caliz.
- OBS. 2.^a *Receptáculo* aovado: *germen* alesnado: *estilo* ninguno: *estigma* agudo, larguísimo y puesto sobre el receptáculo carnososo. *Wernisch*.

ESPECIES.

- Conjugata. 1. RHIZOPHORA *foliis ovato-oblongis obtusiusculis integerrimis, calycibus sessilibus, fructibus cylindraceo-subulatis*. Flor. Zeyl. 181. Rhizophora con hojas entre aovadas y oblongas, algo obtusas, enterisimas; cálices sentados; y frutos entre cilindricos y alesnados.
- Anonyma*. Herm. pict. 279. *Anonyma*.
Burm. ind. 108. R.
- Cast.* Rhizophora apareada.
Habita en la India. *h*

- Gym-
norhy-
za. 2. RHIZOPHORA *foliis ovato-lanceolatis integerrimis, radice terræ super imposita.* Rhizophora con hojas entre ovadas y lanceoladas, enterisimas; y la raíz puesta sobre la haz de la tierra.
Mangium celsum. Rumph. Mangio alto.
Amb. 3. p. 102. t. 68.
Candel. Rheed. Malab. 6. Candel.
p. 57. t. 31. 32. Rai. hist.
1769. Burm. ind. p. 168.
- Cast. Rhizophora con la raíz descubierta.
Habita en las riberas saladas de las Indias. h
- Can-
del. 3. RHIZOPHORA *foliis obtusis, pedunculis bigeminatis folio longioribus, fructibus subulatis.* Rhizophora con hojas obtusas; quatro pedunculos, que salen de dos en dos de un mismo punto, mas largos que la hoja; y frutos alesnados.
Tsierou-Kandel. Rheed. Tsierou-Kandel.
Malab. 6. p. 63. t. 35. Rai.
hist. 1770. Burm. ind. 108.
- Cast. Rhizophora candel.
Habita en terrenos salados de la India. h
- Corni-
culata. 4. RHIZOPHORA *foliis ovatis, floribus confertis, fructibus arcuatis acuminatis.* Rhizophora con hojas ovadas; flores amontonadas; frutos arqueados y puntiaguados.
Mangium fruticosum, corniculatum. Rumph. Amb. Mangio fruticoso, con frutos como cuernecillos.
3. 117. t. 77. Burm. ind. 108.
- Cast. Rhizophora de cuernecillos.
Habita en las Molucas. h
- Man-
gle. 5. RHIZOPHORA *foliis acutis, fructibus subulato-clavatis.* Rhizophora con hojas agudas; y frutos entre alesnados y de figura de maza.

Rhizophora pedunculis bifidis trifidisque, fructibus subulato-clavatis. Jacq. Amer. 141. t. 89. Rhizophora con pedunculos hendidos unos en dos partes, otros en tres; y frutos entre alesnados y de figura de masa.

Candela Americana, foliis Laurinis. Catesb. car. 2. p. 63. t. 63. Candela Americana, con hojas como las del Laurél.

Mangles aquatica, foliis subrotundis & punctatis. Plum. gen. 13. Mangle aquatico; con hojas casi redondas y punteadas.

Mangle Pyrifoliis, cum siliquis longis, Ficui Indicæ affinis. Bauh. hist. 1. p. 415. Rai. hist. 1772. Mangle parecido á la Higuera de Indias; con hojas como las del Peral; y siliquas largas.

Mangium candelarium. Rumph. Amb. 3. p. 108. t. 71. 72. Mangio candelario, ó sea que produce el fruto como candelas.

Peekandel. Rheed. Malab. 6. p. 91. t. 34. Rai. hist. 1770. Peekandel.

Cast. *Rhizophora mangle.*

Habita en lugares pantanosos de tierra de los Caribes y en Malabár. $\frac{h}{2}$

Tiene las *hojas* opuestas, con lomos y pecioladas: el *caliz* hendido en quatro partes: quatro *petalos*; y ocho *estambres*.

Cylindrica. 6. RHIZOPHORA *fructibus cylindricis obtusis.* Rhizophora con los frutos cilindricos y obtusos.

Karil-Kandel. Rheed. Malab. 6. p. 59. t. 33. Rai. hist. 1770. Karil-Kandel.

Mangium minus. Rumph. Amb. 3. p. 106. t. 69. Burm. ind. 108. Mangio menor.

Cast. *Rhizophora cilindrca.*

Habita en terrenos sumideros de Malabár. $\frac{h}{2}$

Ca- 7. RHIZOPHORA *foliis* Rhizophora con hojas a-
seola- *ovatis obtusis, floribus so-* vadas, obtusas; flores soli-
ris. *litariis, fructibus orbicula-* tarias; frutos redondos, de-
tis depressis mucronatis. primidos, y que rematan en
punta rígida.

Mangium caseolare. Rum- Mangio de la figura de un
ph. Amb. 3. p. 111. t. 73. queso.
74.

Cast. Rhizophora como queso. *Llámase así, por tener el*
fruto en forma de un queso.

Habita en las Molucas. h

723. Género BLAKEA. † *Brown. t. 35.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *del fruto:* Periantio baxo del fruto, con seis hojue-
las ovales, cóncavas, extendidas y de la magnitud
de la flor:

de la flor: Periantio de un ribete encima del germen,
enterisimo, membranoso y con seis ángulos.

COR. *Petalos* seis, aovados, extendidos é iguales.

ESTAMB. *Filamentos* doce, alesnados y derechos: con las
anteras triangulares, deprimidas y encadenadas co-
mo en un anillo.

PIST. *Germen* infero, aovado al revés y coronado con el
ribete del caliz: *estilo* alesnado, del largo de la flor:
con el *estigma* agudo.

PERIC. *Capsula* aovada al revés, y de seis celdillas.

SEM. muchas.

OBS. Las *hojuelas* del periantio del fruto se hallan colo-
cadas por pares. *Wernisch.*

ESPECIES.

Tri- 1. BLAKEA *foliis triner-* Blakea con hojas de tres
nervia. *viis.* nervios.

Blakea foliis ellipticis, Blakea con hojas elipti-
trinerviis, nitidis, floribus cas, de tres nervios, lustro-
lateralibus. Brown. jam. 323. sas; y flores laterales.

t. 35.

Bla-

Blakea (trinervia) *bicaliculata*, *foliis ternerviis* (trinerviis?) *transversim subtilissime striatis*. Suppl. p. 246. *Blakea* (de tres nervios) con dos cálices; hojas sin nervios (de tres nervios?) y con estrias muy sutiles transversales.

Cast. *Blakea* de tres nervios.

Habita en la Jamaica. *h*

Posee las *hojas* entre oblongas y aovadas, con peciolo, enterisimas, correosas, opuestas, con tres nervios que sobresalen por debaxo, y de color que tira á negro: las *flores* opuestas y solitarias.

Triplinnervia.

2. *BLAKEA foliis triplinerviis*, *costatis*. Diss. alt. de plant. Surinam. 1776. *Blakea* de hojas con lomos, y tres nervios unidos mas arriba de la base.

Blakea (triplinnervia) *ecaliculata*, *foliis triplinerviis*. Suppl. p. 246. *Blakea* sin caliz del fruto; y con hojas de tres nervios unidos mas arriba de la base.

Blakea quinquenervia. Aubl. guian. p. 525. t. 210. *Blakea* de cinco nervios.

Cast. *Blakea* triplinerve.

Habita en Surinam. Dalberg. *h*

Es *arbol* de la altura de diez y seis pies. Produce las *hojas* opuestas, pecioladas, con tres nervios unidos por encima de su base, del largo de un gemo: los *peduncullos* de tres flores, de la magnitud de las del *Granado*, separadas y sin periantio del fruto: el *periantio de la flor* á manera de campana, hendido en tres ó cinco partes, correoso, persistente, con el receptáculo estriado desde la periferia al centro: cerca de siete *petalos* entre aovados y oblongos, insertos en el caliz, sin uñas, carnosos, amarillos y por dentro blancos: cerca de doce, ó quince *filamentos* casi cilindricos, prendidos en el caliz y que rematan en anteras: las *anteras* aovadas, comprimidas, paralelas, encorvadas, algo planas en su dorso, mas cortas que la corola, como si fuesen truncadas, sin estar encadenadas, sino continuadas con sus filamentos y no sentadas en ellos: el *germen* baxo del caliz: el *estilo* en forma de maza, rollizo, del largo de los *petalos*, inclinado al lado inferior de la corola y fue-

fuera del círculo de los estambres: el *estigma* en cabezuela y estriado: la *baya* casi redonda, de muchas celdillas, coronada con el caliz, cuyo disco es cóncavo y su borde recortado: con muchas *semillas*; y el *fruto* amarillo y sabroso.

Rara vez se puede conservar la *flor* en el *herbario* sin que se rompa.

724. Género BEFARIA. *Auct. Doct. Mutis.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, giboso ácia abaxo, algo hinchado, persistente, hendido en siete *lacinias* casi iguales, aovadas, agudas, arrimadas entre sí, pequeñas, y las exteriores mas anchas.

COR. *Petalos* siete, oblongos, mas anchos por arriba, obtusos, extendidos é insertos en el receptáculo.

ESTAMB. *Filamentos* catorce, alesnados, casi mas cortos que la corola y alternadamente menores: con las *anteras* oblongas y echadas.

PIST. *Germen* dentro de la flor: *estilo* rollizo, mediocre y persistente: el *estigma* gruesecito y con siete estrias.

PERIC. *Baya* sin xugo, de siete lados, deprimida, con ombligo, y de siete celdillas.

SEM. numerosas, entre oblongas y rollizas, y apifiadas.

ESPECIES.

- Æs-
tuans. I. BEFARIA *foliis lanceolatis, floribus racemosis.* Befaria con hojas lanceoladas; y flores racimosas.
Suppl. p. 247.
Icon. Mutis Amer. vol. 1. La figura que trae Mutis.
t. 7.

Cast. Befaria que abrasa.

Habita en la Nueva Granada. *Mutis.* $\frac{h}{2}$

Es semejante á la *Befaria resinosa*; pero mas alta: sus *hojas* tambien se las parecen; pero son lanceoladas.

Tiene los *pedunculos* racimosos, con los piecitos del lar-

largo de la flor , y no mas cortos que ella , como se hallan en la *Befaria resinosa*.

Resi-
nosa. 2. BEFARIA *foliis ovatis, floribus congestis*. Sup-
pl. p. 246. t. 8.  Befaria con hojas aovadas; flores amontonadas.
Icon. Mutis Amer. vol. 1. La figura que trae Mutis.

Cast. *Befaria resinosa*.

Habita en la Nueva Granada. *Mutis. h*

Es árbol que tiene las ramas proliferas, con su corteza tosca, tiernecita y algo vellosa: las hojas esparcidas, con el peciolo corto, aovadas, lisas, perennes, enterisimas y del largo de una pulgada: las flores que salen de la sumidad de las ramas y amontonadas; con los pedunculos vellosos, de una flor, y sin que estén alargados en racimos: la corola purpúrea, muy resinosa ó viscosa; y los estambres vellosos cerca de su base.

Obs. Las especies de *Befaria* tienen un sabor amargo particular, y son semejantes á las especies de *Rhododendro*.

725. Género VATICA.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, obtuso por su base, derecho, partido en cinco lacinias, lanceoladas y mas cortas que la corola.

COR. Petalos cinco, sin uñas, elipticos y grandes.

ESTAMB. Filamento ninguno: anteras quince, cortísimas, de quatro celdillas; las dos exteriores terminadas en una espina interpuesta, y las dos interiores la mitad mas cortas y sin espina.

PIST. Germen cónico, de cinco lados poco mas ó menos: estilo cilindrico y de cinco estrias: con el estigma obtuso.

PERIC.

SEM.

E S P E C I E .

Chi-
nensis.

I. VATICA.

X
X Vatica.

Cast. Vatica de la China.

Habita en la China. ♀

Su estatura se acerca á la de la *Tobera*, *Kæmpf. Amœn.* 797. ó á la del *Cidro*. Echa las *ramas* estriadas, ó anguladas y algo tomentosas: las *hojas* alternas, con peciolo, entre de figura de corazon y aovadas, enterisimas, lampiñas por ambas partes, venosas, con nervios alternos, del largo de un gеме y del ancho de quatro dedos: las *flores*, señaladamente las terminales, en panoja y de la magnitud de las del *Cidro*.

726. Género GARCINIA. † Mangostans. *Garc.*

A. A. 431. t. 1.

C A R . G E N . N A T .

- CAL.** *Periantio* de quatro hojuelas, casi redondas, cóncavas, obtusas, extendidas y persistentes.
- COR.** *Petalos* quatro, casi redondos, cóncavos, extendidos, y un poco mayores que el caliz.
- ESTAMB.** *Filamentos* diez y seis, derechos, puestos en cilindro, sencillos y mas cortos que el caliz: con las *anteras* casi redondas.
- PIST.** *Germen* dentro de la flor, casi oval: *estilo* apenas ninguno: *estigma* plano, extendido, abroquelado, hendido en ocho partes, obtuso y persistente.
- PERIC.** *Baya* correosa, globosa, grande, de una celdilla y coronada con el estigma.
- SEM.** ocho, por una parte convexâs, por la otra anguladas, con pelillos y carnosas.

E S P E C I E S .

Man-
gosta-
na. I. GARCINIA *foliis ova-* X
tis, *pedunculis unifloris.* X das; y pedunculos de una
Hort. Cliff. 182. X flor.

Man-

Mangostans. Garc. act. X Mangostan.
 Angl. 431. t. 1. Bont. jam. X

115.
Mangostana. Rumph. X Mangostana.
 Amb. 1. p. 132. t. 43. X

Laurifolia Javanensis. X Planta de Java, con hoja
 C. B. P. 461. Rai. hist. 1662. X como la del Laurel.

Cast. *Garcinia mangostana.*
 Habita en Java. h

Cele- 2. GARCINIA *foliis lan-* X *Garcinia* con hojas lance-
 bica. *ceolatis, pedunculis triflo-* X ceoladas; y pedunculos de
ris. X tres flores.

Mangostana Celebica. X Mangostana Celebica.
 Rumph. Amb. 1. p. 134. t. X
 44. X

Cast. *Garcinia Celebica* ó sea de Celebe. (*Lugar cerca de*
Macassaram).

Habita en la India. h

Cor- 3. GARCINIA *foliis lan-* X *Garcinia* con hojas lanceo-
 nea. *ceolatis aveniis, peduncu-* X ladas, sin venas; peduncu-
lis unifloris cernuis. Syst. X los de una flor y cabizba-
 veg. 368. X xos.

Lignum corneum. Rumph. X Lefio corneo.
 Amb. 3. p. 55. t. 30. X

Cast. *Garcinia cornea* ó sea de consistencia de asta.

Habita en la India. h

Obs. El *Mangio silvestre* Rumph. Amb. 3. p. 57. t. 31.
 parece distinta especie.

727. Género HALESIA. † Doct. Ellis.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, muy pequeño, encima del
 germen, con quatro dientes y persistente.

COR. de un *petalo*, en forma de campana, ventricosa, con
 su boca hendida en quatro lóbulos, obtusa y exten-
 dida.

ESTAMB. *Filamentos* doce, rara vez diez y seis, alessnados, derechos y poco mas cortos que la corola: con las *anteras* oblongas, obtusas y derechas.

PIST. *Germen* oblongo, baxo del caliz: *estilo* filiforme, mas largo que la corola: con el *estigma* sencillo.

PERIC. *Drupa* con *corteza*, oblonga, angostada por una y otra parte, de quatro ángulos membranosos y de dos celdillas.

SEM. Nuez solitaria.

ESPECIES.

Te- 1. **HALESIA** *foliis lanceolato-ovatis, petiolis glandulosis.* Halesia de hojas entre trapte- ra. lanceoladas y aovadas, con peciolo glandulosos.

Halesia fructibus membranaceo—quadrangulatis. Halesia con frutos membranosos y de quatro ángulos. Ellis. act. Angl. v. 51. p. 931. t. 22. f. A.

Frutex Padi foliis, serratis, floribus monopetalis, albis, campaniformibus, fructu crasso, tetragono. Castesb. car. 1. p. 64. t. 64. Arbusto con hojas como las del Pado, aserradas; flores de un petalo, blancas, en forma de campana; fruto craso y de quatro lados.

Cast. Halesia de quatro alas.

Habita en la Carolina. \hbar

Dipte- 2. **HALESIA** *foliis ovatis, petiolis lævibus.* Halesia de hojas aovadas, ra. con peciolo lisos.

Halesia fructibus alatis. Halesia de frutos con alas. Ellis. act. Angl. v. 51. t. 931. f. B.

Cast. Halesia de dos alas.

Habita en la Carolina. *Garden.* \hbar

Tiene las *hojas* seis veces mayores que la precedente, sin que sean tomentosas por debaxo: el *fruto* que remata en punta rígida, con dos alas opuestas muy grandes y dos menudas. Se acerca al *Estoraque arbol* en el orden natural.

728. Género DECUMARIA. † *Fabric. Willich.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* encima del germen, muy pequeño, de diez hojuelas poco mas ó menos, aovadas, de color, agudadas y redobladas.

COR. *Petalos* diez, lanceolados, obtusos, iguales, extendidos y puestos en un círculo sencillo.

ESTAMB. *Filamentos* de diez y seis hasta veinte y cinco, filiformes, del largo de la corola: con las *anteras* mellizas y deprimidas.

PIST. *Germen* cónico inverso, baxo del caliz: *estilo* cilindrico, mas corto que la corola: y *estigma* giboso, con diez convexidades poco mas ó menos.

PERIC. de diez celdillas.

SEM. solitarias.

OBS. Es género obscuro, mientras que no se conoce el *fruto*. Acaso pertenece á la clase *Dioecia*?

ESPECIE.

Bar- bara.	1. DECUMARIA.	X	Decumaria.
	<i>Tinus flore pleno.</i> Willich.	X	Tino ó sea Durillo, con
	obs. 1762. p. 40. Schreb.	X	la flor plena.
	nov. act. Ups. vol. 1. p. 87.	X	
	<i>Clusia foliis venosis.</i> Fa-	X	Clusia con hojas venosas.
	bric. helmst. 2. p. 293.	X	

Cast. Decumaria barbara.

Habita en Africa? Schreb. \bar{h}

Tiene las *ramas* con nudos que echan raices: las *hojas* opuestas, pecioladas, aovadas al revés, correosas, venosas y con aserraduras apartadas ácia su base: las *yemas* vellosas: la *panoja* corimbosa y terminal: las *flores* semejantes á las del *Tilo*, blanquecinas y muy olorosas: el *caliz* con ocho hasta diez y seis dientes y encima del germen.

729. Género WINTERANIA. † Canella.

Brown. p. 275.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, en forma de campana, hendido en tres lóbulos, redondeados y cóncavos.

COR. *Petalos* cinco, algo oblongos, sin uñas y mas largos que el caliz.

Nectario en forma de jarrito, cónico, cóncavo, truncado y del largo de la corola.

ESTAMB. *Filamento* ninguno: *anteras* diez y seis, lineares, paralelas, separadas y pegadas fuera del nectario.

PIST. *Germen* aovado, dentro del nectario: *estilo* cilindrico y que pasa por la abertura del nectario: con tres *estigmas* obtusos.

PERIC. *Baya* casi redonda, y de tres celdillas.

SEM. de dos en dos, y de figura de corazon.

OBS. Es semejante al género *Tino*.

ESPECIE.

Ca-
nella.

1. WINTERANIA. Hort. X Winterania.

Cliff. 488. Mat. Med. 137.

Laurus foliis enerviis X Laurél con hojas sin ner-
obovatis obtusis. Sp. pl. 1. X vios, aovadas al revés y ob-
p. 371. X tusas.

Canella foliis oblongis, X Canela con hojas oblon-
obtusis, nitidis, racemis ter- X gas, obtusas, lustrosas; y
iminalibus. Brown. jam. 215. X racimos terminales.
t. 27. f. 3.

Cassia lignea Jamaicen- X Casia lignea de Jamaica,
sis, Laureolæ foliis subci- X con hojas como las de la
neræis, cortice piperis mo- X Laureola, algo cenicientas;
do acri. Pluk, Alm. 89. t. 81, X y corteza acre al modo que
f. 1. X la pimienta.

Cas-

Cassia Cynamomea, seu *Casia* como Canela, ó *Cinnamomum sylvestre*, *bar-* *nela silvestre* de los de la *badensium*. Pluk. Alm. 89. Barbada.
t. 161. f. 7.

Arbor baccifera, *Laurifolia*, *aromatica*, *fructu viridi*, *calyculato*, *racemoso*. Arbol aromático, que lleva bayas ó fruto verde con caliz y en racimo; y hojas como las del Laurél.
Sloan. jam. 165. hist. 2. p. 87. t. 191. f. 2. Catesb. car. 2. p. 50. t. 50.

Cast. Winterania Canela. *Farm.* Canella alba seu cortex Winteranus.

Habita en la America. †

Produce la verdadera corteza *Winterana* ó *Magellanica* el *Drimys Winteri*: *pedunculis aggregatis terminalibus*. Forster. gen. 84. Nov. act. ups. 3. p. 181. y es distinta de la *Canela blanca*. Vease *Screber* en la materia Médica de *Linneo* p. 137.

PROPIED. La corteza es acre, estimulante, algo amarga y aromática, expelente y carminativa: se usa con admirables efectos en el escorbuto, catarro, emorragia y parálisis de la lengua.

730. Género CRATÆVA. † *Tapia*. Plum. 21.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, plano por su base, que se cae quando las demas partes de la flor, hendido en quatro laciniás extendidas, aovadas y desiguales.

COR. *Petalos* quatro, oblongos, inclinados á un mismo lado; con uñas delgadas, del largo del caliz, é insertos en sus divisiones.

ESTAMB. *Filamentos* diez y seis, ó mas, setáceos, mas cortos que la corola, y declinados al lado opuesto á los petalos: con las *anteras* derechas y oblongas.

PIST. *Germen* aovado, con un piececito filiforme, larguísimo: *estilo* ninguno: *stigma* sentado y en cabezuela.

PERIC. *Baya* carnosa, globosa, muy grande, con piececito, y de una celdilla.

SEM:

SEM, muchas, casi redondas, escotadas y metidas dentro de la pulpa.

ESPECIES.

Gynandra 1. CRATÆVA *inermis*, foliis integerrimis, floribus gynandris. Crateva inerme, de hojas enterisimas; y flores con los estambres sentados en los pistilos.

Cratæva arborea, triphylla, foliis ovatis, glabris, racemis terminalibus. Brown. Jam. 246. Crateva arborea, con hojas de tres en rama; hojuelas aovadas, lampiñas; y racimos terminales.

Arbor Americana, triphylla, numerosis staminibus purpureis apicibus præditis, floris umbilicum occupantibus. Pluk. phyt. t. 147. f. 6. Arbol de America, con hojas de tres en rama; numerosos estambres, con sus anteras purpúreas y que ocupan el centro de la flor.

Cast. *Cratæva gynandra.*

Habita en la Jamaica. $\frac{h}{2}$

Se diferencia de la *Cratæva tapia* por las hojas delgadas; y por los petalos lanceolados.

Tapia. 2. CRATÆVA *inermis*, foliis integerrimis, foliolis lateralibus basi antica brevioribus. Crateva inerme, con las hojas enterisimas, y las hojuelas laterales mas cortas por su base anterior.

Apioscorodon seu Arbor Americana triphyllus, allii odore, poma ferens. Pluk. Alm. 34. t. 137. f. 7. Apioscorodon ó Arbol Americano, con hojas de tres en rama; de olor de ajo y que lleva pomas.

Malus Americana, trifolia, fructu pomi Aurantii instar colorato. Comm. hort. 1. p. 129. t. 67. Manzano de America, con hojas de tres en rama; y fruto de color como el de la naranja.

Anona trifolia, flore stamineo, fructu spherico, ferrugineo, scabro, minore, allii odore. Sloan. jam. 208. hist. 2. p. 169. Rai. dendr. 79. Anona con hojas de tres en rama; flor estambrosa; fruto esférico, ferrugineo, áspero, mas pequeño; y con olor de ajo.

- Nurruala*. Rheed. Malab. X Nurruala.
 3. p. 49. t. 22. Rai. hist. 1644. X
Tapia arborea, triphylla. X *Tapia arborea*, con hojas
 Plum. gen. 22. t. 21. R. X de tres en rama.
Tapia. Marcgr. bras. 98. X *Tapia*.
 Pis. bras. 68. t. 69. R. X

Cast. *Crateva Tapia*.
 Habita en las Indias. $\frac{h}{2}$

- Mar- 3. CRATÆVA *spinosa*, X *Crateva* espinosa, con ho-
 melos. *foliis serratis*. Fl. Zeyl. 212. X jas aserradas.
Cucurbitifera trifolia, spi- X Planta de Indias, espino-
nosa, Indica, fructu pulpa X sa, que lleva calabazas; con
Cydonii æmula. Pluk. Alm. X hojas de tres en rama; y fru-
 125. t. 170. f. 5. X to con pulpa semejante á la
 del Membrillo.
Cydonia exotica. C. B. P. X Membrillo exótico.
 425.
Bilacus. Rumph. Amb. 1. X Bilaco ó sea fruto en for-
 p. 197. t. 81. X ma de huevo.
Covalam. Rheed. Malab. X Covalam.
 3. p. 37. t. 37. Burm. ind. X
 109. X

Cast. *Crateva marmelos*.
 Habita en la India. $\frac{2}{3}$

Tiene el *caliz* hendido en cinco partes: acaso *petalo* nin-
 guno? bien que *Miller* cuenta cinco. Será tal vez de
 distinto género?

731. Género TRIUMPHETTA. * Plum. 8.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de cinco hojuelas, lanceoladas, con arista
 baxo de su ápice, y que se caen quando las demas
 partes de la flor.

COR. *Petalos* cinco, lineares, derechos, obtusos, cóncavos,
 doblados ácia atrás, y con arista baxo de su
 ápice.

ESTAMB. *Filamentos* diez y seis, iguales, ascendentes, de
 la

la longitud de la corola , alesnados y derechos : con las *anteras* sencillas.

PIST. *Germen* casi redondo : *estilo* de la longitud de los estambres : con el *estigma* hendido en dos partes y agudo.

PERIC. *Capsula* globosa, rodeada por todas partes de aguijones ganchosos ; y de quatro celdillas.

SEM. de dos en dos , por una parte convexâs , y por la otra anguladas.

E S P E C I E S .

Lappula.

1. **TRIUMPHETTA fo-** X Triumphetta con hojas es-
liis basi emarginatis , flori- X cotadas por su base ; y flores
bus ecalyculatis. X sin caliz.

Triumphetta fructu echi- X Triumphetta con el fruto
nato, racemoso. Plum. gen. 40. X erizado y racimoso.
 icon. 255.

Lappula Bermudensis, X Lappula de la Bermuda ,
Althæoides, spicata, fructu X parecida al Malvavisco , es-
orbiculari, majore. Pluk. X pigada ; con el fruto redon-
 Alm. 206. t. 245. f. 7. X do y mayor.

Agrimonia Lappacea, ino- X Agrimonia como Lappa ó
dora, folio subrotundo den- X sea ganchosa , sin olor ; con
tato. Sloan. jam. 92. hist. 1. X hoja casi redonda y denta-
 p. 211. Rai. Suppl. p. 247. X da.

Cast. Triumphetta lappula.

Habita en las Bermudas , Jamaica y Brasil. $\frac{h}{2}$

Bartramia.

2. **TRIUMPHETTA fo-** X Triumphetta con hojas en-
liis basi integris indivisis. X teras por su base é indivisas.

Triumphetta (rhomboidea) X Triumphetta (como rombo),
floribus calyculatis, foliis X de flores con caliz ; y hojas
rhombeo-ovatis. Jacq. Amer. X entre de figura de rombo y
 147. t. 90. X aovadas.

Bartramia. Flor. Zeyl. X Bartramia.
 174. Sp. pl. 1. p. 389. X

Lappula Benghalensis, *tetraspermos*, *Ribesii folio*, *echinis orbiculatis ad foliorum ortum plurimis*, *sessilibus*. Pluk. Alm. 206. t. 41. f. 5.

Lappula de Bengala, con quatro simientes; hoja como la del Ribes; y muchos erizos redondos y sentados en el origen de las hojas.

Agrimonia Maderaspatana, *folio rotundo*, *singulari*, *subtus incano*. Pet. gaz. 31. t. 42. f. 10.

Agrimonia de Madraspatan, con hojas de una en una, redondas y por debaxo tomentosas.

Lappago Amboinica. Rumph. Amb. 6. p. 59. t. 25. f. 2.

Lampazo de Amboina.

Cast. Triumphetta bartramia.

Habita en la India. ☉

La *Oriental* posee las *hojas* redondas y anguladas; pero la *Occidental* las tiene mas de figura de rombo é indivisas.

Semitriloba 3. **TRIUMPHETTA** *foliis semitrilobis*, *floribus completis*.

Triumphetta con hojas medio hendidas en tres lóbulos; y flores completas.

Triumphetta fructibus calyculatis, *foliis semitrilobis*. Jacq. Amer. 147.

Triumphetta de frutos con caliz; y hojas medio hendidas en tres lóbulos.

Cast. Triumphetta medio hendida en tres lóbulos.

Habita en la America mas caliente. h

Es muy parecida á la *Triumphetta lappula*; pero las *flores* tienen caliz.

Annua 4. **TRIUMPHETTA** *foliis ovatis indivisis*, *rarius lobatis*.

Triumphetta con hojas aovadas, indivisas, y muy pocas veces hendidas en lóbulos.

Triumphetta foliis oblongo-ovatis, *obtusis*, *serratis*, *petioliis longissimis*. Mill. ic. 199. t. 29.

Triumphetta de hojas entre oblongas y aovadas, obtusas, aserradas y con peciolos larguissimos.

Cast. Triumphetta annua.

Habita en la India Oriental. ☉

732. Género PEGANUM. * Harmala.

Tourn. t. 133.

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de cinco hojuelas, lineares, las mas veces dentadas, derechas, de la longitud de la corola, agudas y persistentes.
- COR.** *Petalos* cinco, entre oblongos y aovados, y entre derechos y extendidos.
- ESTAMB.** *Filamentos* quince, alesnados, la mitad mas cortos que la corola y ensanchados por su base en un *nectario* baxo del germen: con las *anteras* oblongas y derechas.
- PIST.** *Germen* entre de tres lados y casi redondo, elevado con el receptáculo desde la base de la flor: *estilo* filiforme, rollizo, del largo de las anteras: con el *estigma* oblongo y de tres caras.
- PERIC.** *Capsula* entre de tres lados y casi redonda, de tres celdillas y tres ventallas.
- SEM.** muchas, aovadas y puntiagudas.
- OBS.** Varía con el *estilo* de tres caras; y con tres *estigmas* mas largos que el estilo: y el número que á veces se excluye en el pistilo, se añade á los estambres; y vice versa.

CARACT. GENÉR. DE TOURNEF.

HARMALA. P. 257.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco; de cuyo caliz sale el pistilo que pasa á fruto casi redondo, de tres capsulas (*celdillas*) y lleno de simientes oblongas.

ESPECIES.

- Har- I. PEGANUM *foliis mul-* Pegano con hojas hendi-
mala. *tifidis*. Gmel. Sib. 4. p. 177. *das* en muchas partes.
n. 96.
- Ruta sylvestris*, flore *Ruda silvestre*, con la flor
magno, albo. C. B. P. 336. *grande y blanca.*

Har-

Harmala. Dod. pempt. X *Harmala*.

121. Tourn. p. 257.

Ruta quæ dici solet Harmala. Bauh. hist. 3. p. 200. X *Harmala*.

Cast. Pegano *harmala*. vulgo: Gamârza.

Habita en los contornos de Madrid y en varias partes de Aragon: en Alexandria, Capadocia, Galacia y Siberia. ¶

La *lexia* de las cenizas de esta planta son muy utiles para limpiar los lienzos; las semillas tostadas se venden en Turquia, y la comen los Turcos, causandoles una embriaguez alegre. Linn. Amœn. Acad.

Dau- 2. PEGANUM *foliis indivisis*.

X *Pegano* con hojas indivi-
sas.

Ruta foliis simplicibus, alternis. Gmel. Sib. 4. p. 176. t. 68. f. 1. X *Ruda* con hojas sencillas y alternas.

Harmala montana, Daurica, perennis, multicaulis, Polygalæ folio, flore albo. Amm. ruth. 91. X *Harmala montana*, de Dauria, perenne; con muchos tallos; hoja como la de la Polygala; y flor blanca.

Harmala montana, Polygalæ foliis, floribus luteis. Amm. ruth. 92. X *Harmala montana*, con hojas como las de la Polygala; y flores amarillas. α

Cast. Pegano daurico.

Habita en Siberia. ¶

733. Género HUDSONIA.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* tubuloso, cilindrico, con su boca abierta, de tres hojuelas, entre lanceoladas y lineares y obtusas.

COR. ninguna.

ESTAMB. *Filamentos* quince, capilares, mas cortos que el caliz: con las *anteras* casi redondas.

PIST. *Germen* dentro de la flor, aovado: *estilo* filiforme, de la longitud del caliz: con el *estigma* obtuso.

PE-

PERIC. *Capsula* cilíndrica, la mitad mas corta que el caliz, de una celdilla y tres ventallas.

SEM. tres, por una parte redondeadas, y por la otra con ángulos.

E S P E C I E.

Eti-
coides

1. HUDSONIA.

Ericæ-formis suffrutex X Hudsonia.
Virginianus, floribus exiguis, vasculo seminali oblongo, trifariam diviso. Pluk. X Mata de Virginia, en forma de Brezo, con flores pequeñas; vaso seminal ó sea capsula oblonga y dividida X en tres partes.
 mant. 88.

Cast. Hudsonia como Brezo.

Habita en la Virginia. $\frac{h}{2}$

Es arbusto con traza de Brezo. Tiene las ramitas filiformes, colocadas sin orden y apiñadas; y las ultimas como si estuviesen salpicadas de yemas foliaceas: las hojas entre alesnadas y á manera de alfileres, con pelo áspero, las tiernas mas pelosas y blanquecinas: los pedunculos que salen de las yemas de las hojas, mas largos que ellas, solitarios y filiformes: el caliz derecho y vellosos.

734. Género NITRARIA. * *Act. petrop. VII.*

p. 315. t. 10.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, hendido en cinco partes, derecho, muy corto y persistente.

COR. *Petalos* cinco, oblongos, extendidos, acanalados, arqueados por su ápice, con una punta doblada ácia dentro.

ESTAMB. *Filamentos* quince, alesnados, derechos, del largo de la corola: con las *anteras* casi redondas.

PIST. *Germen* aovado, terminado en *estilo* gruesecito y mas largo que los estambres: con el *estigma* sencillo.

PERIC. *Drupa* de una celdilla, entre aovada y oblonga y puntiaguda.

SEM.

DE XI. HASTA XIX. ESTAMB. Y I. PIST. 31

SEM. una sola , de tres celdillas , aovada y puntiaguda.

E S P E C I E .

Scho-
eri.

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. NITRARIA. Act. nov. X | Nitraria. |
| petrop. 7. p. 315. t. 10. Mur- | |
| ray. Prodr. 191. f. 2. | |
| <i>Osyris foliis obtusis</i> . X | Osyride con hojas obtu- |
| Gmel. Sib. 2. p. 237. t. 98. X | sas. |
| <i>Casia fructu nigro</i> . Amm. X | Casia con fruto negro. |
| ruth. 256. X | |

Cast. Nitraria de Schobero.

Habita en las aguas saladas de la laguna Vranscinense, y lugares cercanos de Astracan y rio Volga. \bar{h}

735. Género PORTULACA. * Tourn. t. 118.

Anacampseros. edit. 1. Telephiastrum.

Dill. elth. 280.

C A R . G E N . N A T .

CAL. Periantio hendido en dos partes, pequeño, encima del germen, comprimido por su ápice y persistente.

COR. Petalos cinco, planos, derechos, obtusos y mayores que el caliz.

ESTAMB. Filamentos muchos, capilares, la mitad mas cortos que la corola: con las anteras sencillas.

PIST. Germen casi redondo: estilo simple y corto: con cinco estigmas oblongos y del largo del estilo.

PERIC. Capsula cubierta, aovada, de una celdilla: y receptáculo libre.

SEM. muchas y pequeñas.

C A R A C T . G E N E R . D E T O U R N . p . 236.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco; de cuyo caliz de una pieza, y hendido en dos partes, sale el pistilo, que junto con él, pasa á fruto aovado, lleno de semillas pequeñas, y adornado en su extremidad con dos cascarras, las quales (siendo la ex-
te-

terior la parte hendida del caliz, y la interior el pistilo ultimamente ensanchado) se abren transversalmente en dos partes, quedando la inferior ó la otra parte del caliz fixada en un piececito.

E S P E C I E S.

- Ole-
racea. **I. PORTULACA foliis** Verdolaga con hojas en
cuneiformibus, floribus ses- forma de cuña; y flores senta-
silibus. Mat. Med. p. 138. tadas.
Roy. Lugdb. 473.
- Portulaca foliis dilatatis,* Verdolaga con hojas en-
laevibus, sessilibus, confertis. sanchadas, lisas, sin pecio-
Hall. helv. n. 968. lo y amontonadas.
- Portulaca foliis cuneifor-* Verdolaga con hojas en
mibus, verticillatis, sessili- forma de cuña, puestas en
bus, floribus sessilibus. verticilo, sentadas; y flores
Hort. Cliff. 207. sin pedunculo.
- Portulaca angustifolia, si-* Verdolaga de hoja angos-
ve sylvestris. C. B. P. 288. ta ó silvestre.
Tourn. p. 236.
- Portulaca sylvestris, mi-* Verdolaga silvestre, me-
nor, seu spontanea. Bauh. nor, ó espontánea.
hist. 3. p. 678.
- Portulaca sylvestris.* Dod. Verdolaga silvestre.
pempt. 661.
- α *Portulaca latifolia, sive* Verdolaga de hoja ancha
sativa. C. B. P. 288. Tourn. ó sática. α
p. 236.
- Portulaca hortensis, lati-* Verdolaga hortense, de ho-
folia. Bauh. hist. 3. p. 678. ja ancha.
- Portulaca sativa.* Dod. Verdolaga sática ó que se
pempt. 661. siembra.

Cast. Verdolaga de hortaliza.

Habita en la India y America: y es frecuente en España. ☉

La capsula de esta especie se abre al través. Varía en el número de los pistilos y estambres.

PROPIED. Es diluyente, humectante, refresca y corrobora: se usa en la nausea, escorbuto, estranguria y cálculo: y algunos la comen por ensalada.

- Pilosa.** 2. *PORTULACA foliis subulatis alternis, axillis pilosis, floribus sessilibus terminalibus.* Verdolaga con hojas alesnadas, alternas; axilas pelosas; flores sentadas y terminales.
- Portulaca Curassavica, angusto, longo lucidoque folio, procumbens.* Comm. hort. 1. p. 9. t. 5. Tourn. p. 236. Verdolaga de Curasao, tendida; con hoja angosta, larga y lustrosa.
- Portulaca lanuginosa, procumbens, Vermiculatæ foliis, Americana.* Pluk. Alm. 304. t. 247. f. 7. Verdolaga Americana, lanuginosa, tendida; con hojas como las de la Vermicular.
- Portulaca Curassavica, lanuginosa, Psyllii folio, erectior & elatior, flore dilutius rubente.* Herm. par. 214. t. 214. Verdolaga de Curasao, lanuginosa, mas derecha y mas alta; con hoja como de la Zaragatona; y flor de color que tira á roxo mas claro. α
- Portulaca Curassavica, lanuginosa, Kali folio, erectior & elatior.* Pluk. Alm. 303. t. 105. f. 4. Verdolaga de Curasao, lanuginosa, mas derecha y mas alta; con hoja como la del Kali.

Cast. Verdolaga pelosa.

Habita en la America Meridional. ⊙

Posee las *hojas* alternas; pero ocho *terminales ó florales* puestas en cerco: las *flores* sentadas, terminales; con el *caliz* hendido en dos partes: quince *estambres*: el *estilo* hendido en cinco lacinias; y la *capsula* que se abre al través.

- Quadrifida** 3. *PORTULACA bracteatis quaternis, floribus quadrifidis, caule geniculis pilosis.* Verdolaga con bracteas de quatro en quatro; flores hendidas en quatro lacinias; y tallo con sus nudos pelosos.
- Portulaca Linifolia.* Forsk. ægypt. p. 92. R. Verdolaga con hoja como la del Lino.
- Portulaca lanuginosa, procumbens, flore luteo.* Herm. par. 216. Verdolaga lanuginosa, tendida; con flor amarilla.

Sedum minus, Arabicum, X Sedo menor, de Arabia;
flore luteo, foliis planis, mu- X con flor amarilla; y hojas
cronatis. Pluk. mant. 169. X planas, terminadas en pun-
 X ta rígida.

Cast. Verdolaga hendida en quatro partes.

Habita en Egipto. ☉

Echa la *raiz* fibrosa: los *tallos* postrados, numerosos, rollizos, alternos, ramosos, lisos, del largo de medio pie, con sus nudos que arrojan raíces y pelosos: las *hojas* opuestas, extendidas, apartadas, entre aovadas y lanceoladas, carnosas, lisas, sin peciolo, enterisimas, concavas por debaxo y salpicadas de puntitos diáfanos: los *piececitos que florecen* terminales, pero laterales quando mas crecidos, de una flor, encrasados por arriba, del largo de las hojas, terminados con *bracteas* de quatro en quatro, ó cruzadas, extendidas y semejantes á una hoja: la *flor* de color amarillo-roxo, sentada y ceñida con pelos blancos: el *periantio* de dos ventallas, membranoso y aovado: la *corola* dividida en quatro partes, entre aovada y oblonga, y que se marchita: ocho *filamentos* setáceos, encorvados por su base ácia fuera y del largo de la corola: con las *anteras* casi redondas: el *germen* baxo de la flor, redondeado: el *estilo* cilindrico, mas grueso por arriba, del largo de los estambres: con quatro *estigmas* oblongos, obtusos, encorvados ácia atrás y vellosos: la *capsula* aovada, de quatro lados poco manifestos, un poco aguda, de una celdilla, y que se abre al través, con muchas semillas algo redondas y adornadas de puntitas.

Ha- 4. PORTULACA *foliis* X Verdolaga con hojas oblon-
 Jimoi- *oblongis carnosis, caule co-* X gas, carnosas; tallo corim-
 de 6. *rymboso, floribus sessili-* X boso; y flores sentadas.
bus. X

Portulaca erecta, Sedi mi- X Verdolaga derecha, con
noris facie, capitulo tomen- X traza de Sedo menor; y ca-
roso. Sloan. jam. 88. hist. 1. X bezuela tomentosa.
 p. 205. t. 129. f. 3. X

*Halymus minimus, foliis oblongis succulentis, tumen-
tibus, summis ramulis den-
sissime sitis.* Brown. jam.
206. Halimo muy pequeño, con
hojas oblongas, xugosas, hin-
chadas, y colocadas muy
densamente en las ramitas
mas altas.

Cast. Verdolaga como Halimo.

Habita en la Jamaica. ☉

Tiene el caliz de dos hojuelas; y la capsula que se abre
al través.

Trian- 5. PORTULACA (race- Verdolaga (*racimosa*) com
gularis mosa) *foliis obovatis pla-
niusculis, racemo simplici* hojas aovadas al revés, algo
triquetro. Sp. pl. 3. p. 620. tres caras.

Portulaca (triangularis) Verdolaga (*triangular*)
*pedunculis multifloris, trian- con pedunculos de muchas
gularibus.* Jacq. Amer. 147. flores y triangulares.

Obs. 1. p. 35. t. 23.

*Helianthemum frutes- Helianthemo frutescente,
cens, Portulaca folio.* Plum. con hoja como la de la Ver-
spec. 7. t. 150. f. 2. dolaga.

Cast. Verdolaga triangular.

Habita en las playas del mar de America. ♀

Posee el caliz de dos hojuelas; y la capsula con tres ven-
tallas.

Ana- 6. PORTULACA *foliis* Verdolaga con hojas aovadas, gibosas; pedunculo
camp- *ovatis gibbis, pedunculo* de muchas flores; y tallo
seros. *multifloro, caule frutico- fruticoso.*
so.

*Anacampseros foliis ova- Anacampsero con hojas
tis convexis acutiusculis.* aovadas, convexas y algo
Hort. Ups. 146. agudas.

Telephiastrum sylvestre, Falso-Telephio silvestre,
folio globoso. Dill. elth. 375. con hoja globosa.
t. 281. f. 363.

*Portulaca Africana, sem- Verdolaga Africana, siem-
pervirens, flore rubicundo.* preverde; con la flor rubi-
Comm. hort. 2. p. 177. t. 89. cunda.

Rai. Suppl. p. 507.

Cast. Verdolaga anacampsero.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Tiene las *hojas* xugosas y sus *axilas* pelosas: la *capsula* con tres ventallas; y el *caliz* de dos hojuelas.

Pa- 7. PORTULACA *foliis* \times Verdolaga con hojas entre
tens. *lanceolato-ovatis planis*, \times lanceoladas y aovadas, pla-
panicula ramosa, calycibus \times nas; panoja ramosa; y cáli-
diphyllis. Jacq. hort. t. 151. \times ces de dos hojuelas.

Portulaca (paniculata) \times Verdolaga (de panoja) con
floribus paniculatis. Jacq. \times flores en panoja.
Amer. 148. \times

Cast. Verdolaga extendida.

Habita en la America. \hbar

Arroja el *tallo* del largo de un pie y dobladizo: las *ra-
mas* alternas, lisas, de quatro lados; y las *inferiores* mas
largas: las *hojas* alternas, con peciolo corto, entre lan-
ceoladas y aovadas, algo xugosas, del largo de media
pulgada, enterisimas, aquilladas y frágiles: la *panoja*
terminal, alargada, con sus piecitos filiformes y ahor-
quillados: el *caliz* roxo, y de dos hojuelas: cinco *peta-
los* aovados y roxos: las *anteras* amarillas: tres *estilos*:
la *capsula* globosa, de una celdilla, y con tres venta-
llas duplicadas: muchas *semillas* y negras. Es enteramente
distinta de la *Verdolaga fruticosa*.

Fruti- 8. PORTULACA *foliis* \times Verdolaga con hojas aovadas al revés, algo planas;
cosa. *obovatis planiusculis, pe-* \times pedunculos racimosos; cáli-
dunculis racemosis, calyci- \times ces de cinco hojuelas; y ta-
bus pentaphyllis, caule fru- \times llo fruticoso.
ticoso. Syst. veg. p. 371. \times

Portulaca (paniculata) fo \times Verdolaga (en panoja) con
liis ovatis planis, panicula \times hojas aovadas, planas; y pa-
racemosa. Sp. pl. 3. p. 640. \times noja racimosa.

Portulaca Americana, la- \times Verdolaga Americana, le-
xifolia, erecta, floribus al- \times vantada; con hojas anchas y
bis. Comm. hort. 1. p. 7. \times flores blancas.

t. 4. \times

Cast. Verdolaga fruticosa.

Habita en lugares maritimos de America. \hbar

Tie-

Tiene la *capsula* con tres ventallas; y las *flores* blancas.

Meri-
diana.

9. PORTULACA *foliis ellipticis carnosis planis, geniculis pilosis, floribus sessilibus terminalibus.* Verdolaga con hojas elip-
Sup- ticas, carnosas, planas; nu-
y dos pelosos; flores sentadas
y terminales.

pl. p. 248.

Portulaca Curassavica, lanuginosa, procumbens. Verdolaga de Curasao,
lanuginosa y tendida.

Herm. par. t. 215. non vero
descriptio.

Cast. Verdolaga meridiana.

Habita en la India Oriental. ☉

Produce los tallos de la estatura del *Sedo acre*, filiformes, herbáceos, rastreros, articulados, ramosos, rollizos, laxos y de color roxo: los nudos que arrojan raices, y salpicados de algunos pelos: las hojas entre elípticas y lanceoladas, lisas, algo carnosas, terminales, opuestas, y tambien de quatro en quatro: las flores amarillas, terminales, solitarias, sentadas, ceñidas de lana y de quatro hojas: el caliz muy tierno, de dos hojuelas aovadas, agudas y rubicundas. Varía en el número de los estambres, y florece á las doce del dia.

736. Género LYTHRUM. * Salicaria. Tourn. r. 129.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, cilindráceo, estriado, con doce dientecitos alternadamente menores.

COR. Petalos seis, oblongos, algo obtusos, extendidos, é insertos por sus uñas en las incisiones del caliz.

ESTAMB. Filamentos doce; filiformes, del largo del caliz, y los superiores mas cortos que los inferiores: con las anteras sencillas y levantadas.

PIST. Germen oblongo: estilo alesnado, del largo de los estambres y declinado: con el estigma redondo.

PERIC. Capsula oblonga, puntiaguda, cubierta, y de dos celdillas.

SEM. numerosas y pequeñas.

OBS. En algunas especies se excluye la sexta parte del número

mero de las de la flor: en otras se hallan seis *estambres* solamente; y el *Lythro con hoja de Tomillo* no tiene mas que dos.

CARACT. GENER. DE TOURNEF.

SALICARIA. P. 253.

La flor es rosácea, ó de muchos petalos que nacen en cerco y de las incisiones del caliz tubulado; de cuyo fondo sale el pistilo que pasa á fruto ó vaso aovado, de dos capsulas (*celdillas*) lleno de simientes pequeñas, fixadas al receptáculo y envuelto con el mismo caliz.

E S P E C I E S.

Salicaria,	1. LYTHRUM <i>foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodecandris.</i> Flor. dan. t. 671.	Lythro con hojas opuestas, entre de figura de corazón y lanceoladas; flores en espiga y de doce estambres.
	<i>Lythrum floribus verticillatis.</i> Flor. lapp. 197.	Lythro con flores verticiladas.
	<i>Salicaria foliis lanceolatis, subhirsutis, floribus spicatis.</i> Hall. helv. n. 854.	Salicaria de hojas lanceoladas, con algun pelo áspero; y flores en espiga.
	<i>Lysimachia spicata, purpurea.</i> C. B. P. 246.	Lysimachia espigada, con la flor de color purpúreo.
	<i>Salicaria vulgaris, purpurea, foliis oblongis.</i> Tourn. n. 253.	Salicaria vulgar, con la flor purpúrea; y hojas oblongas.
	<i>Lysimachia purpurea, communis, major.</i> Clus. hist. 2. p. 51.	Lysimachia comun, mayor; con la flor purpúrea.
	<i>Blattaria rubra, spicata major, folio subrotundo.</i> Moris. hist. 2. p. 490. sect. 5. t. 10. f. 11.	Blattaria mayor, espigada; con la flor encarnada; y hoja casi redonda, *

Cast. Lythro Salicaria.

Habita en Europa en las orillas de las aguas: en el rio Manzanares, Soto-Luzon y Migas-calientes: en Cataluña, Aragon y otras muchas partes de España. ¶

Varia con *hojas* de tres en tres, ó de quatro en quatro.

PRO-

PROPIED. *Es adstringente, vulneraria y refrigerante: y se usa con muy buenos efectos en la diarrea, disenteria y fluxos de sangre.*

Virga-
tum.

2. LYTHRUM foliis oppositis lanceolatis, panicula virgata, floribus dodecandris ternis. Gmel. Sib. 4. p. 175.

Lythro con hojas opuestas, lanceoladas; panoja en varitas; flores de doce estambres, y de tres en tres.

Lythrum (Austriacum) foliis oppositis, lineari-lanceolatis, subsessilibus nitidis. Jacq. Vind. 243. Austr. t. 7.

Lythro (*de Austria*) con hojas opuestas, entre lineares y lanceoladas; casi sin peciolo y lustrosas.

Salicaria Orientalis, Salicis folio, acutissimo & glabro. Tourn. cor. 18.

Salicaria Oriental, con hoja como la del Sauce, muy aguda y lampiña.

Salicaria glabra, ramosissima, longissimis & angustissimis foliis. Amm. ruth. 89.

Salicaria lampiña, muy ramosa; con hojas larguissimas y muy angostas.

Lysimachia rubra, non siliquosa. C. B. P. 246.

Lysimachia de flor encarnada, y que no tiene siliquas.

Lysimachia rubra, secunda seu minor. Clus. hist. 2. p. 51.

Lysimachia segunda ó menor, de flor encarnada.

Cast. Lythro de varitas.
Habita en Austria, Siberia y Tartaria. 24
Tiene el tallo en panoja; con ramas alternas y largas: dos ó tres flores con piececito que salen alternadamente de cada axila del racimo: y varía alguna vez con hojas alternas.

Frutic-
osum

3. LYTHRUM foliis oppositis subtus tomentosis, floribus decandris, corollis calyceque genitalibus brevioribus.

Lythro con hojas opuestas, tomentosas por debaxo; flores de diez estambres; corolas y caliz mas cortos que los genitales.

Cast. Lythro fruticoso.
Habita en la China. 25

Es arbusto que tiene la corteza lacerada : las hojas opuestas, sin peciolo, lanceoladas, enterisimas y por debajo algo tomentosas : las flores solitarias, pedunculadas y casi terminales,

Verticillatum. 4. LYTHRUM foliis oppositis subtomentosis, subpetiolatis, floribus verticillatis lateralibus. Lythro de hojas opuestas, algo tomentosas, con algun peciolo ; flores verticiladas y laterales.

Lythrum foliis oppositis, floribus verticillatis. Gron. Lythro con hojas opuestas ; y flores verticiladas. virg. 52.

Cast. Lythro verticilado.

Habita en la Virginia.

Los pedunculos son cortísimos y de muchas flores.

Petiolatum. 5. LYTHRUM foliis oppositis linearibus petiolatis, floribus dodecandris. Lythro con hojas opuestas, lineares, pecioladas ; y flores de doce estambres.

Lythrum foliis petiolatis. Gron. Lythro de hojas con peciolo. virg. 52.

Cast. Lythro peciolado.

Habita en la Virginia.

Lineare. 6. LYTHRUM foliis oppositis linearibus, floribus oppositis hexandris. Lythro con hojas opuestas, lineares ; flores opuestas y de seis estambres.

Lythrum foliis linearibus, floribus hexandris, solitariis. Gron. Lythro con hojas lineares ; flores de seis estambres y solitarias. virg. 162.

Cast. Lythro linear.

Habita en la Virginia.

Produce el tallo filiforme, derecho, angulado, con hojas opuestas y lineares ; terminado en una espiga mayor, con dos laterales mas pequeñas, compuestas de flores opuestas, apartadas ; y de una hoja baxo de cada una. Su traza es como la del Lythro de hoja de Hysopo.

Par-
onsia. 7. LYTHRUM foliis op-
positis ovalibus, floribus
sessilibus alternis hexan-
dris, caule diffuso. Lythro con hojas opues-
tas, ovales; flores sentadas,
alternas, de seis estambres;
y tallo desparramado.
Parsonsia herbacea, foliis
ovatis oppositis, floribus
singularibus, foliis ad al-
terum latus interpositis. Parsonsia herbácea, con
hojas aovadas, opuestas; y
flores de una en una, inter-
puestas; con hojas al uno de
los dos lados.
Brown. jam. 199. t. 21. f. 2.

Cast. Lythro parsonsia.

Habita en la Jamaica. 24

Tiene los tallos postrados: las *hojas* casi sentadas, desnudas, enterisimas y con tres nervios: los *racimos* alternos; y las *flores* solitarias, alternas y sentadas.

Mela-
nium. 8. LYTHRUM foliis op-
positis ovatis, floribus al-
ternis subdecandris, caule
postrato. Lythro con hojas opues-
tas, aovadas; flores alternas,
con diez ó doce estambres;
y tallo postrado.
Melanium herbaceum, re-
clinatum, foliis ovatis op-
positis, floribus singulari-
bus ad alas alternas. Brown.
jam. 217. Melanio herbáceo, recli-
nado, con hojas aovadas,
opuestas; y flores de una en
una, en las axilas alternas.

Cast. Lythro melanio.

Habita en la Jamaica. 24

ysso-
folia. 9. LYTHRUM foliis al-
ternis linearibus, floribus
hexandris. Jacq. Austr. t.
133. Lythro con hojas alternas,
lineares; y flores de seis es-
tambres.

Salicaria foliis lineari-
bus, floribus in alis sessi-
libus. Hall. helv. n. 855. Salicaria con hojas linea-
res; y flores sentadas en las
axilas.

Hyssopi folia. C. B. P.
218. Planta con hoja como la
del Hysopo.

Salicaria Hyssopi folio
latiore. Hall. Rupp. jen. 147.
t. 6. f. 3. Tourn. p. 253. Salicaria con hoja como
la del Hysopo, pero mas an-
cha.

- Lysimachia Linifolia*, \times *Lysimachia* con hoja co-
purpureo-cærulea. C. B. P. \times mo la del Lino; y flor entre
 246. \times purpúrea y cerúlea. α

Cast. Lythro con hoja de Hysopo.

Habita en lugares inundados de Alemania, Suiza, Ingla-
 terra y Francia: y en los mismos pareces de España
 que el Lythro *Salicaria*. \odot

Arroja los tallos postrados, algo rígidos, ramosos y en
 varitas: las *hojas* alternas, sentadas, entre lineares y
 lanceoladas, obtusas y enterisimas: las *flores* axilares y
 solitarias: el *caliz* tubuloso, con cinco ó seis dientes
 extendidos: seis *petalos* de color purpúreo, pero blancos
 en su base; y seis *estambres* mas cortos que el caliz.

Thy- 10. LYTHRUM *foliis al-* \times Lythro con hojas alternas,
 mifo- *ternis linearibus, floribus* \times lineares; y flores de quatro
 lia. *tetrapetalis*. \times petalos.

Salicaria minima, tenui- \times *Salicaria* muy pequeña,
folia. Tourn. p. 254. \times con hoja delgada.

Hysopifolia minor, seu \times Planta marítima, menor;
potius Thymifolia, mariti- \times con hoja de Hysopo, ó mas
ma. Bauh. hist. 3. p. 792. \times bien de Tomillo.

Polygonum aquaticum, \times *Polygono* aquático, me-
minus. Barr. ic. 773. f. 2. \times nor.

Cast. Lythro con hoja de Tomillo.

Habita en lugares sumideros de Italia, Francia Narbo-
 nense y de España. \odot

Tiene quatro *petalos*: dos *estambres*: y el *caliz* con qua-
 tro dientes: las *hojas* entre lineares y lanceoladas, al-
 ternas y las de abaxo opuestas: las *flores* solitarias,
 axilares y sentadas: el *caliz* apoyado con dos brácteas
 laterales; y el tallo derecho.

Cu- 11. LYTHRUM *foliis op-* \times Lythro con hojas opues-
 phe- *positis petiolatis ovato-* \times tas, pecioladas, entre aova-
oblongis scabriusculis, flo- \times das y oblongas, algo ásper-
ribus dodecandris. Suppl. p. \times ras; y flores de doce estam-
 249. \times bres.

Cuphea viscosissima. Jacq. \times *Cufea* muy viscosa.
 hort. vol. 2. p. 83. t. 177. \times

Balsamona pinto. Van-
dell. fasc. 1771. p. 15. t. 3.

Balsamona pinto.

Cast. Lythro cufea.

Habita en lugares sombríos y húmedos del Brasil. *Doct.*

Latourette. ○

Produce la raiz fibrosa : el tallo rollizo , derecho , del largo de un pie , con vello viscoso y de color purpúreo : las ramas alternas y sencillas : las hojas opuestas , pecioladas , entre aovadas y oblongas , pestafiosas y enterisimas : las flores de color purpúreo , laterales ; con pedunculo muy corto , solitarias y hechadas : el caliz de una pieza , cilindrico , hinchado mas arriba de su base , con doce estrias , veloso , viscoso , de seis dientes , y el superior mas ancho : la corola de seis petalos , insertos en la garganta del caliz , con los dos del lado superior mayorcitos : el nectario de una escama redoblada , dentro de la parte gibosa del caliz : doce estambres puestos en la garganta del mismo caliz : la capsula algo oblonga y de una celdilla : muchas simientes en forma de lenteja y ultimamente negras.

La capsula junto con el caliz , antes de madurarse , se rompen longitudinalmente , y sale el receptáculo de las semillas del lado interior , subiendo con ellas inmaduras , para que descubiertas se maduren ; del mismo modo que lo hace la *Phryma*.

12. LYTHRUM glaber-
rimum, foliis oppositis subsessilibus lanceolatis integris, pedunculis axillaribus oppositis, capitulo trifloro. Suppl. p. 249.

Lythro muy lampiño , con hojas opuestas , casi sin peciolo , lanceoladas , enteras ; pedunculos axilares , opuestos ; y cabezuela de tres flores.

Cast. Lythro de tres flores.

Habita en la America. ¶

Se distingue facilmente de las demas especies , por los pedunculos filiformes , terminados en dos bracteas lanceoladas , acanaladas , extendidas y mas largas que la flor , entre las quales se hallan tres flores iguales , con piececito corto , pequeñas y de color cerúleo.

Pem-
phis.

13. LYTHRUM *fruticosum hirsutum*, *foliis oppositis oblongis integris*, *floribus axillaribus pedunculatis solitariis*, *capsula circumscissa uniloculari*. Suppl. p. 249.

Lythro fruticoso, con pelo áspero; hojas opuestas oblongas, enteras; flores axilares, pedunculadas, solitarias; capsula que se abre al través y de una celdilla.

Pemphis acidula. Forst. gen. n. 34. t. 34.

Pemphis algo agria.

Cast. Lythro pemphis.

Habita en las playas del mar de Zeylan. \mathcal{L}

Es *arbusto* blanquecino; con sus *hojas* acercadas, y puestas en la sumidad de las ramas. Tiene el *caliz* con doce dientecitos desiguales: seis *petalos* insertos en el caliz y blancos: doce *estambres*: la *capsula* cónica inversa, de una celdilla y que se abre al través.

Ra-
cimo-
sum.

14. LYTHRUM *diffusum*, *foliis oppositis petiolatis ovatis*, *racemis terminalibus*, *floribus oppositis*.

Lythro difuso, de hojas opuestas, con peciolo, aovadas; racimos terminales y flores opuestas.

Cast. Lythro racimoso.

Habita en la America Meridional. *Mutis*.

Es *planta* sufruticosa y desparramada. Echa las *hojas* aovadas, enterisimas y venosas: los *racimos* largos, terminales, ó que salen de la ahorquilladura: las *flores* apartadas, opuestas en pares, largas, pedunculadas, derechas y con brácteas aovadas; y los *extremos* de las *ramitas*, los *cálices* y *piececitos* con pelo viscoso.

Dipe-
talum.

15. LYTHRUM. *hispidoviscosum*, *foliis ternis seu oppositis sessilibus ovatis*, *floribus axillaribus nutantibus dipetalis*. Suppl. p. 250.

Lythro con pelo rígido y viscoso; hojas de tres en tres, ú opuestas, sin peciolo, aovadas; flores axilares, inclinadas y de dos petalos.

Cast. Lythro de dos petalos.

Habita en la America. *Mutis*. \mathcal{H}

Es *arbusto* con pelo rígido, viscoso, y de color obscuro.

Atroja las *ramas* alternas: las *hojas* sentadas, entre aovadas.

vadas y oblongas, enterisimas, muy ásperas por todas partes, con pelo rígido y por encima relucientes; las inferiores verticiladas, de quatro en quatro, ó de tres en tres; y las de las ramitas opuestas: las flores axilares, con piececito é inclinadas: el caliz linear, erizado y viscoso: dos petalos mayores, insertos en la margen superior del caliz, aovados al revés, derechos y de color de violeta ó cerúleo.

737. Género GINORA. Jacq. Amer. 148.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza: tubo en forma de campana: borde hendido en seis laciniás, lanceoladas, extendidas, de color y persistentes.

COR. *Petalos* seis, casi redondos, extendidos, mas largos que el caliz é insertos en su cuello; con uñas largas.

ESTAMB. *Filamentos* doce, alesnados, extendidos, de la longitud del caliz, é insertos en él: con las anteras en forma de riñon.

PIST. *Germen* casi redondo, deprimido: *estilo* alesnado, del largo de la corola y persistente: con el *estigma* obtuso.

PERIC. *Capsula* entre deprimida y casi redonda, lustrosa, de color, con tres ó quatro surcos, de quatro ventallas, de una celdilla, y que se abre por su ápice.

SEM. muchas y menudas. *Receptáculo* casi redondo y grande.

ESPECIE.

1. GINORA. Jacq. Amer. $\begin{matrix} \times \\ \times \\ \times \end{matrix}$ Ginora.
148. t. 91.

Cast. Ginora de America.

Habita en las playas pedregosas de los rios de la Isla de Cuba. \bar{h}

Es arbusto hermoso con traza de *Myrto*.

738. Género DODECAS. *Suppl. p. 36.*

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* encima del germen, de una pieza, cónico inverso, medio hendido en quatro *lacinias*, aovadas y extendidas.
- COR.** *Petalos* quatro, sin *uñas*, insertos en el caliz y casi redondos.
- ESTAMB.** *Filamentos* doce, capilares, mas cortos que el caliz, é insertos en el receptáculo: con las *anteras* oblongas.
- PIST.** *Germen* medio dentro de la flor: *estilo* filiforme, mas largo que los estambres: con el *stigma* sencillo.
- PERIC.** baxo de la flor, aovado, de una celdilla, coronado con el caliz extendido, dentro del qual se halla el remate de la capsula descubierto, y de quatro ventallitas.
- SEM.** numerosas, oblongas y menudas.
- OBS.** Acaso es especie de *Fussieua*.

ESPECIE.

Surinamensis

1. DODECAS. *Suppl. p. X* Dodecas.
245. *X**Cast.* Dodecas de Surinam.*Habita* en Surinam. *Dalberg. f.*

Es *arbusto* con traza de *Licio barbaro*, liso, casi de quatro lados, y que lleva las ramas opuestas y cortas: las *hojas* tambien opuestas, entre aovadas y oblongas, ó de figura de cuña, con *peciolo* corto, lisas, obtusas y enterisimas: los *pedunculos* axilares, de una flor, solitarios y del largo del caliz: dos *bracteas* menudas, baxo del caliz: el *caliz*, antes de abrirse, de quatro lados, de quatro ventallas, por debaxo cónico inverso y rollizo: los *petalos* insertos en las divisiones del caliz: los *estambres* prendidos en el receptáculo junto al germen y no en el caliz.

ORDEN II.

DIGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOS PISTILOS.

739. Género HELIOCARPUS. * Montia.

Houst. A. A.

CAR. GEN. NAT.

- CAL. *Periantio* de color, con quatro hojuelas, lineares, largas, algo anchas, extendidas, y que se caen quando las demas partes de la flor.
- COR. *Petalos* quatro, lineares, mucho mas cortos que el caliz y mas angostos.
- ESTAMB. *Filamentos* diez y seis, alesnados, casi de la longitud del caliz: con las *anteras* mellizas, lineares y echadas.
- PIST. *Germen* casi redondo: *estilos* dos, sencillos, derechos, del largo de los estambres: con los *estigmas* agudos y apartados.
- PERIC. *Capsula* entre cónica-inversa y aovada, con pedunculo, comprimida, de dos celdillas, y ceñida por una y otra parte perpendicularmente con rádios pinados ó sea adornados con otros rádios.
- SEM. solitarias, y casi aovadas.

ESPECIE.

- 1. HELIOCARPUS. Hort. \times Heliocarpo.
- Cliff. 211. t. 16. Trew. ehret. \times
- t. 45. \times
- Cast. Heliocarpo de America.
- Habita en Veracruz. \bar{h}

740. Género AGRIMONIA. * *Tourn. t. 155.*

Agrimonoides. *Tourn. t. 155.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, hendido en cinco partes; agudo, pequeño, encima del germen, persistente y rodeado de otro caliz.

COR. *Petalos* cinco, planos, escotados; con *uñas* angostas, é insertos en el caliz.

ESTAMB. *Filamentos* capilares, mas cortos que la corola, prendidos en el caliz: con las *anteras* pequeñas, mellizas y comprimidas.

PIST. *Germen* baxo del caliz: *estilos* dos, sencillos, de la longitud de los estambres: con los *estigmas* obtusos.

PERIC. ninguno: el *caliz* coartado por su cuello, y endurecido hace sus veces.

SEM. dos, y casi redondas.

OBS. Varía en el número de los *petalos* y de los *estambres*, hallandose estos en algunas especies en número de diez, ó doce, y en otras de siete.

CARACTERES GENERICOS DE TOURNEFORT.

AGRIMONIA. p. 301.

La *flor* es rosácea ó que consta de muchos *petalos* puestos en cerco, y sentados en el caliz; el qual (*es el germen*) pasa á fruto oblongo, como erizado, y lleno de una ú otro semilla oblonga.

AGRIMONOIDES. p. 301.

La *flor* es rosácea ó que consta de muchos *petalos* que salen de las divisiones del caliz. Su *flor* junto con el caliz se hallan abrazados de otro caliz, en forma de embudo, y como hendido en flucos: y despues el primero pasa á fruto entre aovado y puntiagudo, envuelto con el segundo, y lleno comunmente de una sola semilla.

ESPECIES.

- Eupa-
oria.
1. AGRIMONIA *foliis caulinis pinnatis, impari petiolato, fructibus hispidis*. Flor. dan. t. 588. Mat. Med. 138. Agrimonia con hojas del tallo pinnadas, la hojuela impar peciolada; y los frutos erizados.
- Agrimonia foliis pinnatis, pinnis alterne minimis*. Hall. helv. n. 991. Agrimonia con hojas pinnadas; y las hojuelas alternadamente muy pequeñas.
- Agrimonia officinarum*. Tourn. p. 301. Agrimonia de las oficinas.
- Agrimonia sive Eupatorium*. Dod. pempt. 28. Agrimonia ó Eupatorio.
- Eupatorium veterum, sive Agrimonia*. C. B. P. 321. Eupatorio de los antiguos ó Agrimonia.
- Eupatorium odoratum*. Lob. advers. 308. Eupatorio oloroso. α

Cast. Agrimonia Eupatorio.

Habita en los prados y caminos de Europa: en los contornos de Madrid y es frecuente en las mas provincias de España. 24

PROPIED. Es adstringente, corroborante, expelente, diuretica y vulneraria.

- Re-
ens.
2. AGRIMONIA *foliis caulinis pinnatis, impari sessili, fructibus hispidis*. Agrimonia con las hojas del tallo pinnadas, la hojuela impar sentada; y los frutos erizados.
- Agrimonia Orientalis, humilis, radice crassissima, repente, fructu in spicam brevem & densam congesto*. Tourn. cor. 21. Agrimonia Oriental, baxa; con la raiz muy crasa, rastrera; y fruto amontonado en espiga corta y densa.

Cast. Agrimonia rastrera.

Habita en Oriente.

Es muy parecida á la *Agrimonia Eupatorio*; pero posee los tallos mas cortos, mas crasos y con pelo áspero: las estipulas del largo de los intersticios, redobladas y que

casi cubren todo el tallo : la *hojuela impar* sin peciolo: la *espiga* corta , espesa y sentada ; con las *bracteas* del largo de las flores.

Agri-
monoi-
des.

3. AGRIMONIA *foliis caulinis ternatis, fructibus glabris.* Hort. Cliff. 179. Agrimonia con las hojas del tallo de tres en rama ; y frutos lampiños.
Scop. carn. 2. n. 568.

Agrimoniae similis. C. B. P. 321. Planta parecida á la Agrimonia.

Agrimonoides. Col. ecphr. 1. p. 145. t. 144. Barr. ic. 612. Tourn. p. 301. Planta que se parece á la Agrimonia.

Cast. Agrimonia como Agrimonia.

Habita en bosques sombríos de Italia y Carniola. ♀

No suele tener mas de ocho *estambres*.

Pro-
cum-
bens.

4. AGRIMONIA *foliis pinnatis hirsutis, caule procumbente, fructibus undique hispido-uncinatis.* Suppl. p. 251. Agrimonia de hojas pinnadas, con pelo áspero ; tallo tendido ; frutos por todas partes erizados con pelos rígidos y ganchosos.

Cast. Agrimonia tendida.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ♀

Echa las *hojas* radicales , pinnadas , y como las de la *Potentilla Anserina*, con veinte *hojuelas* poco mas ó menos , iguales , aserradas , aovadas y muy vellosas : los *tallos* del largo de un pie , tendidos , casi sin hojas , muy sencillos y que se reducen á un racimo : los *frutos* aovados , tomentosos , con púas ganchosas puestas baxo del caliz , comunmente de una *semilla* ; y con un solo *pistilo*.



ORDEN III.

TRIGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON TRES PISTILOS.

741. Género RESEDA. * *Tourn. t. 238. Luteola.*
Tourn. t. 238. Sesamoides. Tourn. t. 238.

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de una pieza, partido en lacinias angostas, agudas, derechas y persistentes, de las cuales dos se hallan mas abiertas para el uso del petalo melifero.
- COR.** *Petalos* algunos, desiguales, con algunos siempre medio hendidos en tres partes; el *superior* giboso en su base, melifero y de la longitud del caliz.
- Nectario:** una glandula, plana, derecha, alargada desde el receptáculo y colocada en el lado superior, entre los estambres y el petalo de mas arriba, y que se arrima con la base de los petalos ensanchada por su mismo lado.
- ESTAMB.** *Filamentos* once hasta quince, cortos: con las *anteras* derechas, obtusas y del largo de la corola.
- PIST.** *Germen* giboso, y que remata en algunos *estilos* cortísimos: con los *estigmas* sencillos.
- PERIC.** *Capsula* gibosa, angulada, puntiaguda mediante los estilos, que abre su boca entre ellos, y de una celdilla.
- SEM.** muchas, en forma de riñon, y pegadas á los ángulos de la capsula.
- OBS.** 1.^a Apenas se halla algun género cuyo caracter sea mas dificultoso de determinar; pues varía en el número y figura en diversas especies.
- El caracter esencial consiste en los petalos hendidos en tres lacinias, con el uno melifero por su base, y la capsula siempre abierta por su boca.
- La *Reseda Luteola* tiene el *periantio* partido en quatro lacinias: tres *petalos*, el de mas arriba melifero, hendido en seis lacinias, y los laterales opuestos, hendidos en tres; pero algunas veces se le añaden

dos *petalos* mas abaxo , muy pequeños y enteros.

La *Reseda alba* posee el *periantio* dividido en seis partes : seis *petalos* casi iguales , y todos hendidos en tres lacinias : quatro *estilos* : la *capsula* quadrangular ; y siempre once *estambres*.

Otras especies producen el *periantio* dividido en cinco partes : cinco *petalos* desemejantes , hendidos en tres lacinias : tres *estilos* ; y muchos *estambres*.

OBS. 2.^a *Periantio* dividido en quatro , cinco , ó seis partes : *petalos* tres , quatro , cinco , ó seis , de los cuales algunos siempre se hallan hendidos en tres lacinias , y uno giboso por su base y melifero. *Wernisch*.

CARACTERES GENERICOS DE TOURNEFORT.

RESEDA. p. 423.

La *flor* es de muchos *petalos* , anómala , esto es , que consta de muchos *petalos* desemejantes ; de cuyo caliz sale el pistilo que pasa á *capsula* membranacea , de tres ó quatro lados , oblonga , ó como cilíndrica , y llena de semillas casi redondas.

LUTEOLA. p. 423.

La *flor* consta de muchos *petalos* , y es anómala , esto es , que consta de muchos *petalos* desemejantes ; de cuyo caliz sale el pistilo que pasa á fruto casi globoso , cóncavo con tres puntas , y lleno de semillas algo redondas.

SESAMOIDES. p. 424.

La *flor* es como la de la *Reseda* , pero con muchos frutos ; algunos de figura de cuernecillos , y en cada uno se encierra una semilla en forma de riñon ; y otros de muchas *capsulas* estrelladas.

ESPECIES.

Luteola.

1. RESEDA *foliis lanceolatis integris basi utrinque unidentatis, calycibus quadrifidis.* Mill. dict. n. 8.

Reseda de hojas lanceoladas, enteras, con un diente en ambas partes de su base; y cálices hendidos en cuatro lacinias.

Reseda foliis ellipticis, obtuse lanceolatis, undulatis, calycibus quadrifidis. Hall. helv. n. 1058.

Reseda con hojas elípticas, obtusamente lanceoladas, ondeadas; y cálices hendidos en cuatro lacinias.

Luteola herba, Salicis folio. C. B. P. 100. Tourn. p. 423.

Luteola yerba, con hoja como la del Sauce.

Lutea Plinii, quibusdam. Bauh. hist. 3. p. 465.

Amarilla de Plinio, llamada así por algunos autores.

Cast. Reseda amarillita. *vulgo*: Gualda.

Habita en la Europa: en los contornos de Madrid: en la Real Casa de Campo, y en otras varias provincias de España, donde la siembran y venden á los Tintoreros para dar el color amarillo. ☉

Canescens.

2. RESEDA *foliis lanceolatis undulatis pilosis.*

Reseda con hojas lanceoladas, ondeadas y pelosas.

Reseda foliis subulatis, sparsis. Sauv. monsp. 48.

Reseda con hojas alesnadas y esparcidas.

Reseda foliis simplicibus, oblongis, integris. Guet. estamp. 1. p. 225.

Reseda con hojas sencillas, oblongas y enteras.

Reseda alba, minor. C. B. P. 100.

Reseda blanca, menor.

Sesamoides flore albo, foliis canescentibus. Tourn. p. 424.

Planta como Sesamo, con la flor blanca; y hojas que encanecen.

Sesamoides Salmanticum, parvum. 2. Clus. hist. 1. p. 296.

Planta como Sesamo, pequeña, que se cria en Salamanca. 2.^a de *Clusio*.

Cast. Reseda que encanece.

Habita en los contornos de Madrid: en la Mancha, Alcar-

carria, Salamanca y otras partes de Castilla la vieja. ²⁴
 Echa el tallo del largo de un pie, derecho y con pelos blancos: las ramas que salen de las axilas superiores mas tardias: las hojas alternas, sin peciolo, lanceoladas, con su quilla pelosa, algo pestañosas, enterisimas, sin diente y ondeadas: el racimo terminal: las flores blancas: once estambres; con las anteras amarillas: y seis gérmenes sentados en un piecечito comun.

Glauc.
ca.

3. RESEDA *foliis linearibus basi dentatis, floribus tetragynis.* Reseda con hojas lineares, dentadas por su base; y flores de quatro pistilos.

Reseda Linariæ foliis. C. Reseda con hojas como las de la Linaria.
 B. P. 100. Prodr. 42. Burs. IV. 88.

Reseda Linariæ folio, glauca, pyrenaica, flore stamineo. Moris. hist. 3. p. 601. sect. 15. t. 1. f. 4. Reseda pirenaica, de color garzo; con hoja como la de la Linaria; y flor estambrosa.

Reseda Linariæ folio, pyrenaica, glauco folio. Pluk. Alm. 317. t. 107. f. 2. Rai. Suppl. p. 511. Reseda pirenaica, con hoja como la de la Linaria y de color garzo.

Luteola pumila, pyrenaica, Linariæ folio. Tourn. p. 424. Luteola pirenaica, enana; con hoja como la de la Linaria.

Cast. Reseda de color garzo.
 Habita en los Pirineos.

Purpuras-
cens.

4. RESEDA *foliis linearibus obtusis, floribus pentagynis.* Reseda con hojas lineares, obtusas; y flores de cinco pistilos.

Sesamoides Salmanticum, parvum. 1. Clus. hist. 1. p. 296. Planta como Sesamo, pequeña, que se cria en Salamanca. 1.^a de Clusio.

Sesamoides foliis crassis, floribus ex herbaceo purpurascens. Tourn. p. 424. Planta como Sesamo, con hojas crasas; y flores de color que de verde tira á purpúreo.

Cast. Reseda de color que tira á purpúreo.

Ha-

Habita en Mompeller y en los collados de Salamanca.

Se-
samoi-
des. 5. RESEDA *foliis lanceo-* X Reseda con hojas lanceo-
latis integris, fructibus stel- X ladas, enteras; y frutos es-
latis. X trellados.

Sesamoides fructu stella- X Planta como Sesamo, con
to. Tourn. p. 424. X el fruto estrellado.

Cast. Reseda como Sesamo.

Habita en Mompeller y en los montes del Escorial, señaladamente por encima de la Granjilla de los Padres Gerónimos.

Fruti-
culosa. 6. RESEDA *foliis pinna-* X Reseda con hojas pinna-
tis apice recurvatis, flori- X das, encorvadas ácia atrás
bus tetragynis, calycibus X por su ápice; flores de qua-
quinquepartitis patentibus, X tro pistilos; cálices partidos
caule basi fruticoso. X en cinco lacinias, extendi-
X das; y tallo fruticoso en su
X base.

Cast. Reseda algo fruticosa.

Habita en la Alcarria: en el Piúl de Ribas y otras partes de España entre las piedras. ¶

La raiz ó tallo cortísimo, dos veces mas grueso que el dedo pulgar, permanece sobre la tierra, saliendo de su remate muchos tallos, ascendentes, lisos y con estrias elevadas. Produce las hojas pinnadas, con cinco ó siete hojuelas, lanceoladas, escurridas, algo ondeadas, lisas, y encorvadas ácia atrás por su ápice: muchas espigas alternas, y las mas aventajadas ácia el remate del tallo: cinco ó seis petalos blancos, hendidos en tres lacinias, mayores que el caliz; y once estambres.

Alba. 7. RESEDA *foliis pinna-* X Reseda con hojas pinna-
tis, floribus tetragynis, X das; flores de quatro pistilos;
calycibus sexpartitis. X y cálices partidos en seis la-
X cinias.

Reseda foliis pinnatis in- X Reseda con hojas pinna-
tegerrimis. Hort. Cliff. 212. X das y enterisimas.

Sesamoides magna. La- X Planta como Sesamo, gran-
gun. 468. X de.

Re-

Reseda maxima. C. B. P. X Reseda muy grande.
100. Lob. hist. 110. X

Cast. Reseda blanca.

Habita en Mompeller : en los cerros y faldas del Real Sitio de Aranjuez ; en la Alcarria y otras partes de España. ○

Undata.

8. RESEDA *foliis pinnatis undulatis, floribus trigynis tetragynisve.* X Reseda con hojas pinnadas, ondeadas ; y flores de tres ó quatro pistilos.

Reseda minor, foliis incisis. Bar. rar. 78. t. 588. X Reseda menor, con hojas cortadas.

Cast. Reseda ondeada.

Habita en los contornos de Madrid y otras partes de España. ♯

Posee el tallo del largo de un pie, angulado, con estrias, enjuto y rígido : las *hojas radicales y del tallo* pinnadas ; con las *hojuelas* lanceoladas, escurridas, agudas, ondeadas, alternadamente mas pequeñas y mas derechas ; pero las *hojas superiores* no tienen las *hojuelas* alternadamente menores : los *racimos* terminales : el *caliz* partido en cinco lacinias : cinco *petalos* hendidos en tres partes y blancos : las *anteras* amarillas : tres *pistilos* en unas flores, y en otras quatro hasta cinco ; y las *capsulas* muy grandes.

Lutea.

9. RESEDA *foliis omnibus trifidis, inferioribus pinnatis.* Jacq. Austr. t. 352. X Reseda con todas las hojas hendidas en tres partes, pero las inferiores pinnadas.

Reseda hexapetala, foliis pinnatis undulatis, calyce sexfido. Hall. helv. n. 1056. X Reseda con seis petalos ; hojas pinnadas, ondeadas ; y caliz hendido en seis partes.

Reseda vulgaris. C. B. P. X Reseda vulgar.
100. Rai. hist. 1053. Tourn. p. 423.

Reseda lutea. Bauh. hist. X Reseda amarilla.
3. p. 467.

α *Reseda Gallica, crispa.* X Reseda crespa, de Francia. α
Bocc. sic. 77. t. 41. f. 3.

Reseda Massiliensis, fo- X *Reseda* de Marsella, con
liis latioribus, crispis. Pluk. X hojas mas anchas y crespas.
 Alm. 317. t. 55. f. 4. X

Cast. *Reseda* amarilla.

Habita en los montes gredosos de la Europa mas Austral:
 en la Alcarria, Aragon, Cataluña y otras partes de Es-
 paña. ☉

Tiene comunmente las *hojas* ondeadas.

Phy- 10. RESEDA *foliis inte-* X *Reseda* con unas hojas en-
 teuma. *gris trilobisque, calycibus* X teras, y otras hendidas en
sexpartitis maximis. Jacq. X tres lóbulos; cálices partidos
 Austr. t. 132. X en seis lacinias y muy gran-
 des.

Reseda foliis radicalibus X *Reseda* con las hojas radi-
integris, caulinis integris X cales enteras, las del tallo
 & *semitrilobis, calycibus* X unas enteras, y otras medio
sexfidis florem superantibus. X hendidas en tres lóbulos; cá-
 Hall. helv. n. 1057. X lices hendidos en seis partes
 y que superan la flor.

Reseda minor, vulgaris. X *Reseda* menor, vulgar,
 Tourn. p. 423.

Resedæ affinis phyteuma. X *Phyteuma* parecida á la
 C. B. P. 100. Prodr. 42. t. 42. X *Reseda*.

Erucago apula, trifida X *Erucago* de pulla, con
quinquefolia. Col. ecphr. X unas hojas divididas en tres,
 267. t. 269. X y otras en cinco.

α *Reseda minor, vulgaris,* X *Reseda* menor, vulgar,
folio minus inciso. Tourn. p. X con hoja menos cortada. α
 423.

β *Reseda minor, vulgaris,* X *Reseda* menor, vulgar,
foliis integris. Tourn. p. 423. X con hojas enteras. β

Cast. *Reseda phyteuma.*

Habita en Francia, Italia, Oriente, Austria y Suiza: en
 los circuitos de Madrid, y es muy frecuente en otras
 muchas partes de España. ☉

Mediterranea.

11. RESEDA *foliis integris trilobisque, calycibus flore brevioribus.*

Reseda con unas hojas enteras, y otras hendidas en tres lóbulos; y cálices más cortos que la flor.

Cast. Reseda Mediterranea.

Habita en Palestina.

Arroja el tallo del largo de un pie, ascendente, ó derecho y por arriba ramoso y áspero: las *hojas inferiores* lanceoladas, alternas, indivisas, ásperas por debaxo; y las *superiores del tallo* hendidas en tres partes: el *racimo* terminal, largo y derecho: el *caliz* de seis hojuelas cortisimas, lineares y extendidas: la *corola* de seis petalos blancos; los *dos superiores* partidos en tres lacini-
nias, con la del *medio* menor; los *dos laterales* divididos en dos lacinias, con la *inferior* mas pequeña; y los *dos de mas abaxo* lineares: los *estambres* pálidos: el *germen* con tres puntas y casi mas largo que el *caliz*: el *estilo* ninguno; y los *estigmas* sencillos.

Odo-
rata.

12. RESEDA *foliis integris trilobisque, calycibus florem æquantibus.*

Reseda con unas hojas enteras, y otras hendidas en tres lóbulos; y cálices que igualan á la flor.

Reseda foliis integris trilobisque, floribus tetragynis. Mill. dict. t. 217.

Reseda con unas hojas enteras, y otras hendidas en tres lóbulos; y flores de quatro pistilos.

Reseda foliis integris, floribus odoratis. Hall. goett. 95. Zinn. goett. 123.

Reseda con hojas enteras y flores olorosas.

Cast. Reseda olorosa. vulgo: Miñoneta.

Habita en Egipto. ♂

Es muy semejante á la *Reseda phyteuma*; pero tiene las *hojas* mas ondeadas: los *cálices* que no son mas largos que la *corola*: las *ramas* declinadas y salpicadas de cerdas: las *flores* de olor suave, y comunmente con quatro pistilos; y las *lacinias laterales* de los petalos, mas cortas.

742. Género EUPHORBIA. * Euphorbium. *Isnard.*

A. G. 1720. *Tithymalus. Tourn. t. 18.*

Tithymaloides. Tourn.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, ventricosos, casi de color, con quatro dientes en su boca (con cinco en la menor parte de sus especies) y persistente.

COR. *Petalos* quatro (cinco en pocas especies), cónicos inversos, gibosos, crasos, truncados, desiguales en su situacion, alternados con los dientes del caliz, puestos con sus uñas en la margen de él y persistentes.

ESTAMB. *Filamentos* muchos (doce ó mas), filiformes, articulados, insertos en el receptáculo, mas largos que la corola, y que salen en diversos tiempos: con las *anteras* mellizas y casi redondas.

PIST. *Germen* algo redondo, de tres caras, y con piecicito: *estilos* tres, hendidos en dos partes: con los *estigmas* obtusos.

PERIC. *Capsula* casi redonda, de tres frutos, de tres celdillas y que se abre elásticamente.

SEM. solitarias, y algo redondas.

OBS. El *Euphorbio de Isnard* tiene el *tallo* angulado ó carnoso; y los *petalos*, en algunas flores, hendidos en tres partes.

El *Tithymalo de Tournefort* produce el *tallo* con hojas.

El *Tithymaloide del mismo Tournefort* posee el *caliz* con su lado inferior giboso, y en forma de zapato; y en algunas especies las primeras *flores* son masculinas.

Tiene las mas veces quatro *petalos*; pero en algunas especies se hallan tambien cinco en una misma planta, con flores de diverso sexô: los mismos *petalos* en las mas especies son glandulosos; en algunas, en forma de media luna ó dentados; en pocas, delgados á manera de una membrana, y comunmente casi puestos

tos fuera del caliz; y la *capsula* es lisa, ó con pelo áspero, y verrugosa.

CARACTERES GENERICOS DE TOURNEFORT.
TITHYMALUS. p. 85.

La *flor* es de un petalo en forma de campana, globosa, hendida en muchas partes, y ceñida con dos hojuelas que parece hacen las veces de caliz; el pistilo, comunmente de tres lados, sale del fondo de la flor, y pasa á fruto de la misma forma, dividido en tres celdillas, y lleno de semillas oblongas.

TITHYMALOIDES. p. 654.

La *flor* es de un petalo, parecida á un zapato, cuyo pistilo pasa á fruto, semejante al del Tithymalo.

ESPECIES FRUTICOSAS CON AGUIJONES.

Antiquorum.

- I. EUPHORBIA *aculeata*, *subnuda*, *triangularis*, *articulata*, *ramis patentibus*. Euphorbia con agujones, casi desnuda, triangular, articulada; y con ramas extendidas. Amoen. Acad. 3. p. 106.
- Euphorbium antiquorum verum*. Comm. hort. 1. p. 23. t. 12. Euphorbio verdadero de los antiguos.
- Schadidacalli*. Rheed. Malab. 2. p. 81. t. 42. Schadidacalli.
- Euphorbia aculeata*, *nuda*, *triangularis*, *articulata*, *ramis erectis*. Mill. dict. Euphorbia con agujones, desnuda, triangular, articulada; y con ramas derechas.
- Tithymalus aizoides triangularis* & *quadrangularis*, *articulosus* & *spinusus*, *ramis compressis*. Comm. præl. Tithymalo como aizoon, de tres y de quatro ángulos, articulado y espinoso; con ramas comprimidas. 55. t. 5.

Cast. Euphorbia de los antiguos.

Habita en la India. *h* Forskæhl contó en esta especie cinco estambres solamente.

EU-

ana-
ensis

2. EUPHORBIA *aculeata, nuda, subquadrangularis, aculeis geminatis.* Amoen. Acad. 3. p. 107.

Tithymalus aizoides, fruticosus, Canariensis, aphyllus, quadrangularis & quinquangularis, spinis geminis, aduncis, atro-nitentibus armatus. Comm. hort. 2. p. 207. t. 104.

Tithymalus aizoides lactifluus, seu Euphorbia Canariensis, quadrilatera & quinquelatera, Cerei efigie. Pluk. Alm. 370. t. 320. f. 2.

Euphorbia con agujones mellizos, desnuda, y de quatro ángulos poco mas ó menos.

Tithymalo de Canarias, como aizoon, fruticoso, sin hojas, de quatro y de cinco ángulos, armado con espinas mellizas, ganchosas, de color negro lustroso.

Tithymalo como aizoon, que fluye leche, ó Euphorbia de Canarias, de quatro y de cinco lados, y de figura de Cirio.

Cast. Euphorbia de Canarias.

Habita en las Canarias. *h*

Tiene la flor sentada en ambas partes debaxo del par de los agujones: una *bractea* mas corta, aovada, cóncava y verde: el *caliz* con cinco lacinias cerradas y de color purpúreo: cinco *petalos* puestos fuera del caliz, de color purpúreo obscuro, sentados, carnosos, enteros y muy obtusos.

Hepta-
gona.

3. EUPHORBIA *aculeata, nuda, septem angularis, spinis solitariis subulatis floriferis.* Amoen. Acad. 3. p. 109.

Euphorbium heptagonum, spinis longissimis, in apice frugiferis. Boerh. Lugdb. 1. p. 258. t. 258.

Euphorbia con agujones, desnuda, de siete ángulos; con espinas solitarias, alenadas y que llevan las flores.

Euphorbio de siete lados, con espinas larguissimas, que llevan el fruto en su ápice.

Cast. Euphorbia de siete lados.

Habita en Etiopia. *h*

Ma-
mia-
ris.

4. *EUPHORBIA aculeata, nuda, angulis tuberosis, spinis interstinctis.* Amœn. Acad. 3. p. 108.

Euphorbium polygonum, aculeis longioribus ex tuberculorum internodiis prodeuntibus. Isnard. act. 1720. p. 386.

Tithymalus aizoides, Africanus, validissimis spinis, ex tuberculorum internodiis provenientes. Comm. præl. 59. t. 9.

Cast. Euphorbia de tetas ó sea con tuberculos.

Habita en Etiopia. $\frac{h}{2}$

Se diferencia de la *Euphorbia* de siete lados por los ángulos duplicados y con convexidades; y por las espinas solitarias, dispuestas longitudinalmente entre cada tuberculo.

Cerei-
formis

5. *EUPHORBIA aculeata, nuda, multangularis, spinis solitariis subulatis.* Amœn. Acad. 2. p. 108.

Euphorbium aphyllum, angulosum, florum comadensissima. Burm. Afr. 19. t. 9. f. 3.

Tithymalus Africanus, spinosus, Cerei efigie. Morris. hist. 3. pag. 245. Pluk. Alm. 370. t. 231. f. 1.

Cast. Euphorbia en forma de Cirio.

Habita en Etiopia. $\frac{h}{2}$

6. EUPHORBIA *aculeata, nuda, multangularis, aculeis geminatis.* Amœn. Acad. Euphorbia desnuda, con muchos ángulos; y agujones mellizos.

3. p. 107. Mat. Med. p. 139. *Euphorbium polygonum, spinosum, Cerei efigie.* Isnard. act. 1720. p. 500. t. 10. Euphorbio con muchos lados, espinoso y de figura de Cirio.

Euphorbium Cerei efigie, caulibus crassioribus, spinis validioribus armatum. Comm. hort. 1. p. 21. t. 11. Euphorbio de figura de Cirio, con tallos mas crasos, y armado de espinas mas robustas.

Seb. thes. 1. p. 29. t. 19. f. 2. *Euphorbium.* C. B. P. 387. Euphorbio.

Cast. Euphorbia de las oficinas.

Habita en Etiopia y Africa mas caliente. \hbar

PROPIED. La leche de esta planta es acre, corrosiva, vegetatoria, drastica y estornutatoria. La misma leche, que se concreta en goma, es el Euphorbio oficial que se usa en las caries, punturas, sarna y ulceras de los caballos, &c.

7. EUPHORBIA *aculeata, seminuda, angulis oblique tuberculatis.* Amœn. Acad. 3. p. 109. Euphorbia con agujones, medio desnuda; y con ángulos que constan de tuberculos obliquos.

Euphorbium Afrum, spinosum, foliis latioribus non spinosis. Seb. thes. 1. p. 18. t. 9. f. 1. Euphorbio de Africa, espinoso; con hojas mas anchas, y que no tienen espinas.

Tithymalus aizoides, arborescens, spinosus, caudice angulari, Nerii folio. Comm. præl. 22. 56. t. 6. Tithymalo como aizoon, arborescente, espinoso; con el tronco angular; y hoja como la de la Adelfa.

Tithymalus Indicus, spinosus, Nerii folio. Comm. hort. 1. p. 25. t. 13. Tithymalo de Indias, espinoso; con hoja como la de la Adelfa.

Ligularia. Rumph. Amb. 4. p. 88. t. 40. Ligularia.

Ela calli. Rheed. Malab. 2. p. 83. t. 43. Ela calli.

Cast.

Cast. Euphorbia con hoja de Adelfa.

Habita en la India. $\frac{h}{2}$

ESPECIES FRUTICOSAS, INERMES, CON EL TALLO
QUE NO ES AHORQUILLADO, NI UMBELIFERO.

Ca-
put me
dusæ.

8. EUPHORBIA *inermis*,

imbricata, tuberculis folio-

lo lineari instructis. Amœn.

Acad. 3. p. 110. Hort. Cliff.

197.

Planta lactaria, Africana.

Comm. hort. 1. p. 33. t. 17.

Tithymalus aizoides, Afri-

canus, simplici squamato

caule, Chamænerii folio.

Comm. præl. 58. t. 8. & p.

23. 57. t. 7.

Euphorbium erectum,

aphyllum, ramis rotundis,

tuberculis tetragonis. Burm.

Afr. 16. t. 7. f. 2.

Euphorbium humile, pro-

cumbens, ramis simplicibus,

copiosis, caule crassissimo,

tuberoso. Burm. Afr. 20. t.

10. f. 1.

Euphorbium procumbens,

ramis plurimis, simplicibus,

squamosis, foliis deciduis.

Burm. Afr. 17. t. 8.

Euphorbium procumbens,

ramis geminatis, caule gla-

bro, oblongo, cinereo. Burm.

Afr. 18. t. 9. f. 1.

Euphorbia inerme, apiña-
da; con tuberculos adorna-
dos de una (ó mas) hojue-
la linear.

Planta lechera, de Africa.

Tithymalo como aizoon, de
Africa, con el tallo sencillo,
escamoso; y hoja como la
del Chamenerio.

Euphorbia derecha, sin
hojas; con ramas redondas;
y tuberculos de quatro la-
dos. α

Euphorbio baxo, tendido;
con ramas sencillas y copio-
sas; tallo muy craso y tube-
roso. β

Euphorbio tendido, con
muchas ramas, sencillas, es-
camosas; y hojas que se caen
facilmente. χ

Euphorbio tendido, con
ramas mellizas; tallo lampi-
ño, oblongo y ceniciento. δ

Cast. Euphorbia Cabeza de Medusa.

Habita en Etiopia. $\frac{h}{2}$

Tiene los *petalos* palmeados.

Mauri-
canica.

9. EUPHORBIA *inermis*, *seminuda*, *fruticosa*, *filiformis*, *flaccida*, *foliis alternis*. Euphorbia inerme, medio desnuda, fruticosa, filiforme y descaecida; con hojas alternas.

Hort. Cliff. 197. Amœn.

Acad. 3. p. 111.

Tithymalus aphyllus, Mauritaniae. Dill. elth. 384. t. sin hojas.

289. f. 373.

Cast. Euphorbia de Mauritania.

Habita en lugares maritimos de Africa. *h*

Tira-
culli.

10. EUPHORBIA *inermis*, *seminuda*, *fruticosa*, *filiformis*, *erecta*, *ramis patulis determinate confertis*. Euphorbia inerme, medio desnuda, fruticosa, filiforme, derecha; con ramas extendidas, y que terminan en otras amontonadas.

Hort. Cliff. 197. Amœn. Acad.

3. p. 111.

Tithymalus Indicus, frutescens. Comm. hort. 1. p. Tithymalo de Indias, frutescente.

27. t. 14.

Tithymalus arborescens, caule aphylo. Pluk. phyt. Tithymalo arborescente, con el tallo sin hojas.

t. 319. f. 6.

Ossifraga lactea. Rumph. Ossifraga que arroja leche.

Amb. 7. p. 62. t. 29.

Tiru Calli. Rheed. Malab. Tiru Calli.

8. p..... t. 44.

Cast. Euphorbia Tiraculli.

Habita en la India. *h*

Llámase *Ossifraga* ó por la admirable figura de la planta, que parece toda compuesta de huesos quebrados, ó por el uso que de su corteza exterior hacen los Indios en las fracturas de los huesos.

Ti-
thyma-
loides.

11. EUPHORBIA *inermis*, *fruticosa*, *foliis distiche alternis ovatis*. Euphorbia inerme, fruticosa, con hojas que miran á ambos lados, alternas y aovadas.

Acad. 3. p. 111. Jacq. Amer.

149. t. 42.

α *Euphorbia Tithymaloides*, X *Euphorbia* parecida al *Ti-*
Myrtifolia. X *thymalo*, con hoja como la
 del *Myrto*. α

Tithymalus Curassavi- X *Tithymalo* de Curasao,
cus, *Myrti folius*, *flore coc-* X con hoja como la del *Myrto*;
cineo mellifluo. Herm. par. X flor coccinea y meliflua.
 234. t. 234.

Tithymalus Curassavi- X *Tithymalo* de Curasao,
cus, *Myrti folius*, *flore pa-* X con hoja como la del *Myrto*;
pilionaceo, *coccineo*, *parvo*. X flor papilionacea, coccinea y
 Comn. hort. 1. p. 31. t. 16. X pequeña.
 Pluk. Alm. 369. t. 230. f. 2.

β *Euphorbia Padifolia*. X *Euphorbia* con hoja como
 la del *Pado*. β

Tithymalus (*Laurocerasi-* X *Tithymalo* (*con hoja de*
folius) *foliis oblongo-ovatis*, X *Lauro Real*) de hojas entre
obtusis, *succulentis*. Mill. X oblongas y aovadas, obtusas
 dict. n. 2. X y xugosas.

Tithymaloides Lauroce- X Planta parecida al *Tithy-*
rasifolio non serrato. Diil. X *malo*, con hoja como la del
 elth. 383. t. 288. f. 372. X *Lauro Real* sin aserraduras.

Cast. *Euphorbia* como *Tithymalo*.

Habita en Curasao. *h*

Hete- 12. *EUPHORBIA iner-* X *Euphorbia* inerme, de ho-
 rophyl *mis*, *foliis serratis petio-* X *jas* aserradas, con peciolo,
 la. *latis difformibus ovatis lan-* X de varias figuras, aovadas,
ceolatis panduriformibus. X lanceoladas, y en forma de
 Amoen. Acad. 3. p. 112. X bandurria.

Tithymalus heterophyl- X *Tithymalo* de hojas va-
lus. Plum. ic. 250. t. 251. X rias.
 f. 3.

Tithymalus Curassavi- X *Tithymalo* de Curasao,
cus, *Salicis* & *Atriplicis* X con hojas varias, como las
foliis variis, *caulibus viri-* X de Sauce, y como las de Ar-
dantibus. Pluk. Alm. 309. X muelle; y tallos que tiran á
 t. 112. f. 6. X color verde.

Cast. *Tithymalo* de hojas varias.

Habita en la America mas caliente.

Coti-
ifolia.

13. *EUPHORBIA foliis oppositis subcordatis petiolatis emarginatis integerrimis, caule fruticoso.* Euphorbia de hojas opuestas, casi de figura de corazon, con peciolo, escotadas, enterisimas; y tallo fruticoso.

Amœn. Acad. 3. p. 112.

Tithymalus Curassavicus, folio Cotini triphyllos, petalis florum serratis. Tithymalo de Curasao, con hojas como las del Fustete, de tres en tres; y petalos de las flores aserrados.

Alm. 369. t. 230. f. 3.

Tithymalus arboreus, Curassavicus, Cotini folio. Tithymalo arboreo, de Curasao; con hoja como la del Fustete.

thes. 1. p. 75. t. 46. f. 4.

Tithymalus arboreus, Americanus, Cotini folio. Tithymalo arboreo, de America; con hoja como la del Fustete.

Comm. hort. 1. p. 29. t. 15.

Cast. Euphorbia con hoja de Fustete.

Habita en Curasao. \bar{h}

Ocy-
lo 1-
ea.

14. *EUPHORBIA inermis, herbacea, ramosa, foliis subcordatis integerrimis petiolo brevioribus, floribus solitariis.* Euphorbia inerme, herbacea, ramosa; con hojas casi de figura de corazon, enterisimas, mas cortas que el peciolo; y flores solitarias.

Acad. 3. p. 112.

Euphorbia inermis, foliis subcordatis, obtusis, integerrimis, petiolatis, caule ramoso erecto. Euphorbia inerme, con hojas casi de figura de corazon, obtusas, enterisimas, pecioladas; tallo ramoso y derecho.

Roy. Lugdb. 199.

Cast. Euphorbia como Albahaca.

Habita en Campeche. *Houst.*

ESPECIES CON EL TALLO AHORQUILLADO, Ó CON UMBELA
HENDIDA EN DOS PARTES, Ó SIN ELLA.

Origa-
noides

15. EUPHORBIA *dichotoma, foliis serrulatis ovatis obtusis trinerviis, panicula terminali, caulibus simplicibus.* Amoen. Acad. 2. p. 114.

Euphorbia ahorquillada, de hojas algo aserradas, avadas, obtusas, con tres nervios; panoja terminal; y tallos sencillos.

Cast. Euphorbia como Oregano.

Habita en la Isla de la Ascension. ¶

Es planta tan parecida al Oregano, que á la primera vista se equivoca mucho con el.

Hypericifolia.

16. EUPHORBIA *dichotoma, foliis serratis ovali-oblongis glabris, corymbis terminalibus, ramis divaricatis.* Amoen. Acad. 3. p. 113.

Euphorbia ahorquillada, con hojas aserradas, entre ovales y oblongas, lampiñas; corimbos terminales; y ramas apartadas.

Euphorbia inermis, foliis ovalibus oppositis hinc serratis uniformibus, ramis alternis, caule erectiusculo. Hort. Cliff. 198.

Euphorbia inerme, con hojas ovales, opuestas, por una parte aserradas, uniformes; ramas alternas; y tallo derecho.

Euphorbia minima, reclinata, foliolis ovatis, denticulatis, floribus subumbellatis, terminalibus lateralibusque. Brown. jam. 235.

Euphorbia muy pequeña, reclinada, de hojuelas aovadas, con dientecitos; flores en umbela, terminales y laterales.

Tithymalus Americanus, flosculis albis. Comm. præl. 60. t. 60.

Tithymalo de America, con florecitas blancas.

Tithymalus erectus, acris, Parietariae foliis glabris, floribus ad caulium nodos conglomeratis. Sloan. jam. 82. hist. 1. p. 197. t. 126.

Tithymalo derecho, acres, con hojas como las de la Parietaria, lampiñas; y flores conglobadas en los nudos de los tallos.

Cast. Euphorbia con hoja de Hypericon.

Ha-

Habita en la India. ☉

Macu-
lata.

17. EUPHORBIA dicho-
toma, foliis serratis oblon-
gis pilosis, floribus axilla-
ribus solitariis, ramis pa-
tulis. Jacq. hort. t. 186.

Euphorbia ahorquillada,
con hojas aserradas, oblon-
gas, pelosas; flores axilares,
solitarias; y ramas extendi-
das.

Euphorbia minima, supi-
na, rufescens. Brown. jam.
236.

Euphorbia muy pequeña,
tendida, y de color rubio.

Tithymalus seu Chamæsy-
ce altera, Virginiana, foliis
crenatis & macula fusca
elegantè notatis. Pluk. Alm.
372. t. 65. f. 8.

Otro Tithymalo ó Chame-
sice de Virginia, con hojas
recortadas y hermosamente
señaladas con una mancha
obscura.

Cast. Euphorbia manchada.

Habita en la America Septentrional. ☉

Echa los tallos ahorquillados: las ramas alternas, exten-
didas y por encima de color que tira á purpúreo: las
hojas entre ovales y oblongas, con tres nervios, algo
pelosas, aserradas, en la mayor parte de un lado ente-
risimas, y señaladas con una mancha obscura siendo
tierna la planta: las flores axilares, solitarias, peque-
ñas; con el caliz rubio: y el fruto liso. Es semejante á
la Euphorbia con hoja de Hypericon.

Hirta.

18. EUPHORBIA dicho-
toma, foliis serrulatis ova-
tis acuminatis, pedunculis
capitatis axillaribus, cauli-
bus pilosis. Amœn. Acad. 3.
p. 114.

Euphorbia ahorquillada,
con hojas algo aserradas, ao-
vadas, puntiagudas; pedun-
culos en cabezuela, axilares;
y tallos pelosos.

Tithymalus botryoides
Zeylanicus, cauliculis villo-
sis. Burm. Zeyl. 223. t. 104.

Tithymalo como en raci-
mo, de Zeylan; con tallitos
vellosos.

Esula esculenta. Rumph.
Amb. 6. p. 54. t. 23. f. 2.

Esula comestible.

Cast. Euphorbia con pelo áspero.

Habita en la India. ☉

P^u
lif. a

19. EUPHORBIA *dichotoma*, foliis serratis ovali-oblongis, pedunculis bicapitatis axillaribus, caule erecto. Amoen. Acad. 3. p. 115.

Tithymalus botryoides erectus. *florum capitulis conjugatis & longiori pediculo insidentibus*. Burm. Zeyl. 224. t. 105. f. 1. Pet. gaz. t. 80. f. 14.

Euphorbia ahorquillada, con hojas aserradas, entre ovales y oblongas; pedunculos de dos cabezuelas, axilares; y tallo levantado.

Tithymalo como en racimo, derecho; con las cabezuelas de las flores apareadas, y sentadas en un piecito mas largo.

Cast. Euphorbia de bolillas.

Habita en la India. ☉

H^s
sopi
folia.

20. EUPHORBIA *dichotoma*, foliis subcrenatis linearibus, floribus fasciculatis terminalibus, caule erecto.

Euphorbia dichotoma, erecta, tenuis, foliis linearibus, floribus quasi umbellatis terminalibus. Brown. jam. 235.

Euphorbia ahorquillada, con hojas algo recortadas, lineares; flores en hacecillo, terminales; y tallo derecho.

Euphorbia ahorquillada, derecha, delgada; con hojas lineares; flores casi en umbela y terminales.

Cast. Euphorbia con hoja de Hysopo.

Habita en la America.

Thy-
micro-
lia.

21. EUPHORBIA *dichotoma*, foliis serratis ovali-oblongis, capitulis axillaribus glomeratis subsessilibus, caulibus procumbentibus. Amoen. Acad. 3. p. 115.

Tithymalus foliis oppositis oblique cordatis obtusis serratis, pedunculis multifloris. Flor. Zeyl. 198.

Euphorbia ahorquillada, con hojas aserradas, entre ovales y oblongas; cabezuelas axilares, conglobadas, casi sentadas; y tallos tendidos.

Tithymalo con hojas opuestas, de figura de corazon obliqua, obtusas, aserradas; y pedunculos de muchas flores.

Tithymalus Indicus, annuus, dulcis, floribus albis, caulibus viridantibus & rubentibus. Pluk. Alm. 272. t. 113. f. 2.

Tithymalo de Indias, annuo, dulce; con flores blancas; y tallos de color que tira á verde y encarnado.

Tithymalus humilis, ramosissimus, hirsutus, foliis Thymi serratis. Burm. Zeyl. 225. t. 105. f. 3.

Tithymalo baxo, muy ramoso, con pelo áspero; hojas como las del Tomillo y aserradas.

Cast. Euphorbia con hoja de Tomillo.
Habita en la India. ☉

parvi-
lora. 22. EUPHORBIA subdichotoma, foliis serratis oblongis glabris, floribus solitariis, caule erectiusculo alterne ramoso.

Euphorbia casi ahorquillada, con hojas aserradas, oblongas, lampiñas; flores solitarias; tallo algo levantado y alternadamente ramoso.

Tithymalus erectus, floribus rarioribus, foliis oblongis, glabris, integris. Burm. Zeyl. 224. t. 105. f. 2.

Tithymalo levantado, con flores más claras; hojas oblongas, lampiñas y enteras.

Cast. Euphorbia de flor pequeña.

Habita en la India. ☉

Tiene comunmente las *hojas* con una mancha obscura: los *cálices* purpúreos; y los *petalos* blancos.

canes-
ens. 23. EUPHORBIA dichotoma, foliis integris subrotundis pilosis, floribus solitariis axillaribus, caulibus procumbentibus.

Euphorbia ahorquillada, con hojas enteras, casi redondas, pelosas; flores solitarias, axilares; y tallos tendidos.

Tithymalus exiguus, villosus, Nummulariæ folio. Tourn. p. 87.

Tithymalo pequeño, veloso; con hoja como la de la Numularia.

Cast. Euphorbia que encanece.

Habita en los contornos de Madrid y otras muchas partes de España. ☉

Es muy parecida á la *Euphorbia Chamecyse*; pero se ha-

halla cubierta de vello blanco: y tiene las *hojas* con alguna escotadura poco manifiesta.

PROPIED. La infusion en agua de esta planta se tiene por muy util en la lue venerea.

Chamæcyse.

24. EUPHORBIA dicho-
toma, foliis crenulatis sub-
rotundis glabris, floribus
solitariis axillaribus, caulibus
procumbentibus. Amœn. X
Euphorbia ahorquillada
con hojas recortaditas, casi
redondas, lampifias; flores
solitarias, axilares; y tallos
tendidos.

Acad. 3. p. 115.

Euphorbia inermis, foliis
oblique cordatis serrulatis
uniformibus, ramis alter-
nis, floribus solitariis. Hort.
Cliff. 198. Gmel. Sib. 2. p. X
Euphorbia inermis, con
hojas de figura de corazon,
obliqua, aserraditas, unifor-
mes; ramas alternas; y flo-
res solitarias.

237.

Chamæcyse. C. B. P. 293. X

Chamecyse.

Clus. hist. 2. p. 187. Bauh.
hist. 3. p. 667. Dod. pempt.

377.

Tithymalus exiguus, gla-
ber, Nummulariæ folio. To-
urn. p. 87. X
Tithymalo pequeño, lam-
pifio; con hoja como la de
la Numularia.

Cast. Euphorbia Camecyse.

Habita en lugares áridos de la Europa Austral, de Sibe-
ria y Mesopotamia: en tierras de Salamanca y otras
muchas partes de España. ☉

Arroja el tallo deprimido y ahorquillado: las *hojas* opues-
tas, casi redondas, lisas, algo recortadas y mas angos-
tas por su base anterior: las *flores* que salen de la
ahorquilladura: el *caliz* rubio: los *petalos* blancos y
recortados: con el *fruto* liso.

Pe-
plis.

25. EUPHORBIA dicho-
toma, foliis integerrimis
semicordatis, floribus soli-
tariis axillaribus, caulibus
procumbentibus. Amœn. X
Euphorbia ahorquillada,
con hojas enterisimas, me-
dio de figura de corazon; flo-
res solitarias, axilares; y ta-
llos tendidos.

Acad. 3. p. 115. X

- Peplis maritima*, folio obtuso. C. B. P. 293. Peplide maritima, con hoja obtusa.
- Peplis*. Clus. hist. 2. p. 187. Cam. epit. 970. Peplide.
- Tithymalus maritimus*, folio obtuso, aurito, rubro & viridi. Tourn. p. 87. Tithymalo maritimo, de hoja obtusa, con orejillas, de color roxo y verde.

Cast. Euphorbia peplide.

Habita en lugares maritimos de Narbona y Carniola: y en las Provincias meridionales de España en terrenos areniscos. ☉

26. EUPHORBIA foliis oppositis integerrimis lanceolatis obtusis, floribus solitariis axillaribus, caulibus procumbentibus. Amœn. Acad. 3. p. 116. Euphorbia con hojas opuestas, enterisimas, lanceoladas, obtusas; flores solitarias, axilares; y tallos tendidos.
- Euphorbia procumbens*, ramulis alternis, foliis lanceolato-linearibus, floribus solitariis. Gron. virg. 58. Euphorbia tendida, con ramitas alternas; hojas entre lanceoladas y lineares; y flores solitarias.
- Euphorbia minima*, ramosissima, angustifolia. Rai. Suppl. p. 431. Euphorbia muy pequeña y muy ramosa, con hoja angosta.

Cast. Euphorbia con hoja de Polygono.

Habita en la Virginia y Canadá. ☉

27. EUPHORBIA dichotoma, foliis lanceolato-ellipticis petiolatis integerrimis, caule erecto, pedunculis dichotomis. Euphorbia ahorquillada, de hojas entre lanceoladas y elípticas, con peciolo, enterisimas; tallo derecho; y pedunculos ahorquillados.
- Euphorbia dichotoma*, foliis oppositis, integerrimis, lanceolatis, pedunculis dichotomis, caule erecto. Jacq. Amer. 151. Obs. 1. p. 5. t. 31. Euphorbia ahorquillada, con hojas opuestas, enterisimas, lanceoladas; pedunculos ahorquillados; y tallo derecho.

Cast.

Cast. Euphorbia graminea.

Habita en lugares húmedos de Cartagena de las Indias entre gramas.

Tiene las corolas blancas.

Ipecacuanha.

28. EUPHORBIA dichotoma, foliis integerrimis lanceolatis, pedunculis axillaribus unifloris folia æquantibus, caule erecto. Amœn. Acad. 3. p. 117.

Euphorbia ahorquillada con hojas enterisimas, lanceoladas; pedunculos axilares, de una flor, iguales á las hojas; y tallo derecho.

Tithymalus flore exiguo, viridi, apicibus flavis, antequam folia emittit florens. Gron. virg. 58.

Tithymalo de flor pequeña, verde; con sus anteras de color amarillo-roxo y que florece antes que eche las hojas.

Cast. Euphorbia de Ipecacuanha.

Habita en la Virginia y Canadá. ¶

Portulacoides.

29. EUPHORBIA dichotoma, foliis integerrimis ovalibus retusis, pedunculis axillaribus unifloris folia æquantibus, caule erecto. Amœn. Acad. 3. p. 117.

Euphorbia ahorquillada con hojas enterisimas, ovales, que rematan en seno obtuso; pedunculos axilares de una flor, iguales á las hojas; y tallo derecho.

Tithymalus perennis, Portulacæ folio. Few. peru. 707. t. 2?

Tithymalo perenne, con hoja como la de la Verdolaga.

Cast. Euphorbia como Verdolaga.

Habita en Filadelfia. Kalm. ¶

Myrtifolia.

30. EUPHORBIA dichotoma, foliis integerrimis subrotundis emarginatis subtus incanis, floribus solitariis, caule erecto.

Euphorbia ahorquillada con hojas enterisimas, casi redondas, escotadas, blancas por debaxo; flores solitarias; y tallo derecho.

Euphorbia erecta, foliolis ovatis oppositis, ramulis tenuibus alaribus. Brown. jam. 235.

Euphorbia levantada, con hojuelas aovadas, opuestas; ramitas delgadas y axilares.

Cast.

Cast. Euphorbia con hoja de Myrto.

Habita en la Jamaica. ☉

ESPECIES CON LA UMBELA HENDIDA EN TRES PARTES.

31. EUPHORBIA umbel-
la trifida dichotoma, invo-
lucellis ovatis, foliis inte-
gerrimis obovatis petiolatis.
Amoen. Acad. 3. p. 117.
Gmel. Sib. 2. p. 236.

Tithymalus foliis rotun-
dis, stipulis floralibus cor-
datis, petalis argute corni-
culatis. Hall. helv. n. 1049.

Euphorbia foliis obverse
ovatis integerrimis, umbel-
la universalis trifida triphyl-
la, partialibus dichotomis
diphyllis. Hort. Cliff. 199.

Peplus seu Esula, rotun-
da. C. B. P. 292. Lob. ic.
362. Bauh. hist. 3. p. 669.
Dod. pempt. 375.

Tithymalus rotundis fo-
liis, non crenatis. Tourn.
p. 87.

Peplis minor. Bauh. hist.
3. p. 670.

Euphorbia con la umbela
hendida en tres partes, ahor-
quillada; involucros parcia-
les, aovados; hojas enterisi-
mas, aovadas al revés y pe-
cioladas.

Tithymalo con hojas re-
dondas; estipulas florales (ó
sean involucros) de figura de
corazon; y petalos en forma
de astitas agudas.

Euphorbia de hojas aova-
das al revés, enterisimas;
umbela universal hendida en
tres partes, con tres hojue-
las; las umbelas parciales
ahorquilladas y con dos ho-
juelas.

Peplo ó Esula con hoja
redonda.

Tithymalo con hojas re-
dondas, sin ser recortadas.

Peplide menor. α

Cast. Euphorbia Peplo.

Habita en lugares cultivados de Europa: en Cataluña,

Aragon y otras partes de España. ☉

Tiene los petalos en forma de media luna.

Fal-
cata:

32. EUPHORBIA umbel-
la trifida dichotoma, invo-
lucellis subcordatis mucro-
natis, foliis lanceolatis ob-
tusiusculis. Amœn. Acad. 3.
p. 118. Jacq. Aust. t. 121.

Tithymalus annuus, su-
pinus, folio rotundiore, acu-
minato. Tourn. p. 87.

Pithyusa minor, subro-
tundis & acutis foliis. Barr.
ic. 751.

Euphorbia con lá umbel-
hendida en tres partes, ahor-
quillada; involucros parcia-
les, casi de figura de cora-
zon, terminados en punta
rígida; hojas lanceoladas y
algo obtusas.

Tithymalo annuo, hecha-
do, con hoja mas redonda y
puntiaguda.

Pithyusa menor, con ho-
jas casi redondas y agudas.

Cast. Euphorbia arqueada.

Habita en la Europa Austral. ☉

Exi-
gua.

33. EUPHORBIA umbel-
la trifida dichotoma, invo-
lucellis lanceolatis, foliis
linearibus. Amœn. Acad. 3.
p. 118. Fl. dan. t. 592.

*Tithymalus foliis lineari-
bus*, stipulis lanceolatis
aristatis. Hall. helv. n.
1048.

Euphorbia exigua, acuta.

Euphorbia inermis, fo-
liis alternis linearibus acu-
tis, umbella universali tri-
fida, parcialibus dichotomis
diphyllis. Hort. Cliff. 199.

*Tithymalus seu Esula
exigua*. C. B. P. Tourn. 86.

Tithymalus minimus, an-
gustifolius, annuus. Bauh.
hist. 3. p. 664.

Euphorbia exigua, retu-
sa.

Euphorbia con la umbel-
hendida en tres partes, ahor-
quillada; involucros parcia-
les lanceolados; y hojas li-
neares.

Tithymalo de hojas line-
ares; estipulas (ó sean invo-
lucros) lanceoladas y termi-
nadas en arista.

Euphorbia pequeña y agu-
da. α

Euphorbia inermis, con ho-
jas alternas, lineares, agu-
das; umbela universal hen-
dida en tres partes; las par-
ciales ahorquilladas y con
dos hojuelas.

Tithymalo ó *Esula* peque-
ña.

Tithymalo muy pequeño
annuo; y de hoja angosta.

Euphorbia pequeña, y que
remata en seno obtuso. β

Ti-

Tithymalus seu Esula X Tithymalo ó Esula peque-
exigua, foliis obtusis. C. B. X ña, con hojas obtusas.

P. 291. prodr. 132. Bauh.
 hist. 3. p. 664. Tourn. p. 86.

X *Tithymalus exiguus, saxá-* X Tithymalo pequeño, saxá-
xatilis. C. B. P. 291. prodr. X til. X

133. Magn. monsp. 259. t.
 258. Burs. XVI. 55. Tourn.
 p. 86.

Cast. Euphorbia pequeña.

Habita en Lusacia, Francia y Suiza entre los sembrados:
 en los contornos de Madrid: en Cataluña, Aragon y
 otras partes de España. ☉

Tiene los *petalos* en forma de media luna; y el *fruto* liso:
 y varía con la *umbela* hendida en quatro ó cinco partes.

34. EUPHORBIA *umbel-* X Euphorbia con la umbela
la trifida, involucrio tetra- X hendida en tres partes; in-
phylo, caule nudo, foliis X volucrio universal de quatro
oblongis emarginatis. Amœ- X hojuelas; tallo desnudo; ho-
 nit. Acad. 3. p. 117. X jas oblongas y escotadas.

Tithymalus humilis, folio X Tithymalo baxo, con hoja
Lapati. Buxb. cent. 2. p. 27. X como la del Lapato ó sea
 t. 23. X Romaza.

Tithymalus Africanus, X Tithymalo de Africa, ba-
humilis, foliis latioribus, X xo, con hojas mas anchas,
oblongis, tuberosa radice. X oblongas; y raiz tuberosa.
 Rai. Suppl. p. 933. X

Cast. Euphorbia tuberosa.

Habita en Egipto y Etiopia. ♁

ESPECIES CON LA UMBELA HENDIDA EN QUATRO PARTES.

35. EUPHORBIA *umbel-* X Euphorbia con la umbela
la quadrifida dichotoma, fo- X hendida en quatro partes,
liis oppositis integerrimis. X ahorquillada; hojas opuestas
 Amœn. Acad. 3. p. 120. Mat. X y enterisimas.
 Med. 139. X

Tithymalus foliis ellipticis, stipulis umbellaribus quaternis, petalis bicornibus succiferis. Hall. helv. n. 1044.

Tithymalo con hojas elípticas; estipulas (ó sean involucros) de las umbelas de cuatro en cuatro; pétalos de dos astitas, y que llevan xugo (ó sea leche).

Euphorbia inermis, foliis oppositis lanceolatis integerrimis, umbella universali quadrifida tetraphylla, ulterioribus dichotomis. Hort. Ups. 140.

Euphorbia inermis, de hojas opuestas, lanceoladas enterisimas; umbela universal hendida en cuatro partes con cuatro hojuelas, y las últimas ahorquilladas.

Lathyrus major. C. B. P. 293.

Lathyrus mayor.

Tithymalus latifolius, Catapucia dictus. Tourn. p. 86.

Tithymalo de hoja ancha llamado Catapucia.

Lathyrus. Matthiol. 1259. Cam. epit. 968. Fuchs. hist. 454.

Lathyrus.

Cast. *Euphorbia lathyrus. vulgo:* Tartago. *Farm.* Catapucia minor.

Habita en las márgenes de los campos de Francia, Italia, Suiza, Alemania y Carniola: en Cataluña, Alcarria y otras partes de España. ♂

PROPIED. *Es lactecente, acre, corrosiva, y purga con mucha violencia.*

Terra- 36. **EUPHORBIA** *umbellata quadrifida dichotoma, foliis alternis lanceolatis retusis mucronatis.*

Euphorbia con la umbela hendida en cuatro partes ahorquillada; hojas alternas lanceoladas, terminadas en seno obtuso y con una puntita rígida.

Euphorbia umbella quadrifida bifida, foliolis cuneiformi-linearibus tridentatis. Allion. cors. 209. t. 3?

Euphorbia con la umbela hendida en cuatro partes ahorquilladas; hojuelas entre de figura de cuña y lineares con tres dientes.

Tithymalus marinus, fo-
lio retuso, terracinus. Barr.
ic. 833. X Tithymalo marino (*mari-*
timo) terracino, con hoja
que remata en seno obtuso.

Cast. Euphorbia terracina. Porque nace en un Puerto de una Ciudad de Nápoles llamada Terracina.

Habita en Terracina. Barrel. y en España. Alstroem.
Produce el tallo herbáceo, del largo de medio pie y rollizo: las hojas alternas, lanceoladas, lisas, obliquas, algo ásperas por su margen, terminadas en seno obtuso y casi truncadas, con una puntita rígida y redoblada: el involucro universal de tres ó quatro hojuelas, entre oblongas y aovadas, obtusas, mas anchas que la hoja y apenas aserradas: los involucros parciales aovados, y por su base truncados: los petalos de color amarillo-roxo, con dos ó tres dientes; y los frutos lampiños. De las axilas inferiores de las hojas salen ramitas estériles. La figura de las hojas se acerca á la de las de la *Euphorbia pequeña*, terminadas en seno obtuso; pero *aquellas* tienen una linea de ancho, y *estas* el de un dedo.

ios. 37. EUPHORBIA umbel-
la quadrifida bifida, involu-
cellis reniformibus, primis
obcordatis. Syst. veg. 375.

Euphorbia umbella quin-
quesida bifida, involu-cellis
obcordatis. Amœn. Acad. 3.
p. 120.

Tithymalus tuberosa Py-
riformi radice. C. B. P. 292.
Tourn. p. 87.

Tithymalus tuberosa ra-
dice. Clus. hist. 2. p. 190.

Cast. Euphorbia apios ó sea de raiz en forma de Pera.
Habita en Creta. 26

Tiene las hojas de las ramas estériles entre lineares lan-

X Euphorbia con la umbela
hendida en quatro partes
hendidas en dos; involucros
parciales en forma de ríñon;
y los primeros de figura de
corazon al revés.

X Euphorbia con la umbela
hendida en cinco partes hen-
didas en dos; é involucros
parciales de figura de cora-
zon al revés.

X Tithymalo con la raiz tu-
berosa, y en forma de Pera.

X Tithymalo con la raiz tu-
berosa.

lanceoladas y obtusas; pero las de las ramas que llevan las flores entre casi redondas y aovadas: la umbela hendida en quatro partes; con las umbelillas hendidas en dos: el involucro universal de quatro hojuelas casi redondas, y apenas agudas; los involucros parciales primeros con hojuelas de figura de corazon al revés; y las de los posteriores en forma de riñon, con alguna puntita rígida.

PROPIED. Toda la planta purga con violencia los humores.

ESPECIES CON LA UMBELA HENDIDA EN CINCO PARTES.

Genis-
toides.

38. EUPHORBIA umbel-
la quinquefida bifida, invo-
lucellis ovatis, foliis linea-
ribus erectis, caule frutes-
cente. Berg. cap. 146.

Euphorbia con la umbela
hendida en cinco partes hen-
didas en dos; involucros par-
ciales aovados; hojas linea-
res, derechas; y tallo frutes-
cente.

Cast. Euphorbia como retama.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. $\frac{h}{2}$

Es arbusto levantado, con ramas alternas, rígidas y er-
xutas, muy sencillas, y las mas cortas que tambien lle-
van flores en su remate. Echa las hojas lineares, algo
amontonadas, derechas, lampifias, enterisimas y pe-
queñas: las umbelas terminales y sentadas: el involu-
cro universal de quatro hojuelas lanceoladas, y del lar-
go de la umbela: los involucros parciales de dos hojue-
las, entre aovadas y rhombas: la umbelilla ahorquilla-
da: los petalos en forma de media luna; y las capsulas
lampifias.

Spi-
osa.

39. EUPHORBIA *umbel-
la subquinquefida simplici,
involucellis ovatis, prima-
riis triphyllis, foliis oblon-
gis integerrimis, caule fru-
ticoso.* Amœn. Acad. 3. p.
120.

Euphorbia con la umbela
hendida en cinco partes, po-
co mas ó menos, sencillas,
ó sea que no se dividen mas
que en un pedunculo; invo-
lucros parciales aovados y los
primarios de tres hojuelas;
las hojas oblongas, enterisi-
mas; y el tallo fruticoso.

*Euphorbia inermis, fruti-
cosa, foliis lanceolatis inte-
gerrimis, floribus solitariis
terminalibus, involucris tri-
phyllis.* Hort. Cliff. 201.

Euphorbia inerme, fruti-
cosa, con hojas lanceoladas,
enterisimas; flores solitarias,
terminales; é involucros de
tres hojuelas.

*Euphorbia inermis, fruti-
cosa, ramis siccis pungens,
foliis ad umbellas ternis,
sæpius ovatis, floribus soli-
tariis.* Sauv. monsp. 51.

Euphorbia inerme, fruti-
cosa, que punza por medio
de sus ramas secas; con ho-
jas de tres en tres en las um-
belas, las mas veces aovadas;
y flores solitarias.

*Tithymalus Ragusinus,
flore luteo, pentapetalo.* Herm.
Lugdb. 600. t. 601.

Tithymalo de Ragusa,
con la flor amarilla y de
cinco petalos.

*Tithymalus maritimus,
spinus.* C. B. P. 291. To-
urn. p. 87.

Tithymalo maritimo, espi-
noso.

Cast. Euphorbia espinosa.

Habita en los montes maritimos de Creta y Provenza. *h*
Tiene comunmente las flores solitarias: las capsulas ver-
rugosas: los petalos redondos: las ramas que persisten
secas y parecen espinosas.

Epi-
ymoi
es.

40. EUPHORBIA *umbel-
la quinquefida bifida, invo-
lucellis ovatis, foliis lanceo-
latis obtusis subtus villo-
sis.* Jacq. Austr. t. 344.

Euphorbia con la umbela
hendida en cinco partes hen-
didas en dos; involucros par-
ciales aovados; hojas lanceo-
ladas, obtusas, y por deba-
xo vellosas.

Tithymalus epithymi X Tithymalo con el fruto
fructu. Col. ecphr. 2. p. 52. como el del epithymo.
 t. 51.
Peplios altera species. C. Otra especie de Peplide.
 B. P. 292. X

Cast. Euphorbia como epithymo.

Habita en Italia y Austria. ¶

Es semejante á la *Euphorbia dulce*; pero tiene las hojas mas ásperas en su margen, y vellosas por debaxo: los frutos erizados, con cerdas alesnadas y de color que tira á purpúreo.

Dulcis 41. EUPHORBIA umbel- X Euphorbia con la umbela
la quinquefida bifida, invo- hendida en cinco partes hen-
lucellis subovatis, foliis didas en dos; involucros par-
lanceolatis obtusis integer- ciales casi aovados; hojas
rimis. Amœn. Acad. 3. p. lanceoladas, obtusas y ente-
 122. Jacq. Austr. t. 213. X risimas.

Euphorbia umbella quin- X Euphorbia con la umbela
quefida bifida, involucellis hendida en cinco partes hen-
cordatis serratis, foliis lan- didas en dos; involucros
ceolatis obtusis, floribus parciales de figura de cora-
sessilibus, capsulis tuber- zon, aserrados; hojas lan-
culosis. Scop. carn. ed. 2. ceoladas, obtusas; flores serr-
 n. 573. X tadas; y capsulas con tuber-
 culos.

Tithymalus montanus, X Tithymalo montano, que
non acris. C. B. P. 292. To- no es acre.
 urn. p. 86.

Tithymalus nemorosus al- X Otro Tithymalo de bos-
ter, foliis latioribus & fir- ques sombríos, con hojas mas
mioribus. Barr. rar. ic. 840. anchas y mas firmes.

Pithyusa seu Esula, minor, X Pithyusa ú otra *Esula*, me-
altera, floribus rubris. Lob. nor; con flores encarnadas.
 ic. 358. X

Tithymalus dulcis, tube- X Tithymalo dulce, con la
rosa radice. Barr. ic. 909. raíz tuberosa.
 Gov. hort. 233. Syn. plant.
 Aragon. 59. X

Cast. Euphorbia dulce.

Habita en lugares sombríos de Alemania, Suiza, Francia é Italia: y en las orillas de los montes junto á Caspe de Aragon.

Echa los *involucros parciales* con aserraduras muy sutiles: el *fruto* encarnado, con puntitas duras; y los *petalos* enteros. Varía con *hojas* vellosas; y secandose se buelve negra.

Pi-
thyusa 42. EUPHORBIA *umbel-*
la quinquefida bifida, involu-
cellis ovatis mucronatis,
foliis lanceolatis, infimis in-
volutis retrorsum imbrica-
tis. Amœn. Acad. 3. p. 122.

Euphorbia con la umbela hendida en cinco partes hendidas en dos; involucros parciales aovados, terminados en punta rígida; hojas lanceoladas, las de abaxo envueltas ácia atrás y apiñadas.

Tithymalus foliis brevibus, aculeatis. C. B. P. 292.

Tithymalo de hojas cortas y con aguijones.

Pithyusa. Dalech. hist. 1652.

Pithyusa.

Tithymalus maritimus, Juniperi folio. Bocc. Sic. 9. t. 5. Moris. hist. 3. p. 337. sect. 10. t. 1. f. 25.

Tithymalo maritimo, con hoja como la del Enebro.

Cast. Euphorbia pithyusa.

Habita en lugares arenosos de Flandes, Italia, Marsella y España.

Port-
landi-
ca. 43. EUPHORBIA *umbel-*
la quinquefida dichotoma,
involucellis subcordatis concavis,
foliis lineari-lanceolatis acutis glabris patentibus. Huds. Angl. 183.

Euphorbia con la umbela hendida en cinco partes, ahorquillada; involucros parciales casi de figura de corazón, cóncavos; hojas entre lineares y lanceoladas, agudas, lampiñas y extendidas.

Tithymalus montanus, Esulæ folio, minor, Italicus. Barr. ic. 822.

Tithymalo montano, de Italia, menor; con hoja como la de la Esula.

Tithymalus maritimus, \times *Tithymalo maritimo*, *me-*
minor. Rai.Synop. 3. p. 313. \times nor.
 t. 24. f. 6. \times

Cast. Euphorbia de Portlandia.

Habita en Inglaterra. $\frac{h}{2}$

Echa los tallos algo fruticosos, del largo de un palmo, poco mas ó menos, lampiños, rollizos y roxos en el invierno: las hojas alternas, casi sin peciolo, entre lineares y lanceoladas, con punta rígida, lampiñas, extendidas y roxas por debaxo de su base: las ramitas laterales, y las que salen de las axilas inferiores estériles, y creciendo finalmente cubren el tallo: las umbelas terminales hendidas en cinco partes, ahorquilladas y extendidas: el involucro universal semejante á las hojas: los involucros parciales casi de figura de corazon, concavos y terminados en punta rígida: las flores casi sentadas y de color amarillo: las primeras y segundas masculinas, con los petalos sin astas y muy obtusos; pero las restantes hermafroditas, con petalos de dos astitas, ó á manera de media luna: y los frutos lampiños, con ángulos adornados de puntitas.

Para- 44. EUPHORBIA umbel- \times Euphorbia con la umbela
 lias. *la subquinquefida bifida; in-* \times hendida en cinco partes, po-
volucellis cordato-renifor- \times co mas ó menos, hendidas en
mibus, foliis sursum imbri- \times dos; involucros parciales en-
catis. Amœn. Acad. 3. p. \times tre de figura de corazon y
 129. Jacq. hort. t. 188. \times de riñon; y hojas arriba api-
 \times ñadas.

Tithymalus foliis lineari- \times *Tithymalo de hojas linea-*
bus, aristatis, imbricatis, \times *res, con arista, apiñadas;*
stipulis umbellaribus ovato- \times *estipulas de las umbelas en-*
lanceolatis, floralibus cor- \times *tre aovadas y lanceoladas; y*
datis. Hall. helv. n. 105. \times *las florales de figura de co-*
 \times *razon.*

Tithymalus maritimus. \times *Tithymalo maritimo.*
 C. B. P. 291. Dod. pempt.
 370. f. 1. 2. Tourn. p. 87. \times
 Barr. ic. 886. \times

Tithymalus paralias. X Tithymalo paralias.
Cam. epit. 962. X

Cast. Euphorbia paralias.

Habita en Europa en la arena del mar: en las playas del mar de Cataluña, Valencia y otras de España. ¶

Es planta de color garzo; con los petalos enteros.

Alep-
bica.

45. EUPHORBIA umbel- X Euphorbia con la umbela
la quinquefida dichotoma, X hendida en cinco partes,
involucellis ovato-lanceola- X ahorquillada; involucros par-
tis mucronatis, foliis infe- X ciales entre aovados y lan-
rioribus setaceis. Amoenit. X ceolados, terminados en pun-
Acad. 3. p. 122. Mill. dict. X ta rígida; y las hojas inferio-
n. 27. X res setáceas.

Tithymalus foliis inferio- X Tithymalo con las hojas
ribus capillaceis, superiori- X inferiores capiláceas; y las
bus Myrto similibus. Moris. X superiores semejantes á las
hist. 3. p. 338. X del Arrayan ó sea Myrto.

Tithymalus cyparissius. X Tithymalo cyparissio.
Alp. exot. 65. t. 64. X

Cast. Euphorbia de Alepo.

Habita en Creta y Alepo. ¶

Pinea.

46. EUPHORBIA umbel- X Euphorbia con la umbela
la quinquefida dichotoma, X hendida en cinco partes,
involucellis cordatis, foliis X ahorquillada; involucros par-
linearibus acuminatis con- X ciales de figura de corazon;
fertis, capsulis leviusculis. X hojas lineares, puntiagudas,
Syst. veg. 376. X amontonadas; y capsulas al-
go lisas.

Cast. Euphorbia como Pino.

Habita::::

Segetalis. 47. *EUPHORBIA umbellata quinquefida dichotoma, involucellis cordatis acutis, foliis lineari-lanceolatis, superioribus latioribus*. Ger. prov. 538. Pall. it. 1. p. 154. X Euphorbia con la umbela hendida en cinco partes, ahorquillada; involucros parciales de figura de corazon, agudos; hojas entre lineares y lanceoladas y las superiores mas anchas.

Euphorbia umbella quinquefida dichotoma, involucellis cordatis acutis, foliis lineari-lanceolatis, ramis floriferis. Amœn. Acad. 3. p. 121. Sp. pl. 3. p. 657. X Euphorbia con la umbela hendida en cinco partes, ahorquillada; involucros parciales de figura de corazon, agudos; hojas entre lineares y lanceoladas; y ramas que llevan flores.

Euphorbia inermis, foliis alternis linearibus acutis, parcialibus umbellæ ovato-rhombeis, petalis bicornibus. Hort. Ups. 142. X Euphorbia inerme, de hojas alternas, lineares, agudas, las parciales de la umbela entre aovadas y rombas; y petalos con dos astitas.

Tithymalus annuus, lunato flore, Linariæ folio longiore. Moris. hist. 3. p. 339. sect. 10. t. 2. f. 3. X Tithymalo annuo, con la flor á manera de media luna; hoja como la de la Linaria y mas larga.

Tithymalus segetum, longifolius. Rai. Angl. 3. p. 312. X Tithymalo que nace entre sembrados, con hoja larga.

Cast. Euphorbia que nace entre las mieses.

Habita en Mauritania y Rusia: Aragon, Cataluña y otras partes de España. ☉

Tiene los *petalos* en forma de media luna: el *fruto* liso, con ángulos ásperos: la *umbela* comunmente de la longitud de toda la planta: los *involucros parciales* casi medio redondos; con *ramas* que tambien llevan flores, debaxo de la umbela.

Hesperosopia. 48. *EUPHORBIA umbellata quinquefida trifida dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus serratis*. Amœn. Acad. 3. p. 124. Flor. dan. t. 725. X Euphorbia con la umbela hendida en cinco partes hendidas en tres y ahorquilladas; los involucros parciales aovados al revés; hojas en forma de cufia y aserradas.

Ti-

Tithymalus foliis petiolatis, subrotundis, serratis, stipulis rotundis, serratis. Tithymalo con hojas petioladas, casi redondas, aserradas; estipulas ó sean involucros redondos y aserrados.

Hall. helv. n. 1500. Tithymalo helioscopio ó que mira al Sol.

Tithymalus helioscopius. C. B. P. 291. Fuchs. hist. 811. Cam. epit. 963. Dod. pemp. 371. Tourn. p. 87.

Cast. Euphorbia que mira al Sol.
Habita en lugares cultivados de Europa: en los contornos de Madrid: en Cataluña, Aragon y otras muchas partes de España entre los sembrados. ☉
 Tiene los *pedunculos* de la umbela dos veces hendidos en tres partes y ahorquillados: los *involucros* semejantes á las hojas: los *petalos* enteros; y el *fruto* liso.

Ser-
 ata. 49. EUPHORBIA *umbellata quinquefida trifida dichotoma, involucellis diphyllis reniformibus, foliis amplexicaulibus cordatis serratis.* Euphorbia con la umbela hendida en cinco partes hendidas en tres y ahorquillada; involucros parciales de dos hojuelas en forma de ríñon; hojas que abrazan el tallo, de figura de corazon y aserradas.

Tithymalus Characias, folio serrato. Tithymalo Characias, con hoja aserrada. C. B. P. 290. Tourn. p. 57.

Tithymalus Myrsinites, Valentinus. Tithymalo de Valencia, con hoja como la del Myrto. Clus. hist. 1. p. 189.

Cast. Euphorbia aserrada.
Habita en Narbona, Italia y Oriente: en los circuitos de Madrid: en Valencia, Aragon, Cataluña y otras partes de España. ☉

Verrucosa.

50. EUPHORBIA umbellata quinquesida subtrifida bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis serrulatis villosis, capsulis verrucosis. Amœn. Acad. 3. p. 120.

Euphorbia umbella quinquesida bifida, involucellis supra medium serratis ovatis, caulibus diffusis. Scop. carn. ed. 2. n. 577.

Tithymalus foliis ellipticis, serratis, stipulis umbellaribus quinis, floralibus obtuse quadrangulis, fructibus undique exasperatis. Hall. helv. n. 1052.

Tithymalus Myrsinites, fructu verrucæ simili. C. B. P. 291. Moris. hist. 2. sect. 10. t. 3. f. 3. Tourn. p. 86.

Cast. *Euphorbia verrugosa.*

Habita en Francia, Suiza, Italia y Oriente: en Aragón, Cataluña y otras partes de España. ♂

Tiene el fruto verrugoso y con vello: los pétalos enteros: y los tallos tendidos, bien que alguna vez se hallan levantados.

Corolada.

51. EUPHORBIA umbellata quinquesida trifida dichotoma, involucellis foliisque oblongis obtusis, petalis membranaceis. Amœnit. Acad. 3. p. 122.

Euphorbia con la umbela hendida en cinco partes hendidas en tres ó quatro, y otra vez hendidas en dos; involucros parciales aovados; hojas lanceoladas, con vello aserraditas; y capsulas verrugosas.

Euphorbia con la umbela hendida en cinco partes hendidas en dos; involucros parciales aserrados de medio arriba, aovados; y tallos difusos.

Tithymalo con hojas elípticas, aserradas; estipulas ó sean involucros de la umbela de cinco en cinco; los florales ó sean parciales de quatro ángulos obtusos; y los frutos por todas partes muy ásperos.

Tithymalo con hoja como la del Myrto; y fruto semejante á una verruga.

Euphorbia con la umbela hendida en cinco partes hendidas en tres, y ahorquillada; involucros parciales y hojas oblongos y obtusos; y pétalos membranáceos.

Euphorbia inermis, foliis lanceolatis, obtusis, alternis, ramis floriferis dichotomis, petalis maximis, subrotundis. Gron. virg. 58. Euphorbia inerme, con hojas lanceoladas, obtusas, alternas; ramas que llevan las flores ahorquilladas; petalos muy grandes y casi redondos.

Tithymalus Marianus, angustis rigidis foliis, summo caule ramosus, foliis atque ramulis ad divaricationes ternis. Pluk. mant. 182. t. 446. f. 3. Tithymalo de la Isla Mariana, ramoso en la sumidad del tallo; con hojas angostas y rígidas, de tres en tres, igualmente que sus ramitas, en las divisiones; ó sea con las umbelas hendidas en tres partes; y los involucros de tres hojuelas.

Cast. Euphorbia con las corolas grandes.
Habita en la Virginia y Canadá.

52. EUPHORBIA umbel. la quinquesida trifida dichotoma, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, capsulis lanatis. Ameen. Acad. 3. p. 123. Euphorbia con la umbela hendida en cinco partes hendidas en tres y ahorquilladas; involucros parciales aovados; hojas lanceoladas; y capsulas lanudas.

Tithymalus arboreus, caule corallino, folio Hyperici, pericarpio barbato. Boher. Lugdb. 1. p. 256. Tithymalo arboreo, con el tallo como Coral; hoja parecida á la del Hypericon; y pericarpio barbado.

Cast. Euphorbia como Coral.
Habita en Sicilia, Mauritania y Oriente. 26

53. EUPHORBIA umbel. la quinquesida trifida bifida, involucris ovatis, petalis integris, foliis lanceolatis subpilosus apice serratis. Euphorbia con la umbela hendida en cinco partes hendidas en tres, y otra vez hendidas en dos; involucros aovados; petalos enteros; hojas lanceoladas, algo pelosas y aserraditas por su ápice.

Euphorbia foliis alternis, ex ovali-lanceolatis, umbellis diphyllis subtrifloris, capsulis erectis, muricatis, caule simplici. Gmel. Sib. 2. p. 226. t. 93.

Euphorbia de hojas alternas, entre ovales y lanceoladas; umbelas con dos hojuelas y tres ó quatro flores capsulas derechas, con puntitas duras; y tallo sencillito.

Tithymalus palustris, villosus, mollior, erectus. Barr. rar. 41. t. 885.

Tithymalo palustre, villososo, mas blando y derecho.

Tithymalus incanus, hirsutus. C. B. P. 292? Tourn. p. 86.

Tithymalo con pelo áspero y blanquecino.

Tithymalus Characias, pratensis, incanus. Magn. monsp. 255.

Tithymalo Characias, pratense, blanquecino.

Cast. Euphorbia pelosa.

Habita en Siberia. \mathcal{L} y en Aragon. *Synops. Aragon.*

Tiene exáctamente la traza como la de la *Euphorbia palustris*; de manera que facilmente se equivoca con ella aunque es un poco mayor: las *hojas* entre anchas lanceoladas, alternas, con pelos en una y otra parte poco manifiestos, y aserradas muy delgadamente por su ápice; de suerte que apenas se observan sus aserraduras: las *umbelas* amontonadas con las *umbelillas* laterales; tanto que dificultosamente se puede averiguar quales sean las primarias: los *involucros* amarillos: las *flores* primarias masculinas y de cinco petalos amarillos: las *restantes* hermafroditas de quatro petalos transversalmente ovales: los *frutos* verrugosos y salpicados de pelos blancos muy sutiles: las *ramas* que salen de las axilas de las hojas inferiores, estériles; pero los *pedunculados* que provienen de las axilas mas altas llevan *umbelas*

Orientalis.

54. EUPHORBIA *umbellata quinquesida quadrifida dichotoma, involucellis subrotundis acutis, foliis lanceolatis.* Amœnit. Acad. 3. p. 123.

Euphorbia con la *umbellata* hendida en cinco partes hendidas en quatro y ahorquillada; involucros parciales casi redondos, agudos; y *hojas* lanceoladas.

Ti-

Tithymalus Orientalis, Sa- X *Tithymalo Oriental*, con
licis folio, caule purpureo, X hoja como la del Sauce; ta-
flore magno. Tourn. cor. 2. X llo purpúreo; y flor grande.

Cast. *Euphorbia Oriental.*
Habita en Oriente.

55. *EUPHORBIA umbel-* X *Euphorbia con la umbela*
la quinquesida trifida di- X *hendida en cinco partes hen-*
chotoma, involucris carina- X *didas en tres y ahorquilladas;*
pilosis, foliis serratis lan- X *involucros pelosos en su qui-*
ceolatis, capsulis verruco- X *lla; hojas aserradas, lan-*
sis. Jacq. austr. t. 376. X *ceoladas; y capsulas verru-*
 X *gosas.*

Euphorbia umbella quin- X *Euphorbia con la umbela*
quesida subquadrifida di- X *hendida en cinco partes hen-*
chotoma, involucellis pri- X *didas en tres ó quatro y ahor-*
mariis tetraphyllis, foliis X *quilladas; involucros parcia-*
serratis lanceolatis sessili- X *les primarios de quatro ho-*
bus. Amoen. Acad. 3. p. 124. X *juelas; hojas aserradas, lan-*
 X *ceoladas y sin peciolo.*

Euphorbia inermis, foliis X *Euphorbia inerme, con*
alternis lanceolatis amplexi- X *hojas alternas, lanceoladas,*
caulibus subserratis, um- X *que abrazan el tallo, algo*
bella universali quinquesida X *aserradas; umbela universal*
pentaphylla, partialibus bi- X *hendida en cinco partes, con*
fidis. Hort. Ups. 141. X *cinco hojuelas; y las umbe-*
 X *las parciales hendidas en dos.*

Euphorbia inermis, foliis X *Euphorbia inerme, con*
lanceolatis, umbella univer- X *hojas lanceoladas; umbela*
sali partialiumque prima X *universal, y la primera de*
quinquesidis, secunda trifi- X *las parciales hendidas en*
da, reliquis bifidis. Roy. X *cinco partes, la segunda en*
Lugdb. 198. X *tres; y las restantes en dos.*

Tithymalus foliis lanceo- X *Tithymalo con hojas lan-*
latis, serratis, stipulis flo- X *ceoladas, aserradas; estipu-*
ralibus cordatis, fructibus X *las ó sean involucros florales*
asperis, lineis levibus divi- X *de figura de corazon; frutos*
sis. Hall. helv. n. 1053. X *ásperos, y divididos con li-*
 X *neas lisas.*

Tithymalus arvensis, latifolius, Germanicus. C. B. P. Tithymalo de Alemania arvensis; y con hoja ancha
291. Moris. hist. 3. sect. 10.
t. 3. f. 1. Tourn. p. 86.

Tithymalus platyphyllos. Tithymalo de hoja ancha
Fuchs. hist. 813. Bauh. hist. 3. p. 670.

Cast. Euphorbia de hoja ancha.

Habita en los campos de Francia, Inglaterra y Alemania y en lugares marítimos de España. ☉

Produce el tallo derecho, del largo de un pie y lampiñas las hojas alternas, apartadas, extendidas, lanceoladas lampiñas, aserraditas, y con pelillos muy claros en su quilla; las inferiores algo pecioladas, y mas anchas á su remate; las superiores escotadas en su base, y sobre ella dobladas por los lados: el involucro universal lanceolado: los involucros parciales entre aovados y oblongos, y todos aserraditos: los pétalos enteros, casi redondos y amarillos: y los gérmenes con verrugas poco manifestas. De las axilas de las hojas sale una umbelilla hendida en tres pedunculos: y la parte superior de la planta es de color entre verde y amarillo-roxo.

En las hojas de la planta tierna se halla una mancha roxa, formada de líneas pequeñas.

ESPECIES CON LA UMBELA HENDIDA EN MUCHAS PARTES

Esula. 56. EUPHORBIA umbel- Euphorbia con la umbelilla
la multifida bifida, involucellis subcordatis, petalis subbicornibus, ramis sterilibus, foliis uniformibus. hendida en muchas partes
Amoen. Acad. 3. p. 127. hendidas en dos; involucros parciales casi de figura de corazon; pétalos casi con dos astitas; ramas estériles y hojas uniformes.

Tithymalus foliis linearibus, petalis emarginatis. Tithymalo con hojas lineares; y pétalos escotados.
Hall. helv. n. 1046.

Euphorbia umbella multifida bifida, involucellis triangulari-cordatis, foliis superioribus latioribus. Ger. prov. 540.

Tithymalus foliis Pini, forte Dioscoridis Pithyusa. C. B. P. 292. Tourn. p. 86.

Tithymalus maritimo affinis, Linariæ folio. C. B. P. 291.

Esula minor. Dalech. hist. 1653. Dod. pempt. 374.

Euphorbia con la umbela hendida en muchas partes hendidas en dos; involucros parciales entre triangulares y de figura de corazon; y hojas superiores mas anchas.

Tithymalo con hojas como las del Pino, y acaso la que Dioscorides llama Pithyusa.

Tithymalo parecido al maritimo, con hoja como la de la Linaria.

Esula menor.

Cast. Euphorbia Esula.

Habita en Alemania, Flandes, Suiza y Carniola. 2

Tiene todas las flores fértiles: quatro petalos de color amarillo-roxo, y con dos astitas poco manifestas: el fruto lampiño; y las umbelas laterales del tallo ahorquilladas.

57. EUPHORBIA *umbella multifida dichotoma, involucellis subcordatis, ramis sterilibus, foliis setaceis, caulinis lanceolatis.* Amoen. Acad. 3. p. 127.

Euphorbia inermis, foliis confertis linearibus, umbella universalis multifida, parcialibus dichotomis, foliolis subrotundis. Hort. Cliff. 199.

Tithymalus cyparissius. C. B. P. 291. Dalech. hist. 1644. Tourn. p. 86.

Euphorbia con la umbela hendida en muchas partes ahorquilladas; involucros parciales casi de figura de corazon; ramas estériles; hojas setáceas; y las del tallo lanceoladas.

Euphorbia inerme, de hojas amontonadas, lineares; umbela universal hendida en muchas partes; las parciales ahorquilladas, con sus hojuelas ó sean involucros casi redondos.

Tithymalo cyparissio.

Euphorbia umbella multifida, dichotoma, involu- cellis cordatis, foliis linearibus, capsulis verrucosis.
Scop. ed. 2. n. 582. R.

Euphorbia con la umbel-
hendida en muchas parte-
ahorquilladas; involucros pa-
ciales de figura de corazón
hojas lineares; y capsu-
verrugosas.

α *Esula degener.* Rivin. R.

Esula que degenera.

Tithymalus cyparissius, foliis punctis croceis notatis.

Tithymalo cyparisio,

C. B. P. 291.

hojas señaladas con puntitos
de color de azafran.

Cast. *Euphorbia cyparisia.*

Habita en los caminos y collados secos de Alemania, Prusia, Suecia, Polonia, Hungría, Italia, Francia, España, Portugal, Sicilia, Cerdeña, y otras partes de España. ¶

Tiene la *umbela* semejante á la de la *Euphorbia Esula* pero quando se marchita crecen mucho las ramitas laterales y forman como un pequeño Pino; con las hojas muy angostas, filiformes y planas. Produce los *petalos* en forma de media luna; y los *frutos* lisos, aunque alguna vez se hallan verrugosos.

Myrsi-
nites.

58. *EUPHORBIA umbella suboctofida bifida, involu- cellis subovatis, foliis spatulatis patentibus carnosis mucronatis margine scabris.*
Amoen. Acad. 3. p. 128.

Euphorbia con la umbel-
hendida casi en ocho parte-
hendidas en dos; involucros
parciales casi aovados; ho-
jas en forma de espatula, ter-
minadas, carnosas, termi-
nadas en punta rígida y
ásperas por su margen.

Euphorbia inermis, foliis ligulatis, spinula terminatis, ad umbellam duodenis, bracteis trigonis, spinula terminatis. Sauv. monsp. 51.

Euphorbia inerme, con
hojas á manera de lengua
terminadas en una espinita
de doce en doce en la umbel-
la; bracteas de quatro
dos, y terminadas también
en una espinita.

Tithymalus Myrsinites, latifolius. C. B. P. 290. Barr.
ic. 1200. Tourn. p. 86.

Tithymalo como Myrsi-
y de hoja ancha.

Tithymalus Myrsinites X Tithymalo como Myrto, legitimus. Clus.hist.2.p.189. X legitimo.

Cast. Euphorbia como Myrto.

Habita en la Calabria, Mompeller y Cataluña. ¶

Arroja muchos tallos del largo de un pie, inclinados, verdes, y con cicatrices por abaxo formadas de la caída de las hojas: las *hojas* alternas, en forma de espatula, correas, cóncavas, de color entre azul y verde, extendidas ó abiertas, terminadas en punta rígida, algo ásperas por su margen, y las superiores redobladas: la *umbela* hendida en siete ó nueve partes hendidas en dos una vez solamente: el *involucro universal* de siete hasta nueve hojuelas, aovadas, mas delgadas y agudas: los *involucros parciales* de dos hojuelas, casi de figura de corazon, mas anchas, cóncavas, agudas, y algo ásperas por su margen: las *flores* que se hallan dentro de los involucros parciales primarios y secundarios, masculinas, y las restantes hermafroditas: los *cálices* aserrados por su boca: quatro *petalos* de color amarillo-roxo, lustrosos, de dos astitas, con sus *ápices* rollizos; y las *capsulas* lampiñas.

59. EUPHORBIA *umbel-* X Euphorbia con la umbela
la multifida subtrifida bi- X hendida en muchas partes
fida, involucellis ovatis, fo- X hendidas en tres ó quatro, y
liis lanceolatis, ramis steri- X hendidas otra vez en dos; in-
libus. Amoen. Acad. 3. p. 126. X volucros parciales aovados;
 Mat. Med. 140. X hojas lanceoladas; y ramas
 estériles.

Tithymalus foliis ellipti- X Tithymalo con hojas elip-
cis, ramis umbellam supe- X ticas; ramas mas altas que la
rantibus, capsulis exaspe- X umbela; y capsulas muy ás-
ratis. Hall. helv. n. 1054. X peras.

Tithymalus palustris, X Tithymalo palustre, fru-
fruticosus. C. B. P. 292. Mo- X ticoso.

ris. hist. 3. sect. 10. t. 2. f. 1.
 Tourn. p. 87.
Esula major. Dalech. hist.
 1653. Dod. pempt. 374.

Esula mayor.

Cast. Euphorbia palustre. Farm. Esula.

Habita en la Suecia Austral, en Alemania y Flandes.

Tiene los *petalos* enteros; y el *fruto* verrugoso.

PROPIED. *La corteza de la raiz de esta planta es acida y corrosiva: purga con mucha violencia los humores y se aplica exteriormente para curar la sarna y herpes.*

Hiberna.

60. EUPHORBIA *umbellata sexfida dichotoma, involucellis ovalibus, foliis integerrimis, ramis nullis, capsulis verrucosis.* Amœn. Acad. 3. p. 128.

Tithymalus latifolius, Hispanicus. C. B. P. 291.

Tithymalus Hibernicus, vasculis muricatis, erectis.

Dill. elth. 387. t. 290. f. 374.

Euphorbia con la umbel-
hendida en seis partes
ahorquillada; involucros pa-
ciales ovales; hojas enteras
mas; rama ninguna; y cap-
sulas verrugosas.

Tithymalo de España, con
hoja ancha.

Tithymalo de Hibernia
con los vasitos ó sean fru-
tos cubiertos de puntas de
ras, y derechos.

Cast. Euphorbia de Hibernia.

Habita en Hibernia, Siberia, Austria, y en los Pirineos. 4

Dendroides.

61. EUPHORBIA *umbellata multifida dichotoma, involucellis subcordatis, primariis triphyllis, caule arboreo.* Amœn. Acad. 3. p. 128.

Tithymalus arboreus. Alp. exot. 60. Tourn. p. 85.

Tithymalus Myrtifolius, arboreus. C. B. P. 290.

Tithymalus dendroides. Camm. epit. 965. Bauh. hist. 3. p. 675.

Euphorbia con la umbel-
hendida en muchas partes
ahorquillada; involucros pa-
ciales casi de figura de cor-
razon, los primarios de tres
hojuelas; y el tallo arboreo.

Tithymalo arboreo.

Tithymalo arboreo, con
hoja como la del Myrto.

Tithymalo arboreo.

Cast. Euphorbia arborea.

Habita en Italia, Creta é Islas Eras. 7

Amig-
a loi-
les.

62. EUPHORBIA *umbel-*
la multifida dichotoma, in-
volucellis perfoliatis orbi-
cularis, foliis obtusis. Amœn.
Acad. 3, p. 126.
Tithymalus Characias,
amigdaloides. C. B. P. 290.

Euphorbia con la umbela
hendida en muchas partes y
ahorquillada; involucros par-
ciales perfoliados, redondos;
y hojas obtusas.
Tithymalo Characias, con
hojas parecidas á las del Al-
mendro.

Cast. Euphorbia con hojas como de Almendro.

Habita en Francia y Alemania.

Tiene umbelas tambien laterales: el tallo herbáceo: las
hojas alternas, apartadas y delgadas.

ylva-
ica.

63. EUPHORBIA *umbel-*
la quinquefida bifida, invo-
lucellis perfoliatis subcor-
datis acutiusculis, foliis
lanceolatis integerrimis.
Jacq. Austr. t. 375.

Euphorbia con la umbela
hendida en cinco partes hen-
didas en dos; involucros
parciales perfoliados, casi
de figura de corazon, algo
agudos; hojas lanceoladas y
enterisimas.

Tithymalus toto anno fo-
lia retinens. Bauh. hist. 3.
p. 671.

Tithymalo que retiene las
hojas todo el año.

Tithymalus lunato flore.
Col. ecphr. 2. p. 56. t. 57.

Tithymalo con las flores 6
sean los petalos á manera de
media luna.

Tithymalus sylvaticus,
lunato flore. C. P. P. 290.
Moris. hist. 3. p. 335. sect.
10. t. 1. f. 3. Tourn. p. 85.

Tithymalo de selvas, con
la flor á manera de media
luna.

Cast. Euphorbia silvática.

Habita en la Europa mas Austral: en Aragon, Cataluña,
Valencia y otras partes de España. \hbar

Echa los tallos fruticosos, prolificos y crasos: las hojas
pelosas y perennes: los petalos en forma de media luna
y roidos.

Characias.

64. *EUPHORBIA umbellata multifida bifida, involu- cellis perfoliatis emarginatis, foliis lanceolatis integerrimis, caule frutescente.* Amoen. Acad. 3. p. 126.

Euphorbia con la umbel-
hendida en muchas partes
hendidas en dos ; involucros
parciales perfoliados , esco-
tados ; hojas lanceoladas ,
enterisimas ; y tallo frutes-
cente.

Euphorbia inermis, foliis lanceolatis, umbella universalis multifida: partialibus dichotomis, involucris semibifidis perfoliatis. Hort. Cliff. 199.

Euphorbia inerme , con
hojas lanceoladas ; umbella
universal hendida en muchas
partes y las parciales ahor-
quilladas ; involucros medio
hendidos en dos partes , y
perfoliados.

Tithymalus Characias, rubens, peregrinus. C.B.P. 290. Tourn. p. 85.

Tithymalo Characias, pe-
regrino , de color que tira á
roxo.

Tithymalus Characias I. Clus. hist. 2. p. 2. p. 188.

Tithymalo Characias pri-
mero.

Cast. Euphorbia Characias.

Habita en Francia , Italia y Alemania : en Andalucía , Valencia , Aragon , Cataluña y otras partes de España. Es sumamente parecida á la *Euphorbia sylvatica* y á la con hojas como de Almendro : y varía de diferentes mo-
dos.

1.^o Con el tallo fruticoso , veloso ; con algunas ramas que salen de su remate : las hojas apenas velosas : los involucros parciales primeros divididos en dos partes , y los restantes perfoliados , y hendidos tambien en dos partes : los petalos enteros , y terminados en seno obtuso. Este es el Tithymalo Characias con hoja lanuginosa. C. B. P. 290. Tourn. p. 86.

2.^o Con el tallo fruticoso , sencillo , con vello poco manifiesto : las hojas extendidas : los pedunculos vellosos : los petalos en forma de media luna , roxos : y las flores pequeñas.

3.^o Con el tallo fruticoso , liso y sencillo : las hojas redobladas , lampiñas y lustrosas : el racimo comun oblongo , é inclinado antes de abrir las flores : los pedunculos lampiños : todos los involucros parciales perfoliados y hendi-
dos

dos en dos partes : los petalos en forma de media luna, con dientecitos : las flores mayorcitas ; y los frutos lisos.

743. Género VISNEA. *Suppl. p. 36.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio baxo del germen , persistente , de cinco hojuelas lanceoladas , encorvadas ácia atrás ; y las tres exteriores pelosas.

COR. de cinco petalos elipticos , iguales , extendidos , enteros , y apenas mas largos que el caliz.

ESTAMB. Filamentos doce , derechos , insertos en el receptáculo , filiformes , mas cortos que los petalos : con las anteras de quatro ángulos , derechas , y terminadas en arista.

PIST. Germen dentro de la flor , con pelo áspero , adelgazado casi en un estilo cortísimo : estilos tres , filiformes y lampiños : con los estigmas sencillos.

PERIC. Nuez aovada y lampiña , puntiaguda , de dos ó tres celdillas , encerrada en las hojuelas del caliz arrimadas ; pero con su tercera parte desnuda ó fuera de ellas.

SEM. una en cada celdilla.

ESPECIE.

1. VISNEA. *Suppl. p. 251. X* Visnea.

Mocanera. Canar.

X Mocanera : llamada así por los de Canarias.

Cast. Visnea Mocanera.

Habita en las selvas montuosas de las Islas Canarias. Francisco Massones. \bar{h}

Es arbusto pequeño , que arroja el tallo algo verrugoso y rollizo : las hojas alternas , derechas , con peciolo corto , elipticas , muy lampiñas , venosas , aserradas , y de la consistencia de las del Laurel : los pedunculos axilares , solitarios , inclinados , apenas mas largos que el peciolo y desnudos ; con una flor pequeña y amarilla.

Fecundada la flor se levanta el pedunculo ; se cierra y se encrasa el caliz ; y sus tres hojuelas exteriores se vuelven obscuras y pelosas.

744. Género TACCA. *Suppl. p. 37.**Forst. gen. n. 35.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* encima del germen , de seis hojuelas , aovadas , arrimadas entre sí ó cerradas y persistentes.**COR.** *Petalos* seis , arqueados é iguales.**ESTAMB.** *Filamentos* apenas alguno : *anteras* oblongas , colocadas de dos en dos en la cavidad de cada *petalo*.**PIST.** *Germen* baxo del caliz : *estilos* tres , cortos : con los *estigmas* de figura de corazon al revés.**PERIC.** *Baya* seca , aovada , angulada y de tres celdillas.**SEM.** muchas , aovadas , y con estrias.

E S P E C I E .

Pinna-
tifida.1. TACCA. *Suppl. p. 251.* X Tacca.*Forst. gen. n. 35.**Tacca littorea.* Rumph. X Tacca de playas.*Amb. 5. p. 328. t. 114,**Tacca sativa.* Rumph. X Tacca sativa.*Amb. 5. p. 324. t. 112.* X**Cast.** Tacca con hojas hendidas al través.**Habita** en la India Oriental y en Taheiti. *Sparrm. 24*
Las *hojas* se asemejan á las del *Draconcio* de muchas *hojuelas*.745. Género PALLASIA. *Suppl. p. 37.**Pterococcus. Pallas.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. ninguno.**COR.** *Petalos* cinco , algo redondos , casi desiguales y persistentes.**ESTAMB.** *Filamentos* quince , setáceos , del largo de la *corola* , gruesecitos por su base , y persistentes : con las *anteras* casi globosas y mellizas.

PIST.

PIST. *Germen* dentro de la flor, cónico y con pliegues: *estilos* tres ó quatro, redoblados: con los *estigmas* en cabezuela.

PERIC. ninguno, sino que sea la corteza de la semilla.

SEM. *Nuez* oblonga, de quatro ángulos hendidos en dos partes y membranosos.

ESPECIE.

Caspica. 1. PALLASIA. Suppl. p. 252. Pallasia.

Pterococcus aphyllus. Pall. *Pterococco* (ó sea fruto con alas) sin hojas.

Cast. Pallasia caspica.

Habita entre Volga y Jaico, en los campos arenosos ácia el mar Caspio. \bar{h}

Es arbusto del largo de quatro pies, muy ramoso, sin hojas y articulado, con las flores laterales en los nudos, conglobadas, blancas, y pequeñas.

ORDEN IV.

PENTAGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON CINCO PISTILOS.

746. Género GLINUS. * *Loefl.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de cinco hojuelas, aovadas, cóncavas, de color por dentro y persistentes.

COR. ninguna.

Nectarios las mas veces cinco, planos, como si fuesen petalos, angostos, mas cortos que el caliz, y hendidos en dos ó tres partes desiguales.

ESTAMB. *Filamentos* cerca de quince, alesnados, planos, y de la longitud del caliz: con las *anteras* derechas, oblongas, comprimidas y mellizas.

PIST. *Germen* de cinco lados: *estilos* cinco y cortos: con los *estigmas* sencillos.

PERIC. *Capsula* aovada, de cinco celdillas, de cinco ángulos, y cinco ventallas.

SEM.

SEM. muchas , casi redondas , con tuberculos , colocadas en una série baxo de las ventallas , y fixadas á la base de una membrana hinchada.

ESPECIES.

- Lo-
toides. 1. *GLINUS caule piloso,* X Glino con el tallo peloso
foliis obovatis. Loeff. it. 145. X y hojas aovadas al revés.
Gron. Orient. 143. Burm. Ind.
t. 36. f. 1.
- Alsine Lotoides , Sicula.* X Alsine de Sicilia , pareci-
Bocc. Sic. 21. t. 11. Tourn. X da al Loto yerba.
p. 242.
- Portulaca Bætica , luteo* X Verdolaga de Andalucía,
flore, spuria, aquatica. Barr. X espuria , aquatica , con flor
rar. 478. t. 336. X amarilla.

Cast. Glino como Loto yerba.

Habita en fosos y lugares de agua : en Extremadura , cerca de Talavera de Badajoz : en Andalucía , Valencia y otras partes de España. ☉

Echa la *raiz* grande , sencilla , y muy profunda , con fibras por sus lados : muchos *tallos* casi del largo de un pie , desparramados , tendidos , algo lampiños , ramosos y casi articulados , con los artículos en las ramificaciones mas crasos por la parte inferior y vellosos : las *ramas* alternas , laterales , otra vez ramosas , semejantes al tallo , y mas vellosas : las *hojas* aovadas al revés , pecioladas , de dos en dos , ó de tres en tres , insertas siempre al lado superior del tallo ; con el *peciola* casi la mitad mas largo que ellas , y algo plano por encima : las *flores* casi sentadas , amontonadas en los nudos y hojas , saliendo siempre de la parte superior del tallo : los *pedunculos* cortísimos , casi del largo del caliz y vellosos. *Loeff.*

- Dic-
tamno-
ides. 2. *GLINUS caule rigoso,* X Glino con el tallo yerto
foliis orbiculatis tomentosis. X hojas redondas y tomentosas
Burm. Ind. 113. † X

Alsine Lotoides, Dictamni X *Alsine de Madraspatan,*
Cretici facie, Maderaspa- X *parecida al Loto yerba; y*
tana. Pluk. Amalt. 10. t. 356. X *con traza como la del Dicta-*
 f. 6. X *mo Cretico.*

Cast. Glino como Dictamo.

Habita en la India.

Vease á Pluk. t. 12. f. 3.

ORDEN V.

POLYGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON MAS DE CINCO
 PISTILOS.

747. Género **SEMPERVIVUM.** * Sedi species.

Tourn. t. 140.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* dividido en seis hasta doce lacinias, cóncavo, agudo y persistente.

COR. *Petalos* de seis hasta doce, lanceolados, ú oblongos, agudos, cóncavos y poco mayores que el caliz.

ESTAMB. *Filamentos* de seis hasta doce, alesnados y delgados: con las *anteras* casi redondas.

PIST. *Gérmenes* de seis hasta doce, puestos en cerco, derechos, que rematan en otros tantos *estilos* extendidos: con los *estigmas* agudos.

PERIC. *Capsulas* de seis hasta doce, oblongas, comprimidas, cortas, puestas en cerco, puntiagudas ácia fuera, y que se abren ácia dentro.

SEM. muchas, casi redondas y pequeñas.

OBS. El número, señaladamente en las partes femeninas, las mas veces se aumenta.

E S P E C I E S.

Arbo-
reum.
 1. **SEMPERVIVUM** *cau-* X *Siempreviva con el tallo*
le arborescente lævi ramoso. X *arborescente, liso y ramoso.*
Sempervivum caule infer- X *Siempreviva con el tallo*
ne nudo lævi ramoso. Hort. X *por abaxo desnudo, liso y*
 Cliff. 179. X *ramoso.*

Se-

Sedum majus, arborescens, X Sedo mayor, arborescente
flosculis candidis. C. B. P. con las florecitas candidas.
 282. Tourn. p. 262.

Sedum majus, legitimum. X Sedo mayor, legitimo.
 Clus. hist, 2. p. 58. Dod.
 pempt, 127.

Cast. Siempreviva arborea.

Habita en Creta, Córcega y Portugal: en Barcelona, Va-
lencia, Murcia, Andalucía, Galicia y otras partes del
 Reyno. h

Tiene el caliz dividido en diez partes: diez *petalos*: diez
pistilos: y otras tantas *escamas* del nectario en la base
 de los filamentos: y veinte *estambres*,

Canariense. 2. SEMPERVIVUM cau- X Siempreviva con el tallo
le foliorum ruderibus lace- lacerado por los residuos de
ro, foliis retusis, las hojas que se han caído, y
 estas que rematan en seno
 obtuso.

Sedum Canarium, foliis X Sedo de las Canarias, con
omnium maximis. Comm. hojas mas grandes que to
 hort. 2. p. 189. t. 95, das las de su género.

Sedum majus, Canarium, X Sedo mayor, de Canarias
acaulon, pilis ad oras folio- sin tallo; y con pelos rige
rum hispidis. Pluk. Alm. dos en las orillas de las ho
 240. t. 314. f. 1. Rai, Suppl. jas,
 p. 362.

Cast. Siempreviva de Canarias.

Habita en Canarias. h

Tiene el tallo corto y sencillo,

Tecto-
 rum.

3. SEMPERVIVUM fo- X Siempreviva con hojas pes
liis ciliatis, propaginibus tañosas, y renuevos abier
patentibus. Mat. Med. 140. tos.
 Flor. Dan. t. 601.

Sempervivum foliis radi- X Siempreviva con las hojas
calibus carnosis ciliatis, radicales carnosas, pestaño
caulinis imbricatis membra- sas, las del tallo apiñadas,
naceis, corymbo racemoso membranáceas; corimbo ra
reflexo. Hort. Cliff. 179. cimoso y redoblado.

Sedum majus alterum, Otro Sedo mayor, ó bar-
seu barba Jovis. Dod. pempt. ba de Júpiter.
 127.

Sedum majus, vulgare. C. Sedo mayor, vulgar.
 B. P. 283. Tourn. p. 262.

Cast. Siempreviva de texados.

Habita en los texados y cerros de Europa: en los Piri-
 neos, montañas de Burgos, Leon, Asturias y otras par-
 tes de España sobre las chozas. ¶

PROPIED. La yerba es algo acre y austera, refrigerante
 y astringente: y se usa en las calenturas, dysenterias,
 aftas, quemaduras y callos.

4. **SEMPERVIVUM** fo-
liis ciliatis, propaginibus Siempreviva con hojas pes-
globosis. Jacq. Austr. t. 12. tañosas, y renuevos globo-
 sos.

Sedum majus, vulgari si- Sedo mayor, semejante al
mile, globulis decidentibus. vulgar, con los globulillos
 Moris. hist. 3. p. 472. sect. que se caen.
 12. t. 7. f. 18.

Sedum vulgari magno si- Sedo semejante al vulgar
mile. Bauh. hist. 3. p. 688. grande.
 Tourn. p. 262.

Cast. Siempreviva globifera.

Habita en Rusia. Gmel. en Austria y Alemania. ¶

Varia con doce petalos, entre alesnados y lanceolados, de
 color amarillo roxo, con pelo áspero y pestañosos.
 Hall.

5. **SEMPERVIVUM** fo-
liis pilis intertextis, propa- Siempreviva de hojas con
ginibus globosis. Knorr. de- pelos entretexidos; y renue-
 vos globosos.
 lin. 2. t. S. 8.

Sempervivum rubrum, Siempreviva montana, en-
montanum, gnaphaloides. carnada, con hojas como
 Col. ecphr. p. 292. t. 291. tomentosas.

Sedum montanum, tomen- Sedo montano, tomento-
tosum. C. B. P. 284, Tourn. so.
 p. 262.

Cast.

Cast. Siempreviva con tela como de araña.

Habita en los Alpes de Italia, Suiza y Pirineos. 24

Tiene nueve *petalos* purpúreos; y es variedad de la *Siepreviva montana* segun *Haller*. Posee los *hacillos* en las hojas encogidos, y cubiertos de pelos largos. *Gerard*.

Echa las *hojas* oblongas, por un lado planas, y por el otro convexas: el *tallo* casi de dos pulgadas de largo y la *raiz* crasa en forma de nabo. *Gov. hort.*

- Hirtum. 6. **SEMPERVIVUM** *foliis, caule, petalorumque apiculus hirtis.* Amœn. Acad. 4. p. 273. *Sedum majus, montanum, foliis dentatis.* C. B. P. 283. Tourn. p. 267. Rai. hist. 1. p. 688. *Cotyledon altera, montana.* Clus. 2. p. 63. *Sedum latifolium, floribus magnis, albicantibus.* Bauh. hist. 3. p. 689.
- Siempreviva de hojas, tallo, y remates de los petalos con pelo áspero.
- Sedo mayor, montano, con hojas dentadas.
- Otro *Cotyledon* montano
- Sedo de hoja ancha, con flores grandes y blancas.

Cast. Siempreviva con pelo áspero.

Habita en Suiza y en el Monte Taurero rastadiense. 24

- Montanum. 7. **SEMPERVIVUM** *foliis integerrimis, propaginibus patulis.* *Sedum alpinum, rubro, magno flore.* C. B. P. 284. Tourn. p. 263. *Sedum majus, montanum, foliis non dentatis, floribus rubentibus.* C. B. P. 283. Tourn. p. 262. *Cotyledon altera III.* Clus. hist. 2. p. 64.
- Siempreviva con hojas enterisimas; y renuevos abiertos.
- Sedo alpino, con la flor encarnada y grande.
- Sedo mayor, montano, con hojas sin dientes; y flores de color que tira á roxo.
- Otro *Cotyledon*, tercero

Cast. Siempreviva montana.

Habita en las peñas de Suiza y Silesia. 24

DE XI. HASTA XIX. EST. Y MAS DE V. PIST. 107

Los *hacecillos* de las hojas se hallan extendidos y sin pelos. Gerard.

ti-
e. 8. SEMPERVIVUM fo-
liis sparsis, inferioribus te-
retibus, superioribus de-
pressis. Syst. veg. 379. Jacq.
hort. t. 81. X

Siempreviva con hojas es-
parcidas; las inferiores rolli-
zas y las superiores depri-
midas.

Cast. Siempreviva en forma de Sedo.

Habita:....

Tiene los *petalos* blanquecinos: y todos los tallos que
siempre permanecen derechos y rígidos. Jacq. miss.

Austr. vol. 1. p. 134.

CLASE XII.

ICOSANDRIA. DE LAS FLORES HERMAFRODITAS QUE TIENEN VEINTE Ó MAS ESTAMBRES INSERTOS EN EL CALIZ.

CARACTERES DE LA CLASE POR LOS QUEL SE DIFERENCIA DE LA POLYANDRIA.

- I.º. El caliz de una pieza y cóncavo.
- II.º. La corola fixada por sus uñas en el caliz.
- III.º. Estambres mas de diez y nueve insertos en el caliz, ó en la corola.

ORDEN I.

MONOGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO.

<i>Géneros.</i>	<i>Caracteres sobresalientes.</i>
748 CACTUS.....	CALIZ de una pieza, encima del germen, apiñado: corola multiplicada ó sea de muchos petalos: baya de una celdilla, y con muchas simientes.
749 PHILADELPHUS. ...	CALIZ partido en quatro cinco lacinias, encima del germen: petalos quatro cinco: capsula de quatro cinco celdillas, y con muchas simientes.
750 PSIDIUM.	CALIZ hendido en cinco partes, encima del germen: petalos cinco: baya de una celdilla, y con muchas simientes.
751 EUGENIA.	CALIZ dividido en quatro partes, encima del germen: petalos

talos quatro: *drupa* de una semilla, y de quatro ángulos.

752 MYRTUS. CALIZ hendido en cinco partes, encima del germen: *petalos* cinco: y *baya* con dos ó tres semillas.

753 PUNICA. CALIZ hendido en cinco partes, encima del germen: *petalos* cinco: *poma* de muchas celdillas, y con muchas simientes.

754 AMYGDALUS. CALIZ hendido en cinco partes, debaxo del germen: *petalos* cinco: y *drupa* con la nuez horadada con muchos poros.

755 PRUNUS. CALIZ hendido en cinco partes, baxo del germen: *petalos* cinco: y *drupa* cuya nuez tiene las suturas que sobresalen.

756 PLINIA. CALIZ partido en quatro ó cinco lacinias: *petalos* quatro ó cinco: *drupa* encima del caliz y asurcada.

757 CHRYSOBALANUS. CALIZ hendido en cinco partes: *petalos* cinco: y *drupa* con la nuez de cinco surcos, y cinco ventallas.

758 SONNERATIA. *Suppl. p. 38.* CALIZ hendido en seis lacinias: *petalos* seis, alednados: *capsula* xugosa, de muchas celdillas, y con muchas simientes.

La *Cleome Icosandra* tiene los *estambres* insertos en el caliz, y pertenece á la Clase XV.

ORDEN II.

DIGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOS PISTILLOS.

- 759 CRATÆGUS. CALIZ hendido en cinco
tes: *petalos cinco*: *baya*
baxo del caliz, y con dos
millas.

ORDEN III.

TRIGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON TRES PISTILLOS.

- 760 SORBUS. CALIZ hendido en cinco lac
nias: *petalos cinco*: y *bay*
debaxo del caliz, con tre
semillas.

- 761 SESUVIUM. CALIZ dividido en cinco *pet*
tes, de color: *petalo ning*
no: *capsula aovada*, de tres
celdillas, que se abre
través, y con muchas
mientes.

La *Espirea con hoja de Opulo* tiene tres *pistilos*, y pe
tenece al orden quinto.

ORDEN IV.

TETRAGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON CUATRO PISTILLOS.

Alguna especie de *Tetragonia* y de *Mesembryanth*
mo poseen cuatro *pistilos*, y pertenecen al orden quinto.

ORDEN V.

PENTAGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON CINCO PISTILOS.

762 MESPILUS. CALIZ hendido en cinco partes: *petalos* cinco: *baya* debaxo del caliz, y con cinco semillas.

763 PYRUS. CALIZ hendido en cinco partes: *petalos* cinco: *poma* debaxo del caliz, de cinco celdillas, y con muchas simientes.

764 TETRAGONIA. CALIZ partido en quatro ó cinco lacinias: *petalo* ninguno: *drupa* baxo del caliz, de quatro ó cinco lados, y de quatro ó cinco celdillas.

765 MESEMBRYANTHEMUM. CALIZ hendido en cinco partes: *petalos* numerosos, lineares: *capsula* carnosa, debaxo del caliz y con muchas semillas.

766 AIZOON. CALIZ dividido en cinco partes: *petalo* ninguno: *capsula* dentro de la flor, de cinco celdillas, y cinco ventallas.

767 SPIRÆA. CALIZ hendido en cinco partes: *petalos* cinco: *capsula* con muchas semillas.

ORDEN VI.

OCTOGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON OCHO PISTILOS.

El *Mesembryanthemo* en forma de cañon de pluma tiene ocho pistilos, y pertenece al orden pentagynio.

ORDEN VII.

DECAGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON DIEZ PISTILOS.

Algunas especies de *Mesembryanthemo* tienen pistilos, y pertenecen al orden *pentagynio*.

ORDEN VIII.

POLYGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON MAS DE DIEZ PISTILOS.

- 768 ROSA..... CALIZ de figura de jarrón hendido en cinco partes carnosas y coartadas por el cuello: *petalos* cinco: *semillas* muchas, erizadas, y prendidas en el lado interior del caliz.
- 769 RUBUS..... CALIZ hendido en cinco partes: *petalos* cinco: *baya* compuesta de frutitos de una semilla.
- 770 FRAGARIA..... CALIZ hendido en diez partes: *petalos* cinco: *receptáculo de las semillas* aovado, reducido á baya, y que se cae facilmente.
- 771 POTENTILLA..... CALIZ hendido en diez partes: *petalos* cinco: *semillas* casi redondas, desnudas, y fixadas en el receptáculo pequeño y acorchado.
- 772 TORMENTILLA.... CALIZ hendido en ocho partes: *petalos* cuatro: *semillas* casi redondas, desnudas, y fixadas en el receptáculo pequeño y acorchado.

- 773 GEUM. CALIZ hendido en diez partes: *petalos cinco: y semillas con arista que tiene un nudo.*
- 774 DRYAS. CALIZ hendido en ocho partes: *petalos ocho: semillas con cola, y pelosas.*
- 775 COMARUM. CALIZ hendido en diez partes: *petalos cinco, menores que el caliz: receptáculo de las semillas aovado, esponjoso, y persistente.*
- 776 CALYCANTHUS. CALIZ de una pieza, de figura de jarrito, con hojuelas apartadas y de color: *corola semejante al caliz: estilos muchos, con el estigma glanduloso: semillas muchas, con cola, y puestas dentro del caliz xugoso.*

CLASE XII.

ICOSANDRIA. DE LAS FLORES HERMAFRODITAS QUE TIENE
VEINTE Ó MAS ESTAMBRES INSERTOS
EN EL CALIZ.

ORDEN I.

MONOGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO.

748. Género CACTUS. * Melocactus. *Tourn. t. 425.*
Cereus. *Juss. A. G. 1716.* Opuntia. *Tourn.*
t. 123. Tuna. *Dill. elth. 295. 299.*
Pereskia. *Plum. 26.*

CAR. GEN. NAT.

- CAL. *Periantio* de una pieza, tubuloso y hueco, con ho-
juelas escamosas; encima del germen, y que se cae
quando las demas partes de la flor.
- COR. *Petalos* numerosos, algo obtusos y anchos; los extre-
riores mas cortos, los interiores mayores, y arrima-
dos entre sí.
- ESTAMB. *Filamentos* numerosos, alesnados, insertos en el
caliz: con las *anteras* oblongas y derechas.
- PIST. *Germen* baxo del caliz: *estilo* de la longitud de los
estambres, cilindráceo: con el *estigma* en cabezuelo
y hendido en muchas partes.
- PERIC. *Baya* algo oblonga, de una celdilla, con ombligo
y muy áspera como el caliz.
- SEM. numerosas, casi redondas, pequeñas y anidadas.
- OBS. 1.^a El *Cirio de Jussieu* es planta larga, recta y angu-
lulada.
El *Melocacto de Tourn.* es planta casi redonda y angu-
lulada.
La *Opuncia* del mismo *Tourn.* es ramosa, ahorquillada
y articulada.

La *Pereskia de Plum.* es arborea con hojas, y tiene el fruto folioso.

Aunque las especies llamadas *Melocacto* tengan un solo *cotyledon*, y las especies denominadas *Opuncia* posean dos, son sin embargo de un mismo género natural.

OBS. 2.^a *Periantio* tubuloso y apiñado con escamas: *petalos* unidos por sus uñas, con los exteriores mayores. *Wernisch.*

CARACTERES GENERICOS DE TOURN.
MELOCACTUS. p. 653.

La flor es de un petalo, en forma de campana, tubulado, hendido en muchas partes, sentado en el caliz, el qual (*es el germen*) pasa á fruto blando, semejante á la aceituna y lleno de una semilla pequeña. El fruto en muchas especies suele recogerse en una hermosa cabezuela.

OPUNTIA. p. 239.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco; cuyo caliz (*es el germen*) pasa á fruto carnoso, con ombligo, de una celdilla, y lleno de simientes con anillo.

ESPECIES LLAMADAS MELOCACTOS ERIZADOS,
Y CASI REDONDOS.

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Mammillaris.</p> <p>1. CACTUS <i>subrotundus</i> <i>tectus tuberculis ovatis barbatis.</i> Hort. Cliff. 181.</p> <p><i>Echino-Melocactus</i>, minor, <i>lactescens</i>, <i>tuberculis seu mammillis majoribus.</i> Herm. par. 136. t. 136.</p> <p><i>Ficoides seu Melocactus mammillaris</i>, <i>glabra</i>, <i>sulcis carens</i>, <i>fructum suum undique fundens.</i> Pluk. Alm. 148. t. 29. f. 1.</p> | <p>Cacto casi redondo, cubierto de tuberculos aovados y con barbas.</p> <p>Erizo-Melocacto menor, lactescente, con tuberculos ó tetillas mas grandes.</p> <p>Ficoide ó Melocacto de tetillas, lampiño ó sea sin tomento, sin surcos, y que arroja su fruto por todas partes.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

116 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Ficoides seu Ficus Ame- Ficoide ó Higuera
ricana, sphaerica, tubercu- America, esférica, lactea
lata, lactescens, flore albo. cente, con tuberculos; y
 Comm. hort. 1. p. 105. t. 55. blanca.
 Bradl. Succul. 3. p. 11. t. 19.

Cast. Cacto con tetillas.

Habita en las peñas de la America mas caliente. *h*
 Veanse el *Melocacto* muy pequeño, lanuginoso y tubero-
 so. *Plum. spec. 19. ic. 201. f. 1.:* y la *Ficoides* ó *Mel-*
locacto lanuginoso, con espinas mas suaves, y frutos
 que salen esparcidos. *Pluk. Alm. 248. t. 29. f. 2.*

Melo- 2. CACTUS *subrotun-* Cacto casi redondo, y de
 cactus *cus quatuordecim-angula-* catorce ángulos.
ris. Hort. Cliff. 181.

Caectus humilis, subro- Cacto baxo, casi redondo,
tundus, sulcatus & corona- do, asurcado, y coronado
tus spinis confertis. Brown. con espinas amontonadas.
 jam. 238.

Melocaectus Indiae Occi- Melocacto de la India Oc-
dentalis. C. B. P. 384. To- cidental.
 urn. p. 653.

Echino-Melocaectus. Clus. Erizo-Melocacto.
 exot. 92. t. 92. Bauh. hist. 3.
 p. 93. Bradl. Succul. 4. p. 9.
 t. 32.

Cast. Cacto melocacto.

Habita en la Jamaica y America mas caliente. *h*

No- 3. CACTUS *subrotundus,* Cacto casi redondo, co-
 bilis. *quindecim-angularis, spi-* quince ángulos; y espinas
nis latis recurvis. Mill. dict. † anchas y encorvadas ácia
 atrás.

Cast. Cacto noble.

Habita en México.

Es un cuerpo casi redondo, de catorce ó quince ángulos
 en cuyo dorso se hallan muchos puntos en hacecillo,
 con espinas como alfileres, y una de ellas en medio
 grande y encorvada ácia atrás.

ESPECIES LLAMADAS CIRIOS DERECHOS.

Pita-
ja. 4. CACTUS *erectus, triangularis*. Jacq. Amer. 151. Cacto derecho, con tres ángulos.

Cast. Cacto pitajaya.

Habita en Cartagena de Indias entre matorrales maritimos.

Septa-
gonus. 5. CACTUS *erectus oblongus septemangularis*. Hort. Cliff. 181. Cacto derecho, oblongo y de siete ángulos.

Cast. Cacto de siete lados.

Habita en la America. \hbar

Tetra-
gonus. 6. CACTUS *quadrangularis longus erectus, angularis compressis*. Hort. Cliff. 181. Cacto de quatro ángulos comprimidos, largo y derecho.

Cereus erectus, minor, fructu spinoso, costarum numero varians. Herm. par. 117. Cirio derecho, menor, con el fruto espinoso, y que varia en el número de los lomos ó sean lados.

Cast. Cacto de quatro lados.

Habita en Curasao y en la America mas caliente. \hbar

Hexa-
gonus. 7. CACTUS *erectus sexangularis longus, angulis distantibus*. Hort. Cliff. 181. Cacto derecho, largo y de seis ángulos distantes.

Knorr. delin. 1. t. F. 7.

Cereus Surinamensis.

Eph. Nat. Cur. 3. p. 349.

t. 7. 8.

Cirio de Surinam.

Cereus erectus, maximus, Americanus, hexangularis, flore albo radiato. Bradl. Succul. 1. p. 1. t. 1. Cirio derecho, muy grande, de America; con seis ángulos; y flor blanca radiada.

Melocactus monoclonos, flore albo, fructu atropurpureo. Plum. sp. 19. ic. 191? Tourn. p. 653. Melocacto de un solo tronco, con la flor blanca; y fruto entre negro y purpúreo.

Cast. Cacto de seis lados.

Habita en Surinam. \hbar

Pentagonus. 8. CACTUS *erectus, subquinquangularis longus articulatus.* Hort. Cliff. 182. Roy. Lugdb. 280. Cacto derecho, casi de cinco ángulos, largo y articulado.

Cast. Cacto de cinco lados.

Habita en America.

Repan dus. 9. CACTUS *erectus longus octangularis: angulis compressis undatis, spinis lana longioribus.* Hort. Cliff. 182. Cacto derecho, largo, de ocho ángulos comprimidos y ondeados, con espinas mas largas que la lana.

Cactus erectus, cylindricus, sulcatus, tenuior, summitate attenuatus, aculeis confertis. Brown. jam. 238. Cacto derecho, cilindrico, asurcado, mas delgado, adelgazado en su extremidad; y con agujijones amontonados.

Cereus altissimus, gracilior, fructu extus luteo, intus niveo, seminibus nigris pleno. Sloan. jam. 197. hist. 2. p. 158. Trew. ehret. t. 14. Cirio muy alto, mas delgado y enxuto, con el fruto amarillo por defuera, de color de nieve por dentro y lleno de semillas negras.

Cast. Cacto ondeado.

Habita en la America mas caliente. \hbar

Lanuginosus. 10. CACTUS *erectus longus subnovemangularis: angulis obsoletis, spinis lana brevioribus.* Hort. Cliff. 182. Cacto derecho, largo, casi de nueve ángulos poco manifestos; y con espinas mas cortas que la lana.

Cereus Curassavicus, *erectus*, *maximus*, *fructu rubro*, *non spinoso*, *lanugine flavescente*. Herm. par. 115. t. 115. Cirio de Curasao, derecho, muy grande; con el fruto roxo, sin espinas; y pelusa de color que tira á amarillo-roxo.

Cast. Cacto lanuginoso.

Habita en Curasao. *h*

Peruvianus

11. *CACTUS erectus longus suboctangularis: angulis obtusis*. Hort. Cliff. 181. Cacto derecho, largo, y casi de ocho ángulos obtusos.

Cactus cylindraceus, erectus, sulcatus, major, summitate obtusus, aculeis confertis. Brown. jam. 238. Cirio mayor, cilindráceo, derecho, asurcado, obtuso en su remate; y con agujones amontonados.

Cereus Peruvianus, spinosus, fructu rubro, nucis magnitudine. C. B. P. 458. Cirio del Perú, espinoso, con el fruto roxo, y de la magnitud de una nuez.

Euphorbii arbor, Cerei effigie. Lob. ic. 2. p. 25. Arbol de Euphorbio, con traza de Cirio.

Cast. Cacto del Perú.

Habita en lugares marítimos, abrigados y áridos de la Jamaica y del Perú. *h*

Tiene los ángulos sin espinas por arriba. *Mill.*

12. *CACTUS erectus articulis subovatis, spinis lanam æquantibus*. Roy. Lugdb. 279. Cacto derecho, de nueve ángulos, con artículos casi aovados; y espinas iguales á la lana.

Cereus erectus, gracilis, spinosissimus, spinis flavis, polygonus, lanugine albopallescente. Boher. Lugdb. I. p. 293. Cirio derecho, delgado y enxuto, de muchos lados, muy espinoso; con las espinas de color amarillo-roxo; y pelusa entre blanca y amarilla.

Cast. Cacto de Royen.

Habita en America. *h*

ESPECIES LLAMADAS CIRIOS RASTREROS,
CON RAICITAS LATERALES.

Gran-
difloro-
rus,

13. CACTUS repens, sub-
quinqueangularis. Knorr.
delin. 1. t. F. 6.

Cacto rastrero, casi de
cinco ángulos.

Cereus scandens, minor,
polygonus, articulatus. Mill.
ic. t. 90.

Cacto trepador, mas pe-
queño, de muchos ángulos y
articulado.

Cereus gracilis, scandens,
ramosus, plerumque sexan-
gularis, flore ingenti atque
fragranti. Trew. ehret. t. 31.
32. Eph. Nat. Cur. 1752.
vol. 9. App. 184. t. 11. 12.

Cirio delgado y enxuto,
trepador, ramoso, las mas
veces de seis ángulos; con la
flor grande y fragante.

13.

Cereus Americanus, ma-
jor, articulatus, flore maxi-
mo, nocte se aperiente, &
suavissimum odorem spiran-
te. Volk. hesp. 1. p. 133. t.

Cirio de America, mayor,
articulado, con la flor muy
grande que de noche se abre
y despide un olor muy sua-

134.

Cast. Cacto con la flor grande.
Habita en la Jamaica y Veracruz. \hbar

Fla-
gelli-
formis,

14. CACTUS repens, de-
cemangularis. Kniph. cent.
1. t. 12. Knorr. del. 1. t. F. 8.

Cacto rastrero, de diez
ángulos.

Cactus scandens, angulis
decem obsolete. Hort. Ups.
121.

Cacto trepador, con diez
ángulos pocos manifiestos.

Cereus minor, scandens,
polygonus, spinosissimus,
flore purpureo. Ehret. Sel. 2.
f. 2. Trew. ehret. t. 30.

Cirio mas pequeño, trepa-
dor, de muchos lados, muy
espinoso; y con la flor pur-
púrea.

Ficoides Americanus, seu
Cereus minima, serpens,
Americana. Pluk. Alm. 148.
t. 158. f. 6.

Ficoide Americano ó Ci-
rio de America, muy peque-
ño y rastrero,

Cast.

Cast. Cacto en forma de azote. *vulgo*: Yerba de la Alfercia.

Habita en la America mas caliente. ¶

PROPIED. Se cree que la flor cura la alfercia de los niños.

15. CACTUS *repens*, *teres striatus muticus*.

Caëtus parasiticus, inermis, aphyllus, ramosus, propendens, ramulis gracilibus, teretibus, striatis.

Brown. jam. 238.

Opuntia minima, flagelliformis, Plum. sp. 6. ic. 197. f. 2.

Cacto rastrero, rollizo, estriado y sin espinas.

Cacto parasitico, inermes, sin hojas, ramoso, que se inclina, con ramitas delgadas y enxutas, rollizas y estriadas.

Opuncia muy pequeña, en forma de azote.

Cast. Cacto parasitico.

Habita en la America.

16. CACTUS *repens triangularis*. Jacq. Amer.

152. Risler. in Act. helv. 5. p. 268. t. 2.

Caëtus triangularis scandens articulatus. Hort. Cliff. 182.

Ficoides Americanum, seu Cereus erectus, cristatus, foliis triangularibus, profunde canaliculatis. Pluk. Alm. 147. t. 29. f. 3.

Melocactus Americanus, repens, trigonus, flore albo, fructu violaceo. Plum. ic. 199. 200?

Caëtus (triangularis foliosus) fructu folioso, insipido. Jacq. Amer. 152. t. 181. f. 65. R.

Cacto rastrero, de tres ángulos.

Cacto de tres ángulos, trepador, y con artículos.

Ficoide Americano, ó Ciri derecho, con espinas que forman como una cresta; hojas de tres ángulos, y profunde acanaladas.

Melocacto Americano, rastrero, de tres lados; con la flor blanca, y fruto violado.

Cacto (*triangular folioso*) de fruto con hojas, é insipido. α

Cast. Cacto triangular.

Habita en el Brasil, en la Jamaica y Martinica.
 La variedad α tiene el *fruto* mucho mas grande, de color
 coccineo lustroso y vestido de hojas casi enteras:
pulpa cándida, algo dulce y comestible; y las *semillas*
 negras y relucientes. *Jacq.*

ESPECIES LLAMADAS OPUNCIAS COMPRIMIDAS,
 Y CON LOS ARTICULOS PROLIFEROS.

Moliniformis. 17. CACTUS articulato-
 prolifer, articulis globosis
 spinosis glomeratis. Cacto articulado y proli-
 fero, con los artículos globu-
 sos, espinosos y congloba-
 dos.
Melocactus ex plurimis
globulis Opuntiae modo nas-
centibus, spinosissimus. Melocacto muy espinoso
 y de muchos globulos que
 nacen al modo que los de
Plum. spec. 20. ic. 198. Opuncia.
Cast. Cacto en forma de collar.
Habita en la America mas caliente. ¶

Opuntia. 18. CACTUS articulato-
 prolifer laxus, articulis
 ovatis, spinis setaceis. Cacto articulado, proli-
 fero y ensanchado, con arti-
 culos aovados; y espinas
Knorr. delin. 1. t. F. a. setáceas.
Cactus compressus arti-
culatus ramosissimus, ar-
ticulis ovatis, spinis seta-
ceis. Hort. Cliff. 183. Cacto comprimido, arti-
 culado, muy ramoso, con
 los artículos aovados; y es-
 pinas setáceas.
Opuntia vulgo Herbario-
rum. Bauh. hist. 1. p. 154. Opuncia vulgarmente llama-
Tourn. p. 239. Mill. ic. 191. da asi por los Botánicos
Ficus Indica, folio spi-
noso, fructu majore. C. B. Higuera de Indias, con la
P. 458. hoja espinosa; y el fruto
 grande.

Cast. Cacto opuncia. vulgo: Higuera Tuna; y su fruto
 Higo chumbo.
Habita en la America y en la Virginia: en Italia, Suiza,
 Menorca y Portugal: en Andalucia, Murcia, Valencia,
 Cataluña y otras partes de la marina de España. ¶

19. CACTUS articulato-
 prolifer, articulis ovato-ob-
 longis, spinis setaceis. Cañto articulado y proli-
 fero, con artículos entre aovados y oblongos; y espinas
 setáceas.

Cañtus compressus arti-
 culatus ramosus, articulis
 ovato-oblongis, spinis seta-
 ceis. Hort. Cliff. 183. Cañto comprimido, articu-
 lado, ramoso, con artículos
 entre aovados y oblongos;
 y espinas setáceas.

Cast. Cañto higuera de Indias.

Habita en la America mas caliente. $\frac{h}{2}$

20. CACTUS articulato-
 prolifer, articulis ovato-ob-
 longis, spinis subulatis. Cañto articulado y proli-
 fero, con artículos entre aovados y oblongos, y espinas
 alesnadas.

Knorr. delin. 2. t. O. Cañto con ramas opuestas;
 artículos entre oblongos y
 aovados, comprimidos; tron-
 co rollizo, derecho y muy
 feroz, con agujijones de las
 ramas cortos y amontonados.

Cañtus brachiatus, articu-
 latus, articulis oblongo-ova-
 tis, compressis, caudice te-
 reti, erecto, ferocissimo, acu-
 leis brachiorum brevibus, Cañto con espinas
 robustas, de color que tira á
 amarillo-roxo; y flor de co-
 lor melado.

confertis. Brown. jam. 237. Tuna mayor, con hoja
 entre oblonga y redonda;
 espinas largas, muy robus-
 tas; y flor amarilla.

Tuna major, spinis vali-
 dis, flavicantibus, flore gil-
 vo. Dill. elth. 396. t. 295. f. 281.

Opuntia major, folio
 oblongo, rotundo, spinis lon-
 gis & validissimis, flore
 luteo. Sloan. jam. 103. hist.
 2. p. 149. t. 244. f. 1.

Cast. Cañto tuna.

Habita en la Jamaica y America mas caliente. $\frac{h}{2}$
 Las cercas formadas de esta planta, sirven de fortaleza en
 las Ciudades de la Isla de San Eustaquio. Jacq. Amer.
 92.

21. CACTUS articulato-
 prolifer, articulis ovato-ob-
 longis subinermibus. Cañto articulado y proli-
 fero, con artículos entre aovados y oblongos, y casi sin
 espinas.

Tu-

Tuna mitior, flore sanguinea, cochenillifera. Dill. elth. 399. t. 297. f. 383. Tuna mas suave, que lleva cochinilla; y con la flor de color de sangre.

Ficus Indica, major, laevis seu spinosa, vermiculos proferens. Pluk. Alm. 146. t. 281. f. 383. Higuera de Indias, mayor, lisa, ó espinosa, que produce gusanos.

Opuntia maxima, folio oblongo-rotundo, majore, spinulis nonnullis innocentibus obsito. Sloan. jam. 194. hist. 2. p. 152. t. 8, f. 1. 2. Opuncia muy grande, con hoja mayor, entre oblonga y redonda, y cercada de algunas espinitas que no ofenden.

Cast. Cacto que lleva cochinilla.

Habita en la Jamaica y America mas caliente. *h*

Curasavicus. 22. CACTUS articulato-prolifer, articulis cylindrico-ventricosis compressis. Knorr. delin. 2. t. O. 2. Cacto articulado y proli-fero, con artículos entre cilindricos y ventricosos, comprimidos.

Ficus Indica seu *Opuntia Curassavica*, minima. Comm. hort. 1. p. 107. t. 56. Higuera de Indias ú Opuncia de Curasao, muy pequeña.

Ficus Indica seu *Opuntia minor*, caulescens arbusculæ in modum, ramis cinericiis, spinosissima. Pluk. Alm. 147. t. 281. f. 3. Higuera de Indias ú Opuncia menor, muy espinosa, que arroja tallos á manera de un arbustito, con ramitas cenicientas.

Cast. Cacto de Curasao. *h*

Habita en Curasao.

Phyllanthus 23. CACTUS prolifer ensiformi-compressus serrato-repandus. Cacto prolifero, en forma de espada, comprimido, con aserraduras y ondeado.

Cactus foliis ensiformibus obtuse serratis. Hort. Cliff. 183. Cacto de hojas en forma de espada, y con aserraduras obtusas.

Cactus mitis, minor, sarmento flexili, rotundo, frondibus longis, compressis, crenatis & ad crenas floridus. Brown. jam. 237.

Cacto suave, menor, con el vástago dobladizo, redondo; las frondes ó sean las hojas largas, comprimidas, recortadas y que florece por sus festones.

Cereus Scolopendri folio brachiato. Dill. elth. 73. t. 64. f. 74.

Cirio con hoja gruesa como si fuese rama ó tronco, y semejante á la de la Escolopendria.

Opuntia non spinosa, minima, caulescens, foliis pilosis, strictissimis è crenis foliorum florem proferens. Sloan. jam. 216. hist. 2. p. 159.

Opuncia sin espinas, muy pequeña, que arroja tallos; con hojas pelosas, muy apretadas y rígidas, y que echa la flor de sus festones.

Phyllanthos Americana, sinuosis foliis longis. Pluk. Alm. 296. t. 247. f. 5.

Phyllantho de America, con hojas sinuosas y largas.

Cast. Cacto phyllantho ó sea que lleva las flores en las hojas.
Habita en el Brasil, Surinam y en la America meridional. *h*

eres-
la. 24. *CACTUS caule tereti arboreo, aculeis geminis recurvis, foliis lanceolato-ovatis.* Hort. Ups. 122.

Cacto de tallo rollizo, arboreo, con agujones mellizos, encorvados ácia atrás; hojas entre lanceoladas y aovadas.

Pereskia aculeata, flore albo, fructu flavescente. Plum. gen. 37. Dill. elth. 305. t. 227. f. 294.

Pereskia con agujones; flor blanca; y fruto de color que tira á amarillo-roxo.

Malus Americana, spinosa, Portulacæ folio, fructu folioso, semine reniformi splendenti. Comm. hort. 1. p. 145. t. 70.

Manzano de America, espinoso, con hoja como la de la Verdolaga; fruto folioso; semilla en forma de riñon y reluciente.

126 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

*Portulaca Americana, la-
rifolia, ad foliorum ortum
lanugine obducta, longiori-
bus aculeis horrida.* Pluk. Verdolaga de America
con hojas anchas, cubiertas
pelusa en su origen, y abun-
dante de espinas mas largas
Alm. 135. t. 215. f. 6.

Cast. Cacto pereskia.

Habita en la Jamaica y America mas caliente. $\frac{1}{2}$

Frutes- 25. CACTUS caule tere-
cens. ti arboreo spinoso, foliis
cuneiformibus retusis. Cacto con el tallo rollizo
árboreo, espinoso; hojas
forma de cuña, y que re-
tan en seno obtuso.

*Opuntia arbor spinosissi-
ma, foliis Portulacæ, cor-
datis.* Plum. spec. 6. ic. 197. Opuncia arbol muy esp-
noso, con hojas como las
la Verdolaga, y de figura
f. 1. corazon.

Cast. Cacto con hoja de Verdolaga.

Habita en la America mas caliente. $\frac{1}{2}$

El fruto de esta especie no se halla con hojas, como el
la precedente.

749. Género PHILADELPHUS. * Syringa.

Tourn. t. 389.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, dividido en quatro partes,
puntiagudo y persistente.

COR. Petalos quatro, casi redondos, planos, grandes
extendidos.

ESTAMB. Filamentos veinte, alesnados y de la longitud
del caliz: con las anteras derechas, y de quatro sur-
cos.

PIST. Germen baxo del caliz: estilo filiforme, dividido en
quatro partes: con los estigmas sencillos.

PERIC. Capsula oval, puntiaguda en una y otra parte, ce-
ñida por medio con el caliz; de quatro celdillas y qua-
tro ventallas.

SEM. numerosas, oblongas y pequeñas.

Obs. Alguna vez se le aumenta una quarta parte en las de su fructificacion.

CARACT. GENER. DE TOURN.
SYRINGA. p. 617.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco ; de cuyo caliz sale el pistilo que pasa á fruto pegado al mismo caliz, cónico inverso , que se abre en quatro partes , y divide en quatro celdillas , y lleno de simientes pequeñas.

ESPECIES.

1. PHILADELPHUS fo-
 ius. *liis subdentatis*. Duham. arbor. 2. t. 83. Philadelpho de hojas con algunos dientes.
- Syringa alba seu Philadelphus Athenæi*. C. B. P. 399. Tourn. p. 617. Syringa blanca , ó Philadelpho de Atheneo.
- Frutex coronarius*. Clus. hist. 1. p. 55. Arbustito de coronas.
- Cast. Philadelpho de coronas. *vulgo*: Geringuilla.
 Habita en Alemania y Suiza. \bar{h}
2. PHILADELPHUS fo-
 ius. *liis integerrimis*. Philadelpho con hojas enterisimas.
- Philadelphus flore albo*, *majore, inodoro*. Catesb. car. 2. p. 84. t. 84. Philadelpho con la flor blanca , mas grande , y sin olor.
- Cast. Philadelpho sin olor.
 Habita en la Carolina. \bar{h}

750. Género PSIDIUM. † Guaiava. Tourn. t. 443.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , en forma de campana , y hendido en cinco *lacinijs* aovadas.

COR. *Petalos* cinco , aovados , cóncavos , extendidos é insertos en el caliz.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos, mas cortos que la corola y prendidos en el caliz: con las *anteras* pequeñas.

PIST. *Germen* redondito, debaxo del caliz: *estilo* alzado, larguísimo: con el *estigma* sencillo.

PERIC. *Baya* oval, muy grande, coronada con el caliz de una celdilla.

SEM. numerosas, muy pequeñas y anidadas.

CARAC. GENER. DE TOURN.

GUAIAVA. p. 660.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco; cuyo caliz en forma de embudo (*germen*) pasa á fruto, casi aovado, coronado y blanco en cuya carne se anidan muchas semillas pequeñas. *Alm. re Clariss. Plumiero.*

ESPECIES.

- | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pyri-ferum. | 1. PSIDIUM <i>foliis linearibus obtusiusculis, pedunculis unifloris.</i> Jacq. Obs. 2. p. 6. | Psidio con hojas rayadas algo obtusas; y pedunculos que llevan una flor. |
| | <i>Psidium caule quadrangulo.</i> Hort. Cliff. 148. | Psidio con el tallo cuadrangular. |
| | <i>Guaiava alba, dulcis.</i> Comm. hort. 1. pag. 121. t. 63. Merian. Surin. 19. t. 19. | Guaiava blanca, y dulce. |
| | <i>Cuiavus domestica.</i> Rumph. Amb. 1. p. 140. t. 47. | Cuiavo doméstico. |
| | <i>Pela.</i> Rheed. Malab. 3. p. 31. t. 34. | Pela. |

Cast. Psidio que lleva peras. *vulgo*: Guaiava.

Habita en la Havana y otras partes de las Indias. *fl*

- | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pomi-ferum. | 2. PSIDIUM <i>foliis linearibus acuminatis, pedunculis trifloris.</i> Jacq. Obs. 2. p. 7. | Psidio con hojas rayadas puntiagudas; y pedunculos de tres flores. |
| | <i>Guaiava alba, acida, fructu rotundiore.</i> Pluk. Alm, 181. t. 193. f. 4. | Guaiava blanca, ácida, con el fruto mas redondo. |

Guaiava

Guaiavo pomifera, Indica, pomis rotundis. C. B. P. 437. Guaiavo de Indias, que lleva manzanas redondas.

Guaiava. Clus. hist. append. 1. Tourn. p. 660. Guaiava.

Cuiavus agrestis. Rumph. Amb. 1. p. 142. t. 48. Merian. Surin. 57. t. 57. Cuiavo agreste.

Malacca pela. Rheed. Malab. 3. p. 33. t. 35. Burm. ind. p. 113. Malacca pela.

Cast. Psidio que lleva manzanas.

Habita en las Indias. \hbar

Decaspermum. 3. PSIDIUM foliis ovatis acuminatis planis, pedunculis unifloris bracteatis. Suppl. p. 252. Psidio de hojas aovadas, puntiagudas, planas; pedunculos de una flor y con bracteas.

Decaspermum fruticosum. Forst. gen. n. 37. Decaspermo (ó sea de diez semillas) fruticoso.

Cast. Psidio de diez semillas.

Habita en Taheti. Sparrm. \hbar

Es arbusto lampiño, que tiene las hojas pecioladas, pequeñas, enterisimas, venosas y sin ser rayadas: los pedunculos axilares, mas cortos que las hojas, cubiertos como de seda, de una flor, y con una ú otra bractea oblonga: las flores pequeñas y blancas: los cálices cubiertos como de seda; y la capsula ó baya pequeña, globosa, con eminencias, y coronada con el caliz persistente.

751. Género EUGENIA. * Mich. 108.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, encima del germen, partido en quatro lacinias, oblongas, obtusas, cóncavas y persistentes.

COR. Petalos quatro, al doble mayores que el caliz, oblongos, obtusos y cóncavos.

TOM. IV.

I

Es-

130 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, insertos en el caliz, de la longitud de la corola: con las *anteras* pequeñas.

PIST. *Germen* cónico inverso, baxo del caliz: *estilo* sencillo, de la longitud de los estambres: con el *estigma* tambien sencillo.

PERIC. *Drupa* coronada, de quatro ángulos y una *caráxida*.

SEM. *Nuez* casi redonda y lampiña.

ESPECIES.

Mala- 1. EUGENIA *foliis integerrimis, pedunculis ramosis lateralibus.* Fl. Zeyl. 187. Eugenia con hojas enteras; pedunculos ramosos y laterales.

Persici ossiculo fructus Malacensis, rubens. C. B. P. 441. Fruto de Málaga, de color roxo, con el huesecito como el de Persico.

Jambosa domestica. Rumph. Amb. 1. p. 121. t. 37. 38. Jambosa doméstica.

Nati-schanibu. Rheed. Malab. 1. p. 29. t. 18. Rai. hist. 1748. Burm. ind. 114. Nati-schanibu.

Cast. Eugenia de Málaga.

Habita en la India. *h*

Jambos. 2. EUGENIA *foliis integerrimis, pedunculis ramosis terminalibus.* Fl. Zeyl. 188. Eugenia con hojas enteras; pedunculos ramosos y terminales.

Persici ossiculo fructus Malacensis, ex candido rubescens. C. B. P. 441. Fruto de Málaga, de color entre cándido y roxo, con el huesecito como el del Persico.

Jambosa sylvestris, alba. Rumph. Amb. 1. p. 127. t. 39. Jambosa silvestre, blanca.

Malaca schambu. Rheed. Malab. 1. p. 27. t. 17. Rai. hist. 1478. Burm. ind. 114. Malaca schambu.

Cast.

Cast. Eugenia Jambos.

Habita en la India. \hbar

Pseu-
o-psi-
lium.

3. EUGENIA foliis integerrimis, pedunculis unifloris pluribus lateralibus terminalibusque. Eugenia con hojas enterisimas; pedunculos de una flor, los mas laterales y terminales.

Eugenia foliis integerrimis, pedunculis unifloris, axillaribus & terminalibus. Eugenia con hojas enterisimas; pedunculos de una flor, unos axilares y otros terminales.

Jacq. Amer. 152. t. 93.

Cast. Eugenia falso psidio.

Habita en la Martinica. \hbar

Tiene el fruto liso.

Uni-
flora.

4. EUGENIA foliis integerrimis cordato-lanceolatis, pedunculis unifloris lateralibus. Fl. Zeyl. 189. Eugenia con hojas enterisimas, entre aovadas y lanceoladas; pedunculos laterales y de una flor.

Eugenia Indica, Myrti folio, deciduo, flore albo, fructu suave rubenti, molli, leviter sulcato & odoro. Eugenia de Indias, con hoja como la del Myrto, caediza; flor blanca; fruto de color roxo delicado, blando, ligeramente asurcado y oloroso.

Mich. gen. 226. t. 108.

Myrtus Indica, foliis rigescentibus, latis ac recurvis, parum odoratis. Till. Myrto de Indias, con hojas rígidas y duras, anchas y encorvadas ácia atrás, y un poco olorosas.

pis. 117. t. 44.

Cast. Eugenia de una flor.

Habita en la India. \hbar

Posee los pedunculos solitarios.

Coti-
nifolia.

5. EUGENIA foliis ovatis obtusis integerrimis, pedunculis unifloris. Jacq. Eugenia con hojas aovadas, obtusas, enterisimas; y pedunculos de una flor.

Obs. 3. p. 3. t. 53. †

Cast. Eugenia con hoja de Fustete.

Habita en la Cayena. \hbar

132 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Echa las ramas mas tiernas anguladas: las hojas opuestas, con algun peciolo, relucientes y correosas; y unos, ó tres pedunculos axilares.

- Acu-
tangu-
la. 6. EUGENIA foliis cre-
natis, pedunculis termina-
libus, pomis oblongis acu-
tangulis. Fl. Zeyl. 190. Eugenia con hojas recor-
tadas; pedunculos termina-
les; pomas oblongas y acu-
tangulas.
Butonica terrestris, ru-
bra. Rumph. Amb. 3. p. 181. t. 115. Butonica terrestre, encar-
nada.
Tsieria—samstravadi. Tsieria-samstravadi.
Rheed. Malab. 4. p. 51. t. 7.
Rai. hist. 140. Burm. ind. 114.

Cast. Eugenia acutangula.
Habita en la India. \bar{h}

- Race-
mosa. 7. EUGENIA foliis cre-
natis, racemis longissimis,
pomis ovatis quadrangulis. Eugenia con hojas recor-
tadas; racimos larguissimos;
pomas aovadas y quadrangu-
las.
Butonica sylvestris, alba. Butonica silvestre, blan-
ca.
Rumph. Amb. 3. p. 181. t. 116.
Samstravadi seu Caibat-
siumbu. Rheed. Malab. 4. p. 11. t. 116. Rai. hist. 1479. Samstravadi ó Caibat-
siumbu.
Burm. ind. 115.

Cast. Eugenia racimosa.
Habita en la India. \bar{h}

752. Género MYRTUS. * Tourn. t. 409.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio encima del germen, de una pieza, hendi-
do en cinco partes, agudo, derecho y persistente.

COR. Petalos cinco, aovados, enteros, grandes é insertos
en el caliz.

Es-

ESTAMB. *Filamentos* numerosos , capilares , del largo de la corola , insertos en el caliz : con las *anteras* muy pequeñas.

PIST. *Germen* debaxo de la flor : *estilo* sencillo , filiforme : con el *estigma* obtuso.

PERIC. *Baya* oval, con ombligo formado del caliz, y de dos ó tres celdillas.

SEM. solitarias y en forma de riñon.

OBS. Algunas especies tienen el caliz hendido en quatro partes ; y quatro petalos : otras poseen el caliz enterisimo é indiviso.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 640.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco ; cuyo caliz (*es el germen*) pasa á baya en forma de azeytuna, coronada, dividida en tres celdillas; y llena de simientes en forma de riñon.

ESPECIES.

Com- munis.	1. MYRTUS <i>floribus solitariis</i> , <i>involucro diphylo</i> . Hort. Cliff. 42. Mat. Med. 141.	X é Myrto con flores solitarias, é involucro de dos hojuelas.
α	<i>Myrtus communis</i> , <i>Romana</i> .	X Myrto comun, de Roma. α
	<i>Myrtus foliis ovatis</i> , <i>pedunculis longioribus</i> . Mill. ic. t. 184. f. 1.	X y Myrto con hojas aovadas; y pedunculos mas largos.
	<i>Myrtus latifolia</i> , <i>Romana</i> . C. B. P. 468. Tourn. p. 640.	X Myrto de Roma, con hoja ancha.
	<i>Myrtus altera</i> . Dod. pempt. 762.	X Otro Myrto.
β	<i>Myrtus communis</i> , <i>Tarentina</i> .	X Myrto comun, Tarentino. β
	<i>Myrtus foliis ovatis</i> , <i>baccis rotundioribus</i> . Mill. dict. n. 6.	X y Myrto con hojas aovadas; y bayas mas redondas.

Myr-

- Myrtus minor, vulgaris.* X Myrto menor, vulgar.
C. B. P. 469. Lob. ic. 127.
Tourn. p. 640.
- Myrtus Tarentina.* Clus. Myrto Tarentino.
hist. 1. 67. Bauh. hist. 1. p.
512.
- X *Myrtus communis, Itali-* Myrto comun, de Italia. X
ca. C. B. P. 468. Tourn. p.
640.
- Myrtus vulgaris, sylves-* Myrto vulgar, silvestre.
tris. Bauh. hist. 1. p. 510.
- A *Myrtus communis, Bæti-* Myrto comun, de Andalu-
ca. cia. A
- Myrtus foliis ovato-lan-* Myrto con hojas entre aov-
ceolatis, confertis. Mill. dict. vadas y lanceoladas, y amon-
n. 4. tonadas.
- Myrtus latifolia, Bætica,* Myrto segundo, de Anda-
secunda, vel foliis Laurinis lucia, con hoja ancha, ó con
confertim nascentibus. C. B. hojas como las del Laurel, y
P. 469. Tourn. p. 640. que nacen amontonadas.
- Myrtus Bætica, latifolia.* Myrto de Andalucia, con
Clus. hist. 64. hoja ancha.
- 6 *Myrtus communis, Lusi-* Myrto comun, de Portu-
tanica. gal. 6
- Myrtus foliis lanceolato-* Myrto con hojas entre lance-
ovatis, acutis. Mill. dict. n. 3. ceoladas y aovadas, y agudas.
- Myrtus sylvestris, foliis* Myrto silvestre, con ho-
acutissimis. C. B. P. 469. jas muy agudas.
Tourn. p. 640.
- Myrtus Bætica, sylves-* Myrto silvestre, de Anda-
tris. Clus. hist. 1. p. 66. lucia.
- φ *Myrtus communis, Belgi-* Myrto comun, de Flan-
ca. des. φ
- Myrtus foliis lanceolatis,* Myrto con hojas lanceo-
acuminatis. Mill. dict. n. ladas y puntiagudas.
- Myrtus latifolia, Belgica.* Myrto de Flandes, con
C. B. P. 469. Tourn. p. 640. hoja ancha.
- γ *Myrtus communis, mucro-* Myrto comun, que remata
nata. en punta rígida. γ
- Myrtus foliis lineari-acu-* Myrto con hojas lineares,
minatis. Mill. dict. n. X y puntiagudas.

Myrtus foliis minimis & mucronatis. C. B. P. 469. X Myrto con hojas muy pequeñas, y que rematan en punta rígida.

Tourn. p. 640. X
Myrtus domestica, fructu albo. Clus. hist. 1. p. 67. X Myrto domestico, con el fruto blanco.

Cast. Myrto comun.

Habita en Asia, Africa, y en la Europa Austral: en Cataluña, Valencia, Andalucía y otras partes de España. \hbar

PROPIED. Las hojas y bayas son fragrantés, calientan, corroboran y restriñen.

Bra-
siliana

2. MYRTUS *floribus solitariis, pedunculis nudis, petalis subciliatis*. X Myrto con flores solitarias; pedunculos desnudos; y petalos algo pestañosos.

Myrti folio arbor, cortece argenteo, foliis oblongis, ad basim latioribus, inodoris. X Arbol con hoja como la del Myrto; corteza de color de plata; hojas oblongas, mas anchas en su base, y sin olor.

Sloan. jam. 162. hist. 2. p. 78. X
 t. 87. f. 3. Rai. dendr. 35. X
Arbor Brasiliána, Myrti Laureæ foliis, inodoris. X Arbol del Brasil, con hojas como las del Myrto de hoja de Laurel y sin olor.

Cast. Myrto del Brasil.

Habita en el Brasil. D. Wachend. \hbar

Tiene las hojas aovadas, obtusas, con peciolo, lampiñas y opuestas: las flores solitarias, axilares; y con el pedunculo sin brácteas: las corolas de quatro ó cinco petalos, entre lacerados y pestañosos, aovados al revés, cóncavos y redoblados; con quarenta estambres pocas ó mas.

Bi-
flora.

3. MYRTUS *pedunculis bifloris, foliis lanceolatis*. X Myrto con pedunculos de dos flores; y hojas lanceoladas.

Amoen. Acad. 5. p. 398. X
Caryophyllus fruticosus, foliis lanceolatis, oppositis, bifloribus geminatis, alaribus. X Clavo de especia, fruticoso, con hojas lanceoladas, opuestas; flores mellizas y axilares.

f. 3.

Cast.

Cast. Myrto de dos flores,
Habita en la Jamaica,

An-
gusti-
folia.

4. MYRTUS *pedunculis* X Myrto con pedunculos en
umbellatis, foliis lineari- X umbela; hojas entre lineares
lanceolatis subsessilibus. X y lanceoladas, y casi sin peciolo.

Phillyrea foliis longis, X Phillyrea con hojas lat-
subtus flavis, fructu deciduo. X gas, de color amarillo-rosa-
Burm. Afr. 237. t. 83. f. 2. X por debaxo y caedizas.

Cast. Myrto de hoja angosta,
Habita en el Cabo de Buena esperanza. D. Schreber. \bar{h}
Es arbustito que produce las ramas rollizas: las ramitas
de quatro lados y lampiñas: las hojas como las de la
Phillyrea de hoja angosta, casi sentadas, largas, entre
lineares y lanceoladas, enterisimas, lampiñas, y mucho
mas largas que los entrenudos: los *pedunculos laterales*
opuestos, cortos, y apenas mas largos que los entrenu-
dos; con una *umbela* en su remate, sencilla, rara vez
compuesta, pequeña y de muchas flores: los *petalos*
casi redondos: muchos *estambres* derechos, setáceos, y
mas largos que los *petalos*.

Luci-
da.

5. MYRTUS *pedunculis* X Myrto con pedunculos de
subtrifloris, foliis subsessi- X tres ó quatro flores; hojas casi
libus lanceolatis attenuatis. X sin peciolo, lanceoladas, y
X adelgazadas.

Cast. Myrto reluciente.
Habita en Surinam. Rolander. \bar{h}
Tiene las hojas que de aovadas se adelgazan mucho en una
punta lanceolada: y las flores de cinco *petalos*.

Cu-
mini,

6. MYRTUS *pedunculis* X Myrto con pedunculos de
multifloris, foliis lanceolato- X muchas flores; y hojas entre
ovatis. Flor. Zeyl. 185. X lanceoladas y aovadas.
Jambosa ceramica. Rumph. X
Air b. 1. p. 130. t. 41. Burm. X *Jambosa ceramica.*
Ind. 115. X

Arbor Zeylanica, Cumi- X Arbol de Zeylan, que hue-
num redolens. Burm. Zeyl. X le mucho á Comino.
 27. R. X

Cast. Myrto de Comino.
 Habita en Zeylan. h

7. MYRTUS *pedunculis* X Myrto con pedunculos en-
trichotomo-paniculatis, fo- X tre divididos en tres partes,
liis oblongis, floribus dioi- X y en panoja; hojas oblongas;
cis. X flores masculinas en un pie
 de planta, y femeninas en
 otro. X

Cast. Myrto dioico.

Habita en America. Miller. h

Produce las *hojas* opuestas, crasas, entre lanceoladas y
 aovadas: los *pedunculos* axilares y terminales; con *ra-*
mitas en panoja, opuestas en forma de aspa, y del lar-
 go de las hojas; con pocos *petalos*.

8. MYRTUS *pedunculis* X Myrto con pedunculos
dichotomis paniculatis to- X ahorquillados, en panoja,
mentosus, foliis geminis X tomentosos; hojas mellizas,
subovatis terminalibus. X casi aovadas y terminales.
 Amœn. Acad. 5. p. 398.

Chytraculia arborea, fo- X Chytraculia arborea, con
liis ovatis, glabris, opposi- X hojas aovadas, lampifias,
tis, racemis terminalibus. X opuestas; y racimos termi-
 nales.
 Brown. jam. 239. t. 137. f. 2.
 2. Pluk. phyt. t. 247, f. 2. X

Cast. Myrto Chytraculia.

Habita en la Jamaica. h

9. MYRTUS *pedunculis* X Myrto con pedunculos de
multifloris, ramis dichoto- X muchas flores; ramas ahor-
mis, foliis geminis subova- X quilladas; hojas mellizas, ca-
tis terminalibus. X si aovadas y terminales.
 Amœnit. Acad. 5. p. 398. X

Zuzigium fruticosum, foliis ovatis, nitidis, & ramulis ubique jugatis. Brown. jam. 240. t. 7. f. 2. X Zuzigio fruticoso, con hojas aovadas, lustrosas; y mitas siempre apareadas. X

Cast. Myrto Zuzigio.
Habita en la Jamaica. \hbar

Zeylanica. 10. MYRTUS *pedunculis multifloris, foliis ovatis subpetiolatis*. Mill. dict. n. 8. X Myrto con los pedunculos de muchas flores; hojas aovadas, y con algun peciolo. X
: *Myrtus Zeylanica*, odoratissima, baccis niveis, monococis. Herm. Lugdb. 434. t. 435. X Myrto de Zeylan, oloroso, con bayas de color de nieve, y un solo grano. X

Cast. Myrto de Zeylan.
Habita en Zeylan. \hbar

Androsæmides. 11. MYRTUS *pedunculis trifido-multifloris, foliis subovalibus sessilibus*. Fl. Zeyl. 184. X Myrto con pedunculos hendidos en tres partes, y muchas flores; hojas ovoides y sentadas. X

Cast. Myrto como Androsemo.
Habita en Zeylan. \hbar

Caryophyllata. 12. MYRTUS *pedunculis trifido-multifloris, foliis ovatis*. Flor. Zeyl. 183. Mat. Med. 141. Jacq. obs. 2. p. 1. X Myrto de pedunculos hendidos en tres partes, con muchas flores; y hojas aovadas al revés. X
: *Caryophyllus aromaticus Indiæ Occidentalis, foliis & fructu rotundis*. Pluk. Alm. 188. t. 155. f. 3. X Clavo aromático de la India Occidental, con hojas y fruto redondos. X

Cast. Myrto como clavo de especia. vulgo: Clavo canela.
Farm. Cassia caryophyllata.
Habita en Zeylan. \hbar
PROPIED. La corteza es aromática, estimulante, cefálica, estomática y tónica.

13. MYRTUS *foliis alternis*. Flor. Zeyl. 186. Mat. Med. 141. Myrto con hojas alternas.
- Myrtus arborea, aromatica, foliis Laurinis*. Sloan. jam. 161. hist. 2. p. 76. t. 191. f. 1. Myrto arboreo, aromático, con hojas como las del Laurel.
- Caryophyllus foliis oblongo-ovatis, alternis, racemis terminalibus & lateralibus*. Brown. jam. 247. Clavo de especia, con hojas entre oblongas y aovadas, alternas; racimos terminales y laterales.
- Caryophyllus aromaticus Americanus, Lauri acuminatis foliis, fructu orbiculari*. Pluk. Alm. 88. t. 155. f. 1. Clavo aromático de America, con hojas como las del Laurel, puntiagudas; y fruto orbicular.
- Piper Jamaicense*. Rai. hist. 1507. Pimienta de Jamaica.

Cast. Myrto pimienta. *vulgo*: Pimienta de Jamaica. Malagueta ó Pimienta de Tabasco. Toda especia. *Habita en Tabasco y en otras partes de la India.* $\frac{1}{2}$
 PROPIED. El fruto es aromático, estomático, y se usa para especia.

753. Género PUNICA. * *Tourn. t. 407.*

CAR. GEN. NAT.

- CAL. *Periantio* de una pieza, en forma de campana, hendido en cinco partes, agudo, de color, y persistente.
- COR. *Petalos* cinco, casi redondos, entre derechos y extendidos é insertos en el caliz.
- ESTAMB. *Filamentos* numerosos, capilares, mas cortos que el caliz y prendidos en él: con las *anteras* algo oblongas.
- PIST. *Germen* baxo de la flor: *estilo* sencillo, del largo de los estambres: con el *estigma* en cabezuela.
- PERIC. *Poma* casi globosa, grande, coronada con el caliz, y de nueve celdillas.
- SEM. muchas, casi redondas y xugosas: *receptáculo* membr-

140 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

branáceo y que divide en dos partes cada celdilla del pericarpio.

Obs. Advierte *Linneo* que nunca ha visto mas que un pistilo en este género , aunque varios Botánicos le atribuyen cinco.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 636.

La flor es rosácea ó que consta de muchos pétalos puestos en cerco ; cuyo caliz en forma de campana, hendiéndose en muchas partes pasa á fruto casi globoso , coronado y dividido en muchas celdillas , que contienen granos llenos de xugo , fixados al receptáculo , y separados por medio de membranas muy delgadas , con su semilla oblonga. El germen puesto baxo del caliz es el que pasa á fruto.

ESPECIES.

- | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Granatum.</p> | <p>1. PUNICA foliis lanceolatis , caule arboreo. Hort. Cliff. 134. Mat. Med. 142.</p> | <p>Granado con hojas lanceoladas ; y tallo arboreo.</p> |
| | <p><i>Punica spinosa</i> , foliis nitentibus , ellipticis , integerrimis , floribus sessilibus . Hall. helv. n. 1098.</p> | <p>Granado espinoso, con hojas lustrosas , elípticas , enterisimas ; y flores sentadas.</p> |
| | <p><i>Malus Punica sylvestris</i> . C. B. P. 438.</p> | <p>Granada silvestre.</p> |
| | <p><i>Punica sylvestris</i> . Cord. hist. 184. Tourn. p. 636.</p> | <p>Granado silvestre.</p> |
| | <p><i>Malus Punica sativa</i> . C. B. P. 438.</p> | <p>Granada que se cultiva.</p> |
| | <p><i>Punica quæ malum granatum fert</i> . Cæsalp. 141. Tourn. p. 636.</p> | <p>Granado que lleva fruto.</p> |
| <p>α</p> | <p><i>Balaustia flore pleno</i> , majore & minore. C. B. P. 438. Knorr. del. 1. t. 5. Tourn. p. 636.</p> | <p>Balaustia con la flor plena mayor y menor. α</p> |

Cast. Punica granado. Farm. Balaustia. Flores Balaustiorum.

Habita en Italia , Mauritania , Persia , Suiza y Carniola : en

en Cataluña, Aragon, Andalucía y otras partes de España. $\frac{h}{2}$

PROPIED. Las flores, corteza del fruto y granos, son estípticos, anodinos, diureticos y antelmínticos.

2. PUNICA foliis linearibus, caule fruticoso. $\frac{h}{2}$ Granado con hojas lineares; y tallo fruticoso.
 Punica Americana, nana $\frac{h}{2}$ Granado de America, enano ó muy baxo.
 seu humillima. Tourn. p. 636. $\frac{h}{2}$

Cast. Granado enano.

Habita en las Islas Antillas. $\frac{h}{2}$

Sube á la altura de cinco pies. Tiene las hojas mas cortas y mas angostas; y florece en todo el verano.

754. Género AMYGDALUS. * Tourn. t. 402.

Persica. Tourn. t. 400.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, tubulado, hendido en cinco laciniás extendidas, obtusas, y que se caen quando las demas partes de la flor.

COR. Petalos cinco, entre oblongos y aovados, obtusos, cóncavos é insertos en el caliz.

ESTAMB. Filamentos treinta, filiformes, derechos, la mitad mas cortos que la corola, y prendidos en el caliz: con las anteras sencillas.

PIST. Germen dentro de la flor, casi redondo y veloso: estilo sencillo, de la longitud de los estambres: con el estigma en cabezuela.

PERIC. Drupa casi redonda, vellosa, grande, y con un surco longitudinal.

SEM. Nuez aovada, comprimida, aguda, con las suturas en una y otra parte que sobresalen, asurcada en forma de redecilla, y punteada con agujeros pequeños.

CARACTERES GENERICOS DE TOURN.
 AMYGDALUS. p. 627.

La flor es rosácea ó que consta de muchos pétalos puestos en cerco ; de cuyo caliz sale el pistilo que pasa al fruto oblongo , oseo , y cubierto de una corteza callosa á modo de almohada , lleno de una semilla oblonga.

PERSICA. p. 624.

La flor es rosácea ó que consta de muchos pétalos puestos en cerco ; de cuyo caliz sale el pistilo que pasa al fruto carnoso , casi globoso , con un surco longitudinal lleno de un huesecito excavado con hoitos profundos , que contiene una almendra oblonga.

ESPECIES.

- Per- I. AMYGDALUS folio-
 sica. rum serraturis omnibus acu- Almendro con todas las
 tis , floribus sessilibus so- aserraduras de las hojas agu-
 litariis. Hort. Cliff. 189. Mat. das ; flores sentadas y solita-
 Med. 142. rias.
- Persica molli carne & Persico arbol vulgar , cuyo
 vulgaris , viridi & alba. C. fruto tiene la carne blanda
 B. P. 440. Tourn. p. 624. verde y blanca. (vulgo
 Abridor).
- Persica rubra. Cam. epit. Persico arbol , con el fru-
 145. Tabern. ic. 995. to roxo.
- Persica succo quasi san- Persico arbol , con el fru-
 guineo. C. B. P. 440. Tourn. to que tiene el xugo casi de
 p. 624. color de sangre.
- Nucipersica quæ Nucum Nuez Persica que se ase-
 juglandium faciem repre- meja á las nueces comunes.
 sentat. C. B. P. 440. Rai.
 hist. 1516.

Cast. Almendro Persico. vulgo : Prisco. Melocoton. Durazno.

Habita ʒ

Varia con las flores plenas.

m-
nis. 2. *AMYGDALUS folio-*
rum serraturis infimis glandu-
dulosis, floribus sessilibus
geminis. Hort. Cliff. 186. y mellizas.
Mat. Med. 142.

Amygdalus foliis gla-
bris, ovato-lanceolatis, serra-
tis, imis dentibus & pe-
tiolis glandulosis. Hall. helv.
n. 1078. Almendro de hojas lampi-
ñas, entre aovadas y lan-
ceoladas, aserradas, con los
dientes de abaxo y piececi-
tos glandulosos.

* *Amygdalus sativa.* C. B.
P. 441. Tourn. p. 627. Mill.
ic. t. 28. f. 1. Almendro que se culti-
va. α

Amygdalus. Dod. pempt.
798. Almendro.

β *Amygdalus amara.* B. B.
P. 441. Bauh. hist. 1. p. 174.
Tourn. p. 627. Almendro amargo. β

Cast. Almendro común.

Habita en las cercas de Mauritania y Suiza: y se cria en
muchas partes de España. h

PROPIED. El azeite de las Almendras dulces es nutritivo,
obtundente, emoliente y relaxante. Se usa en los dolo-
res cólicos, calenturas, en la tos &c.: el de las Al-
mendras amargas es carminativo, expelente, diureti-
co y antelmintico; y se usa tambien en los dolores có-
licos y nefriticos.

Pu-
nila. 3. *AMYGDALUS foliis*
venoso-rugosis. Syst. veg.
385. Herm. Lugdb. 487. t.
489. Almendro con hojas entre
venosas y rugosas.

Amygdalus Persica, nana,
flore carneo, pleno. Pluk.
phyt. t. 11. f. 4. Almendro Persico, enano,
con la flor plena, y de color
de carne.

Persica Africana, nana,
flore incarnato, simplici. To
urn. p. 625. Persico arbol de Africa,
enano, con la flor encarna-
da y sencilla.

Cast. Almendro pequeño.

Habita en Africa. h

Tiene las *ramas* lisas, de dos ó tres pies de alto, y de color entre negro y purpúreo: las *hojas* lanceoladas, en peciolo, venosas, rugosas y aserraditas: las *flores* en yemas, comunmente de dos en dos y sentadas: el color de color que tira á rubio: los *petalos* escotados, enredados, y mas largos que el tubo del caliz: los *filamentos* mas pálidos: el *germen* y *estilo* vellosos por debajo: las *estipulas* lineares, y mas profundamente aserraditas. Varía con los *petalos* puntiagudos, y las *flores* plenas.

- Nana. 4. *AMYGDALUS foliis* X Almendro con las *hojas*
basi attenuatis. Hort. Cliff. X adelgazadas por su base.
 186. X
Amygdalus Indica, nana. X Almendro de Indias, en
 Pluk. Alm. 28. t. 11. f. 3. X no.
 Mill. dict. t. 28. f. 2. X
Armeniaca Persicæ foliis, X Albaricoque con *hojas*
fructu exsucco. Amm. ruth. X como las del Persico; y *fructo*
 273. t. 30. Burm. Ind. 117. X acorchado.

Cast. Almendro enano.

Habita y abunda mucho en tierra de los Calmukos. *H*
 Echa la *raiz* rastrera: los *tallos* del largo de un pie: las *estipulas* lineares: las *hojas* lanceoladas, aserradas, y *hojas* juntas, y que se escurren en peciolo: dos ó tres *flores* juntas, sentadas, y de color roxo.

755. Género PRUNUS. * *Tourn. t. 398.* Armeniaca
Tourn. t. 399. Cerasus. *Tourn. t. 401.*
 Laurocerasus. *Tourn. t. 403.* Padus.
edit. prior.

CAR. GEN. NAT.

- CAL. *Periantio* de una pieza, en forma de campana, hendido en cinco *lacinias*, obtusas, cóncavas, y que se caen quando las demas partes de la flor.
 COR. *Petalos* cinco, casi redondos, cóncavos, grandes, extendidos, é insertos por sus uñas en el caliz.
 ESTAMB. *Filamentos* de veinte hasta treinta, alesnados, ca-

casi de la longitud de la corola y prendidos en el caliz: con las *anteras* mellizas y cortas.

PIST. *Germen* dentro de la flor, casi redondo: *estilo* filiforme, de la longitud de los estambres: con el *estigma* redondo.

PERIC. *Drupa* casi redonda.

SEM. *Nuez* algo redonda y comprimida, con las suturas que sobresalen.

CARACTERES GENERICOS DE TOURNEFORT.

PRUNUS. p. 622.

La *flor* es rosácea ó que consta de muchos pétalos puestos en cerco; de cuyo caliz sale el pistilo que pasa á fruto aovado ó globoso, carnoso, blando, y lleno de un huesecito puntiagudo por una y otra parte, y que encierra la almendra.

ARMENIACA. p. 623.

La *flor* es rosácea ó que consta de muchos pétalos puestos en cerco; de cuyo caliz sale el pistilo que pasa á fruto carnoso, casi globoso, comprimido por una y otra parte, asurcado á lo largo, lleno de un huesecito tambien comprimido, y que encierra una almendra.

CERASUS. p. 625.

La *flor* es rosácea ó que consta de muchos pétalos puestos en cerco; de cuyo caliz sale el pistilo que pasa á fruto carnoso, casi redondo ó en forma de corazon, lleno de un huesecito de la misma forma y que encierra la almendra.

LAUROCERASUS. p. 627.

La *flor* es rosácea ó que consta de muchos pétalos puestos en cerco; de cuyo caliz en forma de embudo, sale el pistilo que pasa á fruto de figura de cereza, blando, y que encierra un huesecito lleno de una almendra casi redonda.

ESPECIES.

- padus.** 1. *PRUNUS floribus racemosis, foliis deciduis basi subtus biglandulosis.* Fl. dan. t. 205. Ciruelo con flores racimosas; hojas que se caen cada año, y que en su base debaxo tienen dos glandulas.
- Padus foliis ovato-lanceolatis, serratis.* Hall. helv. n. 1086. Pado con hojas entreovadas y lanceoladas, y aserradas.
- Cerasus racemosa, sylvestris, fructu non eduli.* C. B. P. 451. Tourn. 626. Tabern. 988. Duham. arbor. 3. Cerezo racimoso, silvestre, con fruto que no es comestible.
- Cerasus racemosa quibusdam, aliis Padus.* Bauh. hist. 1. p. 228. Cerezo racimoso, llamado asi por algunos autores, y Pado por otros.

Cast. Ciruelo pado.

Habita en Europa: en los prados de Bustarviejo: en Galicia, Sierramorena y otras partes de España. \bar{h}
Los racimos se hallan foliosos y debaxo de las hojas: los petalos aserrados, y no escotados como en el Ciruelo cerezo.

PROPIED. Algunos autores tienen el cocimiento del leño de este arbol, por remedio eficaz en la rabia.

- Virgiana.** 2. *PRUNUS floribus racemosis, foliis deciduis, basi antice glandulosis.* Ciruelo con flores racimosas; hojas que se caen cada año, y con glandulas por delante en su base.
- Cerasus sylvestris, fructu nigricante, in racemis longis, pendulis, Phytolacca instar congestis.* Gron. virg. 54. Duham. arbor. 5. Cerezo silvestre, con el fruto de color que tira á negro, y en racimos largos, pendulos y amontonados al modo que los de la Phytolacca ó sea Carmin.
- Cerasus latiore folio, fructu racemoso, purpureo, majore.* Catesb. car. 2. p. 94. t. 94. Cerezo con hoja mas ancha; fruto mayor, racimoso y de color purpúreo.

Cast.

Cast. Ciruelo de Virginia.

Habita en la Virginia y Carolina. \hbar

Es producido del *Ciruelo Pado*; pero tiene las verrugas al doble mayores en las ramas: los *peciolos* por delante y en su remate con dos pares de glandulas: las *hojas* por debaxo menos en redecilla, y casi lampiñas: los *petalos* redondos, y no aovados al revés; y los *frutos* quatro veces mayores.

Canadensis. 3. PRUNUS floribus racemosis, foliis deciduis eglandulosis lato-lanceolatis rugosis utrinque pubescentibus.

Cerasus racemosa, foliis Amygdalinis, Americana.
Pluk. Alm. 97. t. 58. f. 4.

Ciruelo con flores racimosas; hojas que se caen cada año, sin glandulas, anchas y lanceoladas, rugosas y por ambas partes vellosas.

Cerezo racimoso, de America, con hojas como las del Almendro.

Cast. Ciruelo del Canadá.

Habita en la America Septentrional. \hbar

Echa las *ramas* lisas: las *hojas* entre anchas y lanceoladas, sin glandulas, entre venosas y rugosas, menos rígidas que las de las restantes especies, con aserraduras agudas, verdes por una y otra parte, vellosas manifiestamente en el tacto, y escurridas por su base en peciolo.

Lusitanica. 4. PRUNUS floribus racemosis, foliis sempervirentibus eglandulosis. Mill. ic. 131. t. 196. f. 1.

Padus foliis sempervirentibus ovatis. Hort. Cliff. 185.

Lauro-cerasus Lusitanica, minor. Dill. elth. 193. t. 159. f. 193. Tourn. p. 628.

Ciruelo con flores racimosas; hojas siempreverdes, y sin glandulas.

Pado con hojas siempreverdes y aovadas.

Lauro-cerezo menor, de Portugal.

Cast. Ciruelo de Portugal.

Habita en Pensilvania y Portugal: en Extremadura, en las gargantas de los montes de nuestra Señora de Guadalupe y en varias partes de Andalucia. \hbar

148 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS FST.

Lauro-
cera-
sus.

5. PRUNUS *floribus racemosis, foliis sempervirentibus dorso biglandulosis.* Ciruelo con flores racimosas; hojas siempreverdes, y con dos glandulas en el dorso.

Padus foliis sempervirentibus lanceolato-ovatis. Pado con hojas siempreverdes, entre lanceoladas y aovadas.
Hort. Cliff. 185.

Cerasus folio Laurino. C. Cerezo con hoja como la del Laurel.
B. P. 450.

Lauro-cerasus. Clus. hist. Lauro-cerezo.
1. p. 4. Camm. hort. t. 23.
Tourn. p. 627. Rai. hist.
1549. Duham. arb. 1. t. 133.

Cast. Ciruelo Lauro-cerezo. *vulgo*: Lauro Real.

Habita en Trapezunte de donde vino á Europa el año 1576. *h*

Maha-
leb.

6. PRUNUS *floribus corimbosis terminalibus, foliis ovatis.* Ciruelo con flores corimbosas, terminales; y hojas aovadas.
Jacq. Austr. t. 227.

Cerasus foliis subrotundis, serratis, pedunculis multifloris. Cerezo con hojas casi redondas, aserradas; y pedunculos de muchas flores.
Hall. helv. n. 1084.

Cerasus sylvestris, amara, Mahaleb putata. Cerezo silvestre, amargo, tenido por el Mahaleb.
Bauh. hist. 1. p. 227. Tourn. p. 627. Duham. arb. 1. t. 55.

Ceraso affinis. C. B. P. Planta parecida al Cerezo.
451.

Mahaleb. Cam. epit. 91. Mahaleb.
Macaleb Gesneri & Matthioli. Lob. ic. 133. Macaleb de Gesnero y de Matthiolo.

Cast. Ciruelo Mahaleb.

Habita en Suiza y Alemania: en los montes de Avila, de Asturias, de Lievana, Pirineos y otras partes de España. *h*

Produce las *hojas* aovadas, obtusas y recortadas: las esti-
pu-

pulas con dientes de color pardo: el *corimbo* convexo: las *bracteas* cortisimas, muy obtusas y aserradas.

Armeniac. ca. 7. PRUNUS *floribus sessilibus, foliis subcordatis.* X Ciruelo con flores sentadas; y hojas casi de figura de corazon.

Mala Armeniaca majora. C. Albaricoques mayores.

B. P. 442. Cam. epit. 146.

Bauh. hist. 1. p. 167.

Mala Armeniaca majora, nucleo dulci (vel amaro). X Albaricoques mayores, con la Almendra dulce (ó amarga).

Tourn. p. 623.

Armeniac. ca. *Malus Armeniaca minor.* X Albaricoque menor. ca

C. B. P. 442.

Cast. Ciruelo Albaricoque.

Habita.

Varía con el *fruto* mas ó menos grande, entre roxo y amarillo, y de otros varios colores.

Siberica. 8. PRUNUS *floribus sessilibus, foliis ovato-oblongis.* X Ciruelo con flores sentadas; y hojas entre aovadas y oblongas.

Prunus inermis, foliis ex ovato cordatis, longe mucronatis, fructu exsucco. X Ciruelo inerme, con hojas entre aovadas y de figura de corazon, que rematan en punta larga; y fruto acorchado.

Gmel. Sib. 3. p. 172.

Armeniaca Betulae folio & facie, fructu exsucco. X Albaricoque arbol con hoja y traza de Abedul; y fruto acorchado.

Amman. ruth. 272. t. 29.

Cast. Ciruelo de Siberia.

Habita en Siberia. h

Pumila. 9. PRUNUS *floribus subumbellatis, foliis angustolanceolatis.* X Ciruelo con flores casi en umbela; y hojas entre angostas y lanceoladas.

Cerasus (Canadensis) foliis lanceolatis, glabris, integerrimis subtus caesiis, ramis patulis. X Cerezo (del Canadá) con hojas lanceoladas, lampifias, enterisimas, por debaxo de color entre azul y verde; y ramas extendidas.

f. 2.

150 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Cerasus Canadensis, *pumila*, *oblongo angustoque folio*, *fructu parvo*. Duham. arb. 149. n. 17. Cerezo del Canadá, enano, con hoja oblonga y angosta; y fruto pequeño.

Cast. Ciruelo enano.

Habita en el Canadá. \mathfrak{H}

Es arbusto de la estatura del *Almendro enano*. Echa la raíz rastrera: las ramas en varitas y de color que tira á purpúreo: las hojas pálidas por debaxo, ó de color entre azul y verde: los pedunculos propios de una flor, y que salen de tres en tres de las yemas laterales.

Cerasus,

10. PRUNUS *umbellis subpedunculatis*, *foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis*. Mat. Med. 143. Ciruelo de umbelas con pedunculo muy corto; hojas entre aovadas y lanceoladas, lampiñas, y conduplicadas ó sea que sus márgenes se acercan paralelas unas á otras.

Cerasus foliis glabris serratis, *ovato-lanceolatis mucrone producto*. Hall. helv. n. 1083. Cerezo de hojas lampiñas, aserradas, entre aovadas y lanceoladas, con su punta alargada.

α *Cerasus pumila*. C. B. P. 450. Cerezo enano, α

β *Cerasus Avium*, *racemosa*, *hortensis*. C. B. P. 450. Cerezo de Aves, racimoso, y hortense. β

χ *Cerasus hortensis*, *flore pleno*. C. B. P. 450. Tourn. p. 626. Cerezo hortense, con la flor plena. χ

Cast. Ciruelo cerezo.

Habita en Europa y se cultiva en varios terrenos de España. \mathfrak{H}

Tiene las hojas conduplicadas: las *estipulas* dentadas: las *bracteas* aserradas, hendidas en tres partes, y la intermedia como si fuese hoja: las *yemas terminales* como hojas, y las *laterales* que llevan las flores.

Varia con la flor plena; con el fruto de varias figuras, de diferentes colores y sabores.

PROPIED. Los frutos encarnados son refrigerantes y algo agrios; y se usan en las calenturas.

PRU-



Avium

11. PRUNUS *umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis subtus pubescentibus conduplicatis.* Mat. Med. Ciruelo con umbelas sentadas; hojas entre aovadas y lanceoladas, vellosas por debaxo y conduplicadas.

144.

Cerasus major, sylvestris, fructu subdulci, nigro colore inficiente. Tourn. p. 626. Cerezo mayor, silvestre, con el fruto algo dulce, y que tiñe de color negro.

Cerasus sylvestris, fructu nigro & rubro. Bauh. hist. 1. p. 220. Cerezo silvestre, con el fruto negro y encarnado.

Prunus duracina. α

Ciruelo durazno. α

Cerasa crassa, carne dura. C. B. P. 450. Cereza crasa, y con la carne dura.

Prunus Bigarella. β

Ciruelo de Bigarela. β

Cerasa sativa, major. C. B. P. 450. Cereza sática, mayor.

Cerasus major, fructu cordato, magno. Rai. hist. 1538. Tourn. p. 626. Cerezo mayor, con el fruto grande y de figura de corazón.

Cast. Ciruelo de Aves.

Habita en la Europa mas boreal. *h*

Varia con el fruto mayor ó menor, y su carne mas ó menos dura.

Tiene las *hojas* conduplicadas ó sea que sus márgenes se acercan paralelas unas á otras, con una ó dos glandulas en el remate del peciolo: la *umbela* sentada, casi de tres flores con su piececito; y el *involucro* de quatro hojuelas.

Llámase *Ciruelo de Aves* porque muchisimas se alimentan de su fruto.

PROPIED. Los frutos negros ácidos son antispasmodicos y algo anodinos: y se usan en la parálisis y convulsiones.

Do-
mesti-
ca.

12. PRUNUS *pedunculis subsolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis muticis.* Mat. Med. 144. Ciruelo con uno ó dos pedunculos; hojas entre lanceoladas y aovadas, envueltas; y ramas mochas.

Pru-

- Prunus foliis serratis, hirsutis, ovato-lanceolatis, floribus longe petiolatis.* Hall. helv. n. 1079. Ciruelo de hojas aserradas, con pelo áspero, enteras y lanceoladas; flores con piecitos largos.
- Prunus sylvestris, fructu majore.* Vaill. paris. 140. Ciruelo silvestre, con el fruto mayor.
- Prunus.* C. B. P. 443. Ciruelo.
- Pruna Damascena.* Ciruelas Damascenas.
- Pruna majora dulcia & parva, cœrulea.* C. B. P. 443. Tournefort. p. 622. sub Pruno. Ciruelas mayores, dulces, pequeñas, de color entre negro y cerúleo.
- Prunus Hungarica.* Ciruelo de Hungría.
- Pruna magna, crassa, subacida.* C. B. P. 443. Tournefort. p. 622. Ciruelas grandes, crasas y algo agrias.
- Prunus Juliana.* Ciruelo del mes de Julio.
- Pruna oblonga, cœrulea.* C. B. P. 443. Tournefort. p. 622. Ciruelas oblongas, de color cerúleo.
- Prunus perdigona.* Ciruelo perdigono.
- Pruna nigra, carne dura.* C. B. P. 443. Tournefort. p. 622. Ciruelas negras, con la carne dura.
- Prunus cerea.* Ciruelo con fruto de color de cera.
- Pruna colore ceræ ex candido in luteum pallescente.* C. B. P. 433. Tournefort. p. 622. Ciruelas de color de cera, que de cándido pálido tira á amarillo. vulgo: de frayle.
- Prunus Asinina.* Ciruelo de Asno. (Porque su fruto es muy ingrato). vulgo: Harta bellacos.
- Pruna magna, rubra, rotunda.* C. B. P. 443. Tournefort. p. 622. Ciruelas grandes, roxas y redondas.
- Prunus maliformis.* Ciruelo que lleva el fruto en forma de manzana.
- Pruna rotunda, flava, dulcia, Mali amplitudine.* C. B. P. 443. Ciruelas redondas, de color amarillo roxo, dulces, y del ancho de una manzana.
- Prunus Augustana.* Ciruelo que lleva fruto en el mes de Agosto.

- Pruna Augusto maturescentia, minoræ & austeriora.* C. B. P. 443. X Ciruelas menores y mas ásperas, que maduran en el mes de Agosto.
- Prunus fructu minori, austero.* Tourn. p. 623. X Ciruelo con el fruto austero y mas pequeño.
- Prunus precox.* X Ciruelo que dá el fruto temprano. 1
- Pruna parva, præcocia.* C. B. P. 443. Tourn. p. 623. X Ciruelas pequeñas y tempranas.
- Prunus cereola.* X Ciruelo con fruto de color de cera. 2
- Pruna parva ex viridi, flavescencia.* C. B. P. 443. X Ciruelas pequeñas de color verde, que tira á amarillo-roxo.
- Prunus amygdalina.* C. B. P. 443. Tourn. p. 622. X Ciruelo que lleva el fruto como la Almendra. 3 *Riñon de gato.*
- Prunus Galatensis.* Clus. hist. 4. X Ciruelo de Galata. 4
- Pruneoli albi, oblongiusculi, acidi.* C. B. P. 443. Tourn. p. 623. X Ciruelillas blancas, algo oblongas y ácidas.
- Prunus Brignola.* X Ciruelo de Briñola. 5
- Pruna ex flavo rufescencia, mixti saporis gratissima.* C. B. P. 443. X Ciruelas de color que de roxo-amarillo tira al de rubio, de sabor mixto y muy agradable.
- Prunus Brignoniensis, fructu suavissimo.* Tournes. p. 623. X Ciruelo de Briñola, cuyo fruto es muy suave.
- Prunus myrobalanus.* Bauh. hist. 1. p. 189. X Ciruelo llamado Myrobalano. 6
- Prunus fructu rotundo, nigro-purpureo, majori, dulci.* C. B. P. 444. Tourn. p. 623. X Ciruelo con el fruto mayor, redondo, dulce; y de color entre negro y purpúreo.

Cast. Ciruelo domestico.

Habita en lugares elevados de la Europa mas Austral. $\frac{7}{2}$
 PROPIED. El fruto dulce y agridulce es refrigerante, humectante: laxa y purga suavemente; se usa en las calenturas y para afloxar el vientre.

Inci-
titia.

13. PRUNUS *pedunculis geminis, foliis ovatis sub-
tus villosis convolutis, ra-
mis spinoscentibus.* Amœn.
Acad. 4. p. 273.

Ciruelo con pedunculos
mellizos; hojas aovadas, ve-
llosas por debaxo, envueltas
y ramas que se reducen
espinas.

Prunus sylvestris, major.
Rai. hist. 1528. Duham. arb.
2. t. 41.

Ciruelo silvestre, mayor.

Pruna sylvestria, precocia.
C. B. P. 444.

Ciruelas silvestres, tem-
pranas.

*Prunus sylvestris, pre-
cox, altior.* Tourn. p. 623.

Ciruelo silvestre, mas alto
y que dá el fruto temprano.

Cast. Ciruelo de ingertar.

Habita en Alemania, Suiza é Inglaterra: en Cataluña,

Galicia y otras partes de España. $\frac{h}{2}$

Sino-
sa.

14. PRUNUS *pedunculis solitariis, foliis lanceolatis
glabris, ramis spinosis.*
Hort. Cliff. 186. Mat. Med.

Ciruelo con pedunculos
solitarios; hojas lanceoladas
lampiñas; y ramas espinosas.

145.

*Prunus spinosa, foliis gla-
bris, serratis, ovato-lanceo-
latis, floribus breviter pe-
tiolatis.* Hall. helv. n. 1080.

Ciruelo espinoso, de ho-
jas lampiñas, aserradas, en-
tre aovadas y lanceoladas; y
flores con el piececito corto.

Prunus sylvestris. C. B.
P. 444. Tabern. ic. 993.

Ciruelo silvestre.

Cast. Ciruelo espinoso. vulgo: Endrino. Farm. Acacia
nostras.

Habita en los collados abrigados de Europa: en los alre-
dedores de Madrid y otras muchisimas partes de Espa-
ña. $\frac{h}{2}$

PROPIED. La corteza, flores y frutos de esta planta son
adstringentes y refrigerantes: admirables en la diar-
rea y cálculo: y se usan tambien para aderezar los
cueros.

15. PRUNUS *umbellis* X Ciruelo con umbelas sen-
sessilibus, *foliis ovato lan-* X tadas; hojas entre aovadas
ceolatis, *ramulis pallide* X y lanceoladas; y ramitas con
punctatis. Suppl. p. 252. X puntitos pálidos.

Cast. Ciruelo de Pensilvania.

Habita en la America Septentrional. h

Tiene su traza como la del Ciruelo Cerezo; pero las ra-
 mas salpicadas de puntitos blanquecinos ó pálidos como
 en el Ciruelo de Virginia: las hojas entre lanceoladas y
 aovadas, aserraditas, lisas, con dos glandulas en su
 base y comunmente roxas; y las flores mas pequeñas
 que las del Ciruelo Cerezo.

756. Género PLINIA. Plumier. II.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, partido en quatro ó cinco
 lacinas, agudas, planas y pequeñas.

COR. de quatro ó cinco *petalos* aovados y cóncavos.

ESTAMB. Filamentos numerosos, capilares, del largo de
 la corola: con las *anteras* pequeñas.

PIST. Germen dentro de la flor, pequeño: *estilo* alesnado,
 mas largo que los estambres: con el *stigma* sen-
 cillo.

PERIC. *Drupa* muy grande, globosa y asurcada.

SEM. una sola, muy grande, globosa y lampiña.

ESPECIES.

Cro-
 cea. 1. PLINIA *floribus pen-* X Plinia con flores de cinco
tapetalis. X petalos.

Plinia fructu croceo, odo- X Plinia con el fruto de co-
rato. Plum. gen. 9. ic. 225. X lor de azafran y oloroso.

Cast. Plinia azafranada.

Habita en la America. h

Tiene las *hojas* pinnadas, y cerca de doce hojuelas que
 rematan apareadas, entre aovadas y lanceoladas, y en-
 terisimas: las *flores* sin pedunculo, y esparcidas por los
 ramos desnudos mas viejos; y el *fruto* comestible.

Rubra. 2. *PLINIA floribus tetra-* X Plinia con hojas de quatro
petalis. X petalos.
Ibipitanga. Marcgr. Bras. X Ibipitanga.
 187. X

Cast. Plinia encarnada.

Habita. . . . D. Allamand.

Echa las *hojas* opuestas, sentadas, aovadas, puntiagudas enterisimas y rígidas: las *glandulas* alternas y en las axilas de las hojas: la *drupa* encarnada, y de sabor de una *Cereza* austera. Allamand.

Acaso es distinta especie, ó una grande variedad de la antecedente, por razon de las flores de quatro *petalos*; y de las *drupas* encarnadas?

Pedunculata. 3. *PLINIA floribus ped-* X Plinia con flores pedun-
dunculatis polyandris. Sup- X culadas y de muchos estam-
 pl. p. 253. X bres.
Plinia rubra. Syst. veg. X Plinia encarnada.
 ed. 13. p. 386. X

Cast. Plinia pedunculada.

Habita en Surinam. Dalberg. *h*

Es *arbol* que produce las *hojas* opuestas, con peciolo, sencillas, lisas, parecidas á las del *Myrto*, y aovadas: las *flores* con pedunculo, del largo de las *hojas*, y casi en umbela: el *periantio* de quatro hojuelas, aovadas, cóncavas, extendidas y de color: quatro hasta ocho *petalos* aovados al revés, sin uñas, y al doble mas largos que el caliz: muchos *filamentos* capilares, de la longitud de los *petalos*, é insertos en el receptáculo; con las *anteras* casi redondas: el *germen* baxo de la flor, algo redondo y angulado: el *estilo* filiforme, y del largo de los *estambres*; con el *estigma* sencillo: la *baya* casi redonda de la magnitud de una ciruela, con ocho convexidades, de una celdilla, y con ombligo formado de quatro dientes, encarnada, sabrosa y muy semejante á la *drupa* de la *Plinia azafranada*; con una sola *semilla* casi globosa.

757. Género CHRYSOBALANUS. † Icaco.

Plum. 5. Jacq. Amer. 154.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, á manera de campana, herido en cinco *lacinijs* extendidas, y que se marchita.

COR. de cinco *petalos*, oblongos, planos, extendidos, é insertos por sus uñas en el caliz.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, puestos en cerco, derechos, prendidos en el caliz: con las *anteras* pequeñas y mellizas.

PIST. *Germen* aovado: *estilo* de la figura y longitud de los estambres: con el *estigma* obtuso.

PERIC. *Drupa* aovada, grande y de una celdilla.

SEM. *Nuez* aovada, con cinco surcos, rugosa, y de cinco ventallas.

OBS. *Caliz* con cinco dientes, plano y persistente: y *filamentos* vellosos. *Wernisch*.

ESPECIE.

- | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| Icaco. | 1. CHRYSOBALANUS. | X | Chrysobalano. |
| | Jacq. Amer. 154. t. 94. | | |
| | Guaiera. Marcgr. Bras. | X | Guaiera. |
| | t. 2. c. 4. | | |
| α | <i>Icaco fructu ex albo rufescente.</i> | X | Icaco con el fruto de color que de blanco tira á amarillo-roxo. α |
| | Plum. gen. 44. ic. 158. | | |
| | <i>Icaco fructu nigro, vel purpureo.</i> | X | Icaco con el fruto negro, ó purpúreo. |
| | Plum. gen. 44. | | |
| β | <i>Chrysobalanus fruticosus, foliis orbiculatis, alternis, floribus laxè racemosis.</i> | X | Chrysobalano fruticoso, con hojas alternas; y flores en racimo laxo. β |
| | Brown. jam. 250. t. 17. f. 5. | | |
| | Cast. Chrysobalano Icaco. | | |
| | Habita en la America Meridional. † | | |
| | No pudo determinar <i>Linneo</i> si eran una ó mas las especies, por no haber visto otra que la variedad β la qual no tiene el tallo áspero; pero echa las <i>hojas</i> alternas, | | ca- |

158 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

casi redondas , enterisimas y algo escotadas : las flores en panoja : los pedunculos redondeados exteriormente y por dentro planos.

Chrysobalanus (purpurea) X *Chrysobalano* (purpurea)
foliis decompositis , foliolis X con hojas decompuestas ;
ovatis integerrimis . Mill. X hojuelas aovadas y enterisimas ;
 dict. n. 2. R. X mas.

758. Género SONNERATIA. *Suppl. p. 38.*

CAR. GEN. NAT.

- CAL. *Periantio* de una pieza , á manera de campana , plano , persistente , y hendido en seis laciniás aovadas.
 COR. *Petalos* seis , alesnados , insertos en la base del caliz , extendidos , y apenas mas largos que él.
 ESTAMB. *Filamentos* muchos , prendidos en la base del caliz , filiformes y largos : con las *anteras* globosas.
 PIST. *Germen* dentro de la flor , globoso : *estilo* filiforme con el *estigma* sencillo.
 PERIC. *Fruto* sentado en el caliz , persistente y abierto globoso , lampiño , xugoso , y de muchas celdillas.
 SEM. muchas.

ESPECIE.

- Acida. 1. SONNERATIA. *Sup.* X *Sonneratia.*
 pl. p. 252.
Pagapata. *Sonnerat. Vo-* X *Pagapata.*
yage. p. 16. t. 15. 16. X

Cast. *Sonneratia* ácida.

Habita en parages sumideros de la nueva Guinea. \bar{h}
Es arbol que produce las *hojas* opuestas , casi sentadas , oblongas , enterisimas , venosas , muy lampiñas , y parecidas á las del *Hypericon* : las *flores* terminales , solitarias y grandes ; con los *petalos* encarnados : el *fruto* semejante al del *Mesembryantemo* con el xugo ácido y que forma como vexiguillas.

ORDEN II.

DIGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOS PISTILOS.

759. Género CRATÆGUS. * *Tourn.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , entre cóncavo y extendido, persistente , y hendido en cinco partes.

COR. *Petalos* cinco , casi redondos , cóncavos , sin uñas , é insertos en el caliz.

ESTAMB. *Filamentos* veinte , alesnados , prendidos en el caliz : con las *anteras* casi redondas.

PIST. *Germen* baxo del caliz : *estilos* dos , filiformes y derechos : con los *estigmas* en cabezuela.

PERIC. *Baya* carnosa , casi redonda , y con ombligo.

SEM. de dos en dos , algo oblongas , separadas y cartilaginosas.

Varia en el número de los pistilos.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 633.

El fruto es diverso de la Pera en su forma y magnitud ; y merece mas bien llamarse *baya* llena de semillas callosas y recogidas en las celdillas que ocupan el centro.

ESPECIES.

- Aria. 1. CRATÆGUS *foliis* X Cratogo de hojas aovadas,
ovatis incisiss serratis sub- X cortadas , con aserraduras , y
tus tomentosiss. Fl. dan. t. 302. X tomentosas por debaxo.
Mespilus (aria) floribus X Nispero (*aria*) con flores
digyniss , foliis ovatis sub- X de dos pistilos ; hojas aova-
tus tomentosiss. Scop. car. 2. X das , y por debaxo tomento-
 ed. 2. n. 591. X sas.
Sorbus (aria) foliis ovali- X Serbal (*aria*) con hojas
bus serratis , facie splen- X ovales , aserradas , lustrosas
dentibus , dorso tomentosiss, X por su haz , tomentosas en
fructu biloculari. Crantz. X el envés ; y fruto de dos cel-
 Austr. 1. fasc. 1. t. 2. f. 2. X dillas.

Al-

160 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

<i>Alni effigie lanato folio,</i> major. C. B. P. 452.	Planta mayor, parecida Aliso, con hoja lanuda.
<i>Cratægus folio subrotun-</i> <i>do, serrato, subtus incano.</i> Tourn. p. 633.	Cratægo con hoja casi re- donda, aserrada, y por deba- xo blanquecina.
<i>Aria.</i> Dalech. hist. 202.	Aria.
<i>Sorbus alpina.</i> Bauh. hist. 1. p. 65.	Serbál de los Alpes.
* <i>Cratægus Suecica.</i>	Cratægo de Suecia. *
<i>Cratægus inermis, foliis</i> <i>ellipticis, serratis, trans-</i> <i>versaliter sinuatis, subtus</i> <i>villosis.</i> Flor. dan. t. 301.	Cratægo inerme, de hojas elípticas, aserradas, trans- versalmente sinuosas; y con vello por debaxo.
<i>Sorbus sylvestris, Angli-</i> <i>ca.</i> Rai. hist. 1459.	Serbál silvestre, de Inglai- terra.

Cast. Cratægo aria. vulgo: Mostajo.

Habita en lugates frios de Suiza y Europa: en los montes del Escorial, de Avila, Sierramorena, Moncayo, Aragón, en los de Ntra. Sra. de Montserrat y otras partes de España; però la variedad * en Suecia é Inglaterra.

Varia en el número de los estilos y de las semillas.

Tor- mina- lis.	2. CRATÆGUS <i>foliis</i> <i>cordatis septangulis, lobis</i> <i>infirmis divaricatis.</i> Pollich. pal. n. 421.	Cratægo de hojas de figu- ra de corazón, con siete ár- gulos ó lóbulos y los de más abaxo apartados.
	<i>Mespilus foliis serratis,</i> <i>septilobis, lobis primis di-</i> <i>vergentibus.</i> Hall. helv. n. 1088.	Nispero de hojas aserra- das, con siete lóbulos y los primeros divergentes.
	<i>Sorbus torminalis</i> & <i>Cra-</i> <i>tægus Theophrasti.</i> Bauh. hist. 1. p. 63.	Serbál cuyo fruto cura los retortijones: y llamado Cra- tego de Teophrasto.
	<i>Cratægus foliis lacinia-</i> <i>tis.</i> Tourn. p. 633. Duham. arb. 1. t. 79.	Cratægo con hojas laci- niadas.
	<i>Sorbus torminalis.</i> Cam. epit. 162.	Serbál cuyo fruto cura los retortijones.

Mespilus Apii folio, sylvestris, non spinosa, seu Sorbus torminalis. C. B. P. 454. Rai. hist. 1457. Nispero sylvestre, sin espinas, con hoja como la del Apio; ó Serbál cuyo fruto cura los retortijones.

Cast. Cratægo torminal.

Habita en Inglaterra, Alemania, Suiza y Borgoña: en el Pinar de Hoyoquesero: en Moncayo, Pirineos y otras partes de España. \hbar

PROPIED. Los frutos son astringentes, y útiles para curar los fluxos de vientre y disenteria que suelen causar retortijones de vientre; por lo qual se dió á esta especie el nombre trivial de Torminalis.

Coc-
cinea. 3. CRATÆGUS foliis cordatis repando-angulatis serratis glabris. Cratægo de hojas de figura de corazon, entre ondeadas por su margen y anguladas, con aserraduras, y lampiñas.

Mespilus foliis cordatis, ovatis, acuminatis, marginibus acute serratis, ramis spinosis. Mill. dict. t. 179. Nispero con hojas de figura de corazon, aovadas, puntiagudas, agudamente aserradas por sus márgenes; y ramas espinosas.

Mespilus Apifolio, Virginiana, spinis horrida, fructu amplo coccineo. Pluk. Alm. 249. t. 46. f. 4. Nispero de Virginia, con hoja como la del Apio, abundante de espinas; con fruto ancho y de color coccineo.

Mespilus Virginiana, colore rutilo. C. B. P. 453. Nispero de Virginia, con el fruto de color rubio reluciente.

Cast. Cratægo coccineo.

Habita en la Virginia y Canadá. \hbar

Tiene las ramas salpicadas de puntos claros: las espinas axilares, robustas, muy extendidas, y que salen de los rudimentos de las ramas: las hojas entre de figura de cuña y aovadas, con algun lóbulo y aserradas: los pedunculos vellosos, y en corimbo.

Viridis.

4. **CRATÆGUS foliis lanceolato-ovatis subtrilobis serratis glabris, caule inermi.** Medic. in obs. soc. œcon. Lutr. 1774. p. 288.

Mespilus inermis, foliis oblongis, integris, acuminatis, serratis, parvis, utrinque viridibus. Gron. virg. 163.

Cast. Cratogo verde.

Habita en la Virginia. $\frac{h}{2}$ Tiene las *estipulas* de figura de medio corazon.Es variedad del *Cratogo coccineo*. Gron. virg. 76.

Varian mucho estas especies de la America Septentrional con espinas ó sin ellas : en el número de los estilos ; y en la figura de las hojas.

Crusgalli.

5. **CRATÆGUS foliis lanceolato-ovatis serratis glabris, ramis spinosis.** Kalm. it. 1. p. 244.

Mespilus foliis lanceolatis, serratis, spinis robustioribus, floribus corymbosis. Mill. dict. t. 178. f. 2.

Mespilus aculeata, Pyrifolia, denticulata, splendens, fructu insigni, rutilo, virginensis. Pluk. Alm. 249. t. 46. f. 1. Duham. arb. 17. Hort. angl. t. 13.

Cast. Cratogo pierna de Gallo.

Habita en la Virginia. $\frac{h}{2}$

Tiene las *hojas* ovales, lustrosas, y en forma de cuña por su base.

To-
n en-
rosa. 6. CRATÆGUS foliis cu-
neiformi-ovatis serratis
subangulatis subtus villo-
sis, ramis spinosis. Mill.
dict. n. 9.

Cratægo con hojas entre
de figura de cuña, y aova-
das, aserradas, con algun
ángulo, vellosas por debaxo;
y ramas espinosas.

Mespilus Caroliniana,
Apii folio, vulgari similis,
major, fructu luteo. Trew.
ehret. t. 17.

Nispero mayor de la Ca-
rolina, semejante al vulgar;
con hoja como la del Apio;
y fruto amarillo.

Mespilus Virginiana,
Grossulariæ foliis. Pluk.
phyt. 100. f. 1.

Nispero de Virginia, con
hojas como las del Groselle-
ro.

Cast. Cratægo tomentoso.

Habita en la Virginia. \mathcal{H}

Tiene los cálices foliosos: las flores solitarias: y las espi-
nas largas y angostas.

Indica. 7. CRATÆGUS foliis
lanceolatis serratis, caule
inermi, corymbis squamo-
sis.

Cratægo de hojas lanceo-
ladas, con aserraduras; ta-
llo inermes; y corimbos esca-
mosos.

Cast. Cratægo de Indias.

Habita en la India. \mathcal{H}

Es arbol grande que echa las ramas sin espinas: las hojas
entre anchas y lanceoladas, con aserraduras obtusas,
algo crasas y pecioladas: los corimbos terminales, con
pedunculos escamosos, y bracteas alesnadas.

Oxya-
cantha 8. CRATÆGUS foliis ob-
tusis subtrifidis serratis.
Jacq. Austr. t. 292. f. 2. Fl.
dan. t. 634.

Cratægo con hojas obtu-
sas, hendidas en tres ó qua-
tro partes, y aserradas.

Mespilus spinosa, foliis
glabris, serratis, retusis,
trifidis. Hall. helv. n. 1087.

Nispero espinoso, con ho-
jas lampiñas, aserradas, que
rematan en seno obtuso, y
hendidas en tres partes.

Mespilus Apiifolio, syl-
vestris, spinosa, seu Oxya-
cantha. C. B. P. 554. Tourn.
p. 642.

Nispero silvestre, espino-
so ú Oxíacantha, con hoja
como la del Apio.

Oxyacantha seu spina X *Oxiacantha* ó sea *espina*
acuta. Dod. pempt. 752. X aguda.

Cast. Cratægo Oxiacantho. vulgo : Espino majuelo.
Habita en prados abrigados y duros de Europa : en los
 contornos de Madrid : en Aragon, Cataluña y otras mu-
 chas partes de España. h

Varia con uno , dos , tres ó quatro *estilos* ; y con una, dos
 tres ó quatro *semillas*.

PROPIED. *La conserva del fruto de esta planta , se tiene*
por excelente remedio para precaver el aborto.

Asa- 9. CRATÆGUS foliis ob- X Cratægo de hojas obtusas
 rolus. *tusis subtrifidis subden-* X hendidas en tres ó quatro
tatis. Mill. dict. n. 7. X partes , y con algun diente

Mespilus Apiifolio , laci- X Nispero con hoja como la
niato. C. B. P. 453. Tourn. X del Apio , laciniada.
 p. 641.

Mespilus Aronia , vete- X Nispero llamado Aronia
rum. Bauh. hist. 1. p. 67. X de los antiguos.

α *Cratægus Aronia.* X Cratægo Aronia. α

Mespilus Orientalis, Apii- X Nispero Oriental , de hoja
folio , subtus hirsuto. Poch. X como la del Apio , con pelo
 Orient. 189. t. 85. X áspero por debaxo.

Cast. Cratægo Asarolo.

Habita en Florencia , Mompeller y en la Carniola ; y se
 cultiva en muchas partes de España. h

Parece que solamente se diferencia de la *Oxiacantha* por
 la sola magnitud , como el *Serbál doméstico* del silve-
tre. Varía en el número de las *celdillas*.

PROPIED. *El fruto es astringente ; corrobora el estoma-*
go , y corrige el vomito y diarrea.

Maura 10. CRATÆGUS foliis X Cratægo con hojas oblon-
oblongis apice dentatis . X gas , y dentadas por su ápice
 Suppl. p. 253. X ce.

Cast. Cratægo marrueco.

Habita en Mauritania. *Wânström.* h

Su *estatura* y *traza* son como las de la *Oxiacantha.* Es
arbusculo que produce su *corteza* cenicienta : las hojas
 oblon-

oblongas ó casi lanceoladas, obtusas, lisas, y en su remate con tres ó cinco dientes agudos: las flores en corimbos ramosos y semejantes á las de la *Oxiacantha*.

ORDEN III.

TRIGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON TRES PISTILOS.

760. Género SORBUS. * *Tourn.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, entre cóncavo y extendido, persistente, y hendido en cinco partes.

COR. *Petalos* cinco, casi redondos, cóncavos é insertos en el caliz.

ESTAMB. *Filamentos* veinte, alesnados, prendidos en el caliz: con las *anteras* casi redondas.

PIST. *Germen* baxo de la flor: *estilos* tres, filiformes, derechos: con los *estigmas* en cabezuela.

PERIC. *Baya* blanda, globosa y con ombligo.

SEM. tres, algo oblongas, separadas y cartilaginosas.

Varía en el número de los *pistilos*.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 633.

El *Serbál* es un género de planta, diverso del *Peral* y *Cratého*, por la forma de sus hojas; pues las de este (*Serbál*) nacen hermanadas al modo que las del *Fresno*.

ESPECIES.

Aucu-
paria.

1. SORBUS *foliis pinnatis utrinque glabris*. Mat. Med. 145. Gmel. Sib. 3. p. 178. *Sorbál* con hojas pinnadas, y lampiñas por una y otra parte.

Sorbus foliis pinnatis, fructu pomiformi, quinqueloculari. Crantz. aust. p. 88. t. 1. f. 4. *Sorbál* con hojas pinnadas; fruto en forma de Pera, y de cinco celdillas.

156 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Sorbus aucuparia. Bauh. X Serbál de Cazador.
 hist. 1. p. 62. Tourn. p. 634.
 Duham. arb. 2. t. 73.

Sorbus sylvestris, *foliis domesticæ similibus*. C. B. X Serbál silvestre, con ho-
 jas semejantes á las del Do-
 P. 415. Rai. hist. 1457. X méstico.

Sorbus sylvestris. Cam. X Serbál silvestre.
 epit. 161. X

Cast. Serbál de Cazador.

Habita en lugares frios de la Europa, y en el monte Li-
 bano: en Asturias, Alcarria, montes de Burgos y otras
 partes de España. h

Varía en el número de los *estilos* y de las *semillas*.

PROPIED. El fruto es ácido, astringente y útil en las al-
 morranas.

Hy- 2. SORBUS *foliis semi-* X Serbál con hojas medio
 brida. *pinnatis subtus tomentosis*. X pinnadas, y tomentosas por
 Linn. dec. t. 6. Oed. dan. X debaxo.
 t. 30. X

Cast. Serbál híbrido.

Habita en Gotlandia. h y tambien en Turingia. R.

Por su *estatura* y modo de echar las *hojas* se parece en
 algun modo al *Cratægo aria*; y por las flores, corimbo
 y tres pistilos, al *Serbál de Cazador*.

Do- 3. SORBUS *foliis pinna-* X Serbál con hojas pinnadas
 mesti- *tis subtus villosis*. Hall. X y por debaxo vellosas.
 ca. helv. n. 1092.

Sorbus foliis pinnatis, X Serbál con hojas pinnadas
fructu Pyriformi, quinquelo- X fruto en forma de Pera, y
culari. Crantz. Austr. p. 87. X de cinco celdillas.
 t. 2. f. 3.

Sorbus sativa. C. B. P. X Serbál que se cultiva.
 415. Tourn. p. 633.

Sorbus legitima. Clus. X Serbál legitimo.
 hist. 1. p. 10. Duham. arb. 1.

Sorbus domestica. Matth. X Serbál doméstico.
 1. 1. c. 136. Cam. epit. 160.

Lob. ic. 2. p. 106. X

Cast.

Cast. Serbál doméstico.

Habita en parages calientes de Europa: en Moncayo, Cataluña y otras partes de España.

PROPIED. El fruto maduro es muy flatulento; pero antes de madurar es astringente, corroborante y útil en los flatos.

761. Género SESUVIUM. Halimum. Loeffl. it. 191.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, á manera de campana, partido en cinco lacinias aovadas, agudas, de color por dentro, y que se marchitan.

COR. ninguna.

ESTAMB. Filamentos muchos, alesnados, insertos debaxo de las lacinias del caliz, mas cortos que él: con las anteras casi redondas.

PIST. Germen oblongo, colocado en el fondo del caliz, y de tres lados por arriba: estilos las mas veces tres, capilares, derechos, y de la longitud de los estambres: con los estigmas sencillos.

PERIC. Capsula aovada, de tres celdillas, y que se abre al través.

SEM. casi redondas, algo planas, y con un piquito en su margen.

ESPECIE.

Portu- 1. SESUVIUM. Jacq. Amer. X Sesuvio.
lacas- 155. t. 95.

Portulaca foliis lanceola- Verdolaga con hojas lan-
tis convexis, pedunculis ceoladas, convexâs; y pe-
unifloris. Sp. pl. I. p. 446. dunculos de una flor.
Loeffl. it. 191.

Portulaca Curassavica, Verdolaga de Curasao,
angusto, longo lucidoque fo- tendida, con hoja angosta,
lio, procumbens, floribus X larga y reluciente; y flores
rubris. Pluk. Alm. 303. t. 216. encarnadas.
f. 1. Herm. par. 212. t. 212. X

168 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Portulaca marina, latifo- \times Verdolaga marina (*maritima*, flore suave rubente: \times *tima*) con hoja ancha; y flor Plum. spec. 6. ic. 223. f. 2. \times de color roxo delicado.

Cast. Sesuvio falsa Verdolaga.

Habita en lugares maritimos de la India. ☉

Tiene la raiz filiforme y perenne: muchos tallos difusos por todas partes, rastreros, rollizos, articulados y lampiños: las hojas opuestas, lanceoladas ó entre lineares y lanceoladas, algo planas por encima, convexas por debaxo y xugosas, con sus piecitos muy cortos, ó casi ninguno, y las axilas desnudas ó sin pelos: las flores axilares y solitarias; con los pedunculos del largo de ellas: el caliz por de fuera de color entre verde y azul, y por dentro que tira á purpúreo. Habita y es muy abundante ácia el mar cerca de Cumaná, donde la llaman Vidro: y de sus cenizas que casi equivalen á las de la Sosa y Salicor fabrican los Indios el xabon. *Loeff. loco citato.*

ORDEN IV.

PENTAGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON CINCO PISTILOS.

762. Género MESPILUS. * *Tourn. t. 410.*

CAR. GEN. NAT.

CAI. Periantio de una pieza, entre cóncavo y extendido, persistente y hendido en cinco partes.

COR. Petalos cinco, casi redondos, cóncavos, é insertos en el caliz.

ESTAMB. Filamentos veinte, alesnados, y prendidos en el caliz: con las anteras sencillas.

PIST. Germen baxo de la flor: estilos cinco, sencillos y derechos: con los estigmas en cabezuela.

PERIC. Baya globosa, con ombligo, cerrado con las lacinias del caliz arrimadas entre sí, y casi horadado.

SEM. cinco, de consistencia de hueso, y gibosas.

OBS. De los dichos caracteres se manifiesta la mucha afinidad que se halla entre el *Cratago*, *Serbál* y *Nispero*; de manera que apenas pueden distinguirse, sino por

por el número de los pistilos. Las hojas del *Serbál* son pinnadas : las del *Cratago* anguladas ; y las del *Nispero* comunmente enteras.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 641.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco ; cuyo caliz folioso (*es el germen*) pasa á fruto casi globoso , coronado , carnoso , blando , y de una celdilla que recoge huesecitos llenos de una almendra oblonga.

ESPECIES.

- | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ger-
mani-
ca. | 1. <i>MESPILUS inermis</i> ,
<i>foliis lanceolatis subtus to-</i>
<i>mentosus , floribus sessili-</i>
<i>bus solitariis.</i> Hort. Cliff.
189. Mat. Med. 146. | Nispero inerme , con ho-
jas lanceoladas , tomentosas
por debaxo ; flores sentadas
y solitarias. |
| | <i>Mespilus foliis elliptico-</i>
<i>lanceolatis , serratis , caly-</i>
<i>cibus longissimis , persisten-</i>
<i>tibus.</i> Hall. helv. n. 1094. | Nispero con hojas entre
elípticas y lanceoladas , aser-
radas ; cálices larguissimos y
persistentes. |
| | <i>Mespilus Germanica</i> , fo-
lio <i>Laurino</i> , non serrato.
C. B. P. 453. Tourn. p.641. | Nispero de Alemania, con
hoja como la del Laurel, sin
aserraduras. |
| | <i>Mespilus.</i> Dod. pempt.
801. | Nispero. |
| a | <i>Mespilus folio Laurino</i> ,
<i>major.</i> C. B. P. 453. Tourn.
p. 741. Duham. arb. fruit. 1.
t. 3. | Nispero mayor , con hoja
como la del Laurel. a |
| | <i>Mespilus domestica.</i> Lob.
ic. 166. | Nispero doméstico. |

Cast. Nispero de Alemania.

Habita en la Europa Austral. *h*

Tiene las ramas vellosas : las *hojas* entre ovales y lanceoladas , algo vellosas y aserradas por su extremo ; con los *peciolos* cortísimos y acanalados : los *cálices* terminales , con pelo áspero : y una *bráctea* del largo de la corola.

170 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

PROPIED. El fruto es refrigerante y muy astringente, especialmente verde: sirve para detener la diarrea y la disenteria.

- Pyra-
cantha 2. MESPILUS *spinosa*, X Nispero espinoso, con ho-
foliis lanceolato-ovatis cre- X jas entre lanceoladas y ao-
natis, calycibus fructus ob- X vadas, recortadas; y cálices
tusis. Hort. Cliff. 189. X del fruto obtusos.
Mespilus aculeata, Amyg- X Nispero con agujones, y
dalifolio. Tourn. p. 642. Du- X hoja como la del Almendro.
ham. arb. 7. X
Oxyacantha Dioscoridis, X Oxicantha de Dioscori-
seu spina acuta, Pirifolio. X des, ó Espina aguda, con ho-
C. B. P. 454. Rai. hist. 1459. X ja como la del Peral.
Pyracantha quibusdam. X Pyracantha, llamada así
Bauh. hist. 1. p. 51. X por algunos autores.

Cast. Nispero pyracantha.

Habita en las cercas de Provenza é Italia: en Cataluña, Valencia, Andalucía y otras partes de España. $\frac{1}{2}$

- Cha-
mæ-
Mes-
pilus. 3. MESPILUS *inermis*, X Nispero inerme, con ho-
foliis ovalibus acute serra- X jas ovales, agudamente aser-
tis glabris, floribus corym- X radas; y flores entre en co-
boso-capitatis. Scop. carn. X rimbo y cabezuela.
ed. 2. n. 592. X
Cratægus foliis ovalibus, X Cratægo con hojas ovales,
acute serratis, glabris, cau- X agudamente aserradas, lam-
le inermi. Jacq. vind. 243. X piñas; y tallo inerme.
Austr. t. 331. X
Sorbus fruticosa, foliis X Serbal fruticoso, con ho-
oblongo-ovalibus serratis, X jas entre oblongas y ovales,
fructu ovato biloculari. X aserradas; fruto aovado y de
Crantz. Aust. p. 83. t. 1. f. 3. X dos celdillas.
Cotoneaster folio oblongo, X Falso-Membrillo, con ho-
serrato. C. B. P. 452. X ja oblonga y aserrada.
Cratægus folio oblongo, X Cratægo con hoja oblonga,
serrato, utrinque virente. X aserrada, y verde por ambas
Tourn. p. 633. X partes.
Chamæ-Mespilus. Bauh. X Pequeño-Nispero.
hist. 1. p. 72. X

Cast.

Cast. Nispero pequeño-Nispero.

Habita en los alpes de Austria y montes Pirineos. \hbar

Este arbolito se halla con lana mientras es tierno, pero mas crecido se despoja de ella. Posee las *hojas* aovadas al revés; y los *dientes del caliz* mas cortos que su tubo.

Haller, Jacquin y *Scopoli* vieron dos *pistilos* en la flor.

Tiene las *hojas* mas tiernas muy lampiñas y sin pelusa; pero la adquieren despues poco á poco, y en su vejez otra vez la pierden. *Crantz. loco citato. R.*

Coto-
neas-
ter.

4. MESPILUS *inermis*, \times
foliis ovatis integerrimis
subtus tomentosis. Oed. dan.
t. 112.

Nispero inerme, con ho-
jas aovadas, enterisimas, y
por debaxo tomentosas.

Mespilus foliis ovato-acu-
minatis, integerrimis, sub-
tus lanatis, bacca globosa.
Crantz. Austr. p. 81.

Nispero con hojas entre
aovadas y puntiagudas, en-
terisimas, lanudas por deba-
xo; y baya globosa.

Cotoneaster folio rotundo,
non serrato. C. B. P. 452.

Falso Membrillo, con ho-
ja redonda y sin aserraduras.

Mespilus folio subrotun-
do, fructu rubro. Tourn. p.
642.

Nispero con hoja casi re-
donda; y fruto roxo.

Chamæ-Mespilus Gesne-
vi. Clus. hist. 1. p. 60.

Pequeño-Nispero de Ges-
nero.

Cast. Nispero falso Membrillo.

Habita en collados abrigados de la Europa mas fria: en los Pirineos y montes de Ararat: en los de Cataluña, Aragon, Vizcaya, Navarra, Sierranevada y otras partes de España. \hbar

Varía con tres ó quatro *estilos*, y tres ó quatro *semillas*.

Xanthocar-
pus.

5. MESPILUS *spinosa*, X Nispero espinoso, con ho-
foliis subcuneiformibus cre- jas casi en forma de cuña,
natis, floribus solitariis, recortadas; flores solitarias;
laciniis calycinis subfolia- lacinias del caliz como si fue-
ceis inciso-serratis longis sen hojas entre cortadas y
reflexis, fructibus subturbi- aserradas, largas, redobla-
natis punctato-verrucosis. das; y frutos casi cónicos in-
 Suppl. p. 254. versos, con puntitos verru-
 Xgosos.

Cast. Nispero de fruto amarillo-pálido.

Habita en la America Septentrional. *Ehrhart.* h

Es *arbuscito* rígido y espinoso, que produce las *hojas* al-
 go crasas, casi tomentosas, del largo de pulgada y me-
 dia; con el *pedicelo* muy corto: el *pedunculo* que sale
 del extremo de las ramitas, solitario, tomentoso, y de
 la longitud del germen tambien tomentoso: dos ó tres
bracteas entre lineares y lanceoladas, aserradas, y que se
 caen facilmente; las *lacinias del caliz* como si fuesen
 hojas lanceoladas, entre cortadas y aserradas, redobla-
 das y mas largas que el germen: cinco *estilos*; el *fruto*
 casi cónico inverso, amarillo-pálido, punteado de verru-
 gas negras; con el *ombigo* profundo, y de la magnitud
 de la *drupa del Ciruelo de ingertar*; y cinco *nueces*
 de consistencia de hueso. *Suppl.* p. 254.

Phae-
no py-
rum.

6. MESPILUS *spinosa*, X Nispero espinoso, con ho-
foliis cordatis tri-quinque jas de figura de corazon,
seu septemfidis serratis hendidas en tres, cinco, ó siete
glabris, floribus corymbosis, partes, aserradas y lampifias;
segmentis calycinis deci- flores corimbosas; segmen-
duis, fructibus depresso tos del caliz que se caen fa-
globosis late-umbilicatis, nu- cilmente; frutos entre depri-
cibus apice denudatis. midos y globosos, con ombligo
 Suppl. p. 254. ancho; y nueces descu-
 Xbiertas por su extremo.

Cast. Nispero con fruto de color de datil.

Habita en la America Septentrional. *Ehrhart.* h

Es *arbol* mediocre, que echa las *ramas* espinosas, con
 manchas blancas: las *hojas* de figura de corazon, pun-
 tiagudas, agudamente aserradas, lampifias y de la mag-
 ni-

nitud de las del *Abedul blanco*; con el *peciolo* muy delgado, y mas corto que ellas: el *corimbo* compuesto: las *bracteas* en la base de los pedunculos, solitarias, alesnadas, muy pequeñas y que se caen facilmente: la *flor* poco mas pequeña que la del *Cratago oxiacantha*: los *dientes del caliz* cortísimos, obtusos, y que se caen quando el fruto está maduro: cinco *estilos*: el *fruto* entre deprimido y globoso, ó en forma de verticilo, de color coccineo, de la magnitud de el del *Ribes roxo*, con su ombligo ancho y desnudo; y cinco *nueces* de consistencia de hueso, con sus extremos descubiertos y que llenan el ombligo.

Esta especie es la que florece mas tarde que las demas de su género.

763. Género PYRUS. * *Tourn. t. 404. Malus.*

Tourn. t. 406. Cydonia. Tourn. t. 405.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, cóncavo, persistente, y hendido en cinco lacinias extendidas.

COR. *Petalos* cinco, casi redondos, cóncavos, grandes, é insertos en el caliz.

ESTAMB. *Filamentos* veinte, alesnados, mas cortos que la corola, y prendidos en el caliz: con las *anteras* sencillas.

PIST. *Germen* baxo de la flor: *estilos* cinco, filiformes, de la longitud de los estambres: con los *estigmas* sencillos.

PERIC. *Poma* casi redonda, con ombligo, carnosa, y de cinco celdillas membranosas.

SEM. algunas, oblongas, obtusas, puntiagudas en su base, por una parte convexas, y por la otra planas.

OBS. Es de admirar, que los autores hayan distribuido siempre este género tan conocido, en tres; constituyendo generos de las especies, y especies de las variedades.

CARACTERES GENERICOS DE TOURNEFORT. p. 628.

La flor es rosácea ó que consta de muchos pétalos puestos en cerco; cuyo caliz (*es el germen*) pasa á fruto carnoso, cónico inverso, con ombligo, dividido en celdillas y lleno de simientes oblongas.

MALUS. p. 634.

La flor es rosácea ó que consta de muchos pétalos puestos en cerco; cuyo caliz (*es el germen*) pasa á fruto carnoso, casi globoso, con ombligo en una y otra parte, dividido en celdillas, y lleno de simientes callosas y oblongas.

CYDONIA. p. 632.

La flor es rosácea ó que consta de muchos pétalos puestos en cerco; cuyo caliz (*es el germen*) pasa á fruto cónico inverso, carnoso, dividido en celdillas, y lleno de simientes oblongas y callosas.

ESPECIES.

Com. 1. PYRUS *foliis serratis* X Peral con hojas aserradas,
lævibus, floribus corymbo- X lisas; y flores en corimbo.
sis.

Pyrus sylvestris. C. B. P. X Peral silvestre.
 439. Dod. pempt. 788. To- X
 urn. p. 632.

Cast. Peral comun.

Habita en los bosques de Europa: en los de Cataluña y otras muchas partes de España.

Veanse las muchas variedades de frutos que produce esta especie, en *Tournefort, Miller* y otros autores Botánicos.

Pol. 2. PYRUS *foliis serratis* X Peral con hojas aserradas,
lueria. subtus tomentosis, floribus X tomentosas por debaxo; y
corymbosis. X flores en corimbo.

Pyrus (irregularis) foliis ovatis acute serratis, floribus cymosis. Knoop. pomolog. 2. p. 38. t. 4. R. Peral (*irregular*) de hojas aovadas, con aserraduras agudas; y flores cimosas.

Pyrus Polluvilleriana. Bauh. hist. 1. p. 59. Peral de Poluviller.

Cast. Peral de Poluviller.

Habita en Alemania. \bar{h}

Llamóla *Bauhino* con este nombre trivial, por haberla visto en Alemania en el Jardin de los Barones de Poluviller.

Echa las *hojas* aovadas, aserradas, tomentosas por debaxo, y tambien vellosas en la haz, señaladamente por su lomo: los *peciolos* tomentosos: el *corimbo* alargado é igualmente tomentoso: las *flores* muy abundantes, y mucho mas pequeñas que las del *Peral comun*.

Malus. 3. *PYRUS foliis serratis, umbellis sessilibus.* Mat. Med. 146. Hort. Cliff. 189. Peral con hojas aserradas, y umbelas sin pedunculo.

Pyrus foliis ovatis, acuminatis, subtus hirsutis, petiolis florigeris brevissimis. Hall. helv. n. 1097. Peral de hojas aovadas, puntiagudas, con pelo áspero por debaxo; y piecitos que llevan las flores muy cortos.

Malus sylvestris. C. B. P. 443. Dod. pempt. 790. Tourn. p. 634. Manzano silvestre.

Cast. Peral manzano.

Habita en Europa: en Moncayo, Monseñ, Asturias, Alcarria y otras muchas partes de España. Veanse tambien las muchas variedades de los frutos de esta especie, en Tournefort y otros autores.

PROPIED. El zumo del fruto llamado Camuesa es refrigerante, tónico, y se usa en las calenturas.

Baccata. 4. *PYRUS foliis serratis, pedunculis confertis, pomis baccatis.* Pall. it. 3. p. 105. Peral con hojas aserradas; pedunculos amontonados; y pomos de baya.

Cratægus Cerasifoliis, X Cratægo con hojas como
floribus magnis. Amman. X las del Cerezo; y flores gran-
 ruth. 274. t. 31. Mill. t. 269. X des.

Cast. Peral de baya.

Habita en Siberia, y Dauria ácia el rio *Schilkam*. h

Es arbol que produce las ramas lisas: las hojas como las
 del Corno, aovadas, con aserraduras agudas, y lisas en
 una y otra parte: los peciolos del largo de la hoja, y
 que por su base abrazan dos estipulas entre lineares y
 lanceoladas: quatro pedunculos filiformes, lisos, axila-
 res, amontonados, muy sencillos, de una flor y del lar-
 go de los peciolos: el germen baxo del caliz, globoso,
 lampiño y pequeño: cinco petalos sin uñas, ovales,
 cóncavos, blancos y gruesecitos: veinte estambres mas
 cortos que los pistilos; con las anteras de color amari-
 llo-roxo: cinco pistilos mas cortos que la corola: la ba-
 ya casi redonda, de cinco celdillas y encarnada: las se-
 millas de dos en dos y callosas: el caliz menudo, y que
 se cae quando las demas partes de la flor.

El fruto en la figura, consistencia, color y sabor algo
 agrio se parece á una manzana muy pequeña.

Coro-
 naria.

5. PYRUS *foliis serrato-
 angulatis, umbellis pedun-
 culatis.*

*Malus sylvestris, flori-
 bus odoratis.* Gron. virg. 55.
 Duham. arb. 1.

Malus Coronaria. Mill.
 dict. n. 2.

Peral con hojas entre aser-
 radas y anguladas; y umbe-
 las con pedunculo.

Manzano silvestre, con
 flores olorosas.

Manzano de Coronas.

Cast. Peral de Coronas.

Habita en la Virginia. h

Tiene la umbela con pedunculos lampiños: los cálices
 tambien lampiños, y por dentro tomentosos: las hojas
 como las del Peral Manzano; pero mas lampiñas y con
 aserraduras mas agudas.

- Cydo-
nia. 6. PYRUS *foliis integer-
rimis , floribus solitariis.* Peral con hojas enterisi-
mas ; y flores solitarias.
Mat. Med. 146. Jacq. Aust.
t. 342.
- Malus cotonea sylvestris.* Membrillero silvestre.
C. B. P. 434.
- Cydonia angustifolia, vul-
garis.* Tourn. p. 633. Membrillero vulgar de
hoja angosta.
- Cast. Peral membrillero.
Habita en las playas pedregosas del Danubio: y en los
vallados de los campos de Alemania: y se cria tambien
en varias partes de España. \hbar
Tiene el *caliz* extendido, aserrado y del largo de la co-
rola.
- PROPIED. El zumo del fruto es astringente y refrigeran-
te; se usa en el vomito, cólico, diarrea, y para preca-
ver el aborto.
- Ni-
valis. 7. PYRUS *foliis integer-
rimis , floribus corymbosis.* Peral con hojas enterisi-
mas ; y flores corimbosas.
Suppl. p. 255.
- Pyrus nivalis.* Jacq. Peral con hojas de color
Austr. vol. 2. p. 4. t. 107. de nieve.
- Cast. Peral de color de nieve.
Habita en Austria. \hbar
Es arbol que arroja las ramitas algo gruesas: las *hojas*
ovales, pecioladas, enterisimas, y cubiertas por debaxo
con vello blanquecino como seda: las *flores* terminales
y corimbosas: el *fruto* globoso, muy acerbo; pero ma-
duro, y pudriendose muy dulce. *Jacquin.*
- Salici-
folia. 8. PYRUS *foliis lineari-
lanceolatis canis subtus
albo tomentosus , floribus
axillaribus solitariis subses-
silibus.* Suppl. p. 255. Peral de hojas entre linea-
res y lanceoladas, canas,
con tomento blanco por de-
baxo; flores axilares, solita-
rias y casi sentadas.
- Pyrus Salicifolia.* Pall. Peral con hoja como la
It. vol. 3. p. 734. t. N. f. 3. del Sauce.

178 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Pyrus sylvestris, *Orientalis*, *folio oblongo, incano*. Tourn. cor. p. 43. Peral silvestre, de Oriente, con hoja oblonga y blanca quecina.

Cast. Peral con hoja de Sauce.

Habita en lugares arenosos de los desiertos de Siberia. Es arbol que florece en la primavera; y tiene los frutos en forma de pera, ó cónicos inversos y pequeños.

Botry. apium. 9. *PYRUS inermis, foliis ovato-oblongis serratis acutis, racemis simplicibus elongatis*. Suppl. p. 255. Peral inerme, con hojas entre aovadas y oblongas, aserradas, agudas; racimos sencillos y alargados. *Mespilus Canadensis*. Syst. veg. ed. 13. p. 388. Nispero del Canadá. Syst. plant. p. 499.

Cast. Peral de racimo.

Habita en la Virginia y Canadá. Ehrhart. \hbar

Es arbol que se levanta á la altura de diez ó doce pies. Produce las hojas de tres pulgadas de largo, las más tiernas tomentosas, y las crecidas desnudas y lampiñas: los racimos sencillos, alargados, y que salen de los extremos de las ramitas: los *piececitos* tomentosos: las *bracteas* entre alesnadas y filiformes, vellosas, y que se caen facilmente: los *petalos* entre lineares y lanceolados y obtusos: el fruto de color cerúleo que tira á negro, de la magnitud de la baya del *Ribes negro*; con cinco *celdillas*, xugoso, dulce y muy agradable: diez *semillas* poco mas ó menos, y de color pardo obscuro: y las *yemas* como las del *Alamo comun* ó del *Alamo temblon*, con escamas vellosas por dentro.

Ame- 10. *PYRUS inermis, foliis ovalibus obtusis serratis subtus tomentosis calvescentibus, stipulis subulatis lateralibus deciduis, racemo simplici paucifloro, petalis sublinearibus*. Suppl. p. 256. Peral inerme, con hojas ovales, obtusas, aserradas, tomentosas por debaxo y que encanecen; estipulas alesnadas, laterales, caedizas; racimo sencillo, de pocas flores; y petalos casi lineares.

Mespilus Amelanchier.
Syst. veg. ed. 13. p. 388.
Syst. plant. p. 498.

Nispero Amelanchier.

Mespilus floribus pentagynis, racemis terminalibus, foliis ovatis, obtusis, serratis, caule inerme. Scop.
ed. 2. n. 595.

Nispero con flores de cinco pistilos; racimos terminales; hojas aovadas, obtusas, aserradas; y tallo inerme.

Alni effigie, lanato folio, minor. C. B. P. 452.

Planta menor, parecida al Aliso, con hoja lanuda.

Mespilus folio rotundiori, fructu nigro, subdulci. Tourn.
p. 642.

Nispero con hoja mas redonda; fruto negro, y algo dulce.

Cast. Peral Amelanchier.

Habita en Suiza, Austria, Provenza y Alemania: en los peñascos mas altos del Escorial: en los de Jaca, Vizcaya, Asturias, Pirineos de Cataluña y otras partes de España. *h*

Es **arbusto** que sube á la altura de un hombre, con las ramitas del año antecedente cubiertas de una epiderme blanca y suelta. Echa las *hojas* casi del largo de una pulgada, las mas tiernas muy tomentosas por debaxo, y las crecidas que encanecen: las *estipulas* laterales, pegadas al peciolo, alesnadas y que se caen facilmente: el *racimo* sencillo, de quatro ó cinco flores y tomentoso: los *piececitos* con bracteas, entre alesnadas y filiformes, tomentosas y caducas: las *flores* como las del **Peral de racimo**, y las interiores que superan un poco á las exteriores: los *petalos* entre lineares y lanceolados y obtusos: el *fruto* de color cerúleo que tira á negro, de la magnitud de la baya del *Ribes encarnado*, de cinco celdillas, xugoso y de sabor dulce agradable: diez *simientes*, dos en cada celdilla y de color pardo: las *yemas* aovadas, vellosas y rubias, y sus *escamas* con pelillos por dentro.

- Arbutifolia. 11. *Pyrus inermis*, foliis ovato-lanceolatis tenuissimè serratis, rachi supraglandulifera, corymbo composito. Suppl. p. 256. Peral inerme, de hojas entre aovadas y lanceoladas, con aserraduras muy delgadas; el rachis ó nervio longitudinal que lleva glandulas por encima; y el corimbo compuesto.
- Mespilus arbutifolia*. Syst. veg. ed. 13. p. 388. Syst. plant. 498. Nispero con hoja como la del Madroño.
- Crategus Virginiana*, foliis Arbuti. Tourn. p. 633. Mill. dict. t. 109. Cratego de Virginia, con hojas como las del Madroño.
- Sorbus Virginiana*, folio arbuti. Herm. Lugdb. 578. t. 669. Serbál de Virginia, con hoja como la del Madroño.
- α *Pyrus arbutifolia*, fructu rubro. Peral con hojas como las del Madroño; y fruto encarnado. α
- β *Pyrus arbutifolia*, fructu nigro. Peral con hojas como las del Madroño; y fruto negro. β

Cast. Peral con hoja de Madroño.

Habita en la Virginia. Ehrhart. *h*

Es arbustito que echa las hojas entre aovadas y lanceoladas, alguna vez aovadas al revés, ó en forma de cuña, con aserraduras muy delgadas, vellosas por debaxo, y del largo de una pulgada y media, ó de dos; las mas crecidas roxas por la cara superior, y amarillas por la inferior: el rachis ó lomo por encima todo lleno de glandulas amontonadas, entre alesnadas y cilindricas, y de color que de amarillo tira á rubio: las aserraduras con su ápice glanduloso y cartilagineo: las estipulas laterales pegadas al peciolo y alesnadas: el corimbo compuesto, tomentoso, con seis hasta doce flores: las bractéas alesnadas y caducas: las flores apenas de la magnitud del *Cratego Oxiaantha*: los petalos aovados al revés, blancos y por defuera algo roxos: las anteras encarnadas: el fruto casi globoso, y de cinco celdillas; con dos simientes en cada una de ellas, oblongas y de color pardo.

La variedad α tiene las *hojas* mas tomentosas y mas pequeñas: el *fruto* de la magnitud de la baya del *Ribes roxo*, del mismo color y acerbo.

La variedad β posee las *hojas* menos tomentosas, y mas grandes: el *fruto* negro, y de la magnitud de el del *Cratogeomys*.

764. Género TETRAGONIA. *

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* encima del germen, de quatro hojuelas aovadas, entre dobladas y planas, revueltas por su margen, de color y persistentes.
- COR.** ninguna; sino que sea el caliz.
- ESTAMB.** *Filamentos* veinte, capilares, mas cortos que el caliz: con las *anteras* oblongas y hechadas.
- PIST.** *Germen* casi redondo, de cinco ángulos y baxo del caliz: *estilos* quatro, alesnados, encorvados ácia atrás, de la longitud de los estambres: con los *estigmas* á lo largo de los estilos y vellosos.
- PERIC.** una corteza dura, correosa, que no se abre, de quatro lados con quatro alas longitudinales, y los ángulos opuestos mas angostos.
- SEM.** una sola, osea, de quatro celdillas; con las *almen dras* oblongas.
- OBS.** 1.^a La *flor* primera aumenta la quinta parte del número en todas las de su fructificacion; y asi pertenece al orden *pentagyno* segun las leyes establecidas en la *Filosofia Botánica*.
- OBS.** 2.^a *Drupa* de quatro lados, con quatro alas: *nuez* de quatro celdillas y quatro simientes. *Wern.*

E S P E C I E S.

Fruti-
cosa.

1. TETRAGONIA *foliis* \times *linearibus*. Mill. dict. n. 1. \times *neares*.
ic. t. 263. f. 2.
- Tetragonocarpus Africa-* \times *Fruto* de quatro lados,
na, rutilans, foliis longis \times *Africano*, que brilla, con
& angustis. Comm. hort. 2. \times *hojas largas y angostas*.
p. 205. t. 103.

Evo-

182 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Evonymo affinis Africana, *Portulacæ folio*. Seb. tes. 2. p. 13. t. 11. f. 8. Planta Africana parecida al Evonymo, con hoja como la de la Verdolaga.

Cast. *Tetragonia fruticosa*.

Habita en Etiopia. \mathcal{L}

Posee las flores dispuestas en racimo terminal, ó solitarias y muchas hojuelas ó rudimentos de ramas puestas en las axilas de las hojas.

Her-
bacea. 2. TETRAGONIA *foliis ovatis*. Mill. dict. n. 3. & ic. t. 263. f. 1. Tetragonia con hojas aovadas.

Tetragonocarpus Africana, *radice magna, crassa & carnosa*. Comm. hort. 2. p. 203. t. 104. Fruto de quatro lados, Africano, con la raiz grande, crasa y carnosa.

Cast. *Tetragonia herbácea*.

Habita en Etiopia. \mathcal{L}

Tiene comunmente las axilas de las hojas sin rudimentos de ramas: tres pedunculos de una flor, y que salen de las axilas: (con el uno á veces puesto encima del germen de otro) las hojas entre aovadas al revés y lanceoladas: y varían con tres ángulos.

Ivæfo-
lia. 3. TETRAGONIA *erecta, glabra, foliis petiolatis ovato-lanceolatis serratis, petalis deciduis*. Suppl. p. 257. Tetragonia derecha, lampiña, de hojas con peciolo, entre aovadas y lanceoladas, aserradas; y petalos que se caen facilmente.

Cerodea erecta. Thovin. lit. Cerodea levantada.

Cast. *Tetragonia con hoja de Iva*.

Habita. \mathcal{H}

Es mata del largo de dos pies, ramosa, con panoja y levantada. Tiene el tallo roxo, de quatro lados elevados, redondeados y ásperos; con las ramas opuestas: las hojas tambien opuestas, pecioladas, horizontales, entre aovadas y lanceoladas, del largo de una pulgada, ásperas, planas, venosas, con aserraduras desiguales, y que punzan: los peciolos tres veces mas cortos que las ho-

hojas , medio rollizos y acanalados : las *flores* en la sumidad de las ramas , axilares , de tres en tres , pedunculadas , pequeñas , y de color entre verde y roxo : los *pedunculos* cortos , rollizos , ásperos , y que despues de haber florecido se doblan ácia baxo de las hojas : la *corola* de quatro *petalos* , lanceolados , en medio ensanchados , que salen fuera entre las hojuelas del caliz , mas largos que ellas , muy extendidos , y que se caen facilmente : doce *estambres* comunmente insertos en las hojuelas del caliz : y los *estilos* prendidos á la margen del plano del germen cerca del mismo caliz.

Floreció esta planta en el Jardin de *Linneo* , en el mes de Noviembre del año 1779 , manifestando unas flores con petalos y otras sin ellos.

Hir-
suta. 4. TETRAGONIA her-
bacea , hirsuta , procum-
bens , foliis ovatis villosis ,
floribus axillaribus ternis
sessilibus. Suppl. p. 258.

Tetragonia herbácea , ten-
dida , con pelo áspero ; ho-
jas aovadas , vellosas ; flores
axilares , de tres en tres ; y
sentadas.

Cast. Tetragonia con pelo áspero.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Spica-
ta. 5. TETRAGONIA gla-
bra , herbacea , erecta , foliis
inferioribus ovatis , supre-
mis lanceolatis glabris , flo-
ribus racemosis. Suppl. p.
258.

Tetragonia lampiña , her-
bácea , derecha , con las ho-
jas inferiores aovadas , las
de mas arriba lanceoladas ,
lampiñas ; y flores racimo-
sas.

Cast. Tetragonia espigada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

765. Género MESEMBRYANTHEMUM. *

Dill. gen. 9. elth. 179. &c. Ficoides.

Tourn. A. G. 1705.

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de una pieza , hendido en cinco partes, encima del germen , agudo , extendido y persistente.
- COR.** de un *petalo* , con sus *lacinias* á manera de petalos, entre lanceoladas y lineares , numerosisimas , dispuestas en muchas series , poco mas largas que el caliz , y ligeramente unidas por sus uñas en un solo petalo.
- ESTAMB.** *Filamentos* numerosos , capilares , de la longitud del caliz : con las *anteras* echadas.
- PIST.** *Germen* baxo del caliz , con cinco ángulos obtusos: *estilos* las mas veces cinco , alesnados , entre derechos y redoblados : con los *estigmas* sencillos.
- PERIC.** *Capsula* carnosa , casi redonda , con ombligo señalado con rádios : y las *celdillas* que corresponden al número de los *estilos*.
- SEM.** muchas y casi redondas.
- Varía en el número de los *pistilos* y de las *lacinias* del caliz.

ESPECIES CON LAS COROLAS BLANCAS.

Nodi-
florum

- I. MESEMBRYANTH.** X Mesembryanthemo con ho-
foliis alternis teretiuscu- X jas alternas , algo rollizas,
lis obtusis , basi ciliatis. X obtusas , y pestafiosas por su
 Forsk. Ægypt. p. 98. X base.
- Kali Crassulæ minoris fo-* X Kali con hojas como las
liis. C. B. P. 289. Moris. hist. X de la Crasula menor.
 2. p. 610. sect. 5. t. 33. f. 7.
- Kali Neapolitanum , Ai-* X Kali de Nápoles, rastrero,
zoides , repens. Col. ecphr. 2. X parecido al Aizoon.
 p. 72. t. 73.
- Kali II.* Alp. Ægypt. 125. X Kali segundo.
 t. 127.

Cast.

Cast. Mesembryanthemo de flor como nudo.

Habita en Egipto y Nápoles, en lugares arenosos del mar. ☉

Crys-
talli-
num.

2. MESEMBRYANTH. *foliis alternis ovatis papulosis, floribus sessilibus, calycibus late ovatis acutis retusis.* Suppl. p. 259.

Mesembryanthemo de hojas alternas, aovadas, con ampollitas; flores sentadas; cálices aovados, anchos, agudos, y que terminan en seno obtuso.

Mesembryanthemum crystallinum. Syst. veg. ed. 13. p. 389. Syst. pl. 505.

Mesembryanthemo cristalino.

Mesembryanthemum crystallinum, Plantaginis folio undulato. Dill. elth. 231. t. 180. f. 221.

Mesembryanthemo cristalino, con hoja como la del Llantén y ondeada.

Ficoides Africana, folio Plantaginis undulato, micis argenteis adperso. Tourn. Bradl. succ. 5. t. 15. f. 48.

Ficoide Africana, con hoja como la del Llantén, ondeada, y salpicada de ampollitas de color de plata.

Cast. Mesembryanthemo cristalino. vulgo: Yerba plateada ó escarchada.

Habita en Africa y se ha hecho indigena en España. ☉

El caliz se forma de tres lacinias tan anchas, que excluyen las otras dos muy pequeñas. Suppl.

Tiene el tallo primeramente levantado, del grueso de un dedo, con hojas opuestas: las ramas horizontales, larguissimas, opuestas, postradas, con otras ramas alternas y otras hojas tambien alternas.

Copti-
cum.

3. MESEMBRYANTH. *foliis semiteretibus papulosis distinctis, floribus sessilibus axillaribus, calycibus quinquefidis.*

Mesembryanthemo de hojas medio rollizas, con ampollitas y separadas; flores sin pedunculo, axilares; y cálices hendidos en cinco partes.

Kali Ægyptiacum, foliis valde longis, hirsutis. C. B. P. 286.

Kali de Egipto, con hojas muy grandes y con pelo áspero.

Kali III. Alp. Ægypt. 129. X Kali tercero.
t. 128. X

Cast. Mesembryanthemo de Copto.

Habita en Egipto. ☉

Su *estatura* y *magnitud* es como la del *Mesembryanthemo de flor como nudo*. Tiene el *tallo* dividido en tres partes y herbáceo: las *hojas* opuestas, medio rollizas, con ampollitas, que terminan los ramitos, del largo de los entrenudos, sin que en ellos se halle alguna: las *flores* sentadas, solitarias, y puestas en la division de las ramas: el *caliz* hendido en cinco partes, mas largo que la corola: la *capsula* cónica inversa, terminada en seno obtuso, de cinco ángulos pestañosos y comprimidos: las *semillas* algo redondas, estriadas, y casi á manera de caracol.

Parece que el *Kali tercero* de Prospero Alpino pertenece mas bien á esta especie, que al *Llantén de Indias*; aunque su figura es viciosa y carezca de pelo.

- Geniculiflorum. 4. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo de hojas medio rollizas, con ampollitas, separadas; flores sin pedunculo, axilares; y cálices hendidos en quatro partes.
- Mesembryanthemum Capense, geniculiflorum, Neapolitanum creditum.* Dill. Mesembryanthemo del Cabo de Buena-esperanza, que florece en los nudos y tenido por el Napolitano. elth. 271. t. 205. f. 261.
- Ficoides Neapolitana, flore candido.* Bradl. succ. 5. Ficoide Napolitana, con la flor candida. t. 17. f. 34.
- Ficoides Capense, folio tereti, flore albido.* Pet. gaz. Ficoide del Cabo de Buena-esperanza, con hoja rolliza; y flor blanquecina. t. 78. f. 3. X

Cast. Mesembryanthemo que florece en los nudos.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ♀

Tiene el *caliz* hendido en quatro partes: quatro *estilos*: y el *fruto* de quatro celdillas.

Nocti-
lorum

5. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo con ho-
foliis semicylindricis im- jas medio cilindricas , sin
punctatis distinctis, floribus puntos , separadas ; flores
pedunculatis, calycibus qua- con pedunculo; y cálices hen-
drifidis. Knor. del. 1. t. G. 8. didos en quatro partes.

Mesembryanthemum fo- X Mesembrianthemo con ho-
liis subulatis semicylindri- jas alesnadas , medio cilin-
cis lævibus vix connatis dricas , lisas , apenas unidas
apice recurvis. Hort. Cliff. por su base , y encorvadas
220. ácia atrás por su ápice.

Mesembryanthemum noc- X Mesembryanthemo que de
tiflorum , flore intus candi- noche abre la flor , muy olo-
do, extus phæniceo, odoratis- rosa , de color candido por
simo. Dill. elth. 273. t. 206. dentro y de datil por defuera.

a Mesembryanthemum noc- X Mesembryanthemo que de
tiflorum , flore intus candi- noche abre la flor , muy olo-
do, extus stramineo, odora- rosa , candida por dentro , y
tisimo. Dill. elth. 254. t. 206. de color de paja por defue-
f. 263. ra. α

Cast. Mesembryanthemo que abre las flores de noche.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. h

Las flores son de color encarnado y blanco; y huelen mu-
cho por la noche. Tiene el caliz hendido en quatro par-
tes : quatro estilos : y el fruto de quatro celdillas.

Splen-
dens.

6. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo con ho-
foliis subteretibus impunc- jas casi rollizas , sin puntos,
tatis recurvis distinctis encorvadas ácia atrás , que
congestis, calycibus digiti- no están unidas por su base,
formibus terminalibus. amontonadas ; cálices en for-
ma de dedo y terminales.

Mesembryanthemum fo- X Mesembryanthemo con ho-
liis confertis, splendentibus, jas amontonadas, relucientes;
flore pallido. Dill. elth. 270. y flor pálida.
t. 204. f. 260.

Ficoides Capensis, frutes- X Ficoide del Cãbo de Bue-
cens, foliis teretibus, con- na-esperanza, frutescente; con
fertis, glaucis, flore albo. hojas rollizas , amontonadas
Bradl. succ. 1. p. 7. t. 6. X y de color garzo.

Cast. Mesembryanthemo resplandeciente.

Ha-

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Posee el tallo con puntos blanquecinos: las hojas entre tres caras y algo rollizas, extendidas por su ápice y agudas; pero las axilares encorvadas: la corola de color entre blanquecino y amarillo: los cálices derechos, en forma de un dedo, y mochos.

Um-
bellat-
um.

7. MESEMBRYANTH. Mesembryanthemo de ho-
jas alesnadas, con puntos
foliis subulatis scabrido- ásperos, unidas por su base,
punctatis connatis apice extendidas en su remate; ta-
patulo, caule erecto, corym- llo derecho; y corimbo di-
bo trichotomo. vidido en tres partes.

Mesembryanthemum fru- Mesembryanthemo frutes-
tescens, floribus albis, um- cente, con flores blancas y
bellatis. Dill. elth. 277. t. en umbela.
208. f. 266.

Ficoides Africana, erec- Ficoide Africana, dere-
ta, teretifolia, floribus albis, cha, con hoja rolliza; flores
umbellatis. Herm. par. 166. blancas y en umbela.
t. 166. Pluk. phyt. 117. f. 1.
Bradl. succ. 4. p. 12. t. 34.

Cast. Mesembryanthemo umbelado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. $\frac{1}{2}$

Expan-
sum.

8. MESEMBRYANTH. Mesembryanthemo con ho-
jas algo planas, lanceoladas,
foliis planiusculis lanceola- sin puntos, extendidas, se-
tis impunctatis patentibus paradas; unas opuestas y otras
distinctis oppositis alter- alternas y apartadas.
nisque remotis. Knorr. del.
2. t. M. 3.

Mesembryanthemum tor- Mesembryanthemo tortuo-
tuosum, foliis Sempervivi so, con hojas como las de la
expansis. Dill. elth. 234. t. Siempreviva, y extendidas.
182. f. 223,

Ficoides Capensis, folio Ficoide del Cabo de Bue-
lato, acuto, flore albo, intus na-esperanza, con hoja an-
luteo. Fet. gaz. t. 78. f. 10. cha, aguda; flor blanca y
de color amarillo por dentro.

Ficoides Africana, pro-
cumbens, *foliis planis*, con-
jugatis, *lucidis*. Bradl. succ.
 3. p. 7. t. 16.

Ficoide Africana, tendi-
 da, con hojas planas, de dos
 en dos, y lustrosas.

Cast. Mesembryanthemo extendido.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ♀

Tripo-
 lium.

9. MESEMBRYANTH. *foliis alternis lanceolatis*,
planis impunctatis, *cauli-*
bis laxis simplicibus, *caly-*
cibus pentagonis. Hort. Cliff.

Mesembryanthemo con ho-
 jas alternas, lanceoladas,
 planas, sin puntos; tallos
 laxos, sencillos; y cálices de
 cinco lados.

217.

Mesembryanthemum tri-
polii folio, *flore argenteo*.
 Dill. elth. 230. t. 179. f. 220.

Mesembryanthemo con ho-
 ja como la del Tripolio; y
 flor de color de plata.

Ficoides Africanum, pro-
cumbens, *Tripolii succulen-*
to folio, *flore candido*. Brad.
 succ. 5. p. 14. t. 47.

Ficoide Africana, tendida;
 con hoja como la del Tripo-
 lio, xugosa; y flor candida.

Ficoides Africanum, Me-
sembryanthemum majus, pro-
cumbens, *Tripolii folio ma-*
gis succulento; *denticulis*
fimbriato flore argenteo, ad
umbilicum aureo. Pluk.
 mant. 77. t. 328. f. 4.

Ficoide Africana, ó Me-
 sembryanthemo mayor, ten-
 dido; con hoja como la del
 Tripolio, mas xugosa; flor
 de color de plata, pero de
 oro en el centro y hendida
 en dientecitos como fle-
 cos.

Cast. Mesembryanthemo tripolio.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ♂ ♀

Calamifor-
 me.

10. MESEMBRYANTH. *acaule*, *foliis subteretibus*
adscendentibus impunctatis
connatis, *floribus octogy-*
nis. Mill. dict. n. 7. & ic.
 t. 176. f. 1.

Mesembryanthemo sin ta-
 llo, con hojas casi rollizas,
 ascendentes, sin puntitos,
 unidas por su base; y flores
 de ocho pistilos.

Mesembryanthemum cala-
miforme. Dill. elth. 239. t.
 186. f. 228.

Mesembryanthemo en for-
 ma de cañon de pluma.

Cast,

Cast. Mesembryanthemo en forma de cañon de pluma.

Habita en el Cabo de Buena esperanza. 2

Tiene las *hojas* rectas, comunmente extendidas horizontalmente, y encorvadas ácia atrás por su ápice, con puntos ásperos en la superficie.

Apeta-
lum.

11. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo de ho-
foliis lineari-sublanceolatis X jas entre lineares y casi lan-
subtus muricatis, caulibus X ceoladas, con puntitas por
postratis. Suppl. p. 258. X debaxo; y tallos postrados.

Cast. Mesembryanthemo de petalos muy cortos.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Arroja los *tallos* herbáceos, postrados, rollizos, roxos y cubiertos de ampollitas desfiguradas, y relucientes como toda la planta: las *hojas* opuestas, lineares, algo lanceoladas, xugosas, por encima acanaladas, medio cilindricas por debaxo, obtusas, y con algunas ampollitas: los *pedunculos* cortos, tambien con ampollitas, y de una flor: el *caliz* de hojuelas desiguales, entre alesnadas y cilindricas: veinte y quatro *petalos*, blancos apartados, setáceos, cortísimos, como si fuesen otros tantos filamentos sin anteras, y puestos sobre el germen: los *filamentos* alesnados, muy semejantes á los petalos, pero mas cortos; con las *anteras* de color que tira á obscuro: el *germen* baxo del caliz, orbicular, grande, convexo y por encima liso: cinco *estilos* acercados y cortos; con los *estigmas* encorvados ácia atrás.

Crini-
florum

12. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo con ho-
foliis ovatis, scapis uniflo- X jas aovadas; y escapos de
ris. Suppl. p. 259. X una flor.

Cast. Mesembryanthemo con flor de crines.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *D. Montin.*

Es *planta* de la magnitud de la *Margarita perenne*. Tiene las *hojas* entre aovadas y oblongas, pecioladas, con ampollitas cristalinas: el *escapo* del largo de una pulgada y de una flor: el *caliz* hendido profundamente en cinco lacinias oblongas y muy obtusas: cinco *petalos* oblongos, con piececito, mas largos que el caliz y blancos: los *estambres* setáceos, blancos y larguissimos.

ESPECIES CON LAS COROLAS ENCARNADAS.

Cordi-
folium. 13. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo con ho-
foliis cordatis obtusis, cau- jas de figura de corazon, ob-
libus prostratis. Suppl. p. tusas; y tallos postrados.
260.

Cast. Mesembryanthemo con hoja de corazon.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. D. Montin.

Echa los tallos herbáceos, postrados, del largo de un pie, señalados con un surco en una y otra parte: las hojas opuestas, con sus oposiciones apartadas, pecioladas, de figura de corazon, obtusas, y del largo de una pulgada, poco mas ó menos: las flores laterales, alternas, solitarias, con piececito, del largo de las hojas, y de color encarnado: los gérmenes mayorcitos: el caliz de hojuelas opuestas y las mayores aovadas.

Belli-
diflorum. 14. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo sin ta-
acaule, foliis triquetris li- llo, con hojas de tres caras,
nearibus impunctatis, api- lineares, sin puntos, y den-
ce trifariam dentatis. Knor. tadas por su ápice en tres
del. 1. t. G. 5. a. n. partes.

Mesembryanthemum Bel- Mesembryanthemo con flor
lidiflorum. Dill. elth. 244. como la de la Margarita.
t. 189. f. 233.

Cast. Mesembryanthemo con flor de Margarita.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ¶

Deltoides. 15. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo con ho-
foliis triquetris deltoidi- jas de tres caras, que se acer-
bus dentatis impunctatis can á la figura de delta, den-
distinctis. Knorr. del. 1. t. tadas, sin puntos y separa-
G. 5. b. n. 1. das.

Mesembryanthemum del- Mesembryanthemo como
toides, dorso & lateribus delta, con puntas rígidas en
muricatis. Dill. elth. 255. el dorso y costados.
t. 195. f. 246.

* *Mesembryanthemum del-* X *Mesembryanthemo* como
toides , dorso & lateribus X *delta , mayor , con puntitas*
muricatis , majus. Dill.elth. X *rígidas en el dorso y costa-*
 244. t. 196. f. 247. Knorr. X *dos. α*
 del. 1. t. G. 5. b. n. 2.

β *Mesembryanthemum del-* X *Mesembryanthemo* como
toides , non dorso sed late- X *delta , con puntitas rígiditas,*
ribus muricatis. Dill. eith. X *no en el dorso , sino en los*
 253. t. 195. f. 243. 244. X *costados. β*

Cast. *Mesembryanthemo* como delta.

Habita en el Cabo de Buena esperanza. $\frac{h}{2}$

Tiene los *pedunculos* de una flor , con dos hojuelas : la *corola* olorosa , de color purpúreo claro , y sin que sea mas larga que el caliz : los *estambres* derechos , blancos , que forman un cono : y las *anteras* de color amarillo-roxo.

Barbatum.

16. MESEMBRYANTH. X *Mesembryanthemo* de ho-
foliis subovatis papulosis X *jas casi aovadas , con ampo-*
distinctis , apice barbatis . X *llitas , separadas y con pelos*
 Mill. dict. n. 13. ic. t. 176. X *en su ápice.*

Mesembryanthemum ra- X *Mesembryanthemo* radia-
diatum , ramulis prolixis, X *do , con ramitas largas y re-*
recumbentibus. Dill.elth.245. X *clinadas.*
 t. 190. f. 234.

Ficoides Capensis , tereti- X *Ficoide del Cabo de Bue-*
folio , apicibus hirtis. Pet. X *na-esperanza , de hojas rolli-*
 gaz. t. 77. f. 6. X *zas y sus remates con pelo*
 áspero.

Ficoides Capensis , frutes- X *Ficoide del Cabo de Bue-*
cens , folio tumido extremi- X *na esperanza , frutescente,*
tate stellata , flore purpureo. X *de hoja hinchada , estrella-*
 Brodl. succ. 1. p. 6. t. 5. & X *da por su extremidad y con*
 15. X *la flor purpúrea.*

* *Mesembryanthemum ra-* X *Mesembryanthemo* radia-
diatum , humile , foliis mi- X *do , baxo ; con hojas mas pe-*
noribus. Dill.elth.246. t. 190. X *queñas. **
 f. 235.

β *Mesembryanthemum radiatum, humile, foliis majoribus.* Dill. elth. 248. t. 190. f. 236. Mesembryanthemo radiado, baxo, con hojas mas grandes. β

Cast. Mesembryanthemo barbado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Tiene las *hojuelas* del caliz barbadadas por su ápice, igualmente que las hojas de la planta: los *petalos* muy pequeños interiores blancos y que ciñen los estambres.

La variedad α, acaso hibrida, se diferencia de la variedad β por tener el *caliz* de seis hojuelas: y seis *estilos*: por los *pedunculos* erizados, y por las oposiciones de las hojas apañadas y no apartadas.

Hispidum. 17. MESEMBRYANTH. *Mesembryanthemo de ho-*
foliis cylindricis papulosis distinctis, caule hispido. Mill. dict. n. 15. & ic. 176. f. 3. *jas cilindricas, con ampollitas, separadas; y tallo erizado.*

Mesembryanthemum pilosum, micans, flore saturate purpureo. Dill. elth. 289. t. 214. f. 278. Mesembryanthemo peloso, brillante, con la flor de color purpúreo subido.

α *Mesembryanthemum pilosum, micans, flore purpureo pallidiore.* Dill. elth. 290. t. 214. f. 280. 279. Knorr. del. t. 2. f. M. 5. Mesembryanthemo peloso, brillante, con la flor purpúrea y mas pálida. α

β *Mesembryanthemum pilosum, micans, flore purpureo striato.* Dill. elth. 291. t. 215. f. 282. Mesembryanthemo piloso, brillante, con la flor purpúrea y estriada. β

Cast. Mesembryanthemo erizado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Posee el *pedunculo* muy áspero por debaxo: el *caliz* sin pelos: la *flor* olorosa, y muy semejante á la del *Mesembryanthemo barbado* (del qual acaso proviene) á excepcion del pelo de las hojas, el qual, en este, se halla esparcido por el tallo.

194 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Villosum. 18. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo con ho-
foliis pubescentibus connatis impunctatis, caule piloso. Hort. Cliff. 217. Roy. X jas vellosas, unidas por su base, sin puntitos; y tallo peloso.
 Lugdb. 282. Mill. dict. n.16. X

Cast. Mesembryanthemo con pelillos.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Echa las *hojas* lineares, medio rollizas, entre acanaladas y planas, opacas, con su margen salpicada de pelillos, señaladamente ácia la base: el *tallo* vellosa, con pelillos que apenas sobresalen. No vió *Linneo* las flores de esta especie.

Scabrum. 19. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo con ho-
foliis subulatis distinctis, subtus undique punctatoduricatis, calycibus muticis. Hort. Cliff. 219. X jas alesnadas, separadas, punteadas por todo su envés, con puntas duras; y cálices sin espinas.

Mesembryanthemum purpureum, scabrum, staminibus collectis. Dill. elth. 260. X Mesembryanthemo purpúreo áspero; con los estambres recogidos.
 t. 197. f. 251. X

Cast. Mesembryanthemo áspero.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Emarginatum. 20. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo con ho-
foliis subulatis congestis subscabris, calycibus spinosis, petalis emarginatis. X jas alesnadas, amontonadas, algo ásperas; cálices espinosos, y petalos escotados.

Mesembryanthemum purpureum, scabrum, staminibus expansis. Dill. elth. 258. X Mesembryanthemo purpúreo, áspero; con los estambres extendidos.
 t. 197. f. 250.

Ficoides Capensis, triangulari folio, acuto, flore purpureo. Pet. gaz. t. 77. f. 3. X Ficoide del Cabo de Buena-esperanza, con hoja triangular, aguda, y flor purpúrea.

Cast. Mesembryanthemo escotado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Unci-
natum.

21. MESEMBRYANTH.

*articulis caulinis termina-
tis foliis connatis acumi-
natis subtrus dentatis.* Hort.
Cliff. 218.

*Mesembryanthemum per-
foliatum, foliis minoribus
diacanthis.* Dill. elth. 250.
t. 193. f. 239.

*Ficoides Afra, folio tri-
angulari, glauco, perfoliato,
brevissimo, apice spinoso.*
Bradl. succ. 3. p. 8. t. 27. 26.
Burm. Afr. t. 26. f. 3.

* *Mesembryanthemum per-
foliatum, foliis majoribus,
triacanthis.* Dill. elth. 251.
t. 193. f. 240.

*Ficoides Africana, frutes-
cens, perfoliata, folio tri-
angulari, glauco, punctato.*
Bradl. succ. 5. p. 13. t. 46.

Cast. Mesembryanthemo ganchoso.

Habita en el Cabo de Buena esperanza. *h*

Mesembryanthemo con los
articulos del tallo termina-
dos en hojas unidas por su
base, puntiagudas, y por
debaxo dentadas.

Mesembryanthemo perfo-
liado, de hojas mas peque-
ñas con dos espinas.

Ficoide Africana, de ho-
ja triangular, de color gar-
zo, perfoliada y muy corta,
con su remate espinoso.

Mesembryanthemo perfo-
liado, de hojas mas grandes
y con tres espinas. *

Ficoide Africana, frutes-
cente, perfoliada; con hoja
triangular, de color garzo y
punteada.

Spino-
sum.

22. MESEMBRYANTH

*foliis tereti-triquetris punc-
tato distinctis, spinis ramo-
sis.* Hort. Cliff. 216.

*Mesembryanthemum fru-
tescens, ramis triacanthis.*
Dill. elth. 276. t. 208. f. 263.

*Ficoides Africana, acu-
leis longissimis & foliolis
nascentibus ex foliorum alis.*

Tourn. act. 1705. p. 316.
Bradl. succ. 41. t. 39.

Cast. Mesembryanthemo espinoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Mesembrianthemo de ho-
jas entre rollizas y de tres
caras, punteadas, separadas,
y con espinas ramosas.

Mesembryanthemo frutes-
cente, de ramas con tres es-
pinas.

Ficoide Africana, con
aguijones larguissimos; y ho-
juelas que nacen de las axi-
las de las hojas.

Tube-
rosum.

23. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo de ho-
foliis subulatis papulosis jas alesnadas, con ampolli-
distinctis, apice patulis, ra- tas, separadas, extendidas
dice capitata. Hort. Cliff. 216. X por su ápice; y raíz en for-
ma de cabeza.

Cast. Mesembryanthemo tuberoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. h

Fru-
tices-
cens.

24. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo frutes-
radice ingenti tuberosa. Dill. X cente, con la raíz grande y
elth. 275. t. 207. f. 264. X tuberosa.

Cast. Mesembryanthemo frutescente.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. h

Te-
nuifo-
lium.

25. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo con ho-
foliis subfiliformibus gla- jas casi filiformes, lampiñas,
bris distinctis internodio separadas, mas largas que el
longioribus, caulibus pro- entrenudo; y tallo tendido.
cumbentibus.

Mesembryanthemum te- X Mesembryanthemo tendi-
nuifolium, procumbens, folio do, con hoja mas delgada,
tenuiore, viridi, flore cocci- verde; y flor coccinea.
neo. Dill. elth. 264. t. 201.
f. 256.

Ficoides Capensis, humi- X Ficoide del Cabo de Bue-
lis, teretifolia, flore cocci- na-esperanza, baxa, con ho-
neo. Bradl. succ. 1. p. 13. t. 9. X ja rolliza; y flor coccinea.

Ficoides Africana, minor, X Ficoide Africana, menor,
procumbens, folio tenuiore, tendida, con hoja mas del-
viridi, flore coccineo. Moris. X gada, verde; y flor cocci-
hist. 3. p. 507. sect. 12. t. 8. X nea.
f. 6.

Cast. Mesembryanthemo con hoja delgada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. h

Tiene los tallos leñosos y tendidos: las ramas que salen de las axilas superiores: las flores de color coccineo hermoso; con muchos petalos que se abren en medio del dia haciendo sol, y que duran mucho tiempo: y las hojas muy lampiñas.

Stipula-
ceum. 26. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo de ho-
foliis subtriquetris com-
pressis incurvis puncta-
tis distinctis congestis, ba-
si marginatis. Hort. Cliff. 220. X jas casi de tres caras, com-
primidas, encorvadas, pun-
teadas, separadas, por su ba-
se, amontonadas, y con ri-
bete en su base.

Mesembryanthemum fru-
tescens, flore purpureo, ra-
riore. Dill. elth. 279. t. 209. X Mesembryanthemo frutes-
cente, con la flor purpúrea
y que sale mas de tarde en
f. 267. 268. X tarde.

Cast. Mesembryanthemo como si tuviese estipulas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \bar{h}

El tallo, quando florece, se halla rígido, y de color que tira á gris. Echa las hojas lineares, carnosas, muy comprimidas por sus lados, y salpicadas de puntitos transparentes, encorvadas, algo planas por encima, y terminadas en punta rígida: las flores casi corimbosas y purpúreas: con los estambres amarillos.

Cras-
sifolium. 27. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo con ho-
foliis semicylindricis im-
punctatis connatis apice
triquetris, caule repente se-
micylindrico. Hort. Cliff. 217. X jas medio cylindricas, sin
puntitos, unidas por su base,
de tres caras en su remate;
tallo rastrero y medio cilin-
drico.

Mesembryanthemum cras-
sifolium, repens, flore pur-
pureo. Dill. elth. 266. t. 201. X Mesembryanthemo rastre-
ro, con hoja crasa; y flor pur-
púrea.
f. 257.

Ficoides Africana, reptans,
folio triangulari, viridi, flo-
re saturate purpureo. Bradl. X Ficoide Africana, rastre-
ra, con hoja triangular, ver-
de; y flor de color purpúreo
succ. 4. p. 16. t. 38. X subido.

Cast. Mesembryanthemo de hoja crasa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \mathcal{U}

Fulca- 28. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo de ho-
tam. foliis subacinaciformibus in X jas casi en forma de alfange,
curvis punctatis distinctis, X encorvadas ; con puntitos,
ramis teretibus. Hort. Cliff. X separadas ; y ramas rollizas.
219. Knorr, del. 2. t. M. 4.

Mesembryanthemum fal- X Mesembryanthemo arquea-
catum, minimum, flore pur- X do, muy pequeño ; con la
pureo. parvo. Dill. elth. 288. X flor purpúrea y chica.
t. 213. f. 276.

Ficoides Afra, folio tri- X Ficoide Africana, con ho-
angulari, ensiformi, brevissi- X ja triangular, en forma de es-
mo, flore dilute purpuras- X pada, muy corta ; flor de
cente, filamentoso. Bradl. succ. X color que tira á purpúreo cla-
5. p. 9. t. 42. X ro, y filamentosa.

Cast. Mesembryanthemo arqueado.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza, \bar{h}

Glome- 29. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo de ho-
ratum. foliis teretiusculis compres- X jas algo rollizas, comprimi-
sis punctatis distinctis, caü- X das, con puntitos, separa-
le paniculato multifloro. X das ; tallo en panoja y de
Mill. dict. n. 26. X muchas flores.

Mesembryanthemum fal- X Mesembryanthemo arquea-
catum, minus, flore carneo, X do, menor ; con la flor de
minore. Dill. elth, 281, t. 213. X color de carne y mas peque-
f. 274. X ña.

Cast. Mesembryanthemo conglobado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \bar{h}

Produce el tallo difuso y en panoja : las hojas de tres ángulos obtusos, de color garzo y con puntos transparentes : los rudimentos de las ramitas que salen de las axilas, con hojas muy amontonadas y encorvadas : el caliz con pedunculo largo : y sus lacintas membranosas por su remate, baxo del qual se halla una espina extendida : el germen algo verrugoso, con puntos eminentes y desfigurados.

Lo-
reum. 30. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo con
foliis semicylindricis recur- X hojas medio cilíndricas, en-
vis congestis basi interiore X corvadas ácia atrás, amonto-
gibbis connatis, caule pen- X nadas, gibosas por su base
dulo. Mill. dict. n. 30. X interior, unidas; y tallo pen-
dulo.

Mesembryanthemum lo- X Mesembryanthemo de cor-
reum. Dill. elth. 264. t. 200. X deles.
f. 255.

Cast. Mesembryanthemo de cordeles.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ¶

Echa las flores en las axilas de las hojas infimas de la ra-
ma: el *pedunculo* corto: el *caliz* igual y mediocre: los
petalos purpúreos, entre lanceolados y lineares; y los
estambres blanquecinos.

Fila-
mento-
sum. 31. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo con
foliis æquilateri triquetris X hojas de lados iguales, y
acutis subpunctatis connatis, X de tres caras, agudas, con
angulis scabris, ramis X algun puntito, unidas por la
hexagonis. X base, ásperas en sus ángulos;
y ramas de seis lados.

Mesembryanthemum fal- X Mesembryanthemo arquea-
catum, majus, flore purpu- X do, mayor, con la flor pur-
reo, mediocri. Dill. elth. 285. X púrea y mediocre.
t. 212. f. 273.

Cast. Mesembryanthemo filamentosos.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ¶

Tiene las *hojas* punteadas y apenas unidas por su base: las
flores sentadas; y con cinco *estilos*: las *corolas* peque-
ñas, de color de violeta: los *petalos* alesnados y no lan-
ceolados.

Acina-
ciforme. 32. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo de ho-
foliis acinaciformibus im- X jas en forma de alfange, sin
punctatis connatis, angulo X puntitos, unidas por su base,
carinali scabris, petalis X ásperas en el ángulo de la
lanceolatis. Hort. Cliff. 219. X quilla; y *petalos* lanceolados.

Mesembryanthemum acinaciforme, flore amplissimo, purpureo. Dill. elth. 282. t. 211. f. 270. & t. 212. f. 271. *Mesembryanthemo* con hojas en forma de alfange; flor muy ancha y de color purpúreo.

Cast. *Mesembryanthemo* con hoja de alfange.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 2

Forficatum. 33. MESEMBRYANTH. *Mesembryanthemo* con *foliis acinaciformibus obtusis impunclatis connatis apice spinosis, caule ancipiti.* Jacq. hort. t. 26. hojas en forma de alfange, obtusas, sin puntitos, unidas por su base, espinosas en su remate; y tallo de dos filos.

Cast. *Mesembryanthemo* á manera de tixera ó de gatillo.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 2
 Tiene el tallo débil.

ESPECIES CON LAS FLORES AMARILLAS.

Papulosum. 34. MESEMBRYANTH. *Mesembryanthemo* de *foliis oppositis spathulato-oblongis papulosis, floribus pedunculatis, calycibus linearibus.* Suppl. p. 259. hojas opuestas, entre de figura de espátula y oblongas, con ampollitas; flores pedunculadas; y cálices lineares.
Mesembryanthemum Aitonis. Jacq. hort. v. 3. p. 8. t. 7. *Mesembryanthemo* de Aiton.

Cast. *Mesembryanthemo* con muchas ampollas.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ☉

Posee los tallos y ramas deprimidos, rollizos, y ahorquillados en su remate, con muchas ampollitas como en todas las demas partes de la planta: las *hojas* que abrazan el tallo, casi unidas por su base y algo obtusas: las *flores* que salen de las ahorquilladuras, solitarias, derechas, con pedunculos filiformes y declinados: el *caliz* con sus lacinas desiguales, entre lineares y alesnadas: la *corola* apenas más larga que el caliz y de color amarillo: las *capsulas* deprimidas y desnudas.

Se diferencia del *Mesembryanthemo cristalino* (á el qual

qual es muy semejante en las ampollitas cristalinas) por el tallo mas delgado y débil: por las *hojas* opuestas y mas angostas: por las *laciniás del caliz* alesnadas: por la *corola* mucho mas pequeña y amarilla, la qual en el *Mesembryanthemo cristalino* es grande y blanca.

Pin-
natifi-
sum. 35. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo con
foliis pinnatifidis. Suppl. p. X hojas hendidas al través.
260. X

Cast. Mesembryanthemo hendido al través.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.* ☉

Produce el tallo herbáceo, ahorquillado, de la crasitud de un hilo grueso, deprimido y de color de sangre; las *hojas* opuestas, oblongas, liradas ó hendidas al través, con tres lóbulos en cada lado, obtusos y sus senos abiertos, tambien obtusos y que no llegan al lomo: el *lóbulo terminal* impar, mayor y mas agudo; y la base de las mismas *hojas* ensanchada por una parte, y como si proviniese de una *estipula* ancha: las *flores* en las axilas de las ramas, solitarias, pedunculadas, pequeñas y de color amarillo-roxo: el *pedunculo* inclinado y mas corto que la *hoja*: los *petalos* lanceolados: el *fruto* cónico inverso, de cinco lados, con su vertice plano, en redecilla, y como si fuese de cinco ventallas.

Toda la *planta* se halla salpicada de puntitos vexigosos y ácia el otoño se vuelve del todo encarnada: es hermosa y muy singular en este género.

Edule. 36. MESEMBRYANTH. X Mesembryanthemo con ho-
foliis æquilateri-triquetris X jas equilateras y de tres
acutis strictis impunctatis X caras, agudas, apretadas y
connatis carinâ subserratis, X rígidas, sin puntitos, unidas
caule ancipiti. Mill. dict. n. X por su base, algo aserradas
27. X en su quilla; y tallo de dos
X filos.

Mesembryanthemum fal- X Mesembryanthemo arquea-
catum, majus, flore amplo, X do, mayor, con la flor an-
luteo. Dill. elth. 283. t. 212. X cha y de color amarillo.
f. 272. X

Ficoides Africana, major, procumbens, triangularifolio, fructu maximo, eduli. Herm. Lugdb. 244. t. 245. Moris. hist. 3. p. 506. sect. 12. t. 7. f. 1.

Ficoide Africana, mayor, tendida, con hoja triangular; fruto muy grande y comestible.

Cast. Mesembryanthemo comestible.

Habita en las playas del mar del Cabo de Buena-esperanza. \mathfrak{H}

Tiene las hojas del grueso de un dedo, lustrosas, rectas, de tres caras y lados iguales, largas, unidas por su base; con su quilla cartilaginosa y áspera.

Bicolorum.

37. MESEMBRYANTH.

foliis subulatis punctatis levibus distinctis, caule frutescente, corollis bicoloribus. Mill. dict. n. 28. & ic. t. 177. f. 1.

Mesembryanthemo de hojas alesnadas, con puntitos lisas, separadas; tallo frutescente; y corolas de dos colores.

Mesembryanthemum tenuifolium, frutescens, flore croceo. Dill. elth. 267. t. 202. f. 258.

Mesembryanthemo frutescente, con hoja angosta; y flor de color de azafran.

Ficoides Africana, minor, erecta, triangularifolio, viridi, flore intus aureo, foris purpureo. Herm. Lugd. 250. t. 249. Moris. hist. 3. p. 507. sect. 12. t. 6. f. 4.

Ficoide Africana, menor, derecha, con hoja triangular, verde; flor por dentro de color de oro, y por fuera purpúreo.

Ficoides Capensis, frutescens, folio tereti, punctato, petalis luteis. Bradl. succ. 1. p. 8. t. 7.

Ficoide del Cabo de Buena-esperanza, frutescente, de hoja rolliza, con puntitos; y petalos amarillos.

Cast. Mesembryanthemo de dos colores.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \mathfrak{H}

Tiene el caliz con tuberculos.

erra-
im,

38. MESEMBRYANTH. X
foliis subulatis triquetris
punctatis distinctis angu-
lo carinali retrorsum ser-
ratis. Hort, Cliff. 218. Mill.
dict. n. 31.

Mesembryanthemo de ho-
jas alesnadas, de tres caras,
con puntitos, separadas, y
con aserraduras vueltas ácia
atrás en el ángulo de la qui-
lla.

Mesembryanthemum ser-
ratum, flore acetabuliformi,
luteo. Dill, elth. 249. t. 192.
f. 238.

Mesembryanthemo aserra-
do, con la flor amarilla, con-
cava y en forma de vinagre-
ra.

Cast. Mesembryanthemo aserrado.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Mi-
cans.

39. MESEMBRYANTH. X
foliis subcylindricis papu-
losis distinctis, caule sca-
bro. Hort. Cliff. 220. Knorr.
del. 1. t. G. 5.

Mesembryanthemo de ho-
jas casi cilindricas, con am-
pollitas, separadas; y tallo
áspero.

Mesembryanthemum mi-
cans, flore phæniceo, filamen-
tis atris. Dill, elth. 292. t.
215. f. 282.

Mesembryanthemo brillan-
te, con la flor de color de
datil; y filamentos negros.

Ficoides Capensis, folio
tereti, argenteo, petalis per-
plurimis aurantiacis. Bradl.
succ. 1. p. 9. t. 8.

Ficoide del Cabo de Bue-
na-esperanza, con hoja ro-
lliza, de color de plata, y
muchisimos petalos de color
de naranja.

Cast. Mesembryanthemo brillante.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Glau-
cum.

40. MESEMBRYANTH. X
foliis triquetris acutis punc-
tatis distinctis, calycinis
foliolis ovato-cordatis. Hort.
Cliff. 220. Mill. dict. n. 34.

Mesembryanthemo de ho-
jas de tres caras, agudas, con
puntitos, separadas; y ho-
juelas del caliz entre aovadas
y de figura de corazon.

Mesembryanthemum sca-
brum, flore sulphureo, con-
vexo. Dill, elth. 256. t. 196.
f. 248.

Mesembryanthemo áspero,
con la flor convexa, y de co-
lor de azufre.

Ficoides Africana, frutescens, folio triangulari, brevior, glauco. Moris. hist. 3. p. 507. sect. 12. t. 6. 3. Ficoide Africana, frutescente; con hoja triangular, mas corta, y de color garzo.

Ficoides Africana, caule lignoso, erecta, folio triangulari, ensiformi, scabro, flore luteo, magno. Bradl. succ. 4. p. 15. t. 37. Ficoide Africana, derecha, con el tallo leñoso; hoja triangular, en forma de espada, áspera; flor amarilla y grande.

Ficoides Africana, minor, erecta, folio triangulari, glauco, flore luteo. Herm. Lugdb. 247. t. 248. Ficoide Africana, menor, derecha, con hoja triangular, de color garzo; y flor amarilla.

Cast. Mesembryanthemo garzo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \mathcal{H}

Tiene las hojas que terminan en punta rígida, cubiertas como de un rocío de color garzo, con puntos esparcidos, y sin que sean ásperas, sino en la quilla.

Cor-
nicula-
tum. 41. MESEMBRYANTH. *foliis triquetro-semicylindricis scabrido-punctatis supra basim linea elevata connatis.* Mill. dict. n. 35. Mesembryanthemo de hojas entre de tres caras y medio cilindricas, con puntitos ásperos, y unidas con una linea elevada sobre su base.

Mesembryanthemum foliis corniculatis, longioribus. Dill. elth. 262. t. 199. f. 253. 254. Mesembryanthemo con hojas mas largas, y á manera de cuernezueros.

α *Mesembryanthemum foliis corniculatis, brevioribus.* Dill. elth. 261. t. 198. f. 252. Mesembryanthemo con hojas mas cortas, y á manera de cuernezueros. α

Ficoides Africana, repens, folio triangulari, crasso, longissimo, flore intus luteo, extus aurantiaco. Bradl. succ. 4. p. 18. t. 40. Ficoide Africana, rastro, con hoja triangular, crasa, larguísima; flor por dentro amarilla, y por defuera de color de naranja.

Cast. Mesembryanthemo de cuernezueros.

Habita en Africa. \mathcal{L}

Tiene las flores con diez pistilos.

Tor-
u o -
um.

42. MESEMBRYANTH. *foliis planiusculis oblongo-ovatis subpapillosis confertis connatis, calycibus triphyllis bicornibus.* Mill. dict. n. 38.

Mesembryanthemo de hojas algo planas, entre oblongas y aovadas, con algunos puntos carnosos, amontonadas, unidas por su base; y cálices de tres hojuelas, con dos astitas.

Mesembryanthemum tortuosum, foliis Sempervivi congestis. Dill. elth. 233. t. 181. f. 222.

Mesembryanthemo tortuoso, con hojas como las de la Siempreviva, y amontonadas.

Ficoides Capensis, procumbens, Oleaefolio, flore albo, medio croceo. Bradl. succ. 2. p. 7. t. 16.

Ficoide del Cabo de Buena-esperanza, tendida, con hoja como la del Olivo; flor blanca, y en medio de color de azafran.

Cast. Mesembryanthemo tortuoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ☞

Tiene tres hojuelas del caliz extendidas, y dos á manera de asta: la corola mas corta que el caliz: y el pistilo de quatro estilos.

Pome-
ridia-
num.

43. MESEMBRYANTH. *foliis planiusculis lato-lanceolatis lævibus subciliatis distinctis, caule pedunculis germinibusque hirtis.* Linn. dec. 25. t. 13.

Mesembryanthemo de hojas algo planas, entre anchas y lanceoladas, lisas, algo pestañosas, separadas; tallo, pedunculos y gérmenes con pelo áspero.

Ficoides... Africana, major, flore flavo, folio plano, latiore. Herm. Lugdb. 25. Seb. mus. 1. p. 29. f. 5.

Ficoide Africana, mayor, con la flor de color amarillo-roxo; hoja plana y mas ancha.

Cast. Mesembryanthemo que florece despues de medio dia.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ⊙

Arroja el tallo casi ahorquillado, herbáceo, rollizo, del largo de un palmo, poco mas ó menos, con pelos extendidos, amontonados y blancos: las hojas de figura de espatula, ó lanceoladas, con el peciolo ensanchado por su base, separadas y lisas, algo carnosas, casi pestañosas por la margen, señaladamente de los peciolos, mas

largas que los entrenudos , extendidas ; las primeras de tres en tres , y las restantes opuestas : el *pedunculo* terminal , mas largo que el tallo , y con pelo áspero como el tallo : el *caliz de la flor* mas grande , con pelillos blancos por su base , casi partido en cinco lacnias lanceoladas , foliaceas , y mas largas que la corola extendidas y ácia su base interiormente membranosas , de color obscuro : la *corola* de color de azufre , con muchisimos *petalos* lineares y agudos ; y los de mas adentro setáceos , que cubren el centro de la flor á manera de enrejado : los *estambres* amarillos : doce *estilos* ; y otras tantas *celdillas* del fruto.

Tiene las *flores* abiertas desde la una hasta las seis de la tarde ; pero se cierran mas pronto si presienten lluvia , y están mas tiempo abiertas quando se hallan mas crecidas.

Veruculatum.

44. MESEMBRYANTH. \times *Mesembryanthemo* con hojas entre de tres caras y cilíndricas , agudas , unidas por su base , arqueadas , sin puntos , y (otras) separadas.

Hort. Cliff. 220.

Mesembryanthemum foliis veruculiformibus , floribus melinis , umbellatis. Dill. \times *Mesembryanthemo* con hojas á manera de pequeño asador ; flores de color de miel y en umbela.

Cast. *Mesembryanthemo* á manera de pequeño asador.

Habita en Africa. \hbar

Echa las *hojas* entre de tres caras y cilíndricas , transparentes , y por su remate de color que tira á purpúreo : las *flores* muy olorosas , amontonadas , chicas , y de color amarillo-roxo : la *corola* apenas mas larga que el caliz : los *petalos* con dos ó tres dientes en su ápice : y los *estambres* pequeños ; con pelillos en la base de los filamentos.

Rosatum

45. MESEMBRYANTH. \times *Mesembryanthemo* sin tallo , de hojas medio cilíndricas , unidas por su base , y con tuberculos por defuera.

Hort. Cliff. 219.

Mesembryanthemum ros- X *Mesembryanthemo* con ho-
trum Ardeæ referens. Dill. X jas que se asemejan al pico
 elth. 240. t. 186. f. 229. X de la Garza.

Cast. *Mesembryanthemo* con pico.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 24

Rin- 46. MESEMBRYANTH. X

gens. *subacaule, foliis ciliato-* X
dentatis punctatis. Mill. X
 dict. n. 39. ic. t. 77. f. 2. X

Mesembryanthemo casi
 sin tallo, de hojas pestaño-
 sas, dentadas, y con punti-
 tos.

α *Mesembryanthemum rin-* X
gens, caninum. X

Mesembryanthemo perru-
 no y boquiabierto. α

Mesembryanthemum ric- X
tum caninum referens. Dill. X
 elth. 241. t. 188. f. 231. X

Mesembryanthemo que se
 parece á la boca abierta del
 perro.

Ficoides Capensis, humi- X
lis, folio triangulari, pro- X
pe summitatem dentato, flo- X
re luteo. Bradl. succ. 2. p. 8. X
 t. 17. X

Ficoide del Cabo de Bue-
 na-esperanza, baxa; de ho-
 ja triangular, con dientes
 cerca de su extremidad; y
 flor amarilla.

β *Mesembryanthemum rin-* X
gens, felinum. X

Mesembryanthemo gatuno
 y boquiabierto. β

Mesembryanthemum ric- X
tum felinum representans. X
 Dill. elth. 240. t. 187. f. 220. X
 Knorr. del. 1. t. G. b. n. 1. X

Mesembryanthemo que re-
 presenta la boca abierta del
 gato.

Ficoides Afra, folio tri- X
angulari, ensiformi, cras- X
so, brevi, ad margines la- X
terales multis majoribus spi- X
nis aculeato. Mart. cent. 30. X
 t. 30. X

Ficoide Africana, de hoja
 triangular, en forma de es-
 pada, crasa, corta, con mu-
 chos agujones ó espinas mas
 grandes en sus márgenes la-
 terales.

Cast. *Mesembryanthemo* boquiabierto.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. 25

Dola- 47. MESEMBRYANTH. X

brifor- *acaule, foliis dolabrisformi-* X
 me. *bus punctatis.* Hort. Cliff. X
 219. X

Mesembryanthemo sin ta-
 llo; con hojas á manera de
 azuela y punteadas.

Mesembryanthemum do- X *Mesembryanthemo con ho-*
labriformi. Dill. elth. 248. X *jas en forma de azuela.*
 t. 191. f. 237.

Ficoides Capensis, humi- X *Ficoide del Cabo de Bu-*
lis, foliis cornua Cervi re- X *na-esperanza, baxa; de hoja*
ferentibus, petalis luteis, X *que se parecen á las asta-*
noctiflora. Bradl. succ. 1. p. X *del Ciervo; petalos de color*
 11. t. 10. X *amarillo y que se abren de*
 X *noche.*

Cast. *Mesembryanthemo en forma de azuela.*

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Diffor- 48. MESEMBRYANTH. X *Mesembryanthemo sin ta-*
me. acaule, foliis difformibus X *llo, con hojas disformes (de*
punctatis connatis. Mill. dict. X *sea que una ú otra de las*
 n. 42. & ic. t. 176. f. 2. X *opuestas siempre es mucho*
 X *mas corta) punteadas, y uni-*
 X *das por su base.*

Mesembryanthemum fo- X *Mesembryanthemo con ho-*
liis difformibus, flore luteo. X *jas disformes; y flor amarilla.*
 Dill. elth. 252. t. 194. f. 241.
 242.

Ficoides Mesembryanthe- X *Ficoides Mesembryanthe-*
mum, crassisimo & valde X *mo, con hoja crasisima y muy*
succulento folio, nigris punc- X *xugosa, señalada con punti-*
tis notato. Pluk. alm. 148. X *tos negros.*
 t. 325. f. 4. X

Cast. *Mesembryanthemo disforme.*

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. h

Albi- 49. MESEMBRYANTH. X *Mesembryanthemo sin ta-*
dum. acaule, foliis triquetris in- X *llo, con hojas de tres caras*
tegerrimis. Mill. dict. n. 45. X *y enterisimas.*

Mesembryanthemum fo- X *Mesembryanthemo con ho-*
liis robustis albicantibus. X *jas robustas y blanquecinas.*
 Dill. elth. 243. t. 189. f. 232.

Ficoides Africana, folio X *Ficoide Africana, con ho-*
triangulari, ensiformi, glau- X *ja triangular, en forma de*
co, crasso, flore amplo, aureo. X *espada, de color garzo, crasa;*
 Bradl. succ. 5. p. 20. t. 43. X *flor ancha y de color de oro.*
Cast.

Cast. Mesembryanthemo blanquecino.
Habita en Etiopia. \mathcal{U}

Lini-
guifor-
me.

50. MESEMBRYANTH. \times

acaule, foliis linguiformibus altero margine crassioribus impunctatis. Hort. Cliff. 219. Knorr. del. 1. t. G. 6. n.

Mesembryanthemum folio scalprato. Dill. elth. 235. t. 183. f. 224.

α *Mesembryanthemum folio linguiformi, latiore.* Dill. elth. 236. t. 184. f. 224. Knorr. del. 1. t. G. 7. n. 2.

β *Mesembryanthemum folio linguiformi, angustiore.* Dill. elth. 238. t. 185. f. 226.

χ *Mesembryanthemum folio linguiformi, longiore.* Dill. elth. 238. t. 185. f. 227. Knorr. del. 1. t. G. 7. n. 1.

Mesembryanthemo sin talllo, con hojas en forma de lengua, mas gruesas en una de las dos márgenes, y sin puntitos.

Mesembryanthemo con hoja en forma de trinchete. (De cuyo instrumento usan los zapateros).

Mesembryanthemo con hoja en forma de lengua y mas ancha. α

Mesembryanthemo con hoja en forma de lengua, y mas angosta. β

Mesembryanthemo con hoja en forma de lengua, y mas larga. χ

Cast. Mesembryanthemo en forma de lengua.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \mathcal{U}

Tiene las flores con diez pistilos; y el caliz dividido en quatro partes.

Pugio-
nifor-
me.

51. MESEMBRYANTH. \times

foliis alternis confertis subulatis triquetris longissimis impunctatis. Hort. Cliff. 216.

Mesembryanthemum folio pugioniformi, flore amplo, stramineo. Dill. elth. 280. t. 210. f. 269.

Mesembryanthemo con hojas alternas, amontonadas, alesnadas, de tres caras, larguissimas y sin puntitos.

Mesembryanthemo con hoja en forma de puñal; flor ancha y de color de paja.

210 FLORES HERMAF: DE XX. Ó MAS EST.

Ficus Capensis, *Caryo-phylli folio*, *flore aureo specioso*. Bradl. succ. 2. p. 5. t. 14. Higuera del Cabo de Buena-esperanza, con hoja como la de la Clavellina; y flor de color de oro muy hermosa.

Cast. Mesembryanthemo en forma de puñal.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Posee los tallos ramosos en su remate, con las ramas de tres en tres: las hojas que salen del extremo de las ramitas, amontonadas, y las del origen de las ramitas que florecen, ganchosas en su ápice: los pedunculos largos: las flores con diez pistilos, y muy grandes.

Capil-
lare.

52. MESEMBRYANTH. *Mesembryanthemo de ho-*
foliis connatis teretibus jas unidas por su base, rolli-
papulosis, caule erecto, ra- zas, con ampollitas; tallo
mulis unifloris filiformibus derecho; ramitas de una flor,
glabris. Suppl. p. 260. filiformes y lampiñas.

Cast. Mesembryanthemo capilar.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

766. Género AIZOON. * Ficoidea. *Niss. A. G.*

1711. *Dill. gen. 12. elth. 177.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, partido en cinco lacinias lanceoladas y persistentes.

COR. ninguna.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, capilares, insertos por máximas en el seno del caliz, y no distribuidos con igualdad en el receptáculo: y las anteras sencillas.

PIST. *Germen* de cinco lados, dentro de la flor: estilos cinco, sencillos: con los estigmas también sencillos.

PERIC. *Capsula* ventricosa, terminada en seno obtuso, de cinco lados, de cinco celdillas y cinco ventallas.

SEM. muchas y casi redondas.

OB. El carácter esencial consiste en los estambres insertos

comunmente de tres en tres, y acercados como en madexas, en los senos del caliz.

E S P E C I E S.

- Canariense. 1. AIZOON *foliis cuneiformi-ovatis, floribus sessilibus.* Hort. Ups. 127.
Aizoon foliis obverse ovatis. Hort. Cliff. 215.
Glinus crystalinus. Forsk. Flor. Ægypt. p. 95. n. 97. ejusd. ic. t. 14.
Ficoides procumbens, Portulacæ folio. Niss. act. 1711. p. 422. t. 13. f. 1.
Kali Aizoides Canariensis, procumbens. Pluk. Alm. 202. t. 303. f. 4.

Aizoon con hojas entre de figura de cuña y aovadas; y flores sin pedunculo.
 Aizoon con hojas aovadas al revés.
 Glino cristalino.
 Ficoide tendida, con hoja como la de la Verdolaga.
 Kali como Aizoon, de Canarias, tendido.

Cast. Aizoon de Canarias.
 Habita en las Canarias y Canadá. ○

- Hispanicum. 2. AIZOON *foliis lanceolatis, floribus sessibus.*
Ficoidea Hispanica, annua, flore longiore. Dill. elth. 143. t. 117. f. 143.

Aizoon con hojas lanceoladas; y flores sin pedunculo.
 Planta parecida á la Ficoide, de España, annua, con hoja mas larga.

Cast. Aizoon de España.
 Habita en Africa: en Extremadura, *Villalobos*: en Aragon, *Otano* y *Echeandia* todos muy beneméritos Botánicos correspondientes de este Real Jardin.
 Tiene el tallo con pelo áspero; y las *hojas* tambien, aunque no tanto por su haz.

- Paniculatum. 3. AIZOON *foliis lanceolatis, floribus paniculatis.*
Aizoon foliis lanceolatis, subtus hirsutis. Roy. Lugdb. 221.

Aizoon con hojas lanceoladas; y flores en panoja.
 Aizoon de hojas lanceoladas, con pelo áspero por debaxo.

214 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

PERIC. *Capsulas* oblongas, puntiagudas, comprimidas, y de dos ventallas.

SEM. pocas, puntiagudas y pequeñas.

CARACTERES GENERICOS DE TOURNEFORT,
SPIRÆA. p. 618.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco; de cuyo caliz sale el pistilo, que pasa á fruto, compuesto de muchas siliquas y llenas de una semilla oblonga.

FILIPENDULA, p. 293.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco; de cuyo caliz, de una pieza, y de muchas puntas, sale el pistilo que pasa á fruto casi globoso, cuyas semillas se recogen en cabezuela, parecida á una pequeña tinaja.

ULMARIA, p. 265.

La flor es rosácea; de cuyo caliz sale el pistilo que pasa á fruto, compuesto de muchas vaynillas membranosas, torcidas, amontonadas en cabezuela, y llenas comunmente de una semilla pequeña.

ESPECIES FRUTICOSAS.

Lævi-
gata.

1. SPIRÆA foliis lanceo-
latis integerrimis sessili-
bus, racemis compositis. X Espirea con hojas lanceo-
ladas, enterisimas, sin pe-
ciolo; y racimos compuestos.
Spiræa (altaiensis) foliis X Espirea (altaense) con
lanceolatis integerrimis gla-
bris, ad basim angustatis X hojas lanceoladas, enterisi-
mas, lampifias, angostadas
sessilibus, floribus racemo-
sis, racemis simplicibus. X en su base; sin peciolo; flo-
res racimosas y en racimos
Laxm. nov. act. petrop. vol. X sencillos
X XV. p. 555. t. 29. f. 2.

Cast. Espirea alisada.

Habita en Siberia. Laxman. h

Es arbusto que tiene las ramas rollizas: las hojas alter-
nas,

nas, lanceoladas, enterisimas, algo obtusas con punta rígida y muy lisas: los *racimos* terminales, solitarios, derechos, compuestos de racimitos alternos, sostenidos con una *bráctea* pequeña: las *flores* mas largas que los piececitos, blancas y alternas; con los *estambres* mas largos que las corolas.

Salici-
folia.

2. SPIRÆA *foliis lanceolatis obtusis serratis nudis, floribus duplicato-racemosis.* Hort. Cliff. 191. Gmel. Sib. 3. p. 188. n. 47. t. 39.

Espirea con hojas lanceoladas, obtusas, aserradas, desnudas ó sea sin vello; y flores dos veces racimosas.

Spiræa Theophrasti fortè. Clus. hist. 1. p. 84.

Espirea acaso de Theophrasto.

Frutex spicatus, foliis serratis, salignis. C. B. P. 475.

Arbusto con flores en espiga; hojas aserradas, y como las del Sauce.

Spiræa Salicis folio longiore, serrato, floribus rubris. Amm. ruth. 265. Duham. arb. 2. t. 75.

Espirea con hoja como la del Sauce, mas larga, aserrada; y flores encarnadas.

Spiræa Salicis folio. Tourn. p. 618.

Espirea con hoja como la del Sauce.

Cast. Espirea con hoja de Sauce.

Habita en Siberia y Tartaria. *h*

To-
mento-
sa.

3. SPIRÆA *foliis lanceolatis inæqualiter serratis subtus tomentosis, floribus duplicato-racemosis.* Duham. arb. 6.

Espirea de hojas lanceoladas, con aserraduras desiguales, tomentosas por debaxo; y flores dos veces en racimo.

Ulmaria pentacarpos, integris, serratis foliis parvis, subtus incanis, Virginiana. Pluk. Alm. 393. t. 321. f. 5. Rai. Suppl. p. 330.

Ulmaria de Virginia, con cinco frutos; hojas enteras, aserradas, pequeñas, y por debaxo blanquecinas.

Cast. Espirea tomentosa.

Habita en Filadelfia. *Kalm. h*

Se diferencia de la precedente por las *hojas* mas profunda y desigualmente aserradas, muy tomentosas por debaxo

y casi crasas; por el racimo terminal compuesto, mas denso y mas largo; por las flores ultimamente mas encarnadas; con las corolas ocho veces mas pequeñas: y por los frutos vellosos.

- Hy-perici-folia. 4. SPIRÆA foliis obovatis integerrimis, umbellis sessilibus. Hort. Ups. 131. Espirea con hojas aovadas al revés, enterisimas; y umbeladas sentadas.
- Spiræa Hypericifolio, non crenato, Tourn. p. 618. Espirea con hoja como la del Hypericon y enterisima.
- Pruno sylvestri affinis, Canadensis. C. B. P. 517. Pluk. Alm. 408. t. 218. f. 5. Planta del Canadá, semejante al Ciruelo silvestre.

Cast. Espirea con hoja de Hypericon.
Habita en el Canadá, \hbar

- Chamædri-folia. 5. SPIRÆA foliis ovatis inciso-serratis glabris, umbellis pedunculatis. Jacq. hort. t. 140. Espirea con hojas aovadas, entre cortadas y aserradas, lampiñas; y umbeladas con pedunculo.
- Spiræa foliis oblongo ovaris, supra sæpe crenatis, pedunculis simplicibus. Gmel. Sib. 3. p. 189. Espirea con hojas entre oblongas y aovadas, recortadas las mas veces por arriba; y pedunculos sencillos.
- Spiræa Ulmifolia. Scop. carn. ed. 2. n. 600. t. 22. secundum Jacquin. R. Espirea con hoja como la del Olmo.
- Spiræa Chamædryos foliis. Amm. ruth. 269. Espirea con hojas como las del Camedrys ó sea Germandrina.

Cast. Espirea con hoja de Camedrys.
Habita en la Siberia. Gmel.: y en la Carniola. Scop. \hbar
No siempre tiene las hojas de tres en tres, de quatro en quatro, ó de cinco en cinco. Jacquin.

- Cre-nata. 6. SPIRÆA foliis oblongiusculis, apice serratis, corymbis lateralibus. Gou. illustr. 31. Espirea con hojas algo oblongas, aserradas por su extremo; y corimbos laterales.

Spiræa Hispanica, Hy-
perici folio, crenato. Barr. rar. 1376. l. 564. Espirea de España, con
hoja como la del Hypericon
y recortada.

*Spiræa Hyperici folio am-
pliore, modò integro, modò
dentato.* Amm. ruth. 270. Espirea con hoja como la
del Hypericon, mas ancha,
unas veces entera, y otras
dentada.

Cast. Espirea recortada.

Habita en la Siberia: en los montes de Languedoc: en los
de Burgos, Asturias y otros de España. \bar{h}

Posee las *hojas* entre aovadas y oblongas, unas recortadas
ó aserradas por su remate, y otras enterisimas: los *co-
rimbos terminales* perfectisimos; con *flores* blancas y
tan abundantes que visten todo el arbusto de color de
nieve.

Tri-
loba. 7. SPIRÆA foliis lobatis
crenatis, umbellis termina-
libus. Espirea con hojas hendi-
das en lóbulos, recortadas;
y umbelas terminales.

*Spiræa ramosissima, par-
vo, subrotundo, Opuli folio.*
Amm. ruth. 271. Espirea muy ramosa, con
hoja como la del Opulo, pe-
queña y casi redonda.

Cast. Espirea de tres lóbulos.

Habita en la Siberia. D. Laxman. \bar{h}

Es *arbusto* que echa las *ramas* rollizas: las *hojas* alternas,
con peciolo, casi redondas, hendidas en lóbulos, obtu-
sas, recortadas y lisas: las *umbelas* terminales y solita-
rias, con muchos *pedunculos* de una flor é iguales, y
uno ú otro que sale de las *axilas* mas altas de las *hojas*;
y los *estambres* mas cortos que las *corolas*.

Opuli-
folia. 8. SPIRÆA foliis lobatis
serratis, corymbis termina-
libus. Espirea con hojas hendi-
das en lóbulos, aserradas; y
corimbos terminales.

*Spiræa foliis incisís an-
gulatis, floribus corymbo-
sis.* Hort. Cliff. 190. Espirea con hojas corta-
das, anguladas; y flores en
corimbo.

Spiræa Opuli folio. Tourn.
p. 618. Duham. arb. 5. Espirea con hoja como la
del Opulo.

218 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Evonymus Virginiana, \times Evonymo de Virginia, de
Ribesii folio, capsulis ele- hoja como la del Ribes; y
ganter bullatis. Comm. hort. \times capsulas con ampollitas her-
 1. p. 169. t. 87. \times mosas.

Cast. Espirea con hoja de Opulo.
 Habita en la Virginia y Canadá. \mathfrak{h}
 Es arbol con las flores de tres pistilos.

Sorbi-
 folia.

9. SPIREA foliis pinna- \times Espirea de hojas pinnadas,
tis: foliolis uniformibus ser- con hojuelas uniformes, aser-
ratis, caule fruticoso, flo- radas; tallo fruticoso; y flo-
ribus paniculatis. \times res en panoja.

Spiræa foliis pinnatis. \times Espirea con hojas pinna-
 Amoen. Acad. 2. p. 352. \times das.

Spiræa Sorbi folio, tenui- \times Espirea con hoja como la
ter crenato, floribus in thyr- del Serbál, delgadamente
so albis. Amm. ruth. 186. \times recortada; flores blancas y
 \times puestas en panoja aovada.

Cast. Espirea con hoja de Serbál.
 Habita en terrenos sumideros de Siberia. \mathfrak{h}

Ar-
 gentea

10. SPIRÆA fruticosa, \times Espirea fruticosa, de raci-
racemis compositis, foliis \times mos compuestos; hojas con
sericeis cuneiformibus li- vello como seda; en forma
neatis, apice serratis sub- de cuña, rayadas, aserra-
plicatis. Suppl. p. 261. \times das por su extremo y algo
 \times plegadas.

Cast. Espirea de color de plata.

Habita en la nueva Granada. *Mutis.* \mathfrak{h}

Es arbusto que produce las ramas estriadas, derechas,
 con sus ramitas cortas: las hojas alternas, con peciolo,
 lanceoladas, en forma de cuña, rayadas, aserradas por
 su extremo, y cubiertas en ambas partes de vello blan-
 co como seda: los racimos compuestos, terminales, y
 mas largos que sus ramitas: las flores mas pequeñas,
 que en las demas especies; de cinco pistilos: y los gé-
 menes con pelillos.

Japo-
nica.

11. SPIRÆA fruticosa, X Espirea fruticosa, con el
caule pubescente, foliis lan- X tallo veloso; hojas lanceo-
ceolatis acutis serratis X ladas, agudas, aserradas,
nudis, corymbo terminali X sin vello; corimbo terminal
composito. Suppl. p. 262. X y compuesto.

Cast. Espirea del Japon.

Habita en el Japon. Thunb.

Es semejante á la Espirea con hoja de Sauce.

ESPECIES HERBACEAS.

Arun-
cus.

12. SPIRÆA foliis supra- X Espirea con hojas sobre-
decompositis, spicis pani- X decompuestas; espigas en pa-
culatis, floribus dioicis. X noja; y flores masculinas en
Gmel. Sib. 3. p. 192. X un pie de planta, y femeni-
nas en otro.

Spiræa foliis bipinnatis, X Espirea con hojas dos ve-
floribus hermaphroditis mas- X veces pinnadas; y flores her-
culisque. Gov. illustr. 31. X mafroditas y masculinas.

Arunco. Hort. Cliff. 463.

Barba Capræ, floribus X Barba de Cabra, con flo-
oblongis. C. B. P. 163. To- X res oblongas.

urn. p. 265.

Barba Capræ. Bauh. hist. X Barba de Cabra.
3. p. 488. Cam. hort. 26. t. 9.

Cast. Espirea Arunco.

Habita en lugares montuosos de Austria, Auvernia, Ale-
mania, y en los Pirineos: en los de Navarra, Asturias
y otros de España. h

Tiene las flores de tres pistilos; y la capsula con dos ó
tres semillas.

Fili-
pendu-
la.

13. SPIRÆA foliis inter- X Espirea de hojas interrumpi-
rupte pinnatis: foliolis linea- X pidamente pinnadas, con ho-
ri—lanceolatis interrupte X juelas lineares, lanceoladas,
serratis glaberrimis, flo- X interrumpidamente aserra-
ribus cymosis. Suppl. p. 262. X das, muy lampifias; y flores
X cimosas.

Spiræa foliis pinnatis: foliis uniformibus serratis, caule herbaceo, floribus corymbosis. Mat. Med. 147. Fl. dan. t. 635. Syst. pl. 513. Espirea de hojas pinnadas, con hojuelas uniformes, aserradas; tallo herbáceo; y flores en corimbo.

Filipendula foliis pinnatis, minimis intermixtis, extrema trilobata. Hall. helv. n. 1136. Filipendula de hojas pinnadas, con otras muy pequeñas entreveradas; y la hojuela extrema hendida en tres lóbulos.

Filipendula vulgaris, an Molon Plinii. C. B. P. 163. Tourn. p. 293. Filipendula vulgar, acaso Molon de Plinio.

Filipendula. Cam. epit. 608. Bauh. hist. 3. part. 2. p. 189. Dod. pempt. 56. Filipendula.

Filipendula minor. C. B. P. 167. Prodr. 85. Tournef. p. 393. Filipendula menor.

Cast. Espirea filipendula.

Habita en Europa entre pastos: en Cataluña, Aragon, montes de Burgos, Alcarria, Asturias y otras muchas partes de España. ¶

PROPIED. Toda la planta es astringente, vulneraria y diuretica; se usa en la leucorrea, disenteria y bernia.

Ulmaria. 14. *SPIRÆA foliis interrupte pinnatis: foliolis ovatis biserratis subtus canis, floribus cymosis.* Suppl. p. 262. Espirea de hojas interrumpidamente pinnadas, con hojuelas aovadas, dos veces aserradas, canas por debaxo; y flores cimosas.

Spiræa foliis pinnatis, impari majore lobato, floribus cymosis. Mat. Med. 147. Fl. dan. t. 547. Syst. plant. 523. Espirea de hojas pinnadas, con la impar mayor, hendida en lóbulos; y flores cimosas.

Filipendula foliis pinnatis, pinnis acute serratis, minimis intermixtis, extrema trilobata, maxima. Hall. helv. n. 1135.

Filipendula de hojas pinnadas, con hojuelas agudamente aserradas, y otras muy pequeñas entreveradas, la extrema muy grande, y hendida en tres lóbulos.

Barba Capræ, floribus compactis. C. B. P. 164.

Barba de Cabra, con flores compactas.

Ulmaria. Clus. hist. 2. p. 198. Bauh. hist. 3. p. 488.

Ulmaria.

Regina prati. Dod. pempt. 57.

Reyna del prado.

Cast. Espirea ulmaria.

Habita en los mismos parages que la antecedente. ¶

PROPIED. Toda la planta es astringente y sudorifica: se usa en la hernia, disenteria, y en las enfermedades exantematicas.

Pal-
mata. 15. *SPIRÆA foliis pinnatis, impari lateralibusque lobatis biserratis, floribus cymosis.* Suppl. p. 262.

Espirea de hojas pinnadas, con la impar y laterales hendidas en lóbulos, dos veces aserradas; y flores cimosas.

Spiræa foliis pinnato-ternatis, foliolo impari quinquelobo-palmato. Syst. plant. 524. Pall. it. vol. 3. p. 735. t. Q. f. 1.

Espirea de hojas entre pinnadas, y de tres en rama, con la hojuela impar entre palmeada y hendida en cinco lóbulos.

Spiræa lobata. Jacq. hort. vol. 1. p. 38. t. 88.

Espirea hendida en lóbulos.

Spiræa foliolo impari majore, multifido. Gmel. Sib. 3. p. 192.

Espirea con la hojuela impar mayor y hendida en muchas partes.

Cast. Espirea palmeada.

Habita en la Siberia. ¶

Su estatura y traza son como las de la *Ulmaria*. Tiene la raiz olorosa: la yerba sin olor: las hojas casi como las de la *Ulmaria*; con las hojuelas hendidas en lóbulos: las flores encarnadas: y el fruto como el de la *Filipendula*; pero recto.

Trifo-
liata.

16. *SPIRÆA foliis ternatis serratis subæqualibus, floribus subpaniculatis.* Mill. dict. n. 7. & ic. t. 256.

Espirea con hojas de tres en rama, aserradas, apenas iguales; y flores casi en panocha.

Filipendula foliis ternatis. Hort. Cliff. 191.

Filipendula con hojas de tres en rama.

Ulmaria major, trifolia, flore amplo, pentapetalo, Virginiana. Pluk. Alm. 393. t. 236. f. 5. Rai. Suppl. p. 330.

Ulmaria mayor, de Virginia, con hojas de tres en rama; flor ancha, y de cinco petalos.

Cast. Espirea de tres en rama.

Habita en la Virginia y Canadá.

ORDEN V.

POLYGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON MAS DE CINCO PISTILOS.

768. Género ROSA. * *Tourn. t. 408.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza: tubo ventricoso, con su cuello coartado: borde extendido, globoso, partido en cinco *lacini*as largas, entre lanceoladas y angostas, de las cuales (en algunas especies) las dos alternas tienen apéndices en ambos lados, y las otras dos alternas carecen de ellos, y la quinta los posee solamente en un lado.

COR. *Petalos* cinco, de figura de corazon al revés, del largo del caliz, y prendidos en su cuello.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, capilares, cortísimos, é insertos en el cuello del caliz: con las *anteras* de tres lados.

PIST. *Gérmenes* numerosos, en el fondo del caliz: *estilos* otros tantos, vellosos, cortísimos, estrechamente comprimidos en el cuello del caliz, é insertos en el lado del germen: con los *estigmas* obtusos.

PERIC. *Baya* carnosa, cónica inversa, de color, blanda, de una celdilla, coronada con *lacini*as toscas, coartada por el cuello, y formada del tubo del caliz.

SEM.

SEM. numerosas , oblongas , erizadas , y prendidas en el lado interior del caliz.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 636.

La flor consta de muchos petalos puestos en cerco , cuyo caliz folioso pasa á fruto casi redondo , ú oblongo , carnoso , de una celdilla , lleno de simientes comunmente anguladas y vellosas.

ESPECIES CON LOS GERMENES CASI GLOBOSOS.

Eglan-
teria.

1. ROSA *germinibus globosis pedunculisque glabris , caule aculeis sparsis rectis , petiolis scabris , foliolis acutis.* X Rosal con los gérmenes globosos , y lampiños como sus pedunculos ; tallo con agujones esparcidos , rectos ; peciolos ásperos ; y hojuelas agudas.

Rosa (lutea) caule aculeato , foliis pinnatis , foliolis ovatis serratis utrinque glabris , pedunculis brevissimis. Mill. dict. n. 11. X Rosal (amarillo) de tallo con agujones ; hojas pinnadas , con hojuelas aovadas , aserradas , lampiñas en ambas partes ; y pedunculos muy cortos.

Rosa lutea, simplex. C. B. P. 483. Tourn. p. 638. X Rosal con la flor de color amarillo y sencilla.

Rosa eglanteria. Tabern. ic. 1087. X Rosal eglanterio.

α *Rosa lutea, multiplex.* C. B. P. 483. Tourn. p. 639. X Rosal con la flor amarilla y multiplicada. α Hort. Angl. t. 18. Knorr. del. 1. t. R. 1. X

Cast. Rosal eglanterio.

Habita en Alemania y Suiza ? y en Inglaterra. *h*

Tiene las flores de color amarillo-roxo , grandes , sin olor , y las hojas muy olorosas. Varía con el caliz emisférico.

- Rubi- 2. ROSA *germinibus glo-* X Rosal de gérmenes globo-
ginosa- *bosis aculeatisque, aculeis* X sos, y con agujones encor-
recurvis, foliis subtus ru- X vados ácia atrás; y hojas por
biginosis. Jacq. Austr. 1. X debaxo rubiginosas ó sea con
t. 50. X orin.
- Rosa spinis aduncis, foliis* X Rosal de espinas gancho-
subtus rubiginosis. Hall. X sas; y hojas con orin por de-
helv. n. 1103. X baxo.
- Rosa sylvestris, foliis odo-* X Rosal silvestre, con hojas
ratis. C. B. P. 483. Tourn. X olorosas.
p. 638.
- Rosa sylvestris, odorata.* X Rosal silvestre, oloroso.
Dod. pempt. 186. X

Cast. Rosal rubiginoso.

Habita en Alemania y Suiza. \hbar

Produce las ramas lisas; pero con agujones esparcidos, máyores, y encorvados ácia atrás: las hojas pinnadas, con hojuelas de siete en siete, aovadas, agudas, y salpicadas por debaxo con puntitos resinosos de color que tira á purpúreo: los peciolo erizados con agujones menudos encorvados ácia atrás: las brácteas con glandulas menudas puestas en un piececito: el germen casi globoso, con muy pocos agujoncitos, señaladamente en la base: el pedunculo con agujones tambien muy menudos; y la flor de color purpúreo.

- Cin- 3. ROSA *germinibus glo-* X Rosal de gérmenes globo-
namo- *bosis pedunculisque gla-* X sos y lampiños como los pe-
mea. *bris, caule aculeis stipula-* X dunculos; tallo con aguji-
ribus, petiolis subinermibus. X nes que sirven de estipulas;
X y peciolo casi inermes.
- Rosa odore Cinnamomi,* X Rosal con la flor sencilla,
simplex. C. B. P. 483. To- X y de olor de Canela.
urn. p. 638. Duham. arb. 33. X
- Rosa Cinnamomea, flori-* X Rosal espinoso, con flores
bus subrubentibus, spinosa. X algo encarnadas, y de olor
Bauh. hist. 2. p. 39. X de Canela.
- Rosa saxatilis, flore ru-* X Rosal saxátil, con la flor
berrimo. Cam. epit. 99. X muy encarnada.

Cast. Rosal de olor de Canela.

Habita en la Europa Austral. *h*

Arvensis. 4. ROSA *germinibus globosis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis, floribus cymosis.* Huds. angl. 192.

Rosal de gérmenes globosos y lampiños como los pedunculos; tallo y peciolos con aguijones; y flores cimosas.

Rosa spinosissima. Oed. dan. t. 398.

Rosal muy espinoso.

Rosa arvensis, candida.

Rosal arvense, con la flor cándida.

C. B. P. 484. Tourn. p. 638.

Rosa sylvestris, folio glabro, flore plane albo. Bauh. hist. 2. p. 44.

Rosal silvestre, con hoja lampiña; y flor del todo blanca.

Rosa sylvestris, altera, minor, flore albo. Rai. Angl. 3. p. 455.

Otro Rosal silvestre, menor, con la flor blanca.

Cast. Rosal arvense ó sea que nace en campos que se siembran.

Habita en Inglaterra, Suiza, Alemania y Dinamarca. *h*

Pimpinelli-folia. 5. ROSA *germinibus globosis pedunculisque glabris, caule aculeis sparsis rectis, petiolis scabris, foliolis obtusis.* Pall. it. 2. p. 517.

Rosal de gérmenes globosos y lampiños como los pedunculos; tallo con aguijones esparcidos, rectos; peciolos ásperos; y hojuelas obtusas.

Cast. Rosal con hoja de Pimpinela.

Habita en Europa? *h*

Spinosisima. 6. ROSA *germinibus globosis glabris, pedunculisque hispidis, caule petiolisque aculeatissimis.* Pollich. pal. n. 487.

Rosal de gérmenes globosos, lampiños; pedunculos erizados; tallo y peciolos con muchísimos aguijones.

Rosa campestris, spinosissima, flore albo, odorato.

Rosal campestre, muy espinoso, con la flor blanca y olorosa.

C. B. P. 483.

226 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Rosa pumila, *spinosissima*, *foliis Pimpinellæ glabris*, *flore albo.* Bauh. hist. 3. p. 40.

Rosal enano, muy espinoso, con hojas como las de la Pimpinela, lampiñas; y flor blanca.

Rosa dunensis, *species nona.* Dod. pempt. 187.

Rosal dunense, especie nona.

Rosa campestris, *odora.* Clus. hist. 1. p. 116.

Rosal campestre, con la flor olorosa.

Cast. Rosal espinosísimo.

Habita en Europa. \bar{h}

Arroja el tallo con agujones alesnados, rectos, horizontales, muy amontonados y desiguales: las *hojuelas* menudas, aovadas al revés, y de nueve en nueve: los *peciolos* inermes: los *pedunculos* unas veces inermes y otras con agujones: los *gérmenes* las mas veces tambien con agujones en su base: los *petalos* blancos, y por su base de color que tira á amarillo-roxo: el *fruto* globoso y negro quando se halla maduro. Es variedad del Rosal con hoja de Pimpinela segun Haller.

Carolina.

7. ROSA *germinibus globosis hispidis*, *pedunculis subhispidis*, *caule aculeis stipularibus*, *petioli aculeatis.*

Rosal de gérmenes globosos, erizados; pedunculos con algun pelo rígido; tallo con agujones que sirven de estipulas; y los peciolos tambien con agujones.

Rosa Carolina, *fragrans*, *foliis mediotenus serratis?* Dill. elth. 325. t. 245. f. 316.

Rosal de la Carolina, con la flor olorosa; y hojas aserradas hasta el medio.

Cast. Rosal de la Carolina.

Habita en la America Septentrional. \bar{h}

Produce el tallo liso: dos *agujones* que sirven de estipulas: siete *hojuelas* entre oblongas y aovadas, lampiñas, aserradas, y por debaxo mas pálidas: los *peciolos* con agujones: muchos *pedunculos* ramosos, inermes y salpicados de pelos glandulosos: las *hojuelas* del caliz individuales, y con pelo rígido por debaxo: los *petalos* de figura de corazon al revés y rubicundos. La *flor* viene tardía.

Vil-
losa.

8. ROSA *germinibus globosis pedunculisque hispidis, caule aculeis sparsis, petiolis aculeatis, foliis tomentosis.*

Rosa foliis utrinque villosis, fructu spinoso. Flor. Suec. 2. p. 1295.

Rosa poma spinoso, folio & caule hirsuto. Bauh. hist. 2. p. 38. R.

Rosa sylvestris, pomifera, major. C. B. P. 484. Tourn. p. 638.

Rosal de gérmenes globosos y erizados como los pedunculos; tallo con agujones esparcidos; peciolo tambien con agujones; y hojas tomentosas.

Rosal con hojas vellosas en ambas partes; y fruto espinoso.

Rosal de poma espinosa; hoja y tallo con pelo áspero.

Rosal silvestre, mayor, que lleva pomas.

Cast. Rosal velloso.

Habita en Europa: en el pinar del lugar de Hoyoquesero y en las cercas de los prados del lugar de S. Martin del Pimpollar. \hbar

Tiene el tallo liso, con dos ó quatro agujones acercados debaxo de los nudos: las hojas obtusas y tomentosas: los pedunculos erizados: los gérmenes tambien con pelo rígido: y los petalos encarnados.

Sinica.

9. ROSA *germinibus subglobosis glabris, pedunculis aculeatis hispidis, caule petiolisque aculeatis, calycinis foliolis lanceolatis subpetiolatis.* Syst. veg. 394.

Rosal con los gérmenes casi globosos, lampiños; pedunculos con agujones, y pelo rígido; tallo y peciolo tambien con agujones; hojuelas del caliz lanceoladas y algo pecioladas.

Cast. Rosal de la China.

Habita

Sem-
pervi-
rens..

10. ROSA *germinibus globosis pedunculisque hispidis, caule petiolisque aculeatis, floribus subumbellatis.* Mill. dict. n. 9.

Rosal de gérmenes globosos y erizados como los pedunculos; tallo y peciolo con agujones; y flores casi en umbela.

228 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Rosa moscata, *sempervirens*. C. B. P. 482. Duham. arb. 22. Tourn. p. 637. Rosal siempreverde, con la flor de olor de almizcle.

Rosa sempervirens, *Jungermanni*. Dill. elth. 326. t. 246. f. 318. Rosal siempreverde, de Jungerman.

Cast. Rosal siempreverde.
Habita en Alemania. \hbar

ESPECIES CON LOS GERMENES CAVADOS.

Pu- 11. ROSA *germinibus* Rosal de gérmenes aova-
mila. *ovatis*, *petiolis pedunculis-* dos; peciolos y pedunculos
que hispidis, *caule superne* erizados; y tallo por arriba
aculeatissimo. Suppl. p. 262. con muchos agujijones.

Rosa pumila. Clus. hist. Rosal enano.
117. Jacq. Austr. vol. 2. p.
59. t. 198.

Rosa sylvestris, *pumila*, Rosal silvestre enano, con
rubens. C. B. P. 483. Tourn. la flor encarnada.
p. 638.

Cast. Rosal enano.

Habita en Austria. \hbar

Posee las ramitas con mucha abundancia de agujijones; pero los de los tallos se le caen facilmente: los frutos grandes, y en forma de Pera.

Centi- 12. ROSA *germinibus* Rosal de gérmenes aova-
folia. *ovatis pedunculisque his-* dos y erizados como los
pidis, *caule hispido aculea-* pedunculos; tallo tambien
to, *petiolis inermibus*. Mat. erizado, con agujijones; y
Med. p. 148. Knorr, del. 1. peciolos inermes.
t. R.

Rosa multiplex, *media*. C. Rosal medio, con la flor
B. P. 482. Tourn. p. 637. multiplicada.

Rosa centifolia, *Batavica*, Otro Rosal de cien hojas,
altera. Bauh. hist. 2. p. 38. de Holanda.

Cast. Rosal con flores de cien hojas.

Habita \hbar

Vease el *Rosal muy espinoso*, con el *pedunculo musgoso*; y la *flor roxa y plena*. Mill. dict. t. 221. f. 1.

PROPIED. *Las flores son corroborantes, astringentes y algo purgantes: se usan en la leucorrea, y otros qualesquiera fluxos: y son tambien útiles en la optalmia.*

Gal-
lica.

13. ROSA *germinibus ovatis pedunculisque hispidis, caule petiolisque hispido-aculeatis.*

Rosa rubra, simplex, vel multiplex. C. B. P. 481. Tourn. p. 637. Duham. arb. 2. t. 53.

Rosa rubra, flore semiplena. Bauh. hist. 2. p. 34.

α *Rosa Gallica, versicolor.*

Rosa Prænestina, variegata, plena. Mill. dict. t. 221. f. 2.

Rosa versicolor. C. B. P. Tourn. p. 637.

Rosa Prænestina alba & *versicolor.* Bauh. hist. 2. p. 37.

Rosal de gérmenes aovados y erizados como los pedunculos; tallo y peciolo erizados y con agujones.

Rosal con la flor roxa, sencilla, ó multiplicada.

Rosal con la flor roxa y medio plena.

Rosal de Francia, con flor de varios colores. α

Rosal de Palestrina, con flor plena, y de varios colores.

Rosal con flor de varios colores.

Rosal Palestrino, con la flor blanca y de varios colores.

Cast. Rosal de Francia. vulgo: Rosas Castellanas. Farm. Flores rosarum rubrarum.

Habita en Europa. \bar{h}

Echa el tallo liso, ó con pocos agujones: los *pedunculos* erizados: las *hojas* algo agudas, por encima desnudas, y por debaxo un poco tomentosas: el *germen* aovado y erizado por su base; y las *flores* encarnadas, ó blancas.

PROPIED. *Las flores son corroborantes, astringentes, y se usan en la leucorrea, y otros qualesquiera fluxos.*

Alpina

14. ROSA *germinibus ovatis glabris, pedunculisque hispidis, caule inermi.* Jacq. Austr. t. 279.

Rosal de gérmenes aovados, lampiños; pedunculos y peciolo erizados; y tallo sin agujones.

Ro-

230 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Rosa inermis, foliis septenis, glabris, calycis segmentis indivisis. Hall. helv. n. 1107. Rosal inerme, con hojas de siete en siete, lampiñas; y segmentos de los cálices indivisos.

Rosa campestris, spinis carens, biflora. C. B. P. 484. Tourn. p. 639. Rosal campestre, que carece de espinas; y florece dos veces al año.

Rosa Græca & Cynorrhodon, læve. Dalech. hist. 126. Rosal de Grecia y perruno sin espinas.

Rosa rubello flore, simplici, non spinosa. Bauh. hist. 2. p. 39. Rosal sin espinas, con la flor sencilla, y de color que tira á roxo.

Cast. Rosal alpino.

Habita en los Alpes de Suiza. *h*

Tiene las hojas lampiñas: los cálices sencillos: y los pétalos de figura de corazon al revés, con dos lóbulos.

Ca-
nina. 15. ROSA *germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis.* Flot. dan. t. 555. Mat. Med. 148. Rosal de gérmenes aovados y lampiños como los pedunculos; tallo y peciolo con agujones.

Rosa sylvestris, vulgaris, flore odorato, incarnato. C. B. P. 483. Tourn. p. 638. Rosal silvestre, vulgar, con la flor olorosa y encarnada.

Rosa sylvestris, alba cum rubore, folio glabro. Bauh. hist. 2. p. 43. Rosal silvestre, con la flor de color blanco algo bermejo; y hoja lampiña.

Rosa canina vulgo dicta. Dod. pempt. 187. Rosal vulgarmente llamado perruno.

Cast. Rosal silvestre. *Farm.* Flores rosæ sylvestris. Fructus Cynobasti. Fungus Bedegar.

Habita en la Europa: en los contornos de Madrid; y es muy frecuente en las mas provincias de España. *h*

Arroja el tallo liso con dos agujones alternos en los entrenudos: los peciolo tambien con agujones: las hojas algo agudas y sin vello: los pedunculos y gérmenes lampiños: los petalos encarnados y hendidos en dos lóbulos: y dos brácteas opuestas y pestañosas.

PROPIED. Las flores son algo purgantes: la conserva del fru-

fruto se usa en las viruelas , para moderar la inflamacion de la garganta : el hongo ó nido de insecto es astringente , y llevandole encima suaviza el dolor de las almorranas.

- Indica. 16. ROSA *germinibus ovatis pedunculisque glabris , caule subinermi , petiolis aculeatis.* Rosal de gérmenes aovados y lampiños como los pedunculos ; tallo casi inerme ; y peciolos con agujones.
- Rosa subinermis , foliolis quinis subtus tomentosis , impari majori , stipulis obsoletis.* Sp. pl. 1. p. 402. Rosal casi inerme , con hojuelas de cinco en cinco , tomentosas por debaxo ; la impar mayor ; y estipulas desfiguradas.
- Rosa Cheusan , glabra , Juniperi fructu.* Pet.gaz.57. t. 35. f. 11. Rosal Cheusan , lampiño , con fruto como el del Enebro.

Cast. Rosal de Indias.

Habita en la China. *h*

Produce las ramas inermes , y muy pocas veces armadas con uno ú otro agujon delgadísimo , ácia las hojas ó en los peciolos : las hojas pinnadas , con hojuelas de cinco en cinco , tomentosas por debaxo , lampiñas por encima , aserradas , y la de mas afuera al doble mayor : los pedunculos largos , desnudos y sencillos ; el caliz cortado y liso : y el fruto de la magnitud de el del *Serbál de Cazador*.

- Pen- 17. ROSA *germinibus ovatis glabris , pedunculis cauleque hispidis , petiolis inermibus , fructibus pendulis.* Rosal con los gérmenes aovados , lampiños ; pedunculos y tallo erizados ; peciolos inermes ; y frutos pendulos.
- Rosa Sanguisorbæ majoris folio , fructu longo , pendulo.* Dill. elth. 325. t. 255. f. 317. Rosal con hoja como la de la Sanguisorba ó sea Pimpinela mayor ; fruto largo y pendulo.

Cast. Rosal pendulino.

Habita en la Europa. *h*

Alba. 18. ROSA *germinibus ovatis glabris, pedunculis hispidis, caule petiolisque aculeatis*. Knorr. del. 1. t.R. n. 6. Mat. Med. 149. Rosal de gérmenes aovados, lampiños; pedunculos erizados; tallo y peciolo con aguijones.

Rosa alba, vulgaris, major. C. B. P. 482. Tourn. p. 637. Duham. arb. 16. Rosal vulgar, mayor, con la flor blanca.

Rosa sativa, prima. Dod. pempt. 186. Rosal primero, que se cultiva.

Cast. Rosal blanco.

Habita en la Europa. \hbar

PROPIED. Las flores son fragrantés, y se usan en la op-talmia y leucorrea.

Damasce-na. 19. ROSA *germinibus ovatis pedunculisque hispidis, caule aculeato, calycibus pinnatifidis hirsutis*. Mat. Med. 148. Rosal de gérmenes aovados y erizados como los pedunculos; tallo con aguijones; cálices hendidos al través, y con pelo áspero.

Rosa purpurea. C. B. P. 481. Tourn. p. 637. Rosal con la flor purpúrea.

Rosa provincialis, major. Tabern. ic. 1084. Rosal mayor, provincial.

Rosa rubello flore, majore, multiplicato, sive pleno, incarnata vulgo. Bauh. hist. 2. p. 36. Rosal con la flor roxita, mayor, multiplicada ó plena, llamada vulgarmente Rosa encarnada.

Cast. Rosa Damascena, Alexandrina, ó Provincial.

Habita en Europa. \hbar

El Rosal de cien hojas es variedad de este. Varían sumamente los Rosales en la multiplicacion de las flores: en la figura de los frutos, en tener ó no aguijones, y en ser lampiños ó pelosos.

PROPIED. Son las mismas que las de las Rosas de cien hojas.

769. Género RUBUS. * *Tourn. t. 385.*

CAR. GEN. NAT.

- CAL. *Periantio* de una pieza , hendido en cinco *lacinijs* oblongas , extendidas y persistentes.
- COR. *Petalos* cinco , casi redondos , del largo del caliz , entre derechos y extendidos.
- ESTAMB. *Filamentos* numerosos , mas cortos que la corola , é insertos en el caliz : con las *antheras* casi redondas y comprimidas.
- PIST. *Gérmenes* numerosos : *estilos* pequeños , capilares , y que nacen del lado del germen : con los *estigmas* sencillos y persistentes.
- PERIC. *Baya* compuesta de *granitos* casi redondos , de una celdilla cada uno , recogidos en cabezuela convexâ , y por debaxo cóncava.
- SEM. solitarias y oblongas. *Receptáculo de los frutos* cónico.
- OBS. Los *granitos* unidos componen una baya , y no pueden separarse sin que se despedacen.
- La *Zarza saxâtil* lleva las bayas con los granitos separados.
- La *Zarza pequeño moral* es dioica.

CARACT. GÈNER. DE TOURN. p. 614.

La *flor* es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco , sentados en el caliz , de cuyo centro sale el pistilo , acompañado de numerosos estambres y que pasa á fruto casi globoso , compuesto de muchos frutitos como bayas , fixados al receptáculo , llenos de xugo y de una semilla oblonga.

ESPECIES FRUTESCENTES.

Idæus. 1. RUBUS *foliis quinato-pinnatis ternatisque , caule aculeato , petiolis canaliculatis.* Mat.Med. 149 .Knorr. del. 2. t. R. 1. Zarza de hojas entre de cinco y de tres en rama y pinnadas ; tallo con agujones ; y peciolo acanalados.

Ru-

Rubus caule erecto hispido, foliis ternatis. Hort. Cliff. 192. Zarza con el tallo derecho, erizado; y hojas de tres en rama.

Rubus caule spinoso, subrecto, foliis quinatis & ternatis subtus tomentosus, fructibus hirsutis. Hall. helv. n. 1108. Zarza de tallo espinoso, casi recto; hojas de tres y de cinco en rama, tomentosas por debaxo; y frutos con pelo áspero.

Rubus Idæus, spinosus. C. B. P. 479. Tourn. p. 614. Zarza Idea, espinosa.

Rubus Idæus, spinosus, fructu rubro. Bauh. hist. 2. p. 59. Zarza Idea, espinosa, con el fruto roxo.

Rubus Idæus, fructu albo. C. B. P. 479. Tourn. p. 614. Zarza Idea, con el fruto blanco. α

Rubus Idæus, lævis. C. B. P. 479. Tourn. p. 614. Zarza Idea, sin espinas. β

Cast. Zarza Idea. vulgo: Sangueso.

Habita en terrenos pedregosos de Europa: en Aragon: montes de Burgos, Pirineos de Cataluña y otras partes de España. \mathcal{L} ♂

PROPIED. El fruto tiene el gusto ácido agradable: es refrigerante, corrobora; y se usa en la putrefaccion de los humores y para atemperar el ardor de las calenturas.

Occi-
denta-
lis.

2. RUBUS *foliis ternatis subtus tomentosus, caule aculeato, petiolis teretibus.* Kalm. it. 2. p. 283. Zarza con hojas de tres en rama, tomentosas por debaxo; tallo con aguijones, y petiolos rollizos.

Rubus Idæus, fructu nigro, Virginianus. Dill. elth. 327. t. 287. f. 319. Zarza Idea, de Virginia, con el fruto negro.

Cast. Zarza Occidental.

Habita en el Canadá. Kalm. \mathcal{L}

Arroja el tallo rollizo, liso, con aguijones encorvados ácia atrás, y cubierto de una telilla de color cerúleo: los petiolos rollizos, con aguijones encorvados ácia atrás: las hojas de tres en rama: las hojuelas intermedias con piecitos, aovadas, entre cortadas y aserradas, y por deba-

baxo con tomento blanco : el *racimo* terminal ; y el *fruto* negro. Varía tambien con el *fruto* roxo , mas ácido y mas agradable que el de la *Zarza Idea*.

His-
dus.

3. RUBUS *foliis ternatis nudis , caulis petiolisque hispidissimis , strigis rigidulis*. Mill. dict. n. 7. Zarza con hojas de tres en rama, desnudas ; tallos y peciolo muy erizados y con aguijoncillos algo rígidos.

Cast. Zarza erizada.

Habita en el Canadá. *Kalm.* 4

Echa los *tallos* con sarmientos largos , tendidos , leñosos , salpicados de pelos rígidos igualmente que los peciolo: las *hojas* de tres en rama , desnudas , entre cortadas y aserradas : la *hojuela intermedia* con piececito : y los *pedunculos* tambien erizados.

Parvi-
olius.

4. RUBUS *foliis ternatis subtus tomentosis , caule birto petiolisque aculeis recurvis*. Zarza con hojas de tres en rama , tomentosas por debajo ; tallo y peciolo con pelo áspero y agujones encorvados ácia atrás.

Rubus Moluccanus, *parvifolius*. Rumph. Amb. 5. p. 88. t. 47. f. 1. Zarza de las Molucas, con hoja pequeña.

Cast. Zarza de hoja pequeña.

Habita en la India. *Osbek.* 7

Tiene los *tallos* fruticosos , rollizos y tomentosos, con muchos agujones redoblados : las *hojas* con tomento blanco por debaxo , venosas ; y sus *peciolo* por debaxo con *aguijones* encorvados ácia atrás : los *cálices* tomentosos y dispuestos en racimo.

Jamai-
censis.

5. RUBUS *foliis ternatis subtus tomentosis , caule petiolis foliisque pubescentibus recurvato aculeatis*. Zarza con hojas de tres en rama , tomentosas por debajo ; tallo , peciolo y hojas vellosos , y con agujones encorvados ácia atrás.

236 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Rubus foliis longioribus, subtus molli lanugine obductis & incanis, flore fructu minoribus. Sloan. jam. 2. p. 109. t. 213. f. 1. Rai. dendr. 76. Zarza con hojas mas largas, blanquecinas, y cubiertas por debaxo con pelos blandos; flor y fruto mas pequeños,

Rubus flore albo, pleno. Magn. hort. 175. Zarza con la flor blanca plena.

Cast. Zarza de Jamaica.

Habita en la Jamaica. *h*

Se diferencia de la precedente, por los tallos que no son blanquecinos, sino los mas tiernos ligeramente vellosos. Tiene el tallo como el de la *Zarza fruticosa*: las hojas de tres en rama, lisas por encima, entre cortadas y aserradas; y con tomento blanco por debaxo: y posee agujones en el tallo, en los peciolos y en el lomo de las hojas.

Cæsius. 6. RUBUS *foliis ternatis subnudis: lateralibus bilobis, caule aculeato tereti.* Roy. Lugdb. 273. Zarza con hojas de tres en rama, casi desnudas, las hojas laterales hendidas en dos lóbulos; tallo con agujones y rollizo.

Rubus repens, fructu caesio. C. B. P. 479. Tournef. p. 614. Zarza rastrera, con fruto de color entre verde y azul.

Rubus minor, fructu caeruleo. Bauh. hist. 2. p. 59. azul.

Rubus minor. Dod. pempt. 742. Zarza menor.

Cast. Zarza con fruto de color turquesado.

Habita entre zarzales de Europa: en Moncayo de Aragón, Moseñ de Cataluña y otras partes de España. *h*
El tallo se halla salpicado de agujones muy delgados: y las hojas, aunque las mas veces vellosas, no son tomentosas por debaxo.

fruti-
sus.

7. *Rubus foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis.* Flor. Suec. 409. 444. Zarza con hojas divididas como en dedos, de cinco y de tres en rama; tallo y peciolos con agujones.
- Rubus caule aculeato, foliis ternatis ac quinatis.* Hort. Cliff. 192. Zarza de tallo con agujones, y hojas de tres y de cinco en rama.
- Rubus caule spinoso, serpente, foliis quinatis & ternatis, subtus tomentosis, bacis lævibus.* Hall. helv. 1109. Zarza de tallo espinoso, rastretero, con hojas de tres y de cinco en rama, tomentosas por debaxo; y bayas lisas.
- Rubus vulgaris, sive Rubus fructu nigro.* C. B. P. 479. Tourn. p. 614. Zarza vulgar, ó Zarza con el fruto negro.
- Rubus major, fructu nigro.* Bauh. hist. 2. p. 57. Dod. pempt. 742. Zarza mayor, con el fruto negro.
- Rubus vulgaris, major, fructu albo.* Rai. Angl. 3. p. 467. Zarza vulgar, mayor, con el fruto blanco. α
- Rubus flore albo, pleno.* Magn. hort. 176. Tourn. p. 614. Zarza con la flor blanca y plena. β
- Rubus vulgaris, spinis carens.* Tourn. p. 614. Zarza vulgar, sin espinas. χ

Cast. Zarza fruticosa. vulgo: Zarza: y la que no tiene espinas Zarza de San Francisco.

Habita en los vallados de Europa: en los contornos de Madrid, y es frecuente en las mas provincias de España. \hbar Y las variedades se cultivan en los jardines.

Tiene el tallo algo angulado y larguísimo: las hojas verdes en ambas partes, ó por debaxo blancas y tomentosas.

PROPIED. Los frutos y hojas son astringentes y detersivos; y limpian las úlceras de la boca.

Canadensis. 8. RUBUS *foliis digitatis denis quinis ternatisque, caule inermi.* Mill. ic. t. 223. Zarza con hojas puestas en forma de dedos, de diez en diez, de cinco en cinco, y de tres en rama; y tallo sin espinas.

Cast. Zarza del Canadá.

Habita en el Canadá. *Kalm.*

Posee el tallo casi de color purpúreo: las *hojuelas* lanceoladas, desnudas en ambas partes, muy delgadas, y con aserraduras agudas: las *brácteas* lanceoladas: las *estipulas* lineares y agudas.

Odoratus. 9. RUBUS *foliis simplicibus palmatis, caule inermi multifolio multifloro.* Hort. Cliff. 192. Mill. dict. n. 6. & ic. t. 223. Zarza de hojas sencillas, palmeadas; tallo inermes, con muchas hojas y muchas flores.

Rubus odoratus. Corn. Canad. 149. t. 190. f. 150. Zarza olorosa.

Cast. Zarza olorosa.

Habita en el Canadá. \mathcal{L} \mathcal{H}

Moluccanus. 10. RUBUS *foliis simplicibus cordatis sublobatis, caule aculeato decumbente.* Zarza de hojas sencillas, en forma de corazon, casi hendidas en lóbulos; tallo con agujones y echado.

Rubus Moluccanus, latifolius. Rumph. Amb. 5.p.88. t. 47. f. 2. Zarza de Molucas, con hoja ancha.

Cast. Zarza de Molucas.

Habita en Amboina. \mathcal{H}

Tiene las flores en panoja: los *petalos* mas cortos que el caliz: los *gérmenes* con pelo áspero: los *estilos* mas largos que los *estambres*; y las *hojas* tomentosas por debaxo.

Japo-
icus.

11. RUBUS *foliis simplicibus cordatis oblongis serratis, caule inerme suffruticoso.* Zarza con hojas sencillas, de figura de corazon, oblongas, aserradas; tallo inerme y sufruticoso.

Rubus (Japonicus) fruticosus inerms glaberrimus, foliis simplicibus cordatis oblongis acuminatis duplicato-serratis, pedunculis solitariis unifloris. Suppl. p. 263. Zarza (del Japon) inerme, muy lampiña; con hojas sencillas, de figura de corazon, oblongas, puntiagudas, dos veces aserradas; pedunculos solitarios y de una flor.

Cast. Zarza del Japon.

Habita en el Japon. \hbar

Es arbusto baxo, que produce el tallo derecho, inerme, liso, angulado y poco ramoso: las *hojas* alternas, pecioladas, sencillas, aovadas, ó entre aovadas y oblongas, puntiagudas, dos veces aserradas y lisas en ambas partes: el *pedunculo* filiforme, del largo de la corola, terminal y solitario: la *flor* de la magnitud de la de la *Fresera*; con los *petalos* casi redondos, blancos, y mayores que el caliz.

Micro-
phyl-
lus.

12. RUBUS *fruticosus aculeatus glaber, foliis simplicibus cordatis ovatis obtusis sublobatis, pedunculis solitariis unifloris.* Suppl. p. 263. Zarza fruticosa, lampiña, con agujones; hojas sencillas, de figura de corazon, aovadas, obtusas, casi hendidas en lóbulos; pedunculos solitarios y de una flor.

Cast. Zarza microphyla ó sea de hoja pequeña.

Habita en el Japon. Thunb. \hbar

Es semejante á la *Zarza de hoja pequeña n. 4.*; pero aquella encanece con tomento, y tiene siempre las hojas de tres en rama, y blancas por debaxo.

Esta posee los *tallos* muy lampiños, rollizos, y muy pocas veces con agujones: las *hojas* pequeñas, pecioladas, de figura de corazon, obtusas, casi hendidas en tres lóbulos, aserradas, y sin agujones: los *peciolos* y *pedunculos* inermes: las *flores* pequeñas, y de la magnitud de las de la *Potentilla*.

- Cor- 13. RUBUS *fruticosus*, X Zarza fruticosa, tomento-
chori- *aculeatus tomentosus, foliis* X sa, con agujones; hojas sen-
folius. *simplicibus oblongis corda-* X cillas, oblongas, de figura
tis serratis, pedunculis so- X de corazon, aserradas; pe-
litariis unifloris. Suppl. p. X dunculos solitarios y de un
263. X flor.

Cast. Zarza con hoja de Corcoro.

Habita en el Japon. Thunb. \mathfrak{H}

Es arbusto que tiene agujones en el tallo, en los peciolos y alguna vez debaxo de las hojas. El tallo, las hojas por debaxo, los peciolos, pedunculos y cálices se hallan con tomento cano: y los petalos apenas son mas largos que el caliz.

ESPECIES HERBACEAS.

- Saxa- 14. RUBUS *foliis ternatis nudis, flagellis reptan-* X Zarza con hojas de tres en
tilis. *tibus herbaceis.* Jacq. vind. X rama, desnudas; vástagos
245. Oed. dan. t. 134. X rastreros y que perecen todos
Rubus caule herbaceo, fo- X los años.
liis glabris, ternatis, aci- X Zarza de tallo herbáceo,
nis paucissimis. Hall. helv. X hojas lampiñas, de tres en
n. 1111. X rama; y con muy pocos gra-
Rubus saxatilis, alpinus. X nitos.
Clus. hist. 1. p. 118. X Zarza saxátil, de los Alpes.
Chamærubus saxatilis. C. X Pequeña Zarza saxátil.
B. P. 479. X
Rubus alpinus, humilis. X Zarza alpina, baxa.
Bauh. hist. 2. p. 61. Tourn. X
p. 615. X

Cast. Zarza saxátil.

Habita en los collados pedregosos de Europa: en las montañas de Burgos y Leon, de Avila y Sierra nevada, en los Pirineos de Cataluña y Aragon, como en otras partes de España. \mathfrak{H}

Arcti-
cus. 15. RUBUS *foliis ternatis*, caule inermi unifloro. Mat. Med. 149. Flor. dan. t. 488.

Zarza con hojas de tres en rama; tallo inerme y de una flor.

Rubus caule unifloro, foliis ternatis. Fl. Lapp. 207. t. 5. f. 2.

Zarza con tallo de una flor; y hojas de tres en rama.

Cast. Zarza del norte.

Habita en Bothnia de Suecia, en la Siberia y Canadá. **PROPIED.** Su fruto es algo agrio y fragante: admirable humectante, refrigerante, cordial y analeptico; y se usa con muy buenos efectos en las calenturas pútridas, exantemáticas, y en el escorbuto.

Chamaemorus. 16. RUBUS *foliis simplicibus lobatis*, caule inermi unifloro. Mat. Med. 150. Flor. dan. t. 1.

Zarza con hojas sencillas, hendidas en lóbulos; tallo inerme y de una flor.

Rubus caule bifloro, foliis simplicibus. Fl. Lapp. 208. t. 5. f. 1.

Zarza de tallo con dos hojas y una flor; y hojas sencillas.

Rubus palustris, humilis. Tourn. p. 615.

Zarza palustre, baxa.

Chamaerubus foliis Ribes, Anglica. C. B. P. 480.

Pequeña Zarza de Inglaterra, con hojas como las del Ribes.

Chamaemorus. Clus. hist. 1. p. 118,

Pequeño moral.

Cast. Zarza pequeño Moral.

Habita en lugares pantanosos y sumideros de Suecia, Siberia y Dinamarca.

Es planta dioica; y á veces tiene flores masculinas y femeninas en un pie de planta.

PROPIED. El fruto es diuylene, humectante y refrigerante: y se usa en la hemotisis, tisis y escorbuto.

Dalibarda. 17. RUBUS *foliis simplicibus cordatis indivisis cre-natis*, scapo aphylo unifloro. Mill. dict. n. 11.

Zarza con hojas sencillas, de figura de corazon, indivisas, recortadas; escapo sin hojas, y de una flor.

TOM. IV.

Q

Cast.

Cast. Zarza de Dalibard.

Habita en el Canadá. *Kalm.* 24

Echa la *raiz* rastrera : los *renuevos* tambien rastreros y herbáceos : las *hojas* como las de la violeta , de figura de corazon , obtusas , venosas , salpicadas de pelos claros , y por debaxo desnudas : los *peciolos* pelosos , del largo de las hojas : el *escapo* desnudo , peloso , del largo de las hojas y con una flor : el *caliz* partido en cinco lacinias : la *corola* blanca : cinco *semillas* aovadas y desnudas : y los *estambres* tan largos como la corola. Acaso alguna vez , se hallan las flores masculinas y femeninas en una misma planta ?

Su traza persuade haberse de unir con la Zarza , y señaladamente con la Zarza pequeño Moral , ó ambas deberian separarse de este género.

770. Género FRAGARIA. * *Tourn. t.* 152.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , plano , hendido en diez lacinias , alternadamente mas afuera y mas angostas.

COR. *Petalos* cinco , casi redondos , extendidos , y prendidos en el caliz.

ESTAMB. *Filamentos* veinte , alesnados , mas cortos que la corola , insertos en el caliz : con las *anteras* de figura de media luna.

PIST. *Gérmenes* numerosos , muy pequeños , recogidos en cabezuela : *estilos* sencillos , prendidos en el lado del germen : con los *estigmas* tambien sencillos.

PERIC. *Receptáculo comun de las semillas* reducido á baya , entre redondo y aovado , pulposo , blando , grande , de color , truncado por su base , y que se cae facilmente.

SEM. numerosas , muy pequeñas , puntiagudas , y esparcidas por la superficie del receptáculo.

OBS. El *receptáculo comun* se reputa , vulgarmente , por baya.

CARAC. GENER. DE TOURN. p. 295.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco; de cuyo caliz, hendido en muchas partes, sale el pistilo que pasa á fruto casi globoso, ó entre aovado y puntiagudo, á cuyo receptáculo unas veces carnososo, y otras acorchado, se hallan pegadas muchas semillas. A estas notas se añaden las de las hojas sentadas de tres en tres en el remate de un piececito.

ESPECIES.

- | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vesca. | 1. FRAGARIA <i>flagellis reptantibus</i> . Hort. Cliff. 192. | Fresera con vástagos rastroseros. |
| | <i>Fragaria foliis ternatis, flagellis reptantibus</i> . Hall. helv. n. 1112. | Fresera con hojas de tres en rama; y vástagos rastroseros. |
| | <i>Fragaria vulgaris</i> . C. B. P. 326. Tourn. p. 295. | Fresera vulgar. |
| | <i>Fragaria ferens fraga rubra</i> . Bauh. hist. 2. p. 394. | Fresera que lleva las fresas encarnadas. |
| α | <i>Fragaria fructu albo</i> . C. B. P. 326. Tourn. p. 296. | Fresera con el fruto blanco. α |
| β | <i>Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine</i> . C. B. P. 327. Tourn. p. 296. | Fresera con el fruto de la magnitud de una Ciruela pequeña. β |
| χ | <i>Fragaria Chiloensis, fructu maximo, foliis carnosis hirsutis</i> . Dill. elth. 145. t. 120. f. 146. | Fresera de Chiloe, con el fruto muy grande; y hojas carnosas, con pelo áspero. (vulgo Freson) χ |
| d | <i>Fragaria (muricata) caule erecto suffruticoso, foliis hirsutis</i> . Sp. pl. 2. p. 709. | Fresera (con puntas agudas) de tallo derecho, sufruticoso; y hojas con pelo áspero. d |
| i | <i>Fragaria arborea, flore herbaceo</i> . Zan. hist. Moris. hist. 2. p. 186. Mat. med. 150. | Fresera arborea, con la flor de color verde. i |
- Cast. Fresera de fruto comestible.
Habita en Europa: y es frecuente en las mas provincias de España. 2

244 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

PROPIED. Toda la yerba y fruto son diluyentes, humectantes, refrigerantes, diaforéticos, diuréticos y algo purgantes: se usan en el cálculo, calenturas, gota y tisis.

Mono- 2. FRAGARIA foliis x Fresera con hojas sencill-
phylla. simplicibus. x llas.

Cast. Fragaria de una hoja.

Habita.

Acaso es variedad de la antecedente?

Echa la primera hoja de tres en rama; y el escapo mas largo: los petalos mas pequeños; y los cálices cortados. Vease la monografía de la *Fragaria* del Doct. Antonio Nicolas Duchesne.

Ste- 3. FRAGARIA caule de- x Fresera con el tallo tendi-
filis. cumbente, ramis floriferis x do; y ramas floríferas laxás.
laxis.

Fragaria caule prostrato, foliis ternatis, retusis, sericeis. Hall. helv. n. 1113. x Fresera de tallo prostrado; hojas de tres en rama, con vello como seda y terminadas en seno obtuso.

Fragaria sterilis. C. B. x Fresera estéril.
P. 327. Tourn. p. 296.

Fragaria sterilis, seu minime vesca, hirsuta, minime incana. Moris. hist. 2. p. x Fresera estéril, ó que su fruto no es comestible, con pelo áspero, y que no es
186. sect. 2. t. 19. f. 5. x blanquecina.

Cast. Fresera estéril.

Habita en Inglaterra, Suiza y Alemania: en los montes de la Cartuja del Paular de Segovia, de Avila, Pirineos de Cataluña, de Aragon y otras partes de España. 2/

Echa los pimpollos crasos, deprimidos, y cubiertos de estipulas lanceoladas, de color ferrugineo, sin que se alarguen en mimbres ó vástagos, como en la especie antecedente: las hojas de tres en rama: sus hojuelas avadas al revés, aserradas, terminadas en seno obtuso, muy floxas, con pelillos como seda, por debaxo blanquecinas; y los peciolo muy pelosos: los tallos que lle-
van

INSER. EN EL CAL. CON MAS DE V. PIST. 245

van las flores filiformes, inclinados, laxôs, con hojas claras y mas pequeñas: las *flores* solitarias, con pedunculo, y blancas.

771. Género POTENTILLA. * *Quinquifolium*. *Tourn.*
t. 153. *Pentaphylloides*. *Tourn. t.* 153.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, algo plano, hendido en diez *lacinas*, alternadamente mas pequeñas y redobladas.

COR. *Petalos* cinco, casi redondos, extendidos, é insertos por sus uñas en el caliz.

ESTAMB. *Filamentos* veinte, alessnados, mas cortos que la corola, y prendidos en el caliz: con las *anteras* largas, y á manera de media luna.

PIST. *Gérmenes* numerosos, muy pequeños, recogidos en cabezuela: *estilos* filiformes, del largo de los estambres, y prendidos en el lado del germen: con los *estigmas* obtusos.

PERIC. ninguno. El *Receptáculo comun de las semillas* es casi redondo, acorchado, muy pequeño, persistente, cubierto de las mismas semillas, y encerrado en el caliz.

SEM. numerosas y puntiagudas.

CARACTERES GENERICOS DE TOURN.

QUINQUEFOLIUM. p. 296.

La *flor* es rosácea ó que consta de muchos *petalos* puestos en cerco; de cuyo caliz de una pieza, hendido en muchas partes, sale el *pistilo* que pasa á fruto casi globoso, envuelto en el mismo caliz, en el qual se recogen muchas *semillas* en cabezuela. A estas notas se añaden las de tener mas de tres *hojuelas* sentadas en el *piececito*.

PENTAPHYLLOIDES. p. 298.

Es diverso del *Quinquefolio* por tener las hojas dispuestas en otra situacion; esto es que no están sentadas en el remate del piececito en forma de rádios.

ESPECIES CON HOJAS PINNADAS.

- Fru-
tcosa. 1. *POTENTILLA foliis pinnatis, caule fruticoso.* Potentila con hojas pinnadas; y tallo fruticoso.
Roy. Lugdb. 275.
Pentaphylloides rectum, fruticosum, Evoracense. Mo-
ris. hist. 2. p. 193. sect. 2. *ta que se parece al cinco en*
t. 23. f. 5. Hort. angl. 54. *rama) de Yorck, recto y fru-*
t. 54. Duham. arb. 2. t. 20. *uticoso.*
Tourn. p. 298.
Pentaphylloides fruticosa, elatior. Amm. ruth. 88. Pentaphyloide fruticoso y
t. 17. & 89. t. 18. f. 1. *mas levantado.*

Cast. Potentila fruticosa.

Habita en Yorck de Inglaterra: en la Oelandia austral y Siberia. *h*

- An-
serina. 2. *POTENTILLA foliis pinnatis serratis, caule repente, pedunculis unifloris.* Potentila con hojas pinnadas, aserradas; tallo rastre-
Mat. Med. 151. Fl. dan. t. 544. *ro; y pedunculos de una flor.*
Fragaria caule repente, foliis pinnatis, serratis, tomentosis, petiolis longis, unifloris. Hall. helv. n. 1126. Fresera con el tallo ras-
Pentaphylloides argenteum, alatum seu Potentilla. Tourn. p. 298. *trero; hojas pinnadas, aser-*
rada, tomentosas; piececi-
tos largos y de una flor.
Potentilla. C. B. P. 321. Pentaphyloide de color de
Cam. epit. 758. *plata, alado, ó Potentila.*
Potentila,

Argentina. Dod. pempt. X Argentina ó yerba de co-
600. X lor de plata.

Cast. *Potentilla anserina.*

Habita entre pastos arcillosos de Europa: en los montes de Avila, de Burgos, de Asturias, Galicia, Leon y Pireneos de Cataluña. ¶

PROPIED. *Es astringente, y se usa en los fluxos y cálculo.*

- Se-
ricea.
3. *POTENTILLA foliis* Potentilla de hojas dos ve-
bipinnatis utrinque tomen- ces pinnadas, tomentosas en
tosis, segmentis parallelis ambas partes, con sus seg-
approximatis, caulibus de- mentos paralelos, acercados;
cumbentibus. y tallos tendidos.
- Potentilla foliis pinnatis,* Potentilla de hojas pinna-
hirsutis, pinnis tredecim, das, con pelo áspero y tre-
ovatis, crenatis, decurren- ce hojuelas aovadas, recor-
tibus. Hall. Goett. 2. p. 106. tadas y escurridas.
- Potentilla foliis duplicato-* Potentilla de hojas dos ve-
pinnatis, pinnulis linearibus, ces pinnadas, con hojuelas
integerrimis, brevibus. lineares, enterisimas y cor-
Gmel. mss. tas.

Cast. Potentilla como seda.

Habita en la Siberia. ¶

La traza de las hojas es como la de la *Potentilla anserina*; aunque mas pequeñas; pero el tallo y la frutificación como de la *Potentilla de primavera*. Echa la raíz vestida de escamas como pedazos de hojas negras: las hojas pinnadas, con trece hojuelas, poco mas ó menos, aovadas, tomentosas como seda, hendidas al través y paralelas: los pedunculos pelosos: los tallos dos ó tres veces mas largos que las hojas, hechados, sin vástagos, adornados en medio con una sola hoja mas pequeña y mas extendida, rollizos, y por su remate con algunas flores amarillas, alternas y pedunculadas.

Mul-
tifida.

4. *POTENTILLA foliis bipinnatis: segmentis integerrimis distantibus subtomentosis, caule decumbente.* Gmel. Sib. 3. p. 182. n. 30. Pall. it. 3. p. 194.
- Fragaria foliis subtus tomentosus, pinnatis, pinnis primis pinnatis, ultimis simplicibus.* Hall. helv. n. 1125.
- Pentaphylloides supinum, minus, folio glabro, non serrato.* Amm. ruth. 116.
- Pentaphylloides repens, foliis pinnatis.* Buxb. cent. 1. p. 30. t. 49. f. 1.
- Pentaphylloides humile, foliis angustis.* Amm. ruth. n. 113. t. 16. secundum. Pallas. R.
- α *Pentaphylloides supina, minor, foliis alatis, hirsutis, varie dissectis.* Amm. ruth. 117.
- Potentila de hojas dos veces pinnadas, con segmentos enteros, apartados, tomentosos por debaxo; y tallo tendido.
- Fresera con hojas tomentosas por debaxo y pinnadas; las primeras dos veces, y las ultimas una vez sola.
- Pentaphyloide hechado, menor, con hoja lampiña, y sin aserraduras.
- Pentaphyloide rastreado, con hojas pinnadas.
- Pentaphyloide baxo, con hojas angostas.
- Pentaphyloide echado, menor; de hojas aladas, con pelo áspero, y variamente cortadas. α

Cast. Potentila hendida en muchas partes.

Habita en la Siberia, Tartaria, Capadocia y Suiza. 24

Su habito indica que es afine con la *Potentila argentea*.

Posee las hojas de siete hojuelas, con cinco ó siete segmentos lineares ó lanceolados y alternos; pero opuestos en la impar, apartados entre sí por su remate, y tomentosos en el envés.

Los sinonimos de *Amm. num. 116*, y de *Buxbau*, segun *Gmelino* y *Pallas* pertenecen á la *Potentila Bifurcada*: y la descripción que dá aqui *Linneo* manifiesta, que es variedad de la *Potentila como seda*, segun lo advierte el mismo *Pallas* en el lugar citado. R.

Fraga-
rioides

5. **POTENTILLA foliis** *pinnatis ternatisque, extimis majoribus, flagellis rep- tantibus.* Potentila de hojas pinna- das, y de tres en rama, con las hojuelas de mas afuera mayores; y vástagos rastreros.

Potentilla foliis pinnatis ternatisque hirsutis, utrinque & viridibus, lobulis accesoriis. Gmel. Sib. 3. p. 182. n. 31. t. 34. f. 2. Potentila de hojas pinna- das y de tres en rama, con pelo áspero y verdes en am- bas partes; y con otros lóbu- los ó sean hojuelas mas pe- queñas.

Cast. Potentila como Fresera,

Habita en la Siberia. ¶

Su traza es como la de la *Fresera estéril*, con los pimpo- llos ó renuevos tendidos. Arroja la *raiz* casi tuberosa: las *hojas* como seda, con los peciolos pelosos, pinnadas, con tres, cinco, ó siete *hojuelas* opuestas, aovadas, aser- radas, y las mas cercanas á la base mas pequeñas.

Ru-
pestris

6. **POTENTILLA foliis** *pinnatis alternis, foliolis quinis ovatis crenatis, caule erecto.* Jacq. Austr. t. 114. Potentila de hojas pinna- das, alternas, con hojuelas de cinco en cinco, aovadas, recortadas; y tallo rollizo.

Gou. illustr. 32.

Pentaphylloides erectum. Pentaphyloide levantado.

Bauh. hist. 2. p. 398. Moris.

hist. 2. p. 192. sect. 2. t. 20.

f. 1. Tourn. p. 298.

Quinquefolium fragif- rum. C. B. P. 326. Clus. hist. Quinquefolio ó sea cinco en rama que lleva fresas.

2. p. 107. n. 5.

Cast. Potentila rupestre.

Habita en las laderas de los montes de Westrogothia, Si- beria y Alemania: en Aragon, Cataluña, Alcarria y otras partes de España. ¶

Tiene las *flores* blancas: las *hojuelas* de cinco en cinco, de siete en siete, ó de nueve en nueve. *Govan*,

250 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Bifurcata.

7. *POTENTILLA foliis pinnatis subæqualibus, foliolis oblongis subbifidis, extimis confluentibus.* Gmel. it. 1. p. 149. t. 27. f. 1. Potentila de hojas pinnadas, casi iguales, con hojuelas oblongas, algo hendidas en dos partes, y las de afuera que se escurren unidas por debaxo.

Pentaphylloides Orientale, supinum, foliis alatis, bifidis vel trifidis. Tourn. cor. 21. Pentaphyloide Oriental, echado, con hojas aladas y hendidas en dos ó tres partes.

Cast. Potentila ahorquillada.
Habita en la Siberia. 2

Pimpinellas.

8. *POTENTILLA foliis pinnatis, foliolis subrotundis dentatis æqualibus, caule erecto.* Pentaphylloides Orientale, erectum, folio & facie Pimpinellæ. Tourn. cor. 21. Buxb. cent. 1. p. 30. t. 48. Potentila de hojas pinnadas, con hojuelas casi redondas, dentadas, iguales; y tallo derecho.

Pentaphylloides Orientale, erectum, folio & facie Pimpinellæ. Tourn. cor. 21. Buxb. cent. 1. p. 30. t. 48. Pentaphyloide Oriental, derecho, con hoja y traza de Pimpinela.

Cast. Potentila como Pimpinela.
Habita entre peñascos de Armenia. 2


Pensilvanica.

9. *POTENTILLA foliis inferioribus pinnatis, superioribus ternatis, foliolis inciso-serratis, caule erecto pubescente.* Jacq. hort. t. 189. Potentila con las hojas inferiores pinnadas, las superiores de tres en rama; hojuelas entre cortadas y aserradas; tallo derecho y vellosos.

Pentaphylloides Canadense, foliis Agrimonie. Boerh. Lugdb. 1. p. 40. Pentaphyloide del Canadá, con hojas como las de la Agrimonia.

Cast. Potentila de Pensilvania.
Habita en el Canadá. 2

Su traza es como la de la *Potentila recta*. Tiene las hojas radicales pinnadas; con las hojuelas oblongas, algo obtusas, entre aserradas y dentadas, blandas, vellosas, rayadas, y las tres de mas afuera unidas por su base y ma-



mayores ; pero las interiores mas pequeñas y alternas : las *hojas del tallo* casi puestas en forma de dedos , de siete en siete , y como las de la *Potentilla recta* ; pero hendidas al través ; y los *petalos* apenas mayores que el caliz.

- Su-
pina.
10. *POTENTILLA foliis pinnatis , caule dichotomo decumbente.* Gmel. it. 1. p. 149. t. 27. f. 2. Hort. Cliff. 193.
- Pentaphyllum alpinum , minus , supinum.* Pluk. Alm. 285. t. 106. f. 7.
- Pentaphyllum supinum , quorundam , Potentillae facie.* Clus. hist. 2. p. 107.
- Quinquefolio fragifero affinis.* C. B. P. 326.
- Pentaphylloides supinum.* Bauh. hist. 2. p. 398. Tourn. p. 298.
- Potentilla con hojas pinna-
das ; tallo ahorquillado y
tendido.
- Pentaphylo alpino , me-
nor y echado.
- Pentaphylo echado , lla-
mado asi por algunos auto-
res ; con traza de Potentilla.
- Planta semejante al Quin-
quefolio que lleva fresas.
- Pentaphyloide echado.

Cast. Potentilla echada.

Habita en la Siberia , Alemania y Austria. ☉

ESPECIES CON HOJAS PUESTAS EN FORMA DE DEDOS.

- Recta.
11. *POTENTILLA foliis septenatis lanceolatis serratis utrinque subpilosiss , caule erecto.* Jacq. Austr. 383.
- Fragaria caule erecto , foliis quinis & septenis acute serratis.* Hall. helv. n. 1121. R.
- Potentilla foliis digitatis , caule erecto , corymboso.* Roy. Lugdb. 275.
- Potentilla con hojas de sie-
te en rama , lanceoladas ,
aserradas , algo pelosas en
ambas partes ; y tallo dere-
cho.
- Fresera con el tallo dere-
cho ; hojas (*hojuelas*) de
cinco en cinco , y de siete en
siete , y agudamente aserra-
das.
- Potentilla con hojas pues-
tas como en dedos ; tallo de-
recho y corimboso.

Quin-

Quinquefolium rectum, X Quinquefolio derecho, con
luteum. C. B. P. 325. Tourn. flor amarilla.
 p. 297.

Quinquefolium alterum, X Otro Quinquefolio vul-
vulgare. Dod. pempt. 116. gar.

Cast. Potentilla recta.

Habita en las márgenes de los campos de Italia, Narbona, Suiza y Austria: en la Alcarria, montes de Burgos, Asturias y otras partes de España. ¶

Tiene las *hojas* pelosas en ambas superficies; pero se hallan desnudas quanto mas crecidas,

Argen- 12. POTENTILLA *foliis* X Potentilla con hojas de cin-
 tea. *quinatis cuneiformibus in-* co en rama, (*hojuelas*) en
cisis subtus tomentosis, X forma de cuña, cortadas, por
caule erecto. Gmel. Sib. 3. debaxo tomentosas; y tallo
 p. 184. derecho.

Fragaria caule erecto, fo- Fresera con el tallo dere-
liis quinatis, apice serratis, cho; hojas de cinco en rama,
subtus tomentosis. Hall. aserradas en su remate, y
 helv. n. 1124. tomentosas por debaxo.

Quinquefolium folio ar- Quinquefolio con hoja de
genteo. C. B. P. 325. Tourn. color de plata.
 p. 297.

Pentaphyllum rectum, fo- Pentaphylo recto, con ho-
liis profunde sectis, subtus jas profundamente cortadas,
argenteis, flore luteo. Bauh. de color de plata por deba-
 hist. 2. p. 598. xo; y flor amarilla.

Pentaphyllum minus. Pentaphylo menor.
 Camm. epit. 760.

Cast. Potentilla de color de plata.

Habita en Europa: en Aragon, Cataluña, Alcarria, Asturias y otras partes de España. ¶

Inter- 13. POTENTILLA *foliis* X Potentilla con las hojas ra-
 media. *radicalibus quinatis, cauli-* dicales de cinco en rama;
nis ternatis, caule erectius- las del tallo de tres en rama;
culo ramosissimo. X tallo algo derecho, y muy
 X ramoso.

Quinquefolium montanum, \times *Quinquefolio montano*,
erectum, hirsutum, luteum. \times derecho, con pelo áspero; y
 C. B. P. 325. Prodr. 139. \times flor amarilla.
 Tourn. p. 297. \times

Cast. *Potentilla intermedia.*

Habita en Suiza. \mathcal{L}

Es media entre la *Potentilla de color de plata*, y la de *No-
 ruega*; y sería esta ultima si la *raiz* no fuera perenne, y
 no tuviese las hojas casi radicales de cinco en rama;
 fuera de que posee las *hojas inferiores* alternas, y las
superiores opuestas: las *hojuelas* aovadas al revés, en-
 tre cortadas y aserradas, con nueve dientes y sin ser to-
 mentosas: las *hojas del tallo* de tres en rama, y opues-
 tas á la panoja.

Hirta. 14. *POTENTILLA foliis* \times *Potentilla* con hojas de sie-
septenatis quinatisque, cu- \times te y de cinco en rama, (*ho-*
neiformibus incisiss pilosis, \times *juelas*) en forma de cufia,
caule erecto hirta. \times cortadas, pelosas; y tallo
 \times derecho, con pelo rígido.

Quinquefolium rectum, \times *Quinquefolio recto*, me-
minus, angustioribus foliis, \times nor, de Mompeller, con ho-
Monspeliense. Rai. Europ. \times jas mas angostas.
 213. \times

Cast. *Potentilla* con pelo rígido.

Habita en Mompeller y Silesia: en los Pirineos de Cata-
 luña, Aragon y otras partes de España. \mathcal{L}

Tiene cinco ó siete *hojas radicales*; cinco en el *tallo*, to-
 das alternas, casi lineares, y con tres ó cinco dientes:
 y el *tallo*, *pedunculos* y *cálices* muy pelosos.

Stipu- 15. *POTENTILLA foliis* \times *Potentilla* con hojas de sie-
laris. septenatis sessilibus, stipu- \times te en rama, sin peciolo, y
la dilatatae insidentibus. \times sentadas en una estipula en-
 Gmel. Sib. 3. p. 185. t. 37. \times sanchada.
 f. 2. \times

Cast. *Potentilla* estipular.

Habita en la Siberia. \mathcal{L}

Posee el *tallo* ascendente, filiforme, liso y dividido en su
 re-

remate: las *estipulas* que abrazan el tallo, solitarias y escotadas: ocho ú nueve *hojuelas* entre lineares y lanceoladas, algo aserradas, lampiñas, y que cuelgan sin peciolo de la escotadura de la *estipula*.

- Opaca. 16. *POTENTILLA foliis radicalibus quinatis cuneiformibus serratis, caulinis suboppositis, ramis filiformibus decumbentibus*. Amœn. Acad. 4. p. 274. Potentila con las hojas radicales de cinco en rama, (*hojuelas*) en forma de cuña, aserradas, las del tallo casi opuestas; las ramas filiformes, echadas y tendidas.
- Quinquefolium minus, repens, lanuginosum, luteum*. C. B. P. 325. Tourn. p. 297. Quinquefolio menor, ras-trero, lanuginoso; y con flor amarilla.
- Pentaphyllum minus, molli lanugine pubescens, flore luteo*. Bauh. hist. 2. p. 598. Pentaphylo menor, vello-so con pelusa blanda; y de flor amarilla.
- Quinquefolio similis, enneaphyllos, hirsuta*. C. B. P. 325. Prodr. 139. Planta semejante al Quin-quefolio, de nueve *hojuelas*, y con pelo áspero.

Cast. Potentila opaca.

Habita en Austria, Suiza y Alemania: en los montes de Burgos y Asturias. 24

- Verna. 17. *POTENTILLA foliis radicalibus quinatis acute serratis retusis: caulinis ternatis, caule declinato*. Scop. carn. ed. 2. n. 621. Potentila con hojas radi-cales de cinco en rama, agu-damente aserradas, termina-das en seno obtuso y las del tallo, que es declinado, de tres en rama.
- Fragaria caule decum-bente, foliis quinatis, serratis, subhirsutis*. Hall. helv. n. 1119. Fresera con el tallo ten-dido; hojas de cinco en ra-ma, aserradas, y con algun pelo áspero.
- Fragaria foliis ternatis quinatisque subtus canis, caulinis ternatis*. Crantz. Austr. p. 74. n. 6. t. 1. f. 1. Fresera con hojas de tres y de cinco en rama, por de-baxo canas, y las del tallo de tres en rama.

Quinquefolium minus, repens, luteum. C. B. P. 325. X Quinquefolio menor, rastrero y con flor amarilla.
Tourn. p. 297.

Pentaphyllum parvum, hirsutum. Bauh. hist. 2. p. 598. X Pentaphylo pequeño, con pelo áspero.

Cast. *Potentilla* de primavera.

Habita entre pastos secos de Europa: en la Alcarria, Aragón, Cataluña y otras partes de España. 26

Varía con una mancha de color amarillo-roxo en la base de los *petalos*, ó sin ella.

Aurea. 18. *POTENTILLA foliis radicalibus quinatis serratis acuminatis, caulinis ternatis, caule declinato.* Amœnit. Acad. 4. p. 316. Oed. dan. t. 114. X *Potentilla* con las hojas radicales de cinco en rama, aserradas, puntiagudas, las del tallo de tres en rama; y este declinado.

Fragaria caule reclinato, foliis quinatis, serratis. Hall. helv. n. 1122. t. 21. X *Fresera* con el tallo reclinado; hojas (*hojuelas*) de cinco en cinco y aserradas.

Potentilla foliis marginericeis acute serratis, caule declinato. Gerard. prov. 468. X *Potentilla* con hojas como seda por su margen, agudamente aserradas; y tallo declinado.

Quinquefolium III. aureo flore. Clus. hist. 2. p. 105. X *Quinquefolio* tercero, con flor de color de oro.

Quinquefolium alpinum, splendens, aureo flore. Bauh. hist. 2. p. 398. Hall. R. X *Quinquefolio* alpino, reluciente, con la flor de color de oro.

Quinquefolium minus, repens, alpinum, aureum. C. B. P. 325. Tourn. p. 297. X *Quinquefolio* alpino, menor, rastrero, con la flor de color de oro.

Cast. *Potentilla* de color de oro.

Habita en los alpes de Suiza, Austria, Dinamarca y Suecia. 26

Varía con una mancha de color amarillo-roxo en el disco de la *flor*, ó sin ella. Se diferencia de la *Potentilla* de primavera en quanto es mayor, y mas pelosa, señaladamente en el caliz; y en quanto las *hojas florales* se ha-

hallan mas evidentemente opuestas. *Scopoli* la tiene por variedad de la *Potentilla de primavera*.

- Canadensis. 19. **POTENTILLA foliis** X Potentilla con hojas de cinco
quinatis villosis, caule ad- X co en rama, vellosas; tallo
scendente hirsuto. X ascendente, y con pelo áspero.
- Quinquefolium Canadense, humilius.* Moris. hist. 2. X Quinquefolio mas baxo, del Canadá.
 p. 188. X

Cast. *Potentilla Canadense.*

Habita en el Canadá. Kalm.

Su traza es como la de la *Fresera*. Echa las *hojas radicales* de cinco en rama: las *hojuelas* aovadas al revés, agudamente aserradas, vellosas por encima, y por debajo con pelillos blancos como seda: los *peciolos* con mucho pelo blanco y áspero: el *tallo* muy baxo, ramoso; con *hojas* claras: y las *corolas* amarillas. Es semejante á la *Potentilla de primavera*, de la qual se diferencia por las *hojas* muy pelosas, agudamente aserradas, casi redondas; y por el *tallo* con mucho pelo áspero.

- Alba. 20. **POTENTILLA foliis** X Potentilla con hojas de cinco
quinatis apice conniventi- X co en rama, aserradas por su
serratis, caulibus filiformi- X remate donde se cierran; tallos
bus procumbentibus, recept- X filiformes, tendidos; y
aculis hirsutis. Jacq. Austr. X receptáculos con pelo áspero.
 t. 115.

Quinquefolium majus, album, alterum. C. B. P. 325. X Otro Quinquefolio mayor, con la flor blanca.
 Tourn. p. 297.

Quinquefolium album, X Quinquefolio menor, de
minus. C. B. P. 325. Prodr. X flor blanca.
 139. Tourn. p. 297.

Quinquefolium majus, albo flore. Clus. hist. 2. p. X Quinquefolio mayor, con la flor blanca.
 105. X

Cast. *Potentilla blanca.*

Habita en los alpes de Stiria, Austria, Pannonia y en las

selvas de Alemania : en Aragon y otras partes de España. ℥

Caulis
cens.

21. POTENTILLA *foliis*

quinatis apice conniventi-serratis, caulibus multifloris decumbentibus, receptaculis hirsutis. Amœnit. Acad. 4. p. 317. Jacq. Austr. t. 220.

Fragaria foliis ovatis, acute serratis, oris sericeis, pappo disci longissimo. Hall. helv. n. 1123.

Quinquefolium album, majus. Bauh. Prodr. 139. *caulescens.* C. B. P. 325. Tourn. p. 217.

Quinquefolium album, minus, alterum. C. B. P. 325. Tourn. p. 297.

Quinquefolium II. minus, albo flore. Clus. hist. 2. p. 105.

Potentila con hojas de cinco en rama, aserradas en su remate por el qual se cierran; tallos de muchas flores, tendidos; y receptáculos con pelo áspero.

Fresera de hojas aovadas, agudamente aserradas, como de seda por sus orillas; y vilano del disco muy largo.

Quinquefolio mayor, con la flor blanca. . . y que arroja tallos.

Otro Quinquefolio menor, de flor blanca.

Quinquefolio segundo, menor, con la flor blanca.

Cast. Potentila que entallece.

Habita en los alpes de Suiza, Austria y Stiria. ℥

Tiene los cálices con pelo áspero y de color purpúreo.

Nitida.

22. POTENTILLA *foliis*

subternatis tomentosis conniventi-tridentatis, caulibus unifloris, receptaculis lanatis. Syst. veg. 398.... *foliis quinatis...* Amœn. Acad. 4. p. 316.

Heptaphyllum argenteum, alpinum, trifoliatum, sabaudum. Bocc. mus. 2. p. 20. t. 9.

Potentila con hojas casi de tres en rama, tomentosas, con tres dientes, que se cierran; tallos de una flor; y receptáculos lanudos.... con hojas de cinco en rama.

Planta de los alpes de Saboya, de color de plata, con hojas de siete y de tres en rama.

Trifolium alpinum, argenteum, Persici flore. C. B. P. 328. Trifolio alpino, de color de plata; con flor como la del Persico.

Fragaria alpina, major, foliis argenteis, acutis, vel obtusis, flore roseo. Tourn. p. 296. Fresera alpina, mayor, con hojas de color de plata, agudas ú obtusas; y flor como la de la Rosa.

Comaroides alpina, argentea, Persici flore. Segui. ver. I. p. 497. Planta parecida al Comarero, alpina, de color de plata; y con flor como la del Persico.

Cast. *Potentilla lustrosa.*

Habita en el monte Baldo. Segui. 2

Advierte el *D. Turre* que esta especie tiene las *hojas* de tres en rama; pero *Linneo* poseyó algunos exemplares con las *hojas* de abaxo solamente, de cinco en rama.

Val- 23. *POTENTILLA foliis septenatis obovatis serratis tomentosis, caule erecto, petalis calyce brevioribus, receptaculis lanatis.* Valderia. Potentilla con hojas de siete en rama, aovadas al revés, aserradas, tomentosas; tallo derecho; petalos mas cortos que el caliz; y receptáculos lanudos.

Cast. *Potentilla Valderia.*

Habita en los Alpes Valderianos. 2

Tiene las *hojas* radicales de siete en siete: las *hojuelas* aovadas al revés, dobladas, aserradas y muy tomentosas por debaxo: el *tallo* derecho, con pocas hojas de tres en rama: las *flores* ahorquilladas, corimbosas y amontonadas: los *petalos* blancos y mas cortos que el caliz.

Rep- 24. *POTENTILLA foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris.* Fl. Suec. 466. Mat. Med. 151. Potentilla con hojas de cinco en rama; tallo rastrero; y pedunculos de una flor.

Fragaria foliis quinatis, serratis, petiolis unifloris, caule reptante. Hall. helv. n. 1118. Fresera con hojas de cinco en rama, aserradas; piecitos de una flor; y tallo rastrero.

Quinquefolium majus, re-
pens. C. B. P. 325. Tournef. X Quinquefolio mayor, ras-
P. 297. X trero.

Quinquefolium majus, lu-
teum. Fuchs. hist. 624. X Quinquefolia mayor, con
X la flor amarilla.

Cast. *Potentilla rastrera. vulgo*: Cinco en rama.

Habita en lugares arcillosos y abrigados de Europa: en las orillas de los arroyuelos de los contornos de Madrid; y es muy frecuente en las mas provincias de España. 24

PROPIED. *La raiz es astringente y vulneraria: se usa en la disenteria y calenturas intermitentes.*

ESPECIES CON HOJAS DE TRES EN RAMA.

Mons-
pelien-
sis. 25. **POTENTILLA foliis** X *Potentilla* con hojas de tres
ternatis, caule ramoso erecto, pedunculis supra genicula enatis. Hort. ups. 134. X en rama; tallo ramoso, dere-
X cho; y pedunculos nacidos
X sobre los nudos.

Pentaphylloides majus,
erectum, flore luteo. Moris. X Pentaphyloide mayor, de-
X recho, con la flor amarilla.
hist. 2. p. 193. sect. 2. t. 20.
f. 2.

Pentaphylloides Fraga-
riae folio. Magn. monsp. 304. X Pentaphyloide con hoja
X como la de la Fresera.

Fragaria sterilis, alpina,
caulescens. Boerh. Lugdb. 1. X Fresera estéril, alpina, que
X arroja tallos.
p. 42.

Cast. *Potentilla* de Mompeller.

Habita en Mompeller: y en los Pirineos de España. ☉
Posee las *hojuelas* aovadas, con aserraduras obtusas é iguales.

Norue-
gica. 26. **POTENTILLA foliis** X *Potentilla* con hojas de tres
ternatis, caule dichotomo, X en rama; tallo ahorquillado;
pedunculis axillaribus. Oed. X y pedunculos axilares.
dan. t. 171. X

Fragaria foliis ternatis, hirsutis, caulinis tripartitis, stipulis ovato-lanceolatis. Hall. helv. n. 1115 ?

Fresera con hojas de tres en rama, con pelo áspero; las del tallo divididas en tres partes; y estipulas entre aovadas y lanceoladas.

Potentilla foliis ternatis, caule corymboso erecto. Flor. Suec. 420. 457.

Potentila con hojas de tres en rama; tallo corimboso y derecho.

Potentilla foliis ternatis incisís, caule diffuso. Flor. Lapp. 211.

Potentila con hojas de tres en rama, cortadas; y tallo difuso.

Quinquefolium hirsutum, luteum, paucioribus laciniis. Loes. prus. 218. t. 70.

Quinquefolio con pelo áspero, flor amarilla; y de menos lacinias.

Cast. Potentila de Noruega.

Habita en los campos de Noruega, Suecia, Prusia, Siberia y del Canadá. ☉

Tiene las *hojuelas* lanceoladas, aserradas, y con dientes.

Nivea. 27. *POTENTILLA foliis ternatis incisís subtus tomentosis, caule adscendente.* Gunn. noru. n. 512. t. 3. f. 1.

Potentila con hojas de tres en rama, cortadas, tomentosas por debaxo; y tallo ascendente.

Potentilla foliis ternatis, utrinque hirsutis, infra candidis, foliolis ovatis, serratis. Gmel. Sib. 3. p. 183. t. 36. f. 1.

Potentila con hojas de tres en rama, con pelo áspero en una y otra parte, cándidas por debaxo; hojuelas aovadas y aserradas.

Potentilla foliis ampliter crenatis, subtus tomentosis. Hall. goet. 2. p. 108.

Potentila de hojas con festones anchos, y por debaxo tomentosas.

Cast. Potentila de color de nieve.

Habita en los Alpes de Laponia y Siberia.

Su *estructura* es como la *Potentila de primavera*; pero tiene las *hojas* como las de la *Potentila de color de plata*; aunque de tres en tres, y mas anchas, con mas pelo áspero, por debaxo tomentosas y de color de nieve: con la *corola* amarilla.

Gran-
diflora.

28. *POTENTILLA foliis ternatis dentatis utrinque subpilosis, caule decumbente foliis longiore.* Mill. dict. n. 8. Potentila con hojas de tres en rama, dentadas, algo pelosas en una y otra parte; tallo tendido y mas largo que las hojas.

Fragaria foliis ternatis, sericeis, caule declinato, petalis calycem superantibus. Hall. helv. 1114. t. 21. Fresera con hojas de tres en rama, con vello como seda; tallo declinado; y petalos que superan al caliz.

Potentilla foliis ternatis, dentatis utrinque subvillosis & viridibus, ovatis, serratis, obtusis. Gmel. Sib. 3. p. 183. n. 32. t. 35. f. 1. 2. Potentila con hojas de tres en rama, dentadas, algo vellosas y verdes por una y otra parte, aovadas, aserradas y obtusas.

Potentilla foliis ternatis, dentatis, caule superne dichotomo, petalis calyce duplo longioribus. Gerard. prov. 409. Potentila con hojas de tres en rama, dentadas; tallo ahorquillado por arriba; y petalos al doble mas largos que el caliz.

Fragaria sterilis, amplissimo folio & flore, petalis cordatis. Vaill. paris. 55. t. 10. f. 1. Fresera estéril, con hoja y flor muy anchas; y petalos de figura de corazon.

Cast. Potentila de flor blanca.

Habita en la Siberia, Suiza y Pirineos. ☉

Tiene las hojas de un mismo color en ambas superficies: los tallos del largo de un pie, ascendentes y de color que tira á rubio.

Sub-
caulis.

29. *POTENTILLA foliis ternatis dentatis utrinque tomentosis, scapo decumbente.* Gmel. Sib. 3. p. 183. n. 34. t. 36. f. 2. Potentila con hojas de tres en rama, dentadas, tomentosas por una y otra parte; y escapo tendido.

Potentilla foliis radicalibus ternatis, dentatis, utrinque tomentosis, caulibus subfoliosis. Gerard. prov. 469. Garid. prov. 190. t. 37. Potentila con hojas radicales de tres en rama, dentadas, tomentosas por una y otra parte; y tallos con algunas hojas.

262 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Fragaria sterilis, sylvestris, sericea seu incana. Mo-
ris. hist. 2. p. 187. Tourn. p. 296. X *Fragaria* estéril, silvestre, como si fuese de seda ó blanquecina.

Fragariae affinis, sericea, incana. C. B. P. 327. Prodr. 139. X Planta parecida á la *Fresera*, con vello como seda y blanquecina.

Cast. *Potentilla* casi sin tallo.

Habita en la Siberia, Provenza, Francia austral: y en Granada. 24

Echa las *hojas* de tres en rama, rugosas, con tomento espeso, pelosas, correosas, en forma de cuña, obtusas y dentadas: las *estipulas* anchas, agudas y pelosas: el *tallo* ó *escapo* tendido, mas largo (las mas veces) que las hojas, con una ó dos flores: la *corola* muy grande, amarilla; con los *petalos* escotados, de color amarillo-roxo por su base; y los *estambres* amarillos.

772. Género TORMENTILLA. * *Tourn. t. 153.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, plano, hendido en ocho laciniyas, alternadamente mas pequeñas y mas agudas.

COR. *Petalos* quatro, de figura de corazon al revés, planos, extendidos é insertos por sus uñas en el caliz.

ESTAMB. *Filamentos* diez y seis, alesnados, la mitad mas cortos que la corola, y prendidos en el caliz: con las *anteras* sencillas.

PIST. *Gérmenes* ocho, pequeños, acercados en cabezuela: *estilos* filiformes, de la longitud de los estambres é insertos en el lado del germen: con los *estigmas* obtusos.

PERIC. ninguno. *Receptáculo* de las semillas muy pequeño, cargado de simientes, y encerrado en el caliz.

SEM. ocho, casi redondas y desnudas.

OBS. La *Tormentila*, solo en el número, se diferencia de la *Potentilla*; por cuya razon podrian estos dos géneros reducirse á uno.

La flor es rosácea ó que consta de quatro petalos puestos en cerco ; de cuyo caliz, de una pieza, hendido en muchas partes, y en forma de bacía, sale el pistilo que pasa á fruto casi globoso, en el qual se recogen muchas simientes, formando una cabezuela y envueltas en el mismo caliz. A estas notas se añaden las de tener mas de tres hojas sentadas en lo alto del piececito.

ESPECIES.

- Erecta 1. **TORMENTILLA** *caule erectiusculo, foliis sessilibus.* Fl. dan. t. 589. Knorr. del. 2. t. T. 1. Mat. Med. 151. Tormentilla. Cam. epit. 685. Dod. pempt. 118. Bauh. hist. 2. p. 598. Tormentila con el tallo alto derecho ; y las hojas sin peciolo.
- Fragaria tetrapetala, foliis caulinis sessilibus, quinatis.* Hall. helv. n. 1117. Fresera de quatro petalos, con hojas del tallo sentadas, y de cinco en rama.
- Tormentilla sylvestris.* C. B. P. 326. Tourn. p. 298. Tormentila silvestre.
- Cast. Tormentila derecha.
 Habita en Europa entre pastos : en la Alcarria, Aragon, Asturias, Cataluña y otras muchas partes de España. ¶
 Varía con las hojas de tres en rama.
 PROPIED. La raiz es astringente, diuretica, y se usa en la diarrea, disenteria, hematuria, &c.
- Rep- 2. **TORMENTILLA** *caule tante. le repente, foliis petiolatis.* Huds. Angl. 197. Tormentila con el tallo rastrero ; y hojas pecioladas.

264 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Pentaphyllum minus, *viride*, *flore aureo*, *tetrapetalo*, *radiculas in terram e geniculis demittens*. Moris. hist. 2. p. 190. Pentaphylo menor, verde, con la flor de color de oro, de quatro petalos; y que echa raices por sus nudos.

Pentaphyllum reptans, *alatum*, *foliis profundius serratis*. Plot. Oxf. 6. §. 7. t. 9. f. 5. Pentaphylo rastrero, alado, con hojas mas profundamente aserradas.

Tormentilla radice reptante. Tourn. p. 298. Tormentila con la raiz rastrera.

Cast. Tormentila rastrera.

Habita en Inglaterra. 2

773. Género GEUM. * Caryophyllata. Tourn. t. 151.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, derecho, hendido en diez lacinias, alternadamente muy pequeñas y agudas.

COR. *Petalos* cinco, redondos, con uñas angostas, del largo del caliz é insertos en él.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos, alesnados, de la longitud del caliz, y prendidos en él: con las *anteras* cortas, algo anchas y obtusas.

PIST. *Gérmenes* numerosos, recogidos en cabezuela: *estilos* prendidos en el lado del germen, pelosos y largos: con los *estigmas* sencillos.

PERIC. ninguno. *Receptáculo comun de las semillas* oblongo, con pelo áspero, y puesto sobre el caliz redoblado.

SEM. numerosas, comprimidas y erizadas; con el *estilo* largo, nudoso, y en forma de arista.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 294.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco, y que salen de las divisiones del caliz, que es de una pieza, y en forma de bacía; de cuyo centro se alarga el pistilo, que pasa á fruto casi globoso, en el qual se recogen muchas semillas con cola.

ESPECIES.

Vir-
ginia -
num.

I. GEUM *floribus nutantibus, petalis calyce minoribus, fructibus globosis, aristis uncinatis nudis, foliis ternatis.* Geo de flores inclinadas; petalos menores que el caliz; frutos globosos, con aristas ganchosas, desnudas; y hojas de tres en rama.

Geum foliis inferioribus quinatis, pinnis rhomboidibus, rariter incisís, superioribus ternatis, stipulis oblongis, amplis, laciniatis, confluentibus, seminibus pilosis arista nuda. Murray, comm. nov. Goett. tom. 5. p. 32. t. 3. Geo con las hojas inferiores de cinco en rama; las hojuelas romboydes, raramente cortadas: las superiores de tres en rama; estipulas oblongas, anchas, laciniadas, que unidas se escurren; y semillas pelosas, con su arista desnuda.

Caryophyllata Virginiae, albo flore, minore, radice inodora. Herm. par. III. t. III. Tourn. p. 295. Caryophyllata de Virginia, con la flor blanca, mas pequeña; y raiz sin olor.

Cast. Geo de Virginia.

Habita en la Virginia y Siberia. 24

Es semejante al *Geo domestico*; pero se diferencia por los petalos blancos y mas cortos que el caliz: por las flores inclinadas, mientras están en la fructificacion: por los pedunculos encrasados ácia la flor: por las semillas pelosas; y por las hojas radicales casi dos veces pinnadas.

Produce los petalos ó iguales ó poco mayores que el caliz y muy blancos: las semillas manifiestamente pelosas; pero con su arista desnuda, como ya lo observó Willich. illustr. p. 20. El *Geo Canadense*, Jacq. hort. t. 175., á el qual se le ha añadido el nombre de *Caryophyllata Canadensis Agrimoniae foliis.* Hort. reg. paris., se parece mucho á la planta que Linneo llama *Geum Virginianum.* Murray. loco citato. R.

Urbana.

2. GEUM *floribus erectis, fructibus globosis villosis, aristis uncinatis nudis, foliis lyratis.* Mat. Med. 152. y hojas liradas.
Fl. dan. t. 672.

Geum foliis pinnatis, pinnula ultima trilobata, floribus patulis, tubis aduncis. Hall. helv. n. 1130. Geo de hojas pinnadas, con la última hojuela hendida en tres lóbulos; flores abiertas; y estilos ganchosos.

Geum foliis inferioribus quinatis, superioribus ternatis, supremis simplicibus, stipulis subrotundis, distinctis, trilobis, seminibus hispidis, arista nuda. Murray. in nov. comm. Goett. 5. p. 33. t. 4. A. Geo con las hojas inferiores de cinco en rama, las superiores de tres en rama, y las de mas arriba sencillas; estipulas casi redondas, separadas, hendidas en tres lóbulos; y semillas erizadas con la arista desnuda.

Caryophyllata Urbana. Scop. carn. ed. 2. n. 628. Caryophyllata Urbana ó doméstica.

Caryophyllata vulgaris. C. B. P. 321. Tourn. p. 294. Caryophyllata vulgar.

Caryophyllata vulgaris, flore parvo, luteo. Bauh. hist. 2. p. 398. Caryophyllata vulgar, con la flor pequeña y amarilla.

Caryophyllata. Dod. pempt. 137. Caryophyllata.

Cast. Geo doméstico.

Habita en lugares sombríos de Europa: en los bosques de los Reales Sitios de San Ildefonso y del Escorial: en los del Paular de Segovia: en Cataluña, Aragon, Alcarria y otras muchas partes de España. ¶

Tiene las *hojas radicales* liradas; y las *estipulas* con dientes.

PROPIED. *Toda la planta es astringente, antácida y expectorante: se usa en las viruelas, disenteria, y calenturas intermitentes.*

- Rivale 3. *GEUM floribus nutantibus, fructu oblongo, aristis plumosis tortis*. Mat. Med. 152. Flor. dan. t. 722. Geo de flores inclinadas; fruto oblongo, con aristas plumosas y torcidas.
- Geum foliis pinnatis, pinnis acutis, extrema maxima, trilobata, floribus conniventibus, nutantibus*. Hall. helv. n. 1129. Geo de hojas pinnadas, con hojuelas agudas, la extrema muy grande, hendida en tres lóbulos; flores que se cierran é inclinadas.
- Caryophyllata rivalis*. Scop. carn. 2. n. 629. Caryophyllata de riachuelos.
- Caryophyllata aquatica, nutante flore*. C. B. P. 321. Tourn. p. 295. Caryophyllata aquatica, con la flor inclinada.
- Caryophyllata aquatica, flore rubro, striato*. Bauh. hist. 2. p. 298. Caryophyllata aquatica, con la flor roxa y estriada.
- ^α *Caryophyllata aquatica, altera*. C. B. P. 322. Tourn. p. 295. Otra Caryophyllata aquatica. α
- Caryophyllata montana, tertia*. Clus. hist. 2. p. 104. Caryophyllata montana, tercera.

Cast. Geo de riachuelos.

Habita en prados algo húmedos de Europa: en Bustarviejo, Cartuja del Paular de Segovia, montes de Avila, Cataluña, Aragon y otras partes de España. 2f

Tiene el extremo de la arista peloso.

PROPIED. Es astringente, antácida: y se usa en las calenturas intermitentes.

- Mon- 4. *GEUM flore inclinato* Geo de flor inclinada, solitario, fructu oblongo, aristis villosis rectis. Jacq. solitaria; fruto oblongo, con aristas vellosas y rectas.
- Austr. t. 373.
- Geum foliis pinnatis, extrema maxima, rotundo-cordata*. Hall. helv. n. 1131. Geo de hojas pinnadas, con la hojuela extrema muy grande, entre redonda y de figura de corazon.

- Caryophyllata alpina*, lutea. C. B. P. 322. Tourn. p. 295. Caryophylata alpina, con flor amarilla.
- Caryophyllata montana*, flore luteo, magno. Bauh. hist. 2. p. 398. Caryophylata montana, con la flor amarilla y grande.
- Caryophyllata montana*. Dod. pempt. 137. Cam. epit. 727. Caryophylata montana.
- Caryophyllata alpina*, minor. C. B. P. 322. Prodr. 139. Tourn. p. 295. Caryophylata alpina, menor. α
- Caryophyllata alpina*, minima, flore aureo. Barr. rar. 588. t. 399. Caryophylata alpina, muy pequeña, con la flor de color de oro.

Cast. Geo montano.

Habita en los alpes de Suiza, de Austria, Silesia y del Delfinado: en las barrancas del carbon, mas allá del Real Sitio del Pardo: en los montes de Avila, Pirineos, Aragon, Cataluña y otras partes de España. $\frac{h}{2}$
 Posee las hojas con pelo áspero: la flor abierta: el tallo de una flor: los petalos amarillos y escotados.
 Varía con la flor derecha. Crantz. R.

Rep-
tans.

5. GEUM foliis uniformibus incisís; alternis minoribus, flagellis reptantibus. Geo con hojuelas uniformes, cortadas, alternadamente menores; y vástagos rastreros.
- Geum foliis pinnatis, trilobatis, incisís, flagellis foliosis*. Hall. helv. n. 1132. Geo con hojas pinnadas, hendidas en tres lóbulos, cortadas; y vástagos foliosos.
- Caryophyllata alpina, Apii folio*. C. B. P. 322. Tourn. p. 395. Caryophylata alpina, con hoja como la del Apio.
- Caryophyllata alpina, tenuifolia, incana, flore luteo, longius radicata*. Barr. rar. 589. t. 400. Bocc. mus. 160. t. 128. Caryophylata alpina, con hoja delgada, blanquecina; flor amarilla; y raiz mas profunda y extendida.

Cast. Geo rastrero.

Ha-

Habita en Suiza, y en el valle Barcionense.

Tiene los tallos de una flor, y apenas mas largos que las hojas.

774. Género DRYAS. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, partido en cinco ú ocho laciniás, extendidas, lineares, obtusas, iguales, y pocas mas cortas que la corola.

COR. *Petalos* cinco ú ocho, oblongos, escotados, extendidos é insertos en el caliz.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos, capilares, cortos y prendidos en el caliz: con las *anteras* pequeñas.

PIST. *Gérmenes* muchos, amontonados, pequeños: *estilos* capilares, insertos en el lado del germen: con los *estigmas* sencillos.

PERIC. ninguno.

SEM. numerosas, casi redondas, comprimidas y adornadas con estilos larguissimos que llevan lana.

ESPECIES.

Penta-
petala. 1. DRYAS *floribus pentapetalis, foliis pinnatis.* Dryas con flores de cinco petalos; y hojas pinnadas.

Amoen. Acad. 2. p. 353.

Gmel. Sib. 3. p. 187. n. 43.

Caryophyllata pentaphylla. Caryophyllata de cinco hojuelas.

Bauh. hist. 2. p. 398.

quoad solam figuram.

Cast. Dryas de cinco petalos.

Habita en Camschatka. 2

Octo-
petala. 2. DRYAS *floribus octopetalis, foliis simplicibus.* Dryas con flores de ocho petalos; y hojas sencillas.

Flor. Lapp. 215. Hort. Cliff.

195. Gmel. Sib. 3. p. 188.

Dryas floribus octopetalis, foliis ovatis, subtus albissimis. Dryas con flores de ocho petalos; hojas aovadas, y muy blancas por debaxo.

Cha-

270 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

<i>Chamædrys tertia</i> , sive	X	<i>Chamedrys tercera</i> , ó mon-
<i>montana</i> . Clus. hist. 2. p. 325.	X	tana.
<i>Caryophyllata alpina</i> , Cha-	X	<i>Caryophyllata alpina</i> , con
<i>mædryos folio</i> . Tourn. p. 295.	X	hoja como la del <i>Chamedrys</i> .
<i>Chamædrys alpina</i> , Cisti	X	<i>Chamedrys alpina</i> , con
<i>flore</i> . C. B. P. 248.	X	flor como la de la Xara.
<i>Leucas Chamædrys alpi-</i>	X	<i>Chamedrys alpina</i> , lla-
<i>na</i> . Oed. dan. t. 31.	X	mada <i>Leucas</i> .

Cast. Dryas de ocho petalos.

Habita en los alpes de Laponia, Suiza, Austria, Saboya, Hibernia, Siberia y de Alemania: y es comun en las cumbres de los Pirineos de Cataluña, señaladamente en el término del lugar de Setcasas. 24

Tiene seis, ocho y hasta diez *petalos*; y rara vez cinco. *Crantz.*

775. Género COMARUM. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, muy grande, de color, extendido, persistente, y hendido en diez lacinias, alternadamente menores y mas baxas.

COR. *Petalos* cinco, oblongos, puntiagudos, tres veces mas pequeños que el caliz, en el qual están insertos.

ESTAMB. *Filamentos* veinte, alesnados, insertos en el caliz, del largo de la corola, y persistentes: con las *anteras* á manera de media luna y que se caen facilmente.

PIST. *Gérmenes* numerosos, casi redondos, muy pequeños, y recogidos en cabezuela: *estilos* sencillos, cortos, y que salen del lado del germen: con los *estigmas* sencillos.

PERIC. ninguno. *Receptáculo comun de las semillas* aovado, carnoso, muy grande y persistente.

SEM. numerosas, puntiagudas, y que cubren al receptáculo.

ESPECIE.

Pa-lustrc.

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>I. COMARUM. Fl. Lap.
 214. Hort. Cliff. 195. Flor.
 dan. t. 636.
 <i>Fragaria foliis pinnatis,</i>
 <i>petalis lingulatis, minimis.</i>
 Hall. helv. n. 1128.
 <i>Pentaphylloides palustre,</i>
 <i>rubrum.</i> Tourn. p. 298.
 <i>Quinquefolium palustre,</i>
 <i>rubrum.</i> C. B. P. 326.
 <i>Quinquefolium palustre,</i>
 <i>sive aquaticum.</i> Tabern. ic.
 122. Cord. hist. 95.</p> | <p>Comaro palustre.
 Fresera con hojas pinna-
 das; y petalos á manera de
 lenguetas muy pequeñas.
 Pentaphyloide palustre,
 con la flor roxa.
 Quinquefolio palustre, con
 la flor roxa.
 Quinquefolio palustre, ó
 aquatico.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cast. Comaro palustre.

Habita en lugares sumideros de Europa. 24

776. Género CALYCANTHUS. † Beureria. Euret.

Butneria. Duham. Basteria. Miller.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, á manera de jarrito, y escamoso, con hojuelas de color, lanceoladas, las superiores gradualmente mayores y que parecen petalos.

COR. ninguna; sino que sean las hojuelas interiores del caliz.

ESTAMB. Filamentos numerosos, alesnados, é insertos en el cuello del caliz: con las anteras oblongas, asurcadas, é insertas en el ápice de los filamentos.

PIST. Gérmenes muchos, que rematan en estilos alesnados, comprimidos, y del largo de los estambres: con los estigmas glandulosos.

PERIC. ninguno. El caliz encrasado y aovado al revés se reduce á baya.

SEM. muchas y con cola.

E S P E C I E S.

- Flori- 1. CALYCANTHUS pe- X Calycanθο con los petalos (ó sean lacinias del caliz) interiores mas largos.
 dus. *talis interioribus longioribus.* X
Butneria Anemones flore. X Butneria con flor de Anemone.
 Duham. arb. 1. p. 114. t. 45. X
Basteria foliis ovatis, oppositis, floribus lateralibus, caule fruticoso, ramoso. X Basteria con hojas aovadas, opuestas; flores laterales; tallo fruticoso y ramoso. dict. & ic. t. 60.
Beureria petalis coriaceis, oblongis, calycis foliolis reflexis. X Beureria con petalos correosos, oblongos; y hojuelas del caliz redobladas. Ehret. pict. t. 13.
Frutex Corni foliis, floribus instar Anemones stellatæ, petalis crassis, rigidis, colore sordide rubente, cortice aromatico. X Arbusto con hojas como las del Corno; flores al modo que las de la Anemone estrellada; petalos crasos, rígidos, de color roxo obscuro; y corteza aromática. Catesb. car. 1. p. 46. t. 46.

Cast. Calycanθο florido.

Habita en la Carolina. \hbar

Catesbi introduxo esta especie en Europa.

- Præ- 2. CALYCANTHUS pe- X Calycanθο con petalos (ó
 COX. *talis inferioribus minutis.* * X sean lacinias del caliz) inferiores menudos.
Abai seu Robai. X Abai ó Robai. Kœmpf. Amœn. 878. t. 879. X

Cast. Calycanθο temprano.

Habita en el Japon. \hbar

Confiesa Linneo que no conoció esta especie, y que parece ser del género precedente; pero de diversa especie en quanto florece antes que eche las hojas, y en quanto las lacinias inferiores del caliz amarillas y mas pequeñas se reputan por petalos.

CLASE XIII.

POLYANDRIA. DE LAS FLORES HERMAFRODITAS CON VEINTE
Ó MAS ESTAMBRES INSERTOS EN EL
RECEPTACULO.

ORDEN I.

MONOGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO.

FLORES DE UN SOLO PETALO.

Géneros.

Caracteres sobresalientes.

- 777 MARCGRAVIA. . . CALIZ de seis hojuelas, apifiado: *corola* de un petalo, cerrada, en forma de caliptra ó sea cofia: *baya* de muchas celdillas, y con muchas simientes.
- 813 TERNSTROMIA. *Suppl. p. 39.* CALIZ de una pieza, dividido en cinco partes: *corola* de un petalo, partida en cinco ó seis lacinias, globosa, y á manera de campana: *baya* acorchada, de dos celdillas y sin ventallas.
- 814 ALSTONIA. *Suppl. p. 39.* CALIZ baxo del germen, apifiado: *corola* hendida en ocho ó diez lacinias, alternadas ó sea puestas en dos series.

FLORES DE TRES PETALOS.

- 778 TRILIX. CALIZ de tres hojuelas: *corola* de tres petalos: *baya* de cinco celdillas y con muchas simientes.

FLORES DE QUATRO PETALOS.

- 815 SPARRMANNIA. *Suppl. p. 41.* CALIZ de quatro ho-
juelas: *corola* de quatro petalos redoblados: *nectarios* muchos, con convexidades: *capsula* angulada, de cinco celdillas y erizada.
- 816 VALLEA. *Suppl. p. 42.* CALIZ de quatro ó cinco ho-
juelas: *petalos* quatro ó cinco, hendidos en tres partes: *estigmas* hendidos en quatro ó cinco lacinias; y *capsula* de dos celdillas.
- 779 RHEEDIA. CALIZ ninguno: *corola* de quatro petalos; y *baya* con tres semillas.
- 794 MAMMEA. CALIZ de dos hojuelas: *corola* de quatro petalos: *baya* muy grande, y de quatro semillas.
- 785 PAPAVER. CALIZ de dos hojuelas: *corola* de quatro petalos: *capsula* de una celdilla, y que se abre por los poros que se hallan debaxo del estigma persistente.
- 784 CHELIDONIUM. CALIZ de dos hojuelas: *corola* de quatro petalos: *siliqua* de una celdilla y linear.
- 780 CAPPARIS. CALIZ de quatro hojuelas correas: *petalos* quatro: *estambres* largos: *baya* corticosa, de una celdilla y con pedunculo.
- 781 ACTÆA. CALIZ de quatro hojuelas: *corola* de quatro petalos: *baya* de una celdilla; y *simientes* medio redondas.
- 787 CAMBOGIA. CALIZ de quatro hojuelas: *corola* de quatro petalos: *poma* de ocho celdillas; y *simientes* solitarias.

- 797 CALOPHYLLUM. . CALIZ de quatro hojuelas , de color : *corola* de quatro petalos ; y *drupa* globosa.
- 796 GRIAS. CALIZ hendido en quatro partes : *corola* de quatro petalos : *stigma* sentado , cruzado ; y *drupa* con nuez de ocho surcos.
- 808 CARYOPHYLLUS. CALIZ de quatro hojuelas , duplicado : *corola* de quatro petalos : *baya* de una semilla , y baxo del caliz.

FLORES CON CINCO PETALOS.

- 817 MYRISTICA. *Suppl. p. 40.* BAYA carnosa , con una semilla : *membrana* reticular , seca , y colocada entre la baya y la semilla.
- 805 LOOSA. CALIZ de cinco hojuelas : *corola* de cinco petalos : *capsula* la mitad debaxo del caliz , de una celdilla , de tres medias ventallas , y con muchas simientes.
- 804 MENTZELIA. CALIZ de cinco hojuelas : *corola* de cinco petalos : *capsula* baxo del caliz , cilindrica , y con muchas simientes.
- 803 VATERIA. CALIZ hendido en cinco partes : *corola* de cinco petalos : *capsula* de tres ventallas , de una celdilla , y tres simientes.
- 792 SLOANEA. CALIZ de cinco hojuelas , que se caen quando las demas partes de la flor : *corola* de cinco petalos : *stigma* agujereado : *baya* corticosa , erizada , con muchas semillas , y que se abre.
- 809 CISTUS. CALIZ de cinco hojuelas , las dos mas pequeñas : *corola* de cinco

- petalos : y *pericarpio* capsula.
- 811 CORCHORUS. CALIZ de cinco hojuelas , que se caen quando las demas partes de la flor : *corola* de cinco petalos : *capsula* de muchas ventallas , y casi con muchas celdillas.
- 789 SARRACENIA. CALIZ doble , de tres y de cinco hojuelas : *corola* de cinco petalos : *capsula* de cinco celdillas : y *estilo* con el estigma escudado.
- 798 TILIA. CALIZ dividido en cinco partes : *corola* de cinco petalos : *baya* seca , globosa , de cinco celdillas , de cinco ventallas , y que se abre por su base.
- 795 OCHNA. CALIZ de cinco hojuelas : *corola* de cinco petalos : *bayas* de una semilla , fixadas en el receptáculo , casi redondo y grande.
- 788 MUNTINGIA. CALIZ dividido en cinco partes : *corola* de cinco petalos : *baya* de cinco celdillas , y cada una con muchas simientes.
- 800 ELÆOCARPUS. CALIZ de cinco hojuelas : *corola* de cinco petalos , lacerados : *antera* de dos ventallas en su ápice ; y *drupa* con la nuez rizada.

NOTA. El *Delphinio consolida* , el *Delphinio Aiacis* y el *Aconito* tienen estos caracteres , y pertenecen al orden *trigynio*.

FLORES CON SEIS PETALOS.

- 786 ARGEMONE. CALIZ de tres hojuelas : *corola* de seis petalos : y *capsula* con medias ventallas.

LA-

- 806 LAGESTROEMIA. . CALIZ en forma de campana, hendido en seis partes: *corola* de seis petalos, rizados: *estambres* muchos, de los quales los seis exteriores son mas crasos, y mas largos que los petalos.
- 807 THEA. CALIZ de cinco ó seis hojuelas: *corola* de seis hasta nueve petalos: y *capsula* de tres frutos.
- 801 LECYTIS. CALIZ de seis hojuelas: *corola* de seis petalos: *nectario* á manera de lengüeta, y que lleva los estambres: *pericarpio* que se abre horizontalmente, y con muchas semillas.

FLORES DE OCHO PETALOS.

- 782 SANGUINARIA. . . CALIZ de dos hojuelas: *corola* de ocho petalos: *siliqua* aovada, y de una celdilla.

FLORES DE NUEVE PETALOS.

- 783 PODOPHYLLUM. . CALIZ de tres hojuelas: *corola* de nueve petalos: *baya* de una celdilla, y coronada con el estigma.

NOTA. El *The* á veces se halla con nueve *petalos*.

FLORES CON DIEZ PETALOS.

- 791 BIXA. CALIZ con cinco dientes: *corola* de diez petalos: *capsula* erizada, y de dos ventallas.

FLORES CON MAS DE DIEZ PETALOS.

790. NYMPHÆA. CALIZ de quatro ó cinco hojuelas: corola de muchos petalos: baya de muchas celdillas y truncada.

818 CHRYSITRIX. *Polyg. diœc.* CABEZUELA LATERAL sencilla: corolas de glumas en hacecillo, relucientes: estambres muchos, mezclados con las glumas. *Dissertatio Botanica illustrans nova Graminum genera.* Daniel Ericus Næzen. ups. 1779.

Flor hermafrodita.

GLUMA de dos ventallas: corola de muchas pajas setáceas: estambres muchos, de uno en uno dentro de cada paja: pistilo uno.

Flor masculina.

Como en la hermafrodita: pistilo ninguno.

FLORES SIN PETALOS.

793 TREWIA. CALIZ de tres hojuelas, encima del germen: corola ninguna: y capsula de tres frutos.

810 PROCKIA. CALIZ de tres hojuelas, ademas de las dos que se hallan en la base: corola ninguna: baya de cinco ángulos, y con muchas semillas.

799 LÆTIA. CALIZ de cinco hojuelas: corola ninguna, ó de cinco petalos: fruto de una celdilla, de tres la-

- 812 SEGUIERIA. CALIZ de cinco hojuelas: *corola* lados; y *semillas* cubiertas con el arilo pulposo.
ninguna: *capsula* de una semilla, terminada en una ala grande, y con alillas laterales.
- 802 DELIMA. CALIZ de cinco hojuelas: *corola* ninguna; y *baya* de dos semillas.

NOTA. La *Crateva marmelos* carece á veces de *petalos*, y pertenece á la clase *dodecandria monogynia*.

ORDEN II.

DIGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOS PISTILOS.

- 821 FOTHERGILLA. *Suppl. p. 42.* CALIZ indiviso, truncado: *corola* ninguna: *germen* hendido en dos partes: *capsula* de dos celdillas, y cada una de dos ventallas.
semillas solitarias y oseas.
- 822 CALLIGONUM. . . . CALIZ de cinco hojuelas: *petalo* ninguno: *estilos* ninguno: *fruto* erizado, y con una semilla.
- 820 CURATELLA. CALIZ de cinco hojuelas: *petalos* quatro: *estilos* dos: *capsula* dividida en dos partes; y de *celdillas* con dos simientes.
- 819 PÆONIA. CALIZ de cinco hojuelas: *petalos* cinco: *estilo* ninguno; y *capsulas* con muchas semillas.

ORDEN III.

TRIGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON TRES PISTILOS.

- 823 DELPHYNIUM. . . . CALIZ ninguno: *petalos* cinco: *nectario* hendido en dos partes, y como cornezuelo por debajo: *siliquas* tres, ó una sola.
- 824 ACONITUM. CALIZ ninguno: *petalos* cinco, el de mas arriba arqueado: *nectarios* dos, con pedunculo, y encorvados ácia atrás: *siliquas* tres, ó cinco.

NOTA. La *Reseda luteola* tiene á veces tres *pistilos*, y pertenece á la clase *dodecandria*.

El *Corcorus æstuans* posee tambien tres *pistilos*, y corresponde al orden *monogynio* de esta clase.

ORDEN IV.

TETRAGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON QUATRO PISTILOS.

- 825 TETRACERA. CALIZ de seis hojuelas: y *capsulas* quatro.
- 826 CARYOCAR. CALIZ dividido en cinco partes: *petalos* cinco; *estilos* comunmente quatro: *drupa* con nueces de quatro surcos y en redcilla.
- 827 CIMICIFUGA. CALIZ de quatro hojuelas: *corola* de quatro *nectarios* como jarritos: *capsulas* quatro; y con *simientes* escamosas.

ORDEN V.

PENTAGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON CINCO PISTILOS.

- 828 AQUILEGIA. CALIZ ninguno: *petalos* cinco: *nectarios* cinco, como cuernozuelos, puestos entre los *petalos*: *capsulas* cinco, y separadas.
- 829 NIGELLA. CALIZ ninguno: *petalos* cinco: *nectarios* cinco, hendidos en tres partes, puestos ácia dentro de la corola: y *capsulas* cinco, unidas.
- 830 REAUMURIA. CALIZ de cinco hojuelas: *petalos* cinco: *capsula* de cinco celdillas, de cinco ventallas, y con muchas simientes.
- 831 BRATHYS. *Suppl. p. 43.* CALIZ de cinco hojuelas: *petalos* cinco: *nectario* ninguno: *capsula* de una celdilla y con muchas simientes.

NOTA. Algunas especies de *Aconito* tienen tambien cinco *pistilos*.

ORDEN VI.

HEXAGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON SEIS PISTILOS.

- 832 STRATIOTES. ESPATA de dos hojuelas: *periantio* hendido en tres partes: *petalos* tres: *baya* de seis celdillas, y debaxo del caliz.

ORDEN VII.

POLYGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON MAS DE SEIS
PISTILOS.

- 833 DILLENIA. CALIZ de cinco hojuelas: *petalos* cinco: *capsulas* de muchas semillas, unidas y llenas de pulpa.
- 834 ILLICIUM. CALIZ de seis hojuelas: *petalos* veinte y siete: *capsulas* muchas, puestas en cerco, de dos ventallas, y con una semilla.
- 835 LIRIODENDRON. CALIZ de tres hojuelas: *petalos* nueve: y *semillas* apiñadas en forma de cono.
- 836 MAGNOLIA. CALIZ de tres hojuelas: *petalos* nueve: *capsulas* de dos ventallas, apiñadas: *semillas* en forma de baya y pendulas.
- 837 MICHELIA. CALIZ de tres hojuelas: *petalos* quince: *bayas* muchas, y de quatro semillas.
- 838 UVARIA. CALIZ de tres hojuelas: *petalos* seis: *bayas* numerosas, pendulas, y de quatro semillas.
- 839 ANNONA. CALIZ de tres hojuelas: *petalos* seis: *baya* de muchas semillas, casi redondas; y con su *correa* escamosa.
- 840 ANEMONA. CALIZ ninguno: *petalos* seis hasta nueve; y *semillas* muchas.
- 841 ATRAGENE. CALIZ de quatro hojuelas: *petalos* doce; y *semillas* con cola.
- 842 CLEMATIS. CALIZ ninguno: *petalos* quatro, rara vez cinco; y *semillas* con cola.
- 843 THALICTRUM. CALIZ ninguno: *petalos* quatro ó cinco; y *semillas* sin cola.

ADO-

- 844 ADONIS. CALIZ de cinco hojuelas : *petalos* mas de cinco , sin *nectario*; y *semillas* desnudas.
- 845 RANUNCULUS. CALIZ de cinco hojuelas : *petalos* cinco , con su *poro* melifero por la parte de dentro de las *uñas*; y *semillas* desnudas.
- 846 TROLLIUS. CALIZ ninguno : *petalos* cerca de catorce : *capsulas* muchas, aovadas , y con muchas *semillas*.
- 847 ISOPYRUM. CALIZ ninguno : *petalos* cinco : *nectarios* hendidos en tres partes , tubulosos : *capsulas* encorvadas ácia atrás , y con muchas *semillas*.
- 848 HELLEBORUS. CALIZ ninguno : *petalos* cinco ó mas : *nectarios* hendidos en dos labios y tubulosos : *capsulas* con muchas *simientes* y *de-rechitas*.
- 849 CALTHA. CALIZ ninguno : *petalos* cinco : *nectario* ninguno : *capsulas* muchas , y con muchas *simientes*.
- 850 HYDRASTIS. CALIZ ninguno : *petalos* tres : *nectario* ninguno : *baya* compuesta con granitos de una sola *semilla*. *Ellis*.
- 851 DRIMYS. *Suppl. p.* 43. PERIANTIO de tres lóbulos : *petalos* seis hasta doce : *gérmenes* en forma de maza : *estilo* ninguno : y *baya* aovada al revés.
- 852 UNONA. *Suppl. p.* 44. CALIZ de tres hojuelas : *corola* de seis *petalos* : *bayas* muchas , con *piececito* , y de dos *semillas*.

CLASE XIII.

PGLYANDRIA. DE LAS FLORES HERMAFRODITAS QUE TIENEN VEINTE Ó MAS ESTAMBRES INSERTOS EN EL RECEPTACULO.

ORDEN I.

MONOGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON UN SOLO PISTILO.

777. Género MARCGRAVIA. † *Plum.* 29.

Jacq. Amer. 156.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de seis hojuelas apañadas, casi redondas, cóncavas, persistentes, y las dos de mas afuera mayores.

COR. de un *petalo*, entre cónica y aovada, entera, cerrada á manera de cofia, que se abre por su base, y cae al abrirse la flor.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, alesnados, cortos, extendidos, y caedizos: con las *anteras* derechas, grandes, entre aovadas y oblongas.

PIST. *Germen* aovado: *estilo* ninguno: *estigma* en cabezuela y persistente.

PERIC. *Baya* correosa, globosa, de muchas celdillas y muchas ventallas.

SEM. numerosas, pequeñas, oblongas, y anidadas en la pulpa blanda.

OBS. *Estigma* poco manifesto; y *baya* de una celdilla. *Wernisch.*

ESPECIE.

Um-
bellata 1. MARCGRAVIA. Jacq. X Marcgravia.
Amer. 156. t. 96.

Marcgravia scandens,
fructu radiatim posito. Plum. X Marcgravia trepadora, con
gen. 7. ic. 173. el fruto puesto en ródios.

Marc-

Marcgravia scandens, fo-
liis caulinis subrotundis, ad
margines glandulatis, ra-
morum integris, ovatis, al-
ternis, distiche positis, flori-
bus umbellatis, terminali-
bus. Brown. jam. 244. t. 26.

Marcgravia trepadora, con las hojas del tallo casi redondas, glandulosas por su margen, las de las ramas enteras, aovadas, alternas, y que miran á ambos lados; las flores en umbela y terminales.

Phyllitidi scandenti af-
finis, major, folio crasso, sub-
rotundo. Sloan. jam. 15. hist.
 i. p. 74. t. 28. f. i. mala.

Planta mayor, parecida á la Phyllitide trepadora, con hoja crasa y casi redonda.

Cast. Marcgravia umbelada.

Habita en la America mas caliente. $\frac{1}{2}$

Produce las *hojas* alternas, con peciolo, entre aovadas y lanceoladas, y enterisimas: la *umbela* sencilla; con muchos *pedunculos* puestos en cerco, iguales, y extendidos horizontalmente: las *flores* ascendentes, desnudas; con el *caliz* y *corola* que se caen facilmente: el *disco de la umbela* con *glandulas nectaríferas* sin piececito, las mas veces de cinco en cinco, derechas, y en forma de una corola boquiabierta ó del capacete y petalo superior del *Aconito*, con su boca vuelta ácia el ámbito: el *receptáculo*, despues de caida la flor, entero, y sin que se divida en cinco lóbulos.

778. Género TRILIX. Jacquinia. Mutis.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de tres hojuelas, aovadas, agudas, extendidas, planas y persistentes.

COR. *Petalos* tres, lanceolados, agudos y mas pequeños que el caliz.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos, capilares, del largo de la corola: con las *anteras* casi redondas, mellizas y menudas.

PIST. *Germen* de cinco lados: *estilo* cilindrico: con el *estigma* sencillo.

PERIC. *Baya* casi de cinco lados, de cinco celdillas, y cubierta con el caliz.

SEM.

SEM. numerosas , casi redondas y menudas.

E S P E C I E.

Lutea. I. TRILIX. X Trilix.
Jacquinia. Mutis. mss. X *Jacquinia*.

Cast. Trilix amarilla.

Habita en Cartagena de America. \bar{h}

Es *arbusto* de la altura de dos hombres , con muchísimas ramas , rollizas y algo ásperas. Echa las *hojas* alternas , con peciolo , casi abroqueladas , entre de figura de corazón y aovadas , aserradas , puntiagudas , venosas y con vello : los *peciolos* rollizos y lampiños : las *flores* amarillas (no por la corola sino por las anteras) : los *peduncululos* comunmente terminales , con piececitos alternos , de una flor , rollizos y vellosos.

779. Género RHEEDIA. Vanrheedia. Plum. 18.

C A R. G E N. N A T.

CAL. ninguno.

COR. *Petalos* quatro , aovados al revés , cóncavos y extendidos.ESTAMB. *Filamentos* muchos , filiformes , mas largos que la corola : con las *anteras* oblongas.PIST. *Germen* globoso : *estilo* cilindrico , de la longitud de los estambres : con el *estigma* en forma de embudo.

PERIC. aovado , pequeño , xugoso , y de una celdilla.

SEM. tres , entre aovadas y oblongas , muy grandes y señaladas con ciertos caracteres.

E S P E C I E.

Late- I. RHEEDIA. X Rheedia.
 rilflora. *Van-Rheedia folio subro-* X *Van-Rheedia*, con hoja ca-
tundo , *fructu luteo*. Plum. X si redonda ; y fruto amarillo.
 gen. 45. t. 257. X

Cast. Rheedia con flores por sus lados.

Habita en America. \bar{h}

Es *arbol* que echa las *ramas* articuladas , comprimidas , lí-
 sas

sas y vellosas : las *hojas* opuestas , con peciolos cortos y vellosos , lanceoladas , enterisimas y lampiñas : los *pedunculos* axilares , de tres en tres , poco mas ó menos , hendidos en tres partes , y de tres flores.

780. Género CAPPARIS. * *Tourn. t. 139.*

Breynia. Plum. II.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de quatro hojuelas , correosas , aovadas , cóncavas y gibosas.

COR. *Petalos* quatro , obtusos , extendidos , y muy grandes.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos , filiformes y extendidos : con las *anteras* oblongas , rodadizas é inclinadas.

PIST. *Germen* con piececito : *estilo* ninguno : y el *estigma* obtuso.

PERIC. *Baya* corticosa , de una celdilla , y con piececito.

SEM. numerosas , en forma de riñon y anidadas.

OBS. *La figura del fruto en distintas especies es muy diverso.*

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 261.

La *flor* es rosácea ó de quatro *petalos* puestos en cerco ; de cuyo caliz sale el *pistilo* adornado de su *embrion* , que pasa á *fruto* en forma de *Pera* , ó *siliquoso* y *caroso* , en el qual se anidan muchas *semillas* casi *redondas* ó en forma de *riñon*.

E S P E C I E S .

- | | | |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Spi-
nosa. | 1. CAPPARIS <i>pedunculis</i> X | Alcaparro con pedunculos |
| | <i>unifloris solitariis , stipulis</i> X | de una flor , solitarios ; esti- |
| | <i>spinosis , foliis annuis , cap-</i> X | pulas espinosas ; hojas que se |
| | <i>sulis ovalibus. Mat. Med. 153.</i> X | caen cada año ; y capsulas |
| | <i>Gmel. Sib. 4. p. 179.</i> X | ovales. |
| | <i>Capparis spinosa. Bauh.</i> X | Alcaparro espinoso. |
| | <i>hist. 2. p. 63.</i> X | |

- Capparis spinosa*, fructu minore, folio rotundo. C. B. P. 480. Tourn. p. 261. Alcaparro espinoso, con el fruto menor; y hoja redonda.
- Capparis folio acuto*. C. B. P. 480. Lob. ic. 634. Dod. pempt. 746. Tourn. p. 261. Alcaparro con hoja aguda. α
- Capparis Sicula*, duplicata spina, folio acuto. Bocc. Sic. 79. t. 42. f. 3. Alcaparro de Sicilia, con espina duplicada; y hoja aguda.

Cast. Alcaparro espinoso.

Habita en las murallas y terrenos pedregosos de la Europa y de Oriente: en Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, y en Mallorca donde hacen comercio de sus flores y fruto. \bar{h}

PROPIED. La corteza de la raiz es astringente, diuretica y emenagoga. Se usa en las obstrucciones, parálisis é hipocondria.

- Zeylanica. 2. CAPPARIS *pedunculis solitariis unifloris, stipulis spinosis, foliis ovatis utrinque acutis*. Flor. Zeyl. 210. Alcaparro con pedunculos solitarios, de una flor; estipulas espinosas; hojas aovadas y agudas por una y otra parte.
- Capparis Zeylanica*, duplicatis spinis, folio acuto. Pet. mus. 625. Alcaparro de Zeylan, con espinas duplicadas; y hoja aguda.
- Capparis spinosa*, foliis oblongis. Burm. Zeyl. 53. ind. 118. Alcaparro espinoso, con hojas oblongas.

Cast. Alcaparro de Zeylan.

Habita en Zeylan. \bar{h}

Los que tengan la ocasion de observar el fruto, determinarán si esta especie es distinta, ó solamente variedad de la precedente.

- Sepiaria. 3. CAPPARIS *pedunculis umbellatis, stipulis spinosis, foliis annuis ovatis emarginatis*. Alcaparro con pedunculos en umbela; estipulas espinosas; hojas que se caen cada año, aovadas y escotadas.

Arbuscula baccifera, scandens, spinosa, foliis Buxi, pallidioribus. Pluk. Alm. 27. t. 338. f. 3. Arbustito que lleva bayas, trepador, espinoso; con hojas como las del Box, y mas pálidas.

Cast. Alcaparro de cercas.

Habita en la India. *h*

Echa las ramas rollizas y leñosas: las *estipulas* mellizas, espinosas, encorvadas ácia atrás, cortas y negras: las hojas con peciolo corto, aovadas, desnudas, enterisimas y escotadas: las *umbelas* terminales, sencillas y de muchas flores; con el *pedunculo comun* corto.

Fron-
dosa.

4. CAPPARIS *pedunculis umbellatis, foliis passim confertis.* Alcaparro con pedunculos en umbela; y hojas á trechos amontonadas.

Capparis pedunculis subumbellatis, foliis ad intervalla frondosis. Jacq. Amer. 162. t. 104. Alcaparro de pedunculos casi en umbela; y con muchas hojas juntas á trechos.

Cast. Alcaparrõ frondoso.

Habita en las selvas de Cartagena de Indias, y en la Isla de Santo Domingo. *h*

Es arbustito que sube á la altura de mas de siete pies, y produce muy pocas ramas, rectas, y que apenas se dividen: las hojas lanceoladas, agudas, lustrosas, ondeadas, enterisimas, algo correosas, con peciolo, del largo de un pie, poco mas ó menos, y colocadas á montones en varias distancias de los ramos: el *pedunculo comun* rollizo, lustroso, derecho, terminal, solitario, y que en su extremo lleva pocas flores, en umbela, y sin olor, de color verde ó purpúreo, del diámetro de una pulgada, y que despues de la fructificacion revuelven sus petalos, y tuercen variamente sus estambres: las *siliquas* del largo de una pulgada ó de pulgada y media, lustrosas, de color entre negro y purpúreo, con su carne blanquecina. *Jacq. loco citato.*

Ferru-
gina.

5. CAPPARIS *pedunculis*
umbellatis, foliis persisten-
tibus lanceolatis subtus to-
mentosus, floribus octandris.
Amoen. Acad. 5. p. 398.

Capparis octandra. Jacq.
Amer. 160. t. 100. R.

Crateva suffruticosa, fo-
liis singularibus, oblongis,
utrinque acutis, subtus qua-
si villosis, floribus octan-
dris, racemis comosis, ala-
ribus. Brown. jam. 247. t. 28.
f. 1.

Alcaparro con pedunculos
en umbela; hojas persisten-
tes, lanceoladas, tomentosas
por debaxo; y flores de ocho
estambres.

Alcaparro de ocho estam-
bres.

Crateva fruticosa, con ho-
jas de una en una, oblongas,
agudas en una y otra parte,
casi vellosas por debaxo; flo-
res de ocho estambres; ra-
cimos con penacho, y axíla-
res.

Cast. Alcaparro ferrugineo.

Habita en la Jamaica. \bar{h}

Ba-
ducca.

6. CAPPARIS *inermis,*
foliis ovalibus alternis pe-
rennantibus, fructibus ova-
libus. Burm. Ind. Cat. pl.
amer. p. 7. fasc. 1. 62. t. 73.
f. 2.

Capparis alia arborescens,
Lauri foliis, fructu oblongo,
ovato. Plum. cat. pl. amer.
p. 7.

Capparis arborescens, In-
dica, Badukka dicta, flore
tetrapetalo. Rai. hist. 1630.

Baducca. Rheed. mal. 6.
p. 105. t. 57.

Alcaparro inerme, con ho-
jas ovales, alternas, peren-
nes; y frutos ovales.

Otro Alcaparro arbores-
cente, con hojas como las
del Laurel; fruto oblongo
y aovado.

Alcaparro arborescente, de
Indias, llamado *Badukka,*
con flor de quatro petalos.

Baducca.

Cast. Alcaparro baducca. \bar{h}

Habita en Indias.

Es arbol que produce las hojas alternas, sin venas, ova-
les, obtusas, enteras y perennes: las flores que ocupan
la sumidad de las ramas: el fruto aovado, obtuso, y
que cuelga de un piecico muy largo: las semillas de
consistencia de hueso, y que parecen estar colocadas en
cerco dentro de la pulpa.

Cynophallophora.

7. CAPPARIS *pedunculis multifloris terminalibus, foliis ovalibus obtusis perennantibus, glandulis axillaribus.*

Alcaparro con pedunculos de muchas flores, terminales; hojas ovales, obtusas, perennes; y glandulas axilares.

Capparis pedunculis multifloris, axillis glandulosis, foliis oblongis, utrinque nitidis. Jacq. Amer. 158. t. 98.

Alcaparro con pedunculos de muchas flores; axilas glandulosas; hojas oblongas y lustrosas en ambas partes.

Capparis arborescens, Lauri foliis, fructu longissimo, flore albo. Plum. sp. 7. ic. 73. f. 1. Tourn. p. 261.

Alcaparro arborescente, con hojas como las del Laurel; fruto larguísimo y flor blanca.

Breynia fruticosa, foliis oblongis, obtusis. Brown. jam. 246. t. 27. f. 1.

Breynia fruticosa, con hojas oblongas y obtusas.

Cynophalophorus seu penis caninus, Caribearum arbor, foliis subrotundis, clavas pulpiferas phalloides pro siliquis ferens. Pluk. 126. t. 172. f. 4.

Cynophalophoro ó miembro de perro, arbol de los Caribes, con hojas casi redondas, y que lleva en lugar de baynas unas mazas con pulpa, parecidas al miembro de perro.

Cast. Alcaparro de fruto largo.

Habita en la America Meridional. \hbar

Es planta arborea que produce las hojas alternas, entre ovales y oblongas, obtusas, enterisimas, sin venas, y con el nervio longitudinal asurcado: las flores claras, en el extremo de las ramas, grandes y de quatro petalos: las capsulas siliquosas, pendulas, rollizas, sinuosas y llenas de simientes lampiñas y oblongas.

Pulcherri-
ma.

8. CAPPARIS *pedunculis racemosis, foliis oblongis obtusis, fructibus baccatis.* Jacq. Amer. 163. t. 106.

Alcaparro con pedunculos racimosos; hojas oblongas, obtusas; y frutos como bayas.

Cast. Alcaparro muy hermoso.

Habita en las laderas de los montes de Cartagena de Indias. \hbar

Sube hasta la altura de doce pies: tiene las ramas crasas,

rollizas, leñosas y lampiñas: las *hojas* oblongas, obtusas, lustrosas, enterisimas, correosas, con el peciolo corto, alternas y comunmente de diez pulgadas de largo: el *racimo terminal* sencillo, derecho, craso, solitario, del largo de medio pie, y muy hermoso: las *flores* tambien hermosas, de color entre amarillo-roxo y blanquecino, y de olor muy suave: los *filamentos* largos, el primer dia candidos, y el otro de color purpúreo ameno: la *baya* grande, redonda, vestida de una corteza entre verde y obscura, con su carne antes de madurar dura y casi sin olor; pero madura es blanda, nauseosa y tan fétida, que ningun animal llega á ella: las *semillas* vestidas de una corteza membranosa, tenaz y blanca.

Li- 9. CAPPARIS *pedunculis* X Alcaparro con pedunculos
nearis. *subracemosis, foliis lineari-* X algo racimosos; y hojas li-
bus. Jacq. Amer. 161. t. 102. X neares.

Cast. Alcaparro linear.

Habita en collados arenosos de Cartagena de Indias. \bar{h}
Es arbol hermoso y todo lampiño. Echa las *hojas* correosas, enteras, sin venas y lineares, obtusas, con el nervio de en medio que sobresale notablemente y su peciolo corto, alternas, revueltas por sus márgenes, y que miran todas comunmente ácia arriba: las *flores* sin olor, blancas, del diámetro de media pulgada: los *frutos* del de una pulgada y de color roxo, que tira al de la Naranja.

Brey- 10. CAPPARIS *peduncu-* X Alcaparro con pedunculos
nia. *lis racemosis, foliis peren-* X racimosos; hojas perennes,
nantibus oblongis, calycibus X oblongas; cálices y pedun-
pedunculisque tomentosis, X culos tomentosos; y flores
floribus octandris. X de ocho estambres.

Capparis (Breynea) *pe-* X Alcaparro (de Breyn) con
dunculis subumbellatis, fo- X pedunculos casi en umbela;
liis ovali-oblongis, acutis, X hojas entre ovaes y oblon-
subtus scabris, fructibus to- X gas, agudas, ásperas por de-
mentosus. Jacq. Amer. 161. X baxo; y frutos tomentosos.
t. 103. X

Brey-

Breynia Eleagni foliis. X Breynia con hojas como
 Plum. gen. 40. Breyn. ic. 13. X las del arbol de Paraiso.
 C. f.
Breynia affinis arbor oc- X Arbol con flores de ocho
tandra. Loeff. it. 207. X estambres, parecido á la Breynia.

Cast. Alcaparro de Breyn.

Habita en America. *h*

Tiene las últimas ramas, los pedunculos y peciolos salpicados de puntitos de color ferrugineo: las hojas enterísimas, lustrosas por debaxo, ásperas, de color verde pálido, y pecioladas: los pedunculos comunes angulados; con muchas flores casi en umbela, y alguna vez ramosos: las flores cándidas, de olor suavísimo: la siliqua larga, delgada, de color amarillo-oscuro; y su carne de color coccineo.

Has- 11. CAPPARIS peduncu- X Alcaparro con pedunculos
 tata. lis multifloris, foliis hasta- X de muchas flores; hojas en-
 to-lanceolatis nitidis. Jacq. X tre de figura de alabarda y
 Amer. 159. t. 174. f. 56. X lanceoladas, y lustrosas.

Cast. Alcaparro de figura de alabarda.

Habita en las selvas de Cartagena de Indias.

Es arbusto derecho, debil, dividido en pocas ramas; pero larguísimas: tiene los pedunculos comunes racimosos, terminales, con ocho flores, poco mas ó menos, purpúreas y olorosas.

Fle- 12. CAPPARIS peduncu- X Alcaparro con pedunculos
 xuosa. lis congestis terminalibus, X amontonados, terminales; ho-
 foliis persistentibus oblon- X jas persistentes, oblongas,
 gis obtusis glabris, ramis X obtusas, lampiñas; y ramas
 flexuosis. X ondeadas.
Morisona flexuosa. Amoen. X Morisona ondeada.
 Acad. 5. p. 398. X

Cast. Alcaparro ondeado.

Habita en la Jamaica. *h*

Sili-
quosa.

13. *CAPPARIS pedunculis unifloris compressis, foliis persistentibus lanceolato-oblongis acuminatis subtus punctatis.* Alcaparro con pedunculos de una flor, comprimidos; hojas persistentes, entre lanceoladas y oblongas, aguzadas, y por debaxo punteadas.

Breynia arborescens, foliis ovatis, utrinque acuminatis, siliqua torosa, longissima. Brown. jam. 247. Breynia arborescente, con hojas aovadas, aguzadas por una y otra parte; siliqua larguísima, y con convexidades.

Planta forte. Pluk. phyt. t. 327. f. 6. Acaso la planta de Plukenet. &c.

Cast. Alcaparro siliquoso.

Habita en la Jamaica. \hbar

Posee las *hojas* muy puntiagudas, lustrosas por encima, y salpicadas de polvo ferrugineo por debaxo.

Gran-
dis.

14. *CAPPARIS arborea, mitis, foliis ovatis acutis glabris, corymbis terminalibus, fructu globoso.* Suppl. pl. p. 263. Alcaparro arboreo, sin espinas, con hojas aovadas, agudas, lampiñas; corimbos terminales; y fruto globoso.

Cast. Alcaparro grande.

Habita en Zeylan. Koenig. \hbar

Es *arbol* grande y cano, que produce las *hojas* alternas, aovadas, enterisimas, agudas, venosas y lampiñas: los *corimbos* terminales, y los fructíferos alargados en racimo: las *flores* de color entre amarillo y blanco: los *frutos* mayores y globosos.

Hor-
rida.

15. *CAPPARIS arborea, stipulis aculeatis, ramis flexuosis, foliis ovato-lanceolatis mucronatis glabris, floribus axillaribus binis.* Suppl. p. 264. Alcaparro arboreo, de es- tipulas con agujijones; ramas ondeadas; hojas entre aovadas y lanceoladas, que terminan en punta rígida, lampiñas; y flores axilares de dos en dos.

Cast. Alcaparro espantoso.

Habita en Zeylan. Koenig. \hbar

Es *arbol* rígido que echa las *ramas* ondeadas , con agujones de dos en dos en lugar de estipulas , rubicundos , rígidos y que salen del origen de las hojas: las *hojas* con peciolo , aovadas por su base , gradualmente adelgazadas , y que terminan en una espinita : los *pedunculos* de dos en dos , axilares y de una flor.

781. Género ACTÆA. * Christophoriana.

Tourn. t. 154.

CAR. GEN. NAT.

- CAL. *Periantio* de quatro hojuelas , casi redondas , obtusas , cóncavas , y que se caen al abrirse la flor.
- COR. *Petalos* quatro , aguzados por una y otra parte , mayores que el caliz , y que se caen al abrirse.
- ESTAMB. *Filamentos* muchos , las mas veces treinta , capilares , y mas anchos por arriba ; con las *anteras* casi redondas , mellizas y derechas.
- PIST. *Germen* aovado : *estilo* ninguno : con el *estigma* gruesecito y obliquamente deprimido.
- PERIC. *Baya* entre oval y globosa , lampiña , con un surco , y de una celdilla.
- SEM. muchas , medio redondas y puestas unas sobre otras en dos órdenes.
- OBS. 1.^a La *Actea racimosa* tiene el *fruto* correoso y sin pulpa.
- OBS. 2.^a *Petalos* quatro , y casi de quatro lados. *Wernisch.*

CARACT. GÈNER. DE TOURNEF.

CHRISTOPHORIANA. p. 299.

La *flor* es rosácea ó que consta de muchos *petalos* puestos en cerco ; de cuyo centro sale el *pistilo* que pasa á *fruto* blando ó á *baya* blanda , aovada y llena de *semillas* arimadas entre sí y en dos órdenes.

E S P E C I E S.

- Spi-
cata. 1. ACTÆA *racemo ova-* X Actea con el racimo aova-
to, *fructibus baccatis*. Flor. do; y frutos reducidos á ba-
dan. t. 489. yas.
- Actæa foliis circumserra-* X Actea de hojas aserradas
ris, duplicato-pinnatis, pin- al rededor, dos veces pinna-
nula extrema trilobata. Hall. das; y con la hojuela extre-
helv. n. 1076. ma hendida en tres lóbulos.
- Aconitum bacciferum*. C. X Aconito que lleva bayas.
B. P. 183.
- Christophoriana*. Clus. hist. X Christophoriana.
2. p. 86. Dod. pempt. 402.
- Christophoriana vulga-* X Christophoriana vulgar.
ris. Tourn. p. 289.
- Aconitum racemosum*. C. X Aconito racimoso.
B. P. 183.
- α *Actæa spicata, nigra*. X Actea espigada, con fru-
tos negros. α
- Actea racemo ovato, fruc-* X Actea con el racimo aova-
tibus niveis, radice tubero- do; frutos de color de nie-
sa. Mill. dict. n. 2. ve; y raíz tuberosa.
- Aconitum baccis niveis*. X Aconito con bayas de co-
Corn. Canad. 76. t. 77. lor de nieve.
- Christophoriana Ameri-* X Christophoriana de Ame-
cana, racemosa, baccis ni- rica, racimosa, con bayas
veis & rubris. Moris. hist. 2. de color de nieve y encar-
p. 8. sect. 1. t. 2. f. 7. nadas.
- Cast. Actea espigada.
Habita en bosques sombríos de Europa: en Cataluña, Al-
carria, Asturias, y en varios montes de Castilla la vie-
ja; pero la variedad α en America. ¶
Tiene los *petalos* rombos, planos y membranosos.
- Race-
mosa. 2. ACTÆA *racemis lon-* X Actea con los racimos lar-
gissimis, *fructibus siccis*. X guisimos; y frutos secos.
Christophoriana Ameri- X Christophoriana de Ame-
cana, procerior & longius rica, mas alta; y con la es-
spicata. Dill. elth. 79. t. 67. piga mas larga.
f. 78.

Chris-

Christophoriana *facie* X Yerba espigada, con tra-
herba spicata. Pluk. *amalth.* X za de Christophoriana.
 54. t. 383. f. 3. X

Cast. *Actea racimosa*.

Habita en la Florida, Virginia y Canadá. ¶

Posee los *petalos* crasos, gibosos, muy pequeños, con piececico, terminados en una punta cerdosa; y en mayor número que las hojuelas del caliz.

782. Género SANGUINARIA. * *Dill. elth.* 252.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de dos hojuelas, aovadas, cóncavas, mas cortas que la corola, y que se caen al abrirse la flor.

COR. *Petalos* ocho, oblongos, obtusos, muy extendidos, y los de mas adentro alternadamente mas angostos.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, sencillos, mas cortos que la corola: con las *anteras* sencillas.

PIST. *Germen* oblongo, comprimido: *estilo* ninguno: *estigma* gruesecito, persistente, con dos sulcos, y de la altura de los estambres.

PERIC. *Capsula* oblonga, ventricosa, aguda por una y otra parte, y de dos ventallas.

SEM. muchas, redondas y puntiagudas.

ESPECIE.

- | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cana-
densis. | 1. SANGUINARIA. Hort. X
Cliff. 202. X
<i>Sanguinaria minor, flore</i> X
<i>simplici</i> . <i>Dill. elth.</i> 335. t. X
252. f. 326. X
<i>Chelidonium majus, Ca-</i> X
<i>nadense, acaulon.</i> <i>Corn. Ca-</i> X
nad. 212. <i>Moris. hist.</i> 2. p. X
257. <i>sect.</i> 3. t. 11. f. 1. <i>Rai.</i> X
hist. 1887. X | Sanguinaria del Canadá.
Sanguinaria menor, con
la flor sencilla.
Chelidonia mayor, del
Canadá, sin tallo, |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

* *Sanguinaria major*, flore } *Sanguinaria mayor*, con
simplici vel pleno. Dill. elth. } la flor sencilla ó plena. *
 335. t. 252. f. 326. }

Cast. *Sanguinaria del Canadá*.

Habita en la America Septentrional. 24

Tiene una hojuela radical muy tierna, que fomenta y abraza en su seno la flor en su primer estado, al modo que la *Osmunda Lunaria*: una sola hoja á manera de cogulla: el *escapo* de una sola flor, el qual sale de cada yema de la raiz, cuyas yemas tienen dos ventanillas. Los *estambres* de la especie que vió *Linneo* apenas tenían *anteras* con polvillo. Acaso es *dioica*?

Arroja *leche amarilla*, como la de la *Celidonia*.

783. Género PODOPHYLLUM. * *Anapodophyllum*.

Tourn. t. 122.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* grande, de color, cóncavo, derecho, y de tres hojuelas, aovadas, cóncavas, y que se caen quando las demas partes de la flor.

COR. *Petalos* nueve, redondos, cóncavos, y plegados por su margen.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, cortísimos: con las *anteras* oblongas, grandes y derechas.

PIST. *Germen* casi redondo: *estilo* ninguno: *estigma* obtuso y plegado.

PERIC. *Baya* aovada, coronada con el *estigma*, y de una celdilla.

SEM. muchas, casi redondas: y *receptáculo* libre.

CARACTER GENERICO DE TOURNEFORT.

ANAPODOPHYLLUM. p. 239.

La *flor* es rosácea ó que consta de muchos *petalos* puestos en cerco; de cuyo centro sale el *pistilo* que pasa á fruto aovado, de una *capsula* (*celdilla*), y lleno de *simientes* casi redondas.

E S P E C I E S.

- Pel-
tatum. 1. **PODOPHYLLUM fo-** Podophylo con hojas abro-
liis peltatis lobatis. Trew. queladas y hendidas en ló-
I. ehret. t. 29. bulos.
Anapodophyllum Canaden- Anapodophylo del Cana-
se. Tourn. p. 239. Catesb. dá,
car. I. p. 24. t. 24.
Aconitifolia humilis, flo- Planta baxa, con hoja co-
re albo, unico, campanulato, mo la del Aconito; y una
fructu Cynosbati. Mentz. sola flor, blanca, á manera
pug. t. 11. de campana; y fruto como
el del Escaramujo.

Cast. Podophylo abroquelado.

Habita en la America Septentrional. 24

- Di-
phyl-
lum. 2. **PODOPHYLLUM fo-** Podophylo con hojas de
liis binatis semicordatis. dos en rama, y medio de fi-
gura de corazon.

Cast. Podophylo de dos hojuelas.

Habita en la Virginia. Collinson. h

Acaso es especie de *Sanguinaria*? Tiene una sola hoja con dos hojuelas: el *escapo* sin hojas, radical; y la *capsula* oblonga.

No vió *Linneo* las flores y se le fue remitida esta planta con el nombre de especie de *Podophylo*.

784. Género CHELIDONIUM. * Tourn. t. 116.

Glaucium. Tourn. t. 130.

C A R. G E N. N A T.

CAL. *Periantio* algo redondo, de dos hojuelas, casi aovadas, cóncavas, obtusas, y que se caen al abrirse la flor.

COR. *Petalos* quatro, casi redondos, planos, extendidos, grandes, y por su base mas angostos.

ESTAMB. *Filamentos* muchos (*treinta*), planos, mas anchos por arriba, y mas cortos que la corola: con las an-
te-

300 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

teras oblongas , comprimidas , obtusas , derechas y mellizas.

PIST. *Germen* cilindráceo , de la longitud de los estambres: *estilo* ninguno ; *estigma* en cabezuela y hendido en dos partes.

PERIC. *Siliqua* cilindrácea y de dos ventallas.

SEM. muchas , aovadas , lustrosas y acompañadas de un cuerpecito ó apéndice por medio del qual están pegadas á las suturas.

CARACTERES GENERICOS DE TOURN.

CHELIDONIUM. p. 231.

La flor es cruciforme ó que consta de quatro petalos; de cuyo caliz sale el pistilo que pasa á fruto ó siliqua de una capsula (*celdilla*) , de dos ventallas y llega de simientes casi redondas.

GLAUCIUM. p. 254.

La flor es rosácea ó que consta de quatro petalos puestos en cerco ; de cuyo caliz de dos hojuelas sale el pistilo que pasa á siliqua larga , rolliza , de una capsula (*celdillas*) , de dos ventallas pegadas á la entretela intermedia , y llena de semillas casi redondas. Ocurren especies de este género con el fruto de una capsula (*celdilla*) y que se abre en quatro partes.

ESPECIES.

Majus.	1. CHELIDONIUM <i>pedunculis umbellatis</i> . Mat.	Celidonia con pedunculos en umbela,
	Med. 154. Flor. dan. t. 676.	
	<i>Chelidonium lobis foliorum subrotundis</i> . Hall.	Celidonia con los lóbulos de las hojas casi redondos.
	helv. n. 1059.	
	<i>Chelidonium majus</i> , vulgare. C. B. P. 144. Tourn.	Celidonia mayor , vulgar.
	p. 231.	
	<i>Chelidonia</i> . Bauh. hist. 3.	Celidonia.
	p. 482.	

- Chelidonium majus*. Dod. X Celidonia mayor.
 pempt. 48.
 α *Chelidonium majus*, fo- X Celidonia mayor, con ho-
liis quernis. C. B. P. 144. X jas como las de la Encina. α
 Tourn. p. 231.
Chelidonium majus, flore X Celidonia mayor, con la
laciniato. Clus. hist. 2. p. 203. X flor laciniada.

Cast. Celidonia mayor.

Habita en terrenos pedregosos de Europa : en los contornos de Madrid , y es comun en las mas provincias de España.

PROPIED. *Es diureta y diaphoretica : se usa en la itericia, cachexia, hydropesia, edema, herpes y optalmia. La leche amarilla por sí sola es acre, y consume las verrugas.*

Glaucium. 2. CHELIDONIUM pe- X Celidonia con pedunculos
dunculis unifloris, foliis am- X de una flor ; hojas que abra-
plexicaulibus sinuatis, caule X zán el tallo , sinuosas ; y ta-
glabro. Oed. dan. t. 585. X llo lampiño.

Glaucium foliis radicalibus semipinnatis, caulibus amplexicaulibus. Hall. helv. X Glaucio con hojas radicales medio pinnadas ; y las del tallo amplexicaules.
 1060.

Papaver corniculatum, luteum. C. B. P. 171. Bauh. X Adormidera de fruto como cuernezuelo ; y flor amarilla.
 hist. 3. p. 398.

Papaver corniculatum, majus. Dod. pempt. 448. X Adormidera mayor , de fruto como cuernezuelo.

Glaucium flore luteo. Tourn. p. 254. X Glaucio de flor amarilla.

Papaver corniculatum, flavo flore. Clus. hist. 2. p. X Adormidera de fruto como cuernezuelo ; y flor de color amarillo-roxo.
 91.

Cast. Celidonia glaucio.

Habita en lugares arenosos de Inglaterra , Francia , Italia y Virginia : en Aragon , y en las orillas del mar de Cataluña , Valencia y otras partes de España. ☉

Es planta de color garzo. Echa el tallo liso : las hojas algo ásperas : las radicales hendidas al través , y las del

302 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

tallo solamente en lóbulos : las flores de color amarillo-roxo : las siliquas ásperas y separadas en celdillas por medio de su disepimento.

PROPIED. Es resolutiva , detersiva y diuretica.

Cor-
nicula-
tum.

3. CHELIDONIUM pe-
dunculis unifloris , foliis
sessilibus pinnatifidis , cau-
le hispido. Celidonia con pedunculos
de una flor ; hojas sentadas,
hendididas al través ; y tallo
con pelo rígido.
- Glaucium hirsutum , flo-
re phæniceo. Tourn. p. 254. Glaucio con pelo áspero ;
y flor de color de datil.
- Papaver corniculatum ,
phæniceum , hirsutum. C. B. Adormidera de fruto como
cuernezuelo , con pelo áspe-
ro ; y flor de color de datil.
- Papaver cornutum , phæ-
niceo flore. Clus. hist. 2. p. Adormidera con cuerne-
zuelos ; y flor de color de
datil.
- α Papaver corniculatum ,
phæniceum , glabrum. C. B. Adormidera con fruto co-
mo cuernezuelo , lampifia , y
P. 171. flor de color de datil. α

Cast. Celidonia de cuernezuelos.

Habita en Hungría , Bohemia , Austria y Francia : en los contornos de Madrid , en Aragon , en la marina de Cataluña , Valencia y otras partes de España. ☉

Es planta de color verde. Posee todas las hojas hendididas al través : las flores de color entre roxo y amarillo ; y las siliquas con pelo rígido.

Hybri-
dum.

4. CHELIDONIUM pe-
dunculis unifloris , foliis pin-
natifidis linearibus , caule
lævi , siliquis trivalvibus. Celidonia con pedunculos
de una flor ; hojas hendididas
al través , lineares ; tallo liso ;
y siliquas de tres ventallas.
- Papaver caule ramoso ,
foliis linearibus pinnatifi-
dis , capsulis sulcatis. Sauv. Adormidera con el tallo
ramoso ; hojas lineares , hen-
dididas al través ; y capsulas
monsp. 252. asurcadas.
- Papaver corniculatum ,
violaceum. C. B. P. 172. Adormidera de fruto como
cuernezuelo ; y flor de color
Bauh. hist. 3. p. 399. Dod. de violeta.
pempt. 449.

Glau-

Glaucium flore violaceo. X Glaucio con la flor de color de violeta.
 Tourn. p. 252. X
Papaver corniculatum, X Adormidera de fruto como
violaceo flore. Clus. hist. 2. X cuernezuelo ; y flor de color
 p. 92. X de violeta.

Cast. *Celidonia hybrida.*

Habita en la Europa Austral : en los contornos de Madrid : en Aragon , Catalufia y otras muchas partes de España. ☉

Tiene tres *estigmas.*

785. Género PAPAVER. Tourn. t. 119.

CAR. GEN. NAT.

- CAL. *Periantio* aovado , escotado , de dos hojuelas casi aovadas , cóncavas , obtusas , y que se caen al abrirse la flor.
- COR. *Petalos* quatro , casi redondos , planos , extendidos , grandes , mas angostos por su base , y alternadamente mas pequeños.
- ESTAMB. *Filamentos* numerosos , capilares , y mucho mas cortos que la corola : con las *anteras* oblongas , comprimidas , derechas y obtusas.
- PIST. *Germen* casi redondo , grande : *estilo* ninguno : *estigma* abroquelado , plano y radiado.
- PERIC. *Capsula* coronada con el estigma plano , grande , con muchas medias celdillas , y que se abre en su ápice debaxo de la corona , por medio de muchos agujeros.
- SEM. numerosas y muy pequeñas. *Receptáculos* son los pliegues longitudinales , del número de los rádios del estigma y pegados á la pared del pericarpio.
- Obs. *El pericarpio es diverso en la figura entre globosa y oblonga , y en los rádios del estigma.*

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 237.

La flor es rosácea ó que consta de quatro petalos puestos en cerco ; de cuyo caliz, de dos hojuelas, sale el pistilo que pasa á fruto ó capsula aovada ú oblonga , adornada con

con un chapitel, baxo del qual, en algunas especies, se abre una série de agujeritos dispuestos en círculo, que llegan á la cavidad del fruto; y que está guarnecida con varias laminitas, á las cuales se arriman, como á un receptáculo, numerosas semillas redondas y muy menudas.

ESPECIES DE CAPSULAS CON PELO RÍGIDO.

Hybridum.

1. PAPAVER *capsulis subglobosis torosis hispidis, caule folioso multifloro.* Adormidera de capstilas casi globosas, con convexidades y pelo rígido; tallo folioso y de muchas flores.

Papaver foliis ternato-pinnatifidis, capsulis sulcatis hispidis. Hort. Cliff. 201. Adormidera con hojas entre de tres en rama y hendidas al través; capsulas asurcadas y con pelo rígido.

Papaver caule ramoso, foliis lineari-pinnatifidis, capsulis sulcatis hispidis. Hort. Ups. 136. Adormidera con el tallo ramoso; hojas entre lineares y hendidas al través; capsulas asurcadas, y con pelo rígido.

Argemone capitulo brevior. C. B. P. 171. Bauh. hist. 3. p. 396. Argemone con la cabezuela mas corta.

Papaver erraticum, capite oblongo, hispido. Tourn. p. 238. Adormidera erratica, con la cabezuela oblonga y erizada.

Argemone capitulo hirsuto, rotundo, torulis canaliculato. Moris. hist. 2. p. 278. sect. 3. t. 14. f. 9. Lob. ic. 276. Argemone de cabezuela, con pelo áspero, redonda y acanalada con convexidades.

Cast. Adormidera hybrida.

Habita en la Europa Austral: en los contornos de Madrid y en otras muchas partes de España. ○

Argemone.

2. PAPAVER *capsulis clavatis hispidis, caule folioso multifloro.* Adormidera de capsulas en forma de maza, con pelo rígido; tallo folioso, y de muchas flores.

Pa-

Papaver capsulis hispidis, oblongo-turbinatis, sulcatis. Dalib. paris. 152. Adormidera de capsulas, con pelo rígido, entre oblongas y de figura de trompo y asurcadas.

Papaver foliis hispidis, pinnatis, pinnis lobatis, capsulis ellipticis, hispidis. Hall. helv. n. 1061. Adormidera de hojas con pelo rígido, pinnadas, con las hojuelas hendidas en lóbulos; capsulas elípticas y erizadas.

Papaver foliis ternatopinnatis, fructu angulato. Sauv. monsp. 252. Adormidera con hojas entre de tres en rama y pinnadas; y fruto angulado.

Argemone capitulo longiore. C. B. P. 172. Lob. ic. 276. Argemone con la cabezuela mas larga.

Papaver erraticum, capite longiore, hispido. Tourn. p. 238. Adormidera erratica, con la cabezuela mas larga y erizada.

Argemone capitulo tenuiore, longiore, hirsuto. Moris. hist. 2. p. 278. sect. 3. t. 14. f. 10. Argemone con la cabezuela mas delgada, mas larga, y con pelo áspero.

Cast. Adormidera Argemone.

Habita en campos arenosos de Eutopa y entre los sembrados de los circuitos de Madrid. ☉

Tiene las *hojas* divididas en tres partes, y hendidas al través: los *pedunculos* ásperos: los *cálices* y *capsulas* pelosos.

Alpinum. 3. PAPAVER *capsula hispida, scapo unifloro nudo hispido, foliis bipinnatis.* Jacq. Austr. t. 83. Adormidera de capsula erizada; escapo de una flor, desnudo, con pelo rígido; y hojas dos veces pinnadas.

Papaver caule nudo, unifloro, foliis pinnatis, pinnis integris & divisis, capitulis subrotundis, hispidis. Hall. helv. n. 1062. Adormidera con el tallo desnudo, de una flor; hojas pinnadas; hojuelas unas enteras y otras divididas; cabezuelas casi redondas y erizadas.

Papaver alpinum, saxatile, Coriandri folio. Segui. ver. 1. p. 416. t. 4. f. 4. To-urn. p. 239. Adormidera alpina, saxatile, con hoja como la del Cilantro.

Argemone alpina, foliis Scandicis, lutea. C. B. P. 176. Prodr. 93. Burs. XIX. 58. Argemone alpina, con hojas como las de la Escandice; y flor amarilla.

Cast. Adormidera alpina.

Habita en Suiza, en Schneeberg de Austria y Pirineos. ♀
Tiene el *caliz* con pelo áspero: los *petalos* blancos; pero de color amarillo-roxo por su base: la *capsula* aovada; y cinco *estigmas*.

Wh.
Cal. 4. PAPAVER *capsulis hispidis, scapo unifloro nudo hispido, foliis simplicibus pinnato-sinuatis.* Gmel. Sib. 4. p. 180. Fl. dan. t. 41. Adormidera de capsulas erizadas; escapo de una flor, desnudo, con pelo rígido; hojas sencillas entre pinnadas y sinuosas.

Papaver erraticum, nudicaule, flore flavo, odorato. Dill. elth. 202. t. 224. f. 291. Adormidera erratica, con el tallo desnudo; flor de color amarillo-roxo y olorosa.

Cast. Adormidera de tallo sin hojas.

Habita en la Siberia. ♂

Posee los *pedunculos* y *cálices* pelosos. Es muy parecida á la *Adormidera alpina*: y varía con la *corola* blanca y amarilla.

Acaso es diversa solamente por la cultura?

ESPECIES CON LAS CAPSULAS LAMPIÑAS.

Rhæas 5. PAPAVER *capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incis.* Mat. Med. 154. Knorr. del. 1. t. R. 14. Adormidera de capsulas lampiñas, globosas; tallo peloso, con muchas flores; hojas hendidas al través y cortadas.

Papaver foliis semipinnatis, hispidis, fructu ovato, glabro. Hall. helv. n. 1064. Adormidera de hojas medio pinnadas, con pelo rígido; fruto aovado y lampiño.

- Papaver erraticum*, major. C. B. P. 171. Dod. pemp. 447. Adormidera erratica, mayor.
- Papaver rhæas*, prius. Dalech. hist. 439. Adormidera silvestre, primera.
- Papaver erraticum*, pleno flore. C. B. P. 171. Tourn. p. 238. Knorr. del. 1. t. R. 12. 13. Adormidera erratica, con la flor plena.

Cast. Adormidera silvestre. vulgo: Amapola.

Habita entre los sembrados de Europa: en los contornos de Madrid, y es frecuente en España. ☉

PROPIED. Las flores son algo ácidas, conglutinantes, anodinas, diaforeticas, dulcificantes y pectorales: el cocimiento de las cabezuelas es tambien dulcificante y acarrea un poco el sueño; y se usan en la pleuritide y catarro. En tiempo esteril, por el invierno, las gentes del campo suelen comer la yerba en lugar de hortaliza.

- Dubium. 6. PAPAVER *capsulis oblongis glabris, caule multifloro setis adpressis, foliis pinnatifidis incis. An* Adormidera de capsulas oblongas, lampiñas; tallo de muchas flores, con cerdas apretadas; hojas hendidas al través y cortadas. Jacq. austr. t. 25?
- Papaver erraticum, capite longissimo, glabro.* Tourn. inst. 238. Adormidera erratica, con la cabezuela muy larga y lampiña.
- Argemone capitulo longiore, glabro.* Moris hist. 2. p. 279. sect. 3. t. 14. f. 11. Argemone con la cabezuela mas larga y lampiña.

Cast. Adormidera dudosa.

Habita entre los sembrados de la Europa mas Septentrional. ☉

- Somniferum. 7. PAPAVER *calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus, incis.* Adormidera con los cálices y capsulas lampiños; hojas amplexicaules y cortadas. Hall. helv. n. 1065.

308 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Papaver caule multifloro, foliis simplicibus glabris incisicis caulinis. Hort. Ups. 135. Adormidera con el tallo de muchas flores; hojas sencillas, lampiñas, cortadas y puestas en el tallo.

Papaver hortense, semine albo. C. B. P. 170. Tournef. p. 237. Adormidera hortense, con la semilla blanca.

Papaver hortense, semine nigro. C. B. P. 170. Tourn. p. 237. Adormidera hortense, con la semilla negra. α

Papaver nigrum, sive sativum. Dod. pempt. 445. Adormidera negra, ó doméstica.

Papaver cristatum, floribus & semine albo. C. B. P. 171. Tourn. p. 237. Adormidera con flores hendidas en fluecos ó en crestas, y semilla blanca. β

Papaver flore pleno, album. C. B. P. 171. Tournef. p. 238. Adormidera con la flor plena y blanca. γ

Cast. Adormidera somnifera.

Habita en lugares pedregosos de Europa, y en el término de S. Martin de Valdeiglesias y en otras partes de España. ○

Tiene el tallo, hojas y cálices lampiños; y diez estigmas. PROPIED. Es acre, amarga, resinosa, y de olor desagradable, narcotica y antispasmodica; pero las semillas son dulcificantes y anodinas.

La substancia entre gomosa y resinosa, llamada Opio, que se saca de las cabezuelas, tiene las mismas propiedades aunque muchísimo mas eficaces.

Cambricum 8. PAPAVER *capsulis glabris oblongis, caule multifloro levi, foliis pinnatis incisicis.* Huds. angl. 203. Adormidera con capsulas lampiñas, oblongas; tallo de muchas flores, liso; hojas pinnadas y cortadas.

Papaver foliis pinnatis, fructu acuminato. Hort. Cliff. 201. Adormidera con hojas pinnadas; y fruto puntiagudo.

Papaver Cambricum, perenne, flore sulphureo. Dill. elth. 300. t. 223. f. 290. Adormidera de Cambria, perenne, con la flor de color de azufre.

Argemone Cambro-Bri- Argemone de Cambria de
tannica, lutea, capite lon- Inglaterra, con flor amari-
giore, glabro. Moris. hist. 2. ulla; cabezuela mas larga y
 p. 297. sect. 3. t. 14. f. 12. lampiña.

Papaver erraticum, Py- Adormidera erratica, de
renaicum, flore flavo. C. B. Pirineos, con la flor de co-
 P. 171. Prodr. 92. Tourn. p. lor amarillo-roxo.
 239.

Cast. Adormidera cambrica.

Habita en bosques sombríos de la Cambria Septentrional,
 y en los Pirineos. ☞

Posee cinco ó seis *estigmas* separados: la *capsula* oblon-
 ga, mas angosta por abaxo, y que remata casi en pico.

Orien- 9. PAPAVER *capsulis* Adormidera de capsulas
 tale. *glabris, caulibus unifloris* lampiñas; tallos con una flor,
scabris foliosis, foliis pin- ásperos, foliosos; hojas pin-
natis serratis. Knorr. del. 1. nadas y aserradas.
 t. R. 1. 4. A.

Papaver foliis pinnatis, Adormidera con hojas pin-
fructu globoso. Roy. Lugdb. nadas; y fruto globoso.
 279.

Papaver Orientale, hir- Adormidera Oriental, con
sutissimum, flore magno. mucho pelo áspero; y flor
 Tourn. cor. 17. ic. 3. p. 127. grande.
 t. 127. Comm. rar. 34. t. 34.

Cast. Adormidera Oriental.

Habita en Oriente. ☉

Tiene diez y seis *estigmas*, y el tallo con cerdas ásperas,
 esparcidas y apretadas; pero levantadas en la base.

786. Género ARGEMONE. * Tourn. t. 121.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* casi redondo, de tres hojuelas, casi redon-
 das, con puntita, cóncavas, y que se caen al abrirse
 la flor.

COR. *Petalos* seis, casi redondos, entre derechos y exten-
 didos, y mayores que el caliz.

Es-

310 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos , filiformes, de la longitud del caliz : con las *anteras* oblongas y derechas.

PIST. *Germen* aovado , de cinco ángulos : *estilo* ninguno: *estigma* gruesecito , obtuso , redoblado , hendido en cinco partes y persistente.

PERIC. *Capsula* aovada , con cinco ángulos , de una celdilla y de medias ventallas.

SEM. numerosas y muy pequeñas. *Receptáculos* lineares, pegados á los ángulos del receptáculo , y que no se abren.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 239.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco ; de cuyo centro sale el pistilo que pasa á fruto ó capsula aovada , de una celdilla , con sus ventanas y lomos extendidos desde su ápice hasta su base , cuyos intervalos ocupan las ventallas ó sean postigos que se abren en lo alto , arrimandose á cada lomo un receptáculo cargado de semillas globosas.

ESPECIES.

Mexi.
cala. 1. ARGEMONE *capsulis* } Argemone con las capsu-
sexvalvibus , foliis spinosis. } las de seis ventallas; y hojas
} espinosas.

Argemone. Hort. Cliff. 218. } Argemone.

Merian. Surin. 24. t. 24. }
Papaver spinosum. C. B. } Adormidera espinosa.

P. 171. Prodr. 92. Bauh. hist.

3. n. 397. Clus. hist. 2. p. 93.

Papaver spinosum, luteum, } Adormidera espinosa, de
foliis albis venis notatis. } flor amarilla ; y hojas seña-
} ladas con venas blancas.

Moris. hist. 2. p. 277. sect. 3.

t. 14. f. 5.

Argemone Mexicana. To- } Argemone de México.
urn. p. 239. }

Cast. Argemone Mexicana.

Habita en México , Jamaica , tierra de Caribes , y hoy
dia en la Europa Austral. ♂

Arme-
niaca. 2. ARGEMONE *capsulis* X Argemone con las capsu-
trivalvibus. X las de tres ventallas.
Papaver Orientale, Hy- X Adormidera Oriental, con
pecoi folio, fructu minimo. X hoja como la del Hypecoo; y
Tourn. cor. 17. X fruto muy pequeño.

Cast. Argemone de Armenia.
Habita en Armenia.

Pyre-
naica. 3. ARGEMONE *capsulis* X Argemone con las capsu-
quadrivalvibus, caule nudo. X las de quatro ventallas; y ta-
X llo desnudo.

Cast. Argemone pirenaica.
Habita en los Pirineos. Tourn.

Esta especie tiene quatro medias *ventallas*: la segunda posee tres, y la primera cinco ó seis. Todas estas especies ó deben ponerse juntas en otro género ó bien en el de la *Adormidera*.

La traza de esta última especie se acerca á la de la *Adormidera alpina*.

787. Género CAMBOGIA.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de quatro hojuelas, casi redondas, cóncavas, y que se caen quando las demas partes de la flor.

COR. *Petalos* quatro, entre casi redondos y oblongos, cóncavos, y con uñas oblongas.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, cortos: con las *anteras* casi redondas.

PIST. *Germen* algo redondo, estriado: *estilo* ninguno: *estigma* hendido en quatro partes, obtuso y persistente.

PERIC. *Poma* casi redonda, de ocho ángulos, y ocho celdillas.

SEM. solitarias, entre de figura de riñon y oblongas, y algo comprimidas.

E S P E C I E.

- Gutta. I. CAMBOGIA. Amœnit. X Cambogia.
 Acad. 2. p. 402. Mat. Med. X
 155. X
 Coddam-puli. Rheed. mal. X Coddam-puli.
 I. p. 41. t. 24. X
 Carpapuli. Bauh. hist. 2. X Carpapuli.
 p. 137. Rai. hist. 1661. X

Cast. Cambogia gota. vulgo : Gota gamba.

Habita en la India. †

PROPIED. La gota ó zumo de esta planta es muy purgante, hydragogo, y algo emetico.

788. Género MUNTINGIA. † Plum. 6. Jacq.
 Amer. 166,

C A R. G E N. N A T.

- CAL. Periantio de una pieza, cóncavo por su base, y partido en cinco laciniás lanceoladas, puntiagudas, grandes, y que se caen quando las demas partes de la flor.
- COR. Petalos cinco, casi redondos, extendidos, é insertos en el caliz.
- ESTAMB. Filamentos muchos, capilares y cortísimos : con las anteras casi redondas.
- PIST. Germen globoso, cubierto de pelillos : estilo ninguno : estigma en cabezuela, de cinco lados, radiado y persistente.
- PERIC. Baya globosa : con el estigma en forma de ombligo, y de cinco celdillas,
- SEM. numerosas, casi redondas, muy pequeñas y anidadas.

E S P E C I E.

- Ca- I. MUNTINGIA. Jacq. X Muntingia.
 labura. Amer. 166, t. 107. X

<p><i>Muntingia fruticosa</i>, villosa, foliis serratis, oblongis, uno latere brevioribus. Brown. jam. 245.</p>	<p><i>Muntingia fruticosa</i>, vellosa, con hojas aserradas, oblongas, y mas cortas por un lado.</p>
<p><i>Muntingia folio sericeo</i>, molli, fructu majori. Plum. gen. 41. ic. 205.</p>	<p>Muntingia con hoja como de seda, blanda; y fruto mas grande.</p>
<p><i>Calabura alba</i>. Pluk. alm. 75. mant. 34. t. 152. f. 4.</p>	<p>Calabura blanca.</p>
<p><i>Loti arboris folio angustiore</i>, Rubi flore, fructu polyspermo, umbilicato. Sloan. jam. 162. hist. 2. p. 80. t. 194. f. 1. Rai. dend. 32.</p>	<p>Planta de hoja como la del Loto arbol, mas angosta; flor como la de la Zarza; fruto con ombligo, y de muchas simientes.</p>

Cast. Muntingia Calabura.

Habita en la Jamaica. \bar{h}

Tiene las flores axilares, de dos en dos y blancas.

789. Género SARRACENIA. † Tourn. t. 476.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio doble.

El inferior de tres hojuelas, aovadas, muy pequeñas, y que se caen quando las demas partes de la flor.

El superior de cinco hojuelas, casi aovadas, muy grandes, de color, y que se caen quando las demas partes de la flor.

COR. Petalos cinco, aovados, doblados ácia dentro, y que cubren los estambres; con las uñas rectas, entre aovadas y oblongas.

ESTAMB. Filamentos numerosos y pequeños: con las anteras sencillas.

PIST. Germen casi redondo: estilo cilindráceo y muy corto: estigma á manera de escudo, abroquelado, de cinco ángulos que cubren los estambres y persistente.

PERIC. Capsula algo redonda, y de cinco celdillas.

SEM. muchas, casi redondas, puntiagudas y pequeñas.

CARAC. GENER. DE TOURN. p. 657.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco, sentados en el caliz de muchas hojuelas, de cuyo centro sale el pistilo adornado de un escudo membranoso, que pasa á fruto casi redondo, dividido en cinco celdillas y lleno de simientes oblongas.

ESPECIES.

Flava.

1. SARRACENIA.

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Sarracenia foliis rectis.</i>
Hort. Cliff. 497. Gron. Virg.
164.</p> | X | <p>Sarracenia.
Sarracenia con hojas rec-
tas.</p> |
| <p><i>Sarracena foliis longiori-
bus & angustioribus.</i> Ca-
tesb. car. 2. p. 69. t. 69.</p> | X | <p>Sarracena con hojas mas
largas y mas angostas.</p> |
| <p><i>Bucanephyllum elatius,</i>
<i>Virginianum, seu Limonio</i>
<i>congener, altera species ela-
tior, foliis triplo longiori-
bus.</i> Pluk. Alm. 72. Amalth.
46. t. 152. f. 3. mala. t. 376.
f. 5. bona.</p> | X | <p>Bucanephylo de Virginia,
mas levantado, ú otra espe-
cie semejante al Limonio,
mas levantada, con hojas
tres veces mas largas.</p> |
| <p><i>Thuris limpidi folium.</i>
Bauh. hist. 1. p. 307. Da-
lech. hist. 1754. Lob. adver.
430.</p> | X | <p>Hoja de incienso limpio.</p> |

Cast. Sarracenia de color amarillo-roxo.
Habita en lugares húmedos de la America Septentrio-
nal. 2f

Pur-
purea.

2. SARRACENIA *foliis*

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|
| <p><i>gibbis.</i> Mill. ic. 161. t. 241.</p> | X | <p>Sarracenia con hojas gibo-
sas.</p> |
| <p><i>Sarracena foliis breviori-
bus, latioribus.</i> Catesb. car.
2. p. 70. t. 70.</p> | X | <p>Sarracena con hojas mas
cortas y mas anchas.</p> |

Bucanephyllum Americana- X Planta llamada Bucane-
num, Limonio congener, dic- X phylo Americano, semejante
rum. Pluk. Alm. 71. Amalth. X al Limonio.
 46. t. 376. f. 6.

Limonium peregrinum, X Limonio peregrino, con
foliis forma floris Aristolo- X hojas en forma de la flor de
chiæ. C. B. P. 192. X la Aristolochia.

Sarracena Canadensis, X Sarracena del Canadá, de
foliis cavis & auritis. To- X hojas cóncavas y con oreji-
 urn. p. 657. X llas.

Cast. *Sarracenia purpurea.*

Habita en lugares húmedos de la America Septentrio-
 nal. ¶ *Collinson.*

Produce las *hojas* sentadas y á manera de cucurucho; con
 su *tubo* ventricoso y gradualmente ensanchado: la *gar-*
ganta algo apretada, y por delante ensanchada en su
 margen: el *borde* en forma de ríñon, abierto y escota-
 do: el *vientre* por delante con una quilla membranosa
 medio elíptica y de dos nervios.

Asi se transforma la *hoja* de la *Nimphaea* como la de
 la *Sarracenia*, para que recogiendo el agua de lluvia crez-
 ca fuera de las aguas, con admirable providencia de la na-
 turaleza.

790. Género NYMPHÆA. * *Tourn. t. 137. 138.*

Nelumbo. Tourn.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* baxo del germen, de quatro hojuelas,
 grande, de color por encima y persistente.

COR. *Petalos* numerosos (*las mas veces quince*), sentados
 en el lado del germen, y con mas de una serie.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos (*comunmente setenta*),
 planos, encorvados, obtusos y cortos: con las *ante-*
ras oblongas, y pegadas á la margen de los filamen-
 tos.

PIST. *Germen* aovado, grande: *estilo* ninguno: *estigma*
 redondo, plano, abroquelado y sentado, señalado
 con ródios, recortado por su margen y persistente.

PE.

316 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

PERIC. *Baya* dura, aovada, carnosa, tosca, angostada por su cuello, coronada en su remate, de muchas celdillas (*de diez á quince*) y llena de pulpa.

SEM. muchas y casi redondas.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 260.

La flor es rosácea ó que consta de muchos pétalos puestos en cerco; de cuyo caliz sale el pistilo que pasa á fruto casi globoso ó cónico, de muchas celdillas y lleno de simientes oblongas.

NELUMBO. p. 261.

Es diverso de la *Nimphaea*, por la figura de su fruto, y por no dividirse en celdillas, sino que en él se hallan las simientes esparcidas, y como anidadas.

ESPECIES.

- Lutez. 1. NYMPHÆA *foliis cordatis integerrimis, calyce petalis majore pentaphyllo.* Nimphæa con hojas de figura de corazon, enterisimas; caliz de cinco hojuelas y mayor que los pétalos. Flor. dan. t. 603.
- Nymphæa calyce pentaphyllo, petalis majori, fructu conico.* Hall. helv. n. 1066. Nimphæa con el caliz de cinco hojuelas, mayor que los pétalos; y fruto cónico.
- Nymphæa lutea, major.* C. B. P. 193. Tourn. p. 261. Nimphæa mayor, con la flor amarilla.
- Nymphæa lutea.* Bauh. hist. 3. p. 771. Dod. pempt. 585. Cam. epit. 635. Nimphæa de flor amarilla.

Cast. Nimphæa amarilla.

Habita en Europa debaxo de las aguas dulces y encharcadas: en los montes de Burgos: en el rio Pisuerga: en Aragon, Cataluña y otras partes de España. 24

- Alba. 2. *NYMPHÆA foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido*. Mat. Med. p. 155. Gmel. Sib. 4. p. 183. t. 72. Flor. dan. t. 602. Nimphea con hojas de figura de corazon; y caliz hendido en quatro partes.
- Nymphæa calyce tetraphyllo, corola multiplici*. Roy. Lugdb. 480. Nimphea con el caliz de quatro hojuelas; y corola multiplicada.
- Nymphæa calyce quadrifido, petalis minori, fructu spherico*. Hall. helv. n. 1067. Nimphea con el caliz hendido en quatro partes, menor que los petalos; y fruto esférico.
- Nymphæa alba, major*. C. B. P. 193. Tourn. p. 260. Nimphea mayor, con la flor blanca.
- Nymphæa alba*. Bauh. hist. 3. p. 770. Dod. pempt. 585. Cam. epit. 634. Nimphea con la flor blanca.

Cast. Nimphea blanca.

Habita en aguas dulces y encharcadas de Europa: en Extremadura, la Mancha, Valencia, Cataluña y otras partes de España. ¶

PROPIED. La raiz es algo astringente y saponácea: las flores son anodinas y refrigerantes; y se usan en la diarrea, gonorrea y calenturas.

- Lotus. 3. *NYMPHÆA foliis cordatis dentatis*. Haselquist. it. 471. Nimphea con hojas de figura de corazon y dentadas.
- Nymphæa foliis amplioribus, profunde crenatis, subtus areolatis*. Brown. jam. 343. Nimphea de hojas mas anchas, profundamente recordadas, y con quadritos por debaxo.
- Lotus Ægyptia*. Ægypt. 103. exot. 214. t. 213. 216. 218. 220. 222. 226. Loto de Egipto.
- Ambel*. Rheed. Malab. 11. P. 51. t. 26. Ambel.

Cast. Nimphea loto.

Habita en lugares calientes de la India, Africa y America. ¶

- Ne-
lumbo. 4. *NYMPHÆA foliis peltatis undique integris.* Hort. Cliff. 203. Nimphea con hojas abroqueladas, y enteras por todas partes.
- Nymphæa foliis orbiculatis, peltatis, subtus radiatis.* Brown. 343. Nimphea con hojas redondas, abroqueladas y por debajo radiadas.
- Nymphæa Indica, Faba Ægyptia dicta, flore incarnato.* Herm. par. 205. t. 205. Nimphea de Indias, llamada Haba de Egipto, con la flor encarnada.
- Nymphæa Fabifera, Indica, paludibus gaudens, foliis umbilicatis, amplis, pediculis spinosis, flore roseo purpureo.* Pluk. Alm. 267. t. 322. f. 1. optima. Nimphea de Indias, que lleva Habas, y crece en las balsas; de hojas anchas con ombligo; piecitos espinosos; y flor como rosa de color purpúreo.
- Taratti.* Rumph. Amb. 6. p. 168. t. 73. Taratti.
- Tamara.* Rheed. Malab. 11. p. 59. t. 30. Tamara.
- Bem-Tamara.* Rheed. Malab. 11. p. 61. t. 31. Rai. Bem-Tamara.
- α *Nymphæa affinis glandifera, Virginiana, umbilicato folio, flore luteo, pleno.* Moris. hist. 3. p. 514. Rai. Suppl. p. 632. Planta de Virginia, que lleva bellotas, parecida á la Nimphea, de hoja con ombligo; flor plena y de color amarillo. α
- Nymphæa glandifera, Virginiana, lactescens, minori umbilicato folio, pediculo lævi, flore amplo, luteo-pallescete.* Pluk. Alm. 267. Nimphea de Virginia, lactescente, que lleva bellotas; de hoja mas pequeña, con ombligo; piecito liso ó sea sin espinas; flor ancha, y de color amarillo-pálido.

Cast. Nimphea nelumbo.

Habita en las Indias, en la Persia y Rusia. 26

La capsula se abre por su estigma en tantos poros como semillas tiene, y suena con ellas hallandose maduras. Las semillas antes que germinen, contienen dentro de sí algunas hojas perfectas.

La

La variedad *a* se diferencia solamente por las *semillas* duras.

791. Género BIXA. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de cinco dientes, muy pequeño, obtuso, plano y persistente.

COR. doble.

La *exterior* de cinco petalos oblongos, iguales, grandes y mas toscos.

La *interior* de cinco petalos semejantes á los exteriores, y mas delgados.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos, setáceos, y la mitad mas cortos que la corola: con las *anteras* derechas.

PIST. *Germen* aovado: *estilo* filiforme, de la longitud de los estambres: con el *estigma* hendido en dos lacinias paralelas y comprimido.

PERIC. *Capsula* entre aovada y de figura de corazon, comprimida, rodeada de cerdas, de dos ventallas, que se abre por sus ángulos, de una celdilla, y con la membrana interior de dos ventallas.

SEM. numerosas, de figura cónica inversa, y con ombligo truncado. *Receptáculo* linear, longitudinal, y pegado en medio de las ventallas.

ESPECIE.

Orellana.	1. BIXA. Hort. Cliff. 211.	X	Bixa.
	Mat. Med. 156.		
	<i>Orleana seu Orellana,</i>	X	Orleana ú Orellana, con
	<i>folliculis Lappaceis.</i> Pluk.	X	los foliculos ganchosos como
	Alm. 272. t. 209. f. 4. Comm.	X	los del Lampazo.
	hort. 1. p. 65. f. 33. t. 33.	X	
	<i>Pigmentaria.</i> Rumph.	X	Planta cuyos granos sirven
	Amb. 2. p. 79. t. 19.	X	para pintar.
	<i>Achiod.</i> Hernand. Mex.	X	Achiod.
	p. 74.	X	
	<i>Arbor Mexioacana, fructu</i>	X	Arbol de México, con el
	<i>Castaneæ, coccifera.</i> C. B.	X	fruto como el de la Castaña,
	P. 419.	X	en el qual lleva granos.

Uru-

320 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Urucu. Sloan. jam. 250. X Urucu.
 hist. 2. p. 52. t. 181. f. 1. X

Cast. Bixa orellana. Farm. Orleana terra.

Habita en los fosos y fuentes de la America mas caliente:
 en el Brasil y México. h

PROPIED. La fecula de las semillas de esta planta, re-
 putada por una especie de tierra, es algo amarga, un
 poco aromática y de color encarnado: es refrigerante, un
 corroborante y estomática: se usa en la hemorragia y
 demas fluxos de los humores: en los tintes, y se mez-
 cla alguna vez con el chocolate. Los Indios se sirven
 de las semillas de este arbol, para las comidas en lu-
 gar de azafran.

792. Género SLOANEA. Loeff. it. 311.

Sloana. Plum. 15.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de cinco hojuelas, que se caen quando las
 demas partes de la flor.

COR. de cinco petalos.

ESTAMB. Filamentos muchos, alesnados, mas anchos por
 arriba, y de la longitud del caliz; con los exteriores
 estériles y foliáceos: y las anteras pegadas al lado de
 los filamentos.

PIST. Germen metido en el caliz: estilo alesnado, mas lar-
 go que los estambres: con el estigma horadado.

PERIC. Capsula grande, casi redonda, erizada, á manera
 de baya por dentro y que se abre.

SEM. numerosas y con almendras oblongas.

ESPECIES.

Den- I. SLOANEA foliis cor- X Sloanea de hojas entre de
 tata- dato-ovatis denticulatis, X figura de corazon y aovadas,
 stipulis serratis. Loeff. it. X con dienteitos; y estipulas
 311. X aserradas.

Sloanea amplis Castanæ X Sloanea con hojas anchas,
 foliis, fructu echinato. Plum. X como las del Castaño; y
 gen. 49. ic. 244. X fruto erizado.

Cas-

<p><i>Castanea foliis oblongo-ovatis, serratis, fructu rotundo, maximo, echinato.</i> Mill. dict.</p> <p><i>Apeiba.</i> Marcgr. bras. 123. t. 123. Rai. hist. 1643.</p>	<p>Castaño con hojas entre oblongas y aovadas, aserradas ; fruto redondo , muy grande y erizado.</p> <p>Apeiba.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cast. Sloanea dentada.

Habita en la America meridional. *h*

Es de género hasta ahora obscuro , y ciertamente atendiendo á las hojas , á las ventallas del pericarpio , y á su aspereza , es muy verosimil la opinion de *Miller* , quien la tiene por especie de *Haya* , á lo qual no se conforma *Loefling* en la descripcion siguiente.

Es *arbol* mediocre ó *arbusto* alto , que nace cerca los riachuelos ; con *ramas* laxás , largas , claras y variamente dispersas. Produce las *hojas* alternas , en los extremos de las ramas , casi sentadas , oblongas , del largo de un gema , obtusas por su base , de figura de corazon , algo rugosas por encima , pero con venillas lindamente dispuestas , tomentosas por debaxo , pelosas y aserradas : las *flores* en racimo , opuesto á la hoja de mas abaxo , compuesto de ramitas alternas , de cuya sumidad salen tres ó quatro flores con piececito : las *bracteas* de dos en dos , opuestas en cada ramita lateral ; tres , quatro , ó cinco mayores , extendidas y aovadas en los piecечitos , los quales son de media pulgada de largo : el *caliz* derecho , abierto , rígido y enxuto , de cinco hojuelas lineares y agudas , crasas por su margen , contiguas antes de abrirse la flor , del largo de media pulgada , con vello peloso por defuera , y que se caen quando las demas partes de la flor : la *corola* de cinco petalos derechos , entre oblongos y casi redondos , poco mas altos que la mitad del caliz ; con *uñas* cortas , oblongas , algo obtusas , ensanchandose gradualmente ácia arriba : muchos *filamentos* (de ciento hasta doscientos) filiformes , la mitad mas cortos que la corola , compactos , algo planos por arriba , los de afuera estériles , por arriba foliáceos , lanceolados y con algun pelo áspero : las *anteras* entre oblongas y lineares , pegadas en el lado interior del filamento , con su remate casi foliáceo y con al-

gun pelo áspero: el *germen* casi redondo, deprimido: el *estilo* filiforme, al doble mas largo que los estambres, poco mas largo que la corola y algo encorvado por su ápice: el *estigma* obtuso, horadado y á manera de cilindro: la *baya* casi redonda, deprimida, del ancho de la palma de la mano, erizada por todas partes, con pelos blandos, agudos, carnosos por dentro y acaso es capsula: muchas *semillas* casi redondas, algo comprimidas y mediocres. El color de la corola es amarillo. *Loeff. loco citato.* Aprobó *Linneo* la descripción del mismo *Loefling*.

Emarginata. 2. SLOANEA *foliis oblongis integerrimis emarginatis.* Sloanea con hojas oblongas, enterisimas y escotadas.

Anona foliis Laurinis in summitate incisís, fructu compresso, scabro, fusco, in medio acuminé longo. Catesb. Anona de hojas como las del Laurel, cortadas en lo alto; fruto comprimido, áspero, obscuro, y con una punta larga en medio. *car. 2. p. 87. t. 87.*

Cast. Sloanea escotada.

Habita en la Carolina. *h*

793. Género TREWIA.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de tres hojuelas, aovadas, redobladas, de color y persistentes.

COR. ninguna; sino que sea el caliz.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos, capilares, de la longitud del caliz: con las *anteras* sencillas.

PIST. *Germen* baxo del caliz: *estilo* sencillo, del largo de los estambres: con el *estigma* tambien sencillo.

PERIC. *Capsula* cónico inversa, de tres caras, coronada, de tres celdillas y tres ventallas.

SEM. solitarias, por una parte convexas, y por la otra anguladas.

OBS. Sospechó *Linneo* que en este género se hallasen tambien flores meramente masculinas.

ESPECIE.

Nudi-
flora.

I. TREWIA.

*Arbor racemosa, Malab-
rica, fructu triquetro.* Com.
mal. 3.

Canschi. Rheed. Mal. 1.
p. 76. t. 42. *Burm. Ind.* 298.

Trewia.

Arbol racimoso, de Mala-
bár, con el fruto de tres ca-
ras.

Canschi.

Cast. Trewia con flor desnuda.

Habita en lugares arenosos de Malabár. $\frac{7}{2}$

794. Género MAMMEA. † *Jacq. Amer.* 264.

Mamei. *Plum.* 4.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, partido en dos hojuelas, aovadas, cóncavas, correosas, de color, y que se caen quando las demas partes de la flor.

COR. *Petalos* quatro, casi redondos, cóncavos, extendidos y mayores que el caliz.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, capilares, cortísimos: con las *anteras* oblongas y derechas.

PIST. *Germen* casi redondo, deprimido: *estilo* cilindrico, mas largo que los estambres: con el *estigma* en cabezuela, convexo y persistente.

PERIC. *Baya* carnosa, muy grande, puntiaguda con el estilo, esférica y de una celdilla.

SEM. quatro, casi aovadas y ásperas.

OBS. *Jacquin* observó flores masculinas en uná misma y en distinta planta.

ESPECIES.

Ame-
ricana.

I. MAMMEA *staminibus*

flore brevioribus. *Jacq. amer.*
268. t. 181. f. 82.

*Mammea foliis ovalibus,
nitidis, fructu subrotundo,
scabro.* *Brown. jam.* 248.

Mammea con los estam-
bres mas cortos que la flor.

Mammea con hojas ovales,
lustrosas; fruto casi redon-
do y áspero.

X 2

Mam-

324 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Mammei magno fructu, Persicæ sapore. Plum. gen. 44. ic. 170. Mammei con el fruto grande, y de sabor de Persico.

Mamay. Bauh. hist. i. p. 172. Dalech. hist. 1836. Laet. amer. 356. Mamay.

Malus Persica maxima, foliis rotundis, splendidibus, glabris, fructu maximo, scabro, rugoso. Sloan. jam. 179. hist. 2. p. 123. t. 217. f. 3. Persico muy grande, con hojas redondas, relucientes, lampiñas; fruto muy grande, áspero y rugoso.

Arbor Indica, Mammei dicta. C. B. P. 417. Rai. hist. 1665. Arbol de Indias, llamado Mammei.

Cast. Mammea Americana.

Habita en las Islas Española y Jamaica. *h*

Es arbol alto, de figura piramidal; y con ramas ásperas. Echa las *hojas* opuestas, oblongas y obtusas: el *fruto* de color leonado, de la magnitud de la cabeza de un niño y muy agradable; pero la *corteza* y *pulpa* propias de la semilla son muy amargas.

Asia- 2. MAMMEA *staminibus* Mammea con los estam-
tica. *flore longioribus.* Osb. ic. 278. bres mas largos que la flor.

Mammea maxima, foliis longioribus, cortice sulcato, cinereo. Brown. jam. 248? Mammea muy grande, con hojas mas largas; corteza asurcada y cenicienta.

Mali Persicæ Mameyæ folio longiore, arbor maxima, cortice sulcato, cinereo, amaro. Sloan. jam. 180. hist. 2. p. 124? Arbol muy grande, con hoja como la del Persico llamado Mamey, pero mas larga; corteza asurcada, cenicienta y amarga.

Cast. Mammea Asiática.

Habita en Java. Osbeck. *h*

Es arbol grande y comunmente tendido. Produce las *hojas* del largo de un pie, aovadas al revés ú oblongas y lisas: los *pedunculos* de una flor: el *caliz* aovado y dividido en dos partes: quatro *petalos* aovados, tres veces mas

mas largos que el caliz, y que se caen pronto junto con los *estambres* que son numerosos, alesnados, derechos, y al doble mas largos que la corola: las *anteras* casi redondas, y muy pequeñas; y el *fruto* de quatro lados.

795. Género OCHNA. † Jabotapita. Plum. 32.

CAR. GEN. NAT.

- CAL. *Periantio* de cinco hojuelas, aovadas, extendidas, pequeñas y persistentes.
 COR. *Petalos* cinco, casi redondos; con *uñas* del largo del caliz, extendidos y muy obtusos.
 ESTAMB. *Filamentos* numerosos, cortos y arrimados entre sí: con las *anteras* casi redondas.
 PIST. *Germen* aovado, que remata en un *estilo* alesnado y recto: con el *estigma* sencillo.
 PERIC. *Receptáculo* casi redondo, truncado, carnoso, y muy grande, en el qual están metidas por su base dos hasta cinco *bayas* aovadas y apartadas.
 SEM. solitaria y aovada.

ESPECIES.

Squar-rosa.

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. OCHNA <i>racemis lateralibus</i> . Flor. Zeyl. 209. | X | Ochna con racimos laterales. |
| <i>Japotapita Cinnamomi folio, floribus spicatis</i> . Burm. Zeyl. 123. t. 56. | X | Japotapita con hoja como la del Arbol de Canela; y flores espigadas. |
| α <i>Arbor Africana, subrotundo folio, margine denticulis acutis aspero, floribus pentapetalis, atropurpureis</i> . Pluk Alm. 41. t. 263. f. 1. 2. | X | Arbol de Africa, de hoja casi redonda, áspera por su margen con dientecitos agudos; y flores de cinco petalos, de color entre negro y purpúreo. α |

Cast. Ochna desparramada.

Habita en la India; y la variedad en Africa.

Los *racimos* persisten desparramados debaxo de las hojas, despues de haber caido los *piecitos* que sostenian la fructificacion.

OCHNA

326 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST .

Jabotapita,	2. <i>OCHNA racemis terminalibus.</i> † <i>Jabotapita pyramidata flore luteo , fructu rubro.</i> Plum. amer. 42. ic. 153. <i>Jabotapita.</i> Marcgr. bras. 101. Rai. hist. 1633.	Ochna con los racimos terminales. Jabotapita con la flor en forma de piramide, amarilla; y el fruto roxo. Jabotapita.
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cast. Ochna Jabotapita.
 Habita en la America Meridional. *h*

796. Género GRIAS. †

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de una pieza , en forma de cubilete , hendidó en quatro partes y lacerado.
- COR.** *Petalos* quatro , casi redondos , cóncavos y correosos.
- ESTAMB.** *Filamentos* numerosos , setáceos , mas largos que la corola , é insertos en el receptáculo : con las *anteras* casi redondas.
- PIST.** *Germen* algo deprimido , y metido en el caliz : *estilo* ninguno ; *estigma* gruesecito , de quatro lados , y excavado en forma de cruz.
- PERIC.** *Drupa* grande , de una celdilla , y puntiaguda por su base y ápice.
- SEM.** Nuez señaladâ con ocho surcos.

ESPECIE.

1. GRYAS. Cauli- flora.	<i>Calophyllum foliis tripetalibus , obovatis , floribus per caulem & ramos sparsis.</i> Brown. jam. 245. <i>Palmis affinis Malus Persica , maxima , caudice non ramoso , foliis longissimis , flore tetrapetalo , pallide luteo, fructu ex arboris trunco.</i> Sloan. jam. 179. hist. 2. p. 123. t. 217. f. 1. 2.	Grias. Calophylo con hojas del largo de tres pies , aovadas al revés ; y flores esparcidas por el tallo y ramas. Persico muy grande , parecido á las Palmas , con el tronco sin ramas ; hojas larguissimas ; flor de quatro petalos , de color amarillo pálido ; y fruto que sale del tronco del arbol.
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cast.

Cast. Grias que florece en el tronco.

Habita en la Jamaica. *h*

797. Género CALOPHYLLUM. *Jacq. Amer. 269.*

Calaba. *Plum.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de quatro hojuelas, aovadas, cóncavas, de color, y que se caen quando las demas partes de la flor, con las dos exteriores mas cortas.

COR. *Petalos* quatro, oblongos, cóncavos y extendidos.

ESTAMB. *Filamentos* muchos (*diez segun Jacquin*), filiformes y cortos: con las *anteras* derechas y oblongas.

PIST. *Germen* casi redondo: *estilo* filiforme, del largo de los estambres: con el *estigma* en cabezuela y obtuso.

PERIC. *Drupa* globosa.

SEM. *Nuez* globosa, muy grande y algo puntiaguda.

OBS. Notó *Jacquin* flores masculinas separadas.

ESPECIES.

- | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ino-
phyl-
lum. | 1. CALOPHYLLUM fo-
liis ovalibus. Fl. Zeyl. 101. | Calophylo con hojas ova-
les. |
| | <i>Arbor Indica, Mali me-
dicæ amplioribus foliis.</i> Pluk. | Arbol de Indias, con ho-
jas como las del Cidro, pero
mas anchas. |
| | <i>Bitangor maritima.</i> Rum-
ph. amb. 2. p. 211. t. 71. | Bitangor maritima. |
| | <i>Ponna seu Ponna-maram.</i>
Rheed. Mal. 4. p. 76. t. 38. | Ponna ó Ponna-maram. |
| | <i>Rai. hist. 1525.</i> | |

Cast. Calophylo Inophylo ó sea hoja hermosa de la Diosa
Ino.

Habita en la India. *h*

- | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Calaba | 2. CALOPHYLLUM fo-
liis ovatis obtusis. Fl. Zeyl.
202. <i>Jacq. Amer. 269. t. 165.</i> | Calophylo con hojas ao-
vadas y obtusas. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Calophyllum foliis ovatis X Calophylo de hojas aova-
obtusis, striis parallelis das, obtusas, con estrias pa-
transversis. Hort. Cliff. 206. ralelas y transversales.

Inophyllum flore quadri- Inophylo con la flor hen-
fido. Burm, Zeyl. t. 60. dida en quatro partes.

Tsierou-ponna. Rheed. X Tsierou-ponna.
 Mal. 4. p. 81. t. 39.

Cast. Calophylo Calaba.

Habita en las Indias. \bar{n}

PROPIED. Se cree que de esta especie, que se cria tambien en la Provincia de Mariquita, sacan el Bálsamo ó Aceyte de Maria, el qual es tenido por excelente estomático, vulnerario y nervino: se usa asi interior, como exteriormente en los afectos del pecho, en las obstrucciones, y para corroborar las entrañas.

798. Género TILIA, * Tourn, t. 381.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* dividido en cinco partes, cóncavo, de color, casi de la magnitud de la corola, y que se cae quando las demas partes de la flor.

COR. *Petalos* cinco, oblongos, obtusos, y recortados por su ápice.

ESTAMB. *Filamentos* muchos (*treinta y aun mas*), alesnados, del largo de la corola: con las *anteras* sencillas.

PIST. *Germen* casi redondo: *estilo* filiforme, de la longitud de los estambres: con el *estigma* de cinco lados y obtuso.

PERIC. *Capsula* correosa, globosa, de cinco celdillas, de cinco ventallas, y que se abre por su base,

SEM. solitarias y casi redondas.

ORS. Crece comunmente una sola semilla, la qual empuja á un lado las restantes que no cuajan, de manera que la capsula parece de una celdilla.

El *Tilo Americano* goza de cinco escamas puestas al rededor del germen, y pegadas á las uñas de la corola.
D. Kalm.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 611.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco ; de cuyo caliz sale el pistilo que pasa á capsula de una celdilla , llena de simientes oblongas.

ESPECIES.

Euro-
pæa.

1. *TILIA floribus nectario destitutis.* Mat. Med. 136. Flor. dan. t. 553.

Tilo con flores que carecen de nectario.

Tilia foliis cordato-lanceolatis , spongiolis ad nervorum angulos sessilibus. Hall. helv. 1030.

Tilo con hojas entre de figura de corazon y lanceoladas ; y esponjitas sentadas en los ángulos de los nervios.

Tilia fœmina , folio majore. C. B. P. 426. Tourn. p. 611.

Tilo femenino , con la hoja mas grande.

Tilia vulgaris , platyphyllos. Bauh. hist. 1. p. 133.

Tilo vulgar , de hoja ancha.

Tilia urbana. Gesn. t. 3.

Tilo urbano, ó sea doméstico.

α *Tilia montana , maximo folio.* C. B. P. 426.

Tilo montano , con hoja muy grande. α

β *Tilia fœmina , folio minore.* C. B. P. 426. Tourn. p. 611. Bauh. hist. 1. p. 137.

Tilo femenino , con hoja mas pequeña. β

Tilia (cordata) foliis cordatis , acuminatis , inæqualiter serratis , fructibus quinquelocularibus , tomentosis. Mill. dict. n. 1.

Tilo (de figura de corazon) con hojas de figura de corazon , puntiagudas , desigualmente aserradas ; frutos de cinco celdillas y tomentosos.

Tilia Ulmifolia. Scop. car. 2. n. 642.

Tilo con hoja como la del Olmo.

χ *Tilia Ulmifolia , semine hexagono.* Rai. angl. 3. p. 473.

Tilo con hoja como la del Olmo ; y semilla de seis lados. χ

Tilia foliis molliter hirsutis, viminibus rubris, fructu tetragono. Rai. angl. 3. p. 473. Synops. 316. Tourn. p. 611. Duham. arb. 4. Tilo de hojas con pelo blando; vástagos de color roxo; y fruto de quatro lados. *A*

Tilia Bohemica, foliis minoribus, glabris, fructu oblongo, utrinque acuminato, minime costulato. Till. pis. 165. t. 49. f. 9. 3. Tilo de Bohemia, con hojas mas pequeñas, lampiñas; fruto oblongo, puntiagudo por una y otra parte, y sin lomos ó sean lados. *z*

Cast. Tilo de Europa.

Habita en los prados de Europa: en Asturias, Pirineos de Cataluña y Aragón. *h*

PROPIED. Las flores son anodinas, antispasmodicas, y se usan en los vertigos y epilepsia.

Americana. 2. *TILIA floribus nectario instructis.* Kalm. Tilo con flores adornadas de nectarios.

Tilia Caroliniana. Mill. dict. n. 4. Tilo de la Carolina.

Tilia foliis majoribus, mucronatis. Gron. virg. 58. Tilo con hojas mayores, y que rematan en punta rígida. *X*

Cast. Tilo de America.

Habita en la Virginia y Canadá. *h*

799. Género LÆTIA. † *Loefl. it.* 190.

Jacq. Amer. 167.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de cinco hojuelas, oblongas, cóncavas, redobladas, de color y que se marchitan.

COR. ninguna, ó de cinco petalos.

ESTAMB. Filamentos numerosos, capilares, y poco mas cortos que el caliz: con las anteras casi redondas.

PIST. Germen oblongo, y que remata en un estilo filiforme, mas largo que los estambres: con el estigma en cabezuela, y deprimido.

PERIC. Baya globosa, de tres lados, señalada con tres lineas,

INSERTOS EN EL RECEPT. Y I. PIST. 331

neas, de una celdilla, y por dentro acompañada de una membrana cartilaginosa.

SEM. muchas, anidadas, anguladas y cubiertas con el arilo pulposo.

OBS. La *Lecia completa* tiene cinco petalos; y la *capsula* de tres ventallas.

La *Lecia sin petalos* posee la baya carnosa.

ESPECIES.

Apetala. 1. *LÆTIA floribus apetalis*. Jacq. Amer. 167. t. 108. *Lecia* con flores sin petalos.
Amoen. Acad. 5. p. 413.

Guidonia Lætia. Loeffl. it. 190. *Guidonia Lecia*.

Guidonia foliis ovatis, utrinque porrectis, alternis, quandoque crenatis, racemis laxis, alaribus. Brown. Jam. 249. *Guidonia* con hojas aovadas, extendidas por una y otra parte, alternas, alguna vez recortadas; y racimos laxos que salen de las axilas.

Cast. *Lecia* sin petalos.
Habita en America. \bar{h}

Completa. 2. *LÆTIA floribus petaloides completis*. Jacq. Amer. 167. t. 183. f. 60. *Lecia* de flores completas con petalos.

Cast. *Lecia* completa.
Habita en America. \bar{h}

800. Género ELÆOCARPUS. † *Burm.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de cinco hojuelas, lanceoladas, agudas e iguales.

COR. *Petalos* cinco, entre laciniados y lacerados, iguales, y de la longitud del caliz.

ESTAMB. *Filamentos* veinte, cortísimos, fixados en el receptáculo: con las *anteras* lineares y mas cortas que la corola.

PIST.

332 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

PIST. *Germen* puntiagudo : *estilo* filiforme , y del largo de los estambres : con el *estigma* agudo.

PERIC. *Drupa* redonda.

SEM. *Nuez* rizada y esférica.

OBS. Excluye con frecuencia la quinta parte del número de las de la flor.

ESPECIES.

Serratus.

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <i>ELÆOCARPUS</i> <i>monogynus</i> , <i>foliis alternis oblongis serratis</i> , <i>racemis axillaribus</i> . Suppl. p. 266. | Eleocarpo con un pistilo; hojas alternas , oblongas , aserradas ; y racimos axilares. |
| <i>Elæocarpus foliis Lauri</i> , <i>serratis</i> , <i>floribus spicatis</i> . Burm. Zeyl. 39. t. 40. | Eleocarpo con hojas como las del Laurel , aserradas ; y flores en espiga. |
| <i>Ganitrus</i> . Rumph. amb. 3. p. 60. t. 101. | Ganitro. |
| <i>Perin-kara</i> . Rheed. Mal. 4. p. 51. t. 24. Rai. hist. 1546. Dendr. 42. | Perin-kara. |
| <i>Dicera dentata</i> . Forst. gen. n. 40. | Dicera dentada. |

Cast. Eleocarpo aserrado.

Habita en la India. $\frac{f}{2}$

Rumphio hace mencion de muchas especies de este género. *Linneo* vió en la de *Zeylan* veinte estambres: y en la de *Java* ocho: en la de *Burman* diez y seis hasta veinte: y en otra muestra , que seria diferente especie ó variedad, observó el *caliz* partido en cinco lacinias y agudo : tres *petalos* con uñas , mas largos que el caliz , y lace- rados con raeduras capilares : ocho *filamentos* cortos : las *anteras* á manera de columna , y que se abrian por su ápice de dos ventallas : el *germen* dentro de la flor, y casi globoso ; y el *estilo* filiforme , del largo de los estambres , con el *estigma* sencillo.

Dicera 2. **ELÆOCARPUS** *tetragynus*, *foliis oppositis ovatis duplicato-serratis, racemis lateralibus oppositis.* Eleocarpo de quatro pistilos; hojas opuestas, aovadas, dos veces aserradas; y racimos laterales tambien opuestos.
 Suppl. p. 266.
Dicera serrata. Forst. gen. n. 40. Dicera aserrada.

Cast. Eleocarpo Dicera.

Habita en la nueva Zeelanda.

La estructura de la flor conviene con la del *Eleocarpo aserrado*; pero se diferencia por los quatro *estilos*; por el *fruto* de baya y de quatro celdillas; y por tener dos *simientes* en cada una.

801. Género **LECYTHIS.** *Loefl. it.* 189.

Jacq. Amer. 168.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de seis hojuelas casi redondas, cóncavas y persistentes.

COR. *Petalos* seis, oblongos, obtusos, planos, y muy grandes, insertos por sus uñas en el receptáculo del germen, y debaxo de la base del nectario; de los cuales los quatro superiores son muy extendidos.

Nectario en forma de petalo, de una pieza, á manera de lengüeta, con su base plana, ribeteada y horadada por donde pasa el germen; con una *cinilla* doblada ácia arriba desde el lado inferior de la flor, linear, convexâ por defuera, crasa, aovada por su ápice y que cubre los genitales.

ESTAMB. *Filamentos* copiosísimos, insertos por todas partes en el disco interior de la base del nectario; cortísimos, y mas gruesos por arriba: con las *anteras* oblongas y pequeñas.

PIST. *Germen* deprimido, puntiagudo, y ceñido con el receptáculo de la flor: *estilo* cortísimo: con el *estigma* cónico y algo obtuso.

PERIC. casi redondo por su base, leñoso, ceñido por arriba con los rudimentos del caliz, truncado, casi de qua-

334 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

quatro celdillas, y que se abre al través con su cubierta redonda.

SEM. muchas, lustrosas, y por su margen ásperas.

E S P E C I E S.

Ollaria 1. *LECYTHIS foliis sessilibus cordato-ovatis subintegerrimis*. Loeff. it. 189. Lecytis con hojas sentadas, entre de figura de corazón y aovadas, y casi enterisimas.

Jacapucaya. Marcg. bras. Jacapucaya.
128. Pis. bras. 135.

Cast. Lecytis de ollas.

Habita en las Indias. \hbar

Posee las *hojas* alternas y sentadas: y la *flor* y *fruto* muy particulares.

Produce la naturaleza, en esta especie, el *fruto* leñoso, concavo y muy semejante á una olla; por cuyo motivo y por subir con frecuencia los Monos sobre este árbol, los Americanos le dan el nombre de *Olla de Mono*.

Minor. 2. *LECYTHIS foliis petiolatis lanceolatis serratis*. Jacq. Amer. 168. t. 109. Lecytis de hojas con peciolo, lanceoladas y aserradas.

Cast. Lecytis menor.

Habita en las selvas de Cartagena de America. \hbar

802. Género DELIMA.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de cinco hojuelas, aovadas, obtusas, iguales y persistentes.

COR. ninguna.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos, capilares, y casi iguales al caliz: con las *anteras* algo redondas.

PIST. *Germen* algo aovado: *estilo* cilindrico, de la longitud de la flor: con el *estigma* sencillo y persistente.

PERIC. *Baya* mayor que el caliz, aovada, puntiaguda y de dos ventallas.

SEM. dos.

ESPECIE.

Sar-
mento-
sa.

1. DELIMA. Fl. Zeyl. 205. X Delima.
 Amoen. Acad. 1. p. 403. X
 Peripu. Rheed. Mal. 7. t. X Peripu.
 34. Burm. Ind. t. 35. f. 1. X

Cast. Delima sarmentosa.

Habita en Zeylan. *h*

Rheede no cuenta mas que cinco estambres en esta especie, por cuya razon se halla dudosa.

803. Género VATERIA.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* hendido en cinco partes, agudo, pequeño y persistente.

COR. *Petalos* cinco, aovados y extendidos.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos, mas cortos que la corola: con las *anteras* sencillas.

PIST. *Germen* algo redondo: *estilo* sencillo y corto: con el *estigma* en cabezuela.

PERIC. *Capsula* cónica inversa, correosa, sentada en el caliz redoblado, señalada con tres suturas, de una celdilla y tres ventallas.

SEM. una sola y aovada.

ESPECIE.

- Indica. 1. VATERIA. Flor. Zeyl. X Vateria.
 204. X
 Pænoe. Rheed. mal. 4. p. X Pænoe.
 33. t. 15. X

Cast. Vateria de Indias.

Habita en la India. *h*

804. Género MENTZELIA. Plum. 6.

Jacq. Amer. 164.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* encima del germen , de cinco hojuelas, extendidas , lanceoladas , cóncavas , y que se caen quando las demas partes de la flor.

COR. *Petalos* cinco , aovados al revés , planos , puntiaguados , extendidos y un poco mas largos que el caliz.

ESTAMB. *Filamentos* muchos , capilares ; los exteriores por arriba planos , membranosos y obtusos : con las *anteras* pequeñas , y casi redondas.

PIST. *Germen* cilindrico , larguísimo , debaxo del caliz : *estilo* setáceo , de la longitud de la corola : con el *estigma* sencillo y obtuso.

PERIC. *Capsula* cilindrica , larga , de una celdilla , y por su ápice de tres ventallas.

SEM. muchas , oblongas y anguladas.

ESPECIE.

- | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| As.
pera. | 1. MENTZELIA. Amœn. X
Acad. 5. p. 498. Loeff. it.
223.
<i>Mentzelia foliis & fructibus asperis.</i> Plum. gen. 41.
ic. 174. f. 1.
<i>Mentzelia setis uncinatis munita, foliis lobatis, fructibus sessilibus, singularibus ad divaricationes ramorum.</i> Brown. jam. 249. | Mentzelia.
Mentzelia con hojas y frutos ásperos.
Mentzelia guarnecida de cerdas ganchosas ; con hojas hendidas en lóbulos ; frutos sentados , y de uno en uno en las divisiones de las ramas.
Onagra Americana , con hoja como la de la Betonica ; y fruto erizado. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cast. Mentzelia áspera.

Habita en la America.

805. Género LOASA. *Aut. Cl. Jacq.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* encima del germen , de cinco hojuelas persistentes , lanceoladas , muy extendidas ó abiertas , y redobladas por sus lados (*y pelosas*).

COR. *Petalos* cinco , aovados al revés , en forma de cucurucho , grandes , muy extendidos y adelgazados en uñas por su base (*y algo pelosos*).

Nectario de cinco hojuelas que alternan con los petalos , y que arrimandose entre sí forman un cono agudo , poco mas cortas que la corola , lanceoladas , rugosas y con dos filamentos como aristas.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos , capilares , mas largos que el nectario , y quince hasta diez y seis en cada petalo : con las *anteras* echadas y algo redondas.

PIST. *Germen* casi aovado , la mitad debaxo del caliz : *estilo* filiforme , derecho , y de la longitud de los estambres : con el *estigma* sencillo y obtuso.

PERIC. *Capsula* cónica inversa (*con pelo áspero*), rodeada por arriba con las lacinias del caliz marchitas , de una celdilla , con tres ventallas en su ápice , medio aovadas , agudas y abiertas.

SEM. muchas , aovadas , rugosas y pequeñas. *Receptáculos* tres , lineares , que se extienden desde el fondo de la capsula hasta las incisiones de las ventallas.

OBS. Este género es muy parecido á la *Mentzelia*. *Jacquin.*

E S P E C I E ,

Hispidada.

1. LOASA.

Loasa urens. Jacq. obs.2.

p. 15. t. 38.

Loasa. Adans. fam. 2. p.

501 ?

Ortiga Chilensis, urens,

Acanthi folio. Fewel. peru.2.

p. 757. t. 43.



Loasa.

Loasa que abrasa.

Loasa.

Ortiga del Chile, que abrasa , con hoja como la del Acantho.

Cast. Loasa erizada.

TOM. IV.

Y

Ha-

Habita en el Perú. ☉

Tiene los *petalos* de color amarillo-roxo: los *nectarios* blancos, con puntos encarnados y verdes: los *filamentos* en cinco hacecillos que ocupan los intersticios de los nectarios: y los *estambres* primeramente derechos y ultimamente redoblados.

Toda la *planta* se halla armada de agujones rígidos, lustrosos, y que pinchan, causando mucho ardor; del mismo modo que los de la *Ortiga*. Echa los *tallos* rollizos, de color entre blanco y verde, señalados con líneas pequeñas, esparcidas, longitudinales y de color obscuro: las *hojas* hendidas al través, pecioladas, alternas, sin orden, ásperas y obtusas, con sus lacinias hendidas tambien al través, entre dentadas y sinuosas; las superiores menos divididas, aunque muy desiguales; pero las de mas arriba sinuosas solamente. *Jacquin*.

806. Género LAGERSTROEMIA.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, hendido en seis partes, á manera de campana, liso y algo agudo.

COR. *Petalos* seis, aovados, obtusos, crespos, ondeados y torcidos: con las *uñas* filiformes, mas largas que el caliz é insertas en el receptáculo.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, filiformes, mas largos que el caliz, de los cuales seis exteriores son al doble mas crasos y mas largos que los *petalos*: con las *anteras* ovales y echadas.

PIST. *Germen* casi globoso: *estilo* filiforme, y de la longitud de los *estambres* mayores: con el *estigma* sencillo.

PERIC.

SEM.

E S P E C I E.

Indica.	1. LAGERSTROEMIA. X	Lagerstroemia.
	<i>Tsiin-kin</i> . Rumph. Amb. X	<i>Tsiin-kin</i> .
	7. p. 61. t. 28. X	
	<i>Sibi</i> . Kœmpf. Amœn. 855. X	<i>Sibi</i> .

Cast.

Cast. Lagerstroemia de Indias.

Habita en la China. \bar{h}

Es árbol de la magnitud del *Granado*. Lleva las *hojas* opuestas, alguna vez alternas, casi sentadas, oblongas, enterisimas, lampiñas; y las *florales* algo redondas: la *panoja* aovada, terminal, floxa, con *piececitos* hendididos en tres partes ó de tres flores encarnadas; y los *petalos* con uñas largas, y rizados al modo que el *mesenterio* ó sea entresijo.

807. Género THEA. † *Kæmpf.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* muy pequeño, plano, de cinco ó seis hojuelas redondas, obtusas y persistentes.

COR. *Petalos* seis, casi redondos, cóncavos, iguales y grandes.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos (*casi doscientos*), filiformes, y mas cortos que la corola: con las *anteras* sencillas.

PIST. *Germen* entre globoso y de tres lados: *estilo* alesnado, de la longitud de los estambres: y con tres *estigmas*.

PERIC. *Capsula* de tres globos unidos, de tres celdillas, y que se abre por su ápice en tres partes.

SEM. solitarias, globosas, y ácia dentro anguladas.

OBS. Este carácter se observa en las mas flores; pero en otras de distinto árbol, llamado por el *D. Hill*, *Thé verde*, se hallan del modo siguiente.

CAL. *Periantio* muy pequeño, de cinco hojuelas redondas y persistentes.

COR. *Petalos tres exteriores* iguales, de mediana magnitud; y *seis interiores* iguales y muy grandes.

Estilos tres, conglutinados, y sin alguno sencillo.

ESPECIES.

- Bohea. 1. *THEA floribus hexapetalis*. Amœn. Acad. 7. p. 237. t. 4. Hill. exot. t. 22. Mat. Med. 156. Thé con flores de seis petalos.
- Thee*. Kœmpf. Jap. 605. t. 606. Thé.
- Thee frutex*. Barr. rar. 128. t. 904. Bont. jav. 87. t. 88. Letsom. diss. Lugdb. 1769. t. 1. f. 1. 2. Thé arbusto.
- Thee Sinensium*. Breyn. cent. III. t. 112. ic. 17. t. 3. Bocc. mus. 114. t. 94. Thé de los de la China.
- Chaa*. C. B. P. 147. Chaa.
- Evonymo affinis, arbor Orientalis, nucifera, flore roseo*. Pluk. Alm. 39. t. 88. f. 6. Arbol Oriental que lleva nueces, parecido al Evonymo, con la flor como Rosa.

Cast. Thé boheo.

Habita en el Japon y en la China. $\frac{h}{2}$

Tiene las *hojas* alternas, elípticas, consistentes, lisas, algo obtusas, y obtusamente aserradas; con sus *peciolos* cortos, rollizos por debaxo y gibosos.

Los Chinos manifiestan, muchas veces, por la planta del *Thé*, la *Camelia* con la qual facilmente engañan á los menos versados; especialmente si se halla sin flor, y no se observan con cuidado los *peciolos*.

Muchos manifestaron otro arbusto en lugar del *Thé*; pero le pareció á *Linneo*, que nadie poseyó viva esta planta en Europa antes que él.

PROPIED. Las *hojas* de este arbusto son corroborantes y diureticas: se usan en las enfermedades soporosas, convulsiones y cálculo; pero dañan á los que tienen el estomago débil.

- Viridis 2. *THEA floribus enneapetalis*. Hill. exot. t. 22. Thé con las flores de nueve petalos.

Cast.

Cast. Thé verde.

Habita an la China. \bar{h}

Las hojas de esta especie son mas largas que las de la antecedente.

808. Género CARYOPHYLLUS. † Caryophyllus aromaticus. *Tourn. t. 432.* Caryophyllodendron. *Vaill. A. G. 1722.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio del fruto* encima de él , dividido en quatro partes , agudo , pequeño y persistente.

Periantio de la flor encima del germen , de quatro hojuelas casi redondas , cóncavas , y que se caen quando las demas partes de la flor.

COR. *Petalos* quatro , casi redondos , recortados , y mas pequeños que el caliz de la flor.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos , capilares : con las *anteras* sencillas.

PIST. *Germen* baxo del caliz , oblongo , grande y terminado en el caliz del fruto : *estilo* sencillo , inserto en el receptáculo de quatro ángulos : con el *estigma* sencillo.

PERIC. oval , de una celdilla , terminado con el caliz del fruto endurecido y cerrado , y con ombligo.

SEM. una sola , oval y grande.

CARAC. GENER. DE TOURN. p. 661.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco y sentados en el caliz (*es el germen*), el qual pasa á fruto aovado , con ombligo , de una capsula (*celdilla*) y lleno de una simiente oblonga.

ESPECIE.

Aromaticus.

1. CARYOPHYLLUS. \times Clavo aromático ó sea de Sonnerat. voy. p. 196. t. 119. \times especie. Mat. Med. 157. \times

Car-

342 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Caryophyllus foliis ovato-lanceolatis oppositis , flori- bus terminalibus , stamini- bus corolla longioribus. Mill. dict. n. 1. Clavo aromático , con ho- jas entre opuestas y lanceo- ladas , opuestas ; flores ter- minales ; y estambres mas largos que la corola.

Caryophyllus aromaticus , fructu oblongo. C. B. P. 410. Tourn. p. 661. Clavo aromático , con el fruto oblongo.

Caryophyllus aromaticus , Indiæ Orientalis , fructu clavato , monopyreno. Pluk. alm. 88. t. 155. f. 1. Clavo aromático de la In- dia Oriental , con el fruto á manera de maza , y de un solo grano.

Caryophyllus. Cam. epit. 349. Clus. exot. 16. Rumph. amb. 2. p. 3. t. 1. 2. 3. Clavo aromático.

Cast. Clavo aromático.

Habita en las Molucas , en la nueva Guinea , y otras Is- las cercanas. *Sonnerat.* Se cultiva en Amboina y penín- sulas de Omoa , Honimoa , y Nussalauta. \bar{h}

PROPIED. El fruto es muy caliente , tónico , estomático ; promueve la saliva y el menstuo : se usa en la nausea , parálisis , vertigos , y dolores de muelas.

809. Género CISTUS. * *Tourn. t. 136.*

Helianthemum. Tourn. t. 128.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de cinco hojuelas , casi redondas , cóncavas , de las cuales las dos alternas están mas abaxo , y son mas pequeñas.

COR. Petalos cinco , casi redondos , planos , extendidos , y muy grandes.

ESTAMB. Filamentos numerosos , capilares , mas cortos que la corola : con las anteras casi redondas y pequeñas.

PIST. Germen algo redondo : estilo sencillo , de la longi- tud de los estambres : con el estigma plano y re- dondo.

PERIC. Capsula casi redonda y cubierta con el caliz.

SEM. numerosas , algo redondas y pequeñas.

OBS.

OBS. El *carácter esencial* consiste en las dos hojuelas del caliz alternas y mas pequeñas.

El *Helyanthemo de Tournefort* se distingue por la capsula de una celdilla y de tres ventallas: y la *Xara* del mismo *Tournefort* por la capsula de cinco ó de diez celdillas.

CARACTERES GENERICOS DE TOURNEFORT.
CISTUS. p. 259.

La *flor* es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco; de cuyo caliz sale el pistilo que pasa á fruto casi redondo ó puntiagudo, y que se abre por su ápice, de muchas capsulas (*celdillas*) y lleno de simientes pequeñas.

HELANTHEMUM. p. 248.

La *flor* es rosácea; de cuyo caliz de muchas hojuelas sale el pistilo que pasa á fruto casi globoso, y que se abre en tres partes, lleno de simientes casi redondas, y fixadas á unos capilamentos delgados ó al receptáculo.

ESPECIES FRUTICOSAS Y SIN ESTIPULAS.

Ca-
pensis. 1. CISTUS *arborescens*, X Cisto ó sea Xara arbores-
exstipulatus, foliis ovato- X cente, sin estipulas; con ho-
lanceolatis petiolatis triner- X jas entre aovadas y lanceo-
viis denticulatis utrinque X ladas, pecioladas, de tres
nudis. X nervios, con dientecitos, y
X desnudas por una y otra
X parte.

Cast. Xara del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \hbar

Villo-
sus. 2. CISTUS *arborescens*, X Xara arborescente, sin es-
exstipulatus, foliis ovatis X tipulas, de hojas aovadas,
petiolatis hirtis. X con peciolo, y pelo áspero.
Cistus pilosus. Linn. sp. X Xara pelosa.
pl. 3. p. 736. X

Cistus mas, folio rotundo, hirsutissimo. C. B. P. 464. Xara masculina, de hoja redonda, y con mucho pelo áspero.

Cistus mas, major, folio rotundiore. Bauh. hist. 2. p. 2. Tourn. p. 259. Duham. arb. 1. p. 167. t. 64. Xara masculina, mayor, con hoja mas redonda.

Cistus mas, Matthioli. Dalech. hist. 222. Xara masculina, de Matthioli.

Cast. Xara vellosa.

Habita en Italia, en la Alcarria, Cataluña, Aragon y Valencia. \hbar

Tiene las hojas rugosas, verdes, y vellosas por una y otra parte: los pedunculós de una flor y con un nudito.

Po-
puli-
fius.

3. CISTUS *arborescens, exstipulatus, foliis cordatis lævibus acuminatis petiolatis.* Hort. Cliff. 205. Xara arborescente, sin estipulas; con hojas de figura de corazon, lisas, puntiaguadas y pecioladas.

Cistus Ledon, foliis Populi nigrae, major. C. B. P. 467. Tourn. p. 260. Xara Ledo, mayor, con hojas como las del Alamo negro.

Ledum latifolium II. major. Clus. hist. 1. p. 78. Ledo segundo, mayor, con hoja ancha.

Cistus Ledon, foliis Populi nigrae, minor. C. B. P. 467. Tourn. p. 260. Xara Ledo, menor, con hojas como las del Alamo negro. α

Ledum latifolium II. minus. Clus. hist. 1. p. 78. Ledo segundo, menor, de hoja ancha.

Cast. Xara con hoja de Alamo.

Habita en Portugal, Extremadura, Sierramorena y otras muchas partes de Andalucia. \hbar

Tiene las ramas y hojas tiernas pelosas; pero desnudas siendo mas crecidas: los cálices tambien muy pelosos, y que forman tres caras antes de abrirse: los petalos blancos, sin mancha, y algo purpúreos por su margen: y los estambres amarillos.

Latri-
folius.

4. CISTUS *arborescens*, X Xara arborescente, sin es-
exstipulatus, *foliis oblon-* tipulas, de hojas entre oblon-
go-ovatis petiolatis triner- gas y aovadas, de tres ner-
viis supra glabris, *petiolis* vios, lampiñas por encima;
basi connatis. y con pecioloos unidos por su
base.

Cistus Ledon, *foliis Lau-* Xara Ledo, con hojas co-
rinis. C. B. P. 467. Tourn. mo las del Laurel.
p. 260.

Cistus Ledon, *latiore fo-* Xara Ledo, con hoja mas
lio. Bauh. hist. 2. p. 8. ancha.

Ledon primum, *latifo-* Ledo primero, de hoja an-
lium. Clus. hist. 1. p. 77. cha.
Hisp. 156.

Cast. Xara con hoja de Laurel. *vulgo*: Estepa.

Habita en los contornos de Madrid: en el Real Sitio del Pardo: montes de Avila, Sierramorena, Extremadura, Aragon y otras muchas partes de España. $\frac{h}{2}$

Arroja el *tallo* con ramas pelosas: las *hojas* lanceoladas, agudas, rugosas, y verdes por una y otra parte: los *pecioloos* por su base de color que tira á purpúreo, las mas veces separados; y las *flores* blancas.

Lada-
nife-
rus.

5. CISTUS *arborescens*, X Xara arborescente, sin es-
exstipulatus, *foliis lanceo-* tipulas, de hojas lanceola-
latis supra lævibus, *petio-* das, lisas por encima; con
lis basi coalitis vaginan- pecioloos unidos por su base
tibus. Hort. Cliff. 205. y que envaynan.

Cistus ladanifera, *Hispa-* Xara de España, ladanife-
nica, *incana*. C. B. P. 467. ra, ó sea que lleva Ladano,
y blanquecina.

Cistus ladanifera, *Salicis* Xara ladanifera, con hoja
folio, *flore candido*. Tourn. como la del Sauce; y flor
p. 260. candida.

Cistus Ledon primum, *an-* Xara Ledo, primero, con
gustifolius, *flore omnino in-* hoja angosta; y flor alguna
terdum albo. Clus. hist. 1. vez enteramente blanca.
p. 77.

α *Cistus ladanifera*, *Hispanica*, flore albo, macula punnicante insignito. Tourn. p. 260. macula nigricante. Bauh. hist. 2. p. 8. macula ex purpura nigricante. Clus. hist. 1. p. 77. Xara ladanifera de España, de flor blanca, y señalada con una mancha de color que tira al de la flor de Granada..... de color que tira á negro..... ó purpúreo negruzco. α

Cast. Xara ladanifera ó sea que lleva Ladano. *vulgo*: Xara.

Habita en Portugal: en el circuito de Madrid; en Aragón, Cataluña y abunda en muchas partes de España. *h*

Tiene la corola blanca y muy grande: el germen con diez convexidades; y el estigma sentado ó sin estilo.

De esta especie se puede aprovechar el Labdano que se usa en las oficinas, sin tener la necesidad de comprarlo á los Estrangeros.

Mons-
pelien-
sis.

6. *CISTUS arborescens*, *exstipulatus*, *foliis linearilanceolatis sessilibus*, *utrinque villosis trinerviis*. Hort. Cliff. 205. Xara arborescente, sin estipulas, de hojas entre lineares y lanceoladas, sin peciolo, vellosas por una y otra parte, y con tres nervios.

Cistus ladanifera Monspelien- sium. C. B. P. 467. Tourn. p. 260. Xara ladanifera de los de Mompeller.

Cistus ladanifera, *sive Ledon Monspessulanum*, *angusto folio*, *nigricans*. Bauh. hist. 2. p. 10. Xara ladanifera, ó Ledo de Mompeller, negruzco; y con hoja angosta.

α *Cistus Ledon*, *foliis Oleæ sed angustioribus*. C. B. P. 467. Tourn. p. 260. Xara Ledo, con hojas como las del Olivo; pero mas angostas. α

Ledon V. Clus. hist. 1. p. 79. Ledo quinto.

Cast. Xara de Mompeller. *Catal.* Estepa.

Habita en la Francia Narbonense: en Valencia y Cataluña, donde abunda mucho. *h*

Posee las hojas superiores mas anchas por su base, las restantes lineares, por debaxo en redecilla y de tres nervios:

vios: el *racimo* con el pedunculo largo, las mas veces hendido en dos partes; y la *corola* blanca.

- Salvi-
folius.
7. *CISTUS arborescens*, Xara arborescente, sin es-
exstipulatus, foliis ovatis tipulas, de hojas aovadas,
petiolatis utrinque hirsutis. pecioladas, y con pelo áspero
Hort. Cliff. 205. por una y otra parte.
- Cistus fruticosus, foliis* Xara fruticosa, de hojas
petiolatis, ovatis, rugosis, con peciolo, aovadas, rugo-
serratis. Hall. helv. n. 1031. sas y aserradas.
- Cistus fœmina, folio Sal-* Xara femenina, con hoja
viæ. C. B. P. 464. Tourn. como la de la Salvia.
p. 259.
- Cistus fœmina.* Clus. hist. Xara femenina.
1. p. 70.

Cast. Xara con hoja de Salvia.

Habita en Italia, Sicilia, Narbona, Suiza y Carniola: en la Alcarria, Andalucia, Cataluña, Aragon y otras muchas partes de España. \hbar

Echa las *hojas* aovadas, obtusas, sin venas, y menos blandas: los *pedunculos* laterales, solitarios, con una flor blanca, y mas largos que las hojas.

- Inca-
nus.
8. *CISTUS arborescens*, Xara arborescente, sin es-
exstipulatus, foliis spatu- tipulas, con hojas en forma
latis tomentosis rugosis, de espatula, tomentosas, ar-
inferioribus basi vaginanti- rugadas, las inferiores uni-
bus connatis. Hort. Cliff. das por su base, y que en-
205. vaynan.
- Cistus mas, angustifo-* Xara masculina, de hoja
lius. C. B. P. 464. angosta.
- Cistus mas, II. folio lon-* Xara masculina, segunda,
giore. Bauh. hist. 2. p. 2. con hoja mas larga.
Tourn. p. 259.
- Cistus mas, secundus.* Xara masculina, segun-
Clus. hist. 1. p. 69. Hisp. da.
137.

Cast. Xara muy blanca.

Habita en la Francia Narbonense: en Galicia y Extremadura. \hbar

348 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Produce las ramas vellosas: las hojas sin nervios, y que rematan en punta rígida, algo ondeadas en su disco, escurridas por su base en peciolo unidos que envaynan, ó mas bien entre aovadas al revés y en forma de espatula, mas unidas que las inferiores por su base y que casi envaynan: los cálices pelosos, con sus hojuelas que tiran á figura de corazon: los pétalos purpúreos, escotados, ó de hechura de corazon al revés, enterisimos y cóncavos.

Creticus.

9. CISTUS *arborescens*, X Xara arborescente, sin es-
exstipulatus, *foliis spatu-* tipulas, de hojas entre de
lato-ovatis petiolatis ener- figura de espatula y aovadas,
viis scabris, calycinis lan- con peciolo, sin nervios, ás-
ceolatis. peras; y las del caliz lan-
 ceoladas.

Cistus ladanifera, *Cretica*, Xara ladanifera, de Creta,
flore purpureo. Tourn. cor. con la flor purpúrea.
 19. it. 1. p. 30. Buxb. cent.

3. p. 34. t. 64. f. 1.
Cistus Ledon, *Cretense.* Xara Ledo, de Creta.

C. B. P. 467. non synonyma.
Ladanum Creticum. Alp. Ladano de Creta.
 exot. 89. t. 88.

Cast. Xara de Creta.

Habita en Creta y Siria. \bar{h}

Lleva las flores de color purpúreo.

PROPIED. De esta especie se saca el Labdano que se gasta en las oficinas: es paregorico y estomático: se usa en la disenteria y catarro; sin que en estas propiedades exceda al Labdano que se saca de la especie quinta llamada Xara ladanifera.

Albidus.

10. CISTUS *arborescens*, X Xara arborescente, sin es-
exstipulatus, *foliis ovato-* tipulas, de hojas entre aova-
lanceolatis tomentosiss inca- das y lanceoladas, tomento-
nis sessilibus subtrinerviis. sas, blanquecinas, sentadas,
 Satv. monsp. 150. X y con tres ó quatro nervios.

Cistus mas, folio oblongo incano. C. B. P. 464. Tourn. Xara masculina, con hoja oblonga y blanquecina.

p. 259.

Cistus mas, I. Clus. hist. Xara masculina, primera.

i. p. 68.

Cistus mas, IV. Montpellierensis, folio oblongo, albido. de Mompeller, con hoja oblonga y blanquecina.

Bauh. hist. 2. p. 3.

Cast. Xara blanquecina.

Habita en la Francia Narbonense: en la Mancha, Extremadura, Galicia, Aragon, Cataluña y otras partes de España. *h*

Es muy semejante á la *Xara muy blanca*; pero tiene las ramas tomentosas y no pelosas: las *hojas* mas pálidas, blandas, horizontales, sentadas, no pecioladas y con *vayna*, aunque anchas y lanceoladas, y de tres ó quatro nervios: los *cálices* sin pelo áspero, con sus hojuelas exteriores mas largas y redobladas por sus lados: muchos *pedunculos* que salen del extremo de las ramas, y apenas mas largos que las hojas: los *petalos* purpúreos, no escotados, pero recortaditos por su margen y algo planos.

Crispus.

II. *CISTUS arborescens, exstipulatus, foliis lanceolatis pubescentibus trinerviis undulatis.* Roy. Lugdb. Xara arborescente, sin estipulas, con hojas lanceoladas, vellosas, de tres nervios y ondeadas.

465.

Cistus mas, foliis undulatis & crispis. Tourn. p. Xara masculina, con hojas ondeadas y crespas.

259.

Cistus mas V. Clus. hist. Xara masculina, quinta.

i. p. 69.

Cistus mas, V. foliis crispis & quadammodo sinuosis. Bauh. hist. 2. p. 3. Xara masculina, quinta, con hojas crespas, y en algun modo sinuosas.

Cast. Xara rizada.

Habita en Portugal y Sierramorena: en Cataluña, Andalucía y otras partes de España. *h*

Tiene las *ramitas*, *pedunculos* y *cálices* salpicados de cier-

cierta lana delgada : las flores de color purpúreo ; y los cálices lanceolados,

- Ha- 12. *CISTUS arborescens*, X Xara arborescente, sin es-
 limifo- *extipulatus, foliolis duo-* tipulas, con dos hojuelas del
 lius. *bus calycinis linearibus.* caliz lineares,
 Sauv. monsp. 147.
- Cistus fœmina, Portula-* Xara femenina, con hoja
cæ marinæ folio, latiore, ob- como la de la Verdolaga ma-
 tuso. C. B. P. 465. rina (*maritima*), mas ancha
 y obtusa.
- Helianthemum Halimi* Helianthemo con hoja de
folio, brevior, obtuso. Tourn. Halimo, mas corta y obtusa.
 p. 249.
- Cistus folio Halimi, pri-* Xara primera, con hoja
mus. Clus. hist. 1. p. 71. como la del Halimo ó sea
 Orzaga,
- a Cistus fœmina, Portula-* Xara femenina, con hoja
cæ marinæ folio, angustiore, como la de la Verdolaga ma-
mucronato. C. B. P. 465. ritima, mas angosta, y que
 remata en punta rígida. α
- Helianthemum Halimi* Helianthemo con hoja co-
folio, latiore, mucronato. mo la del Halimo, mas an-
 Tourn. p. 249. cha, y que remata en punta
 rígida.
- Cistus folio Halimi, lon-* Xara con hoja como la
giore, incano. Bauh. hist. 2. del Halimo, mas larga y
 p. 5. blanquecina.
- Cistus folio Halimi II.* Xara segunda, con hoja
 Clus. hist. 1. p. 71. como la del Halimo.
- β Cistus fruticosus, errec-* Xara fruticosa, levantada,
tus, foliis oppositis, sessili- con hojas opuestas, senta-
bus, utrinque incanis. Mill. das, y blanquecinas por una
 ic. t. 290. y otra parte. β

Cast. Xara con hoja de Halimo ó sea de Orzaga.

Habita en lugares maritimos de Portugal, de Galicia, An-
 dalucia, Valencia y Cataluña. ζ

Posee las flores amarillas.



- Liba-
notis. 13. *CISTUS arborescens*, X Xara arborescente, sin es-
exstipulatus, *foliis lineari-* tipulas, con hojas lineares,
bus revolutis, *floribus um-* revueltas; y flores en umbe-
bellatis. la.
- Cistus angusto Libanoti-* Xara con hoja como la
dis folio, *flore singulari*. X del Romero, angosta; y flor
Barr. ic. 294. de una en una.
- Cistus Ledon*, *angustis* Xara Ledon, con hojas
foliis. C. B. P. 467. Tourn. X angostas.
p. 260.

Cast. Xara como Romero.

Habita en la Mancha, Extremadura, Andalucía, Aragon, Cataluña y otras partes de España. \hbar

Es arbusto con traza de Romero. Produce el tallo desnudo, y de color que tira á purpúreo: las hojas opuestas, sentadas, lineares, revueltas por una y otra parte, lisas, con pelo áspero en las márgenes de su base, mas largas que los entrenudos, y acercadas en los extremos de las ramas: las hojas florales ó de mas arriba mas cortas, aovadas y planas: los pedunculos terminales, y mas largos que las hojas: algunas flores amarillas; y los cálices aovados y viscosos,

ESPECIES SUFRUTICOSAS Y SIN ESTIPULAS.

- Um-
belia-
tus. 14. *CISTUS suffruticosus*, X Xara sufruticosa, tendida,
procumbens, *exstipulatus*, X sin estipulas, con hojas
foliis oppositis linearibus, X opuestas, lineares; y flores
floribus umbellatis. X en umbela.
- Cistus Ledon*, *foliis Thy-* Xara Ledo, con hojas co-
mi. C. B. P. 467. mo las del Tomillo.
- Helianthemum folio Thy-* Helianthemo con hoja co-
mi, *floribus umbellatis*. X mo la del Tomillo; y flores
Tourn. p. 250. X en umbela.
- Ledon* X. Clus. hist. 1. X Ledo decimo.
p. 81.

Cast. Xara umbelada.

Habita en Francia: en el Reyno de Leon, Andalucía, en las dos Castillas, Cataluña y Aragon. \hbar
Las umbelas se hallan con pedunculo.

Lævi-
pes. 15. *CISTUS suffrutico-* Xara sufruticosa, ascen-
sus, adscendens, exstipula- dente, sin estipulas, con ho-
tus, foliis alternis fascicu- jas alternas, en hacecillo,
latis filiformibus glabris, filiformes, lampiñas; y pe-
pedunculis racemosis. Amœ- dunculos racimosos.
nit. Acad. 4. p. 475. Jacq.
hort. t. 158.

Cistus suffruticosus, pro- Xara sufruticosa, tendida,
cumbens, foliis alternis, con hojas alternas, amonto-
confertis, inæqualibus, seta- nadas, desiguales y setáceas.
ceis. Ger. prov. 394. t. 14.

Cistus humilis, Massilio- Xara baxa, de Marsella,
tica, Camphorata tenuissi- con hojas como las de la Al-
mis foliis, glabris. Pluk. canforada, muy delgadas y
Alm. 107. t. 84. f. 6. lampiñas.

Helianthemum Massilien- Helianthemo de Marsella,
se, Coridis folio. Tourn. p. con hojas como las del Co-
250. ris.

Cast. Xara de pie liso ó sea sin pelo.

Habita en Cataluña, Aragon y otras partes de España. *h*
Echa las flores amarillas, y de cada axila de las hojas un
hacecillo pequeño de hojillas.

Caly-
cinus. 16. *CISTUS suffrutico-* Xara sufruticosa, levanta-
sus, erectus exstipulatus, da, sin estipulas, con hojas
foliis linearibus, pedunculis lineares; pedunculos de una
unifloris, calycibus triphyl- flor; y cálices de tres hojue-
lis. las.

Cistus humilis seu Cha- Xara baxa ó pequeña Xa-
mæ-Cistus, Ericæ folio, lu- ra, mas levantada, con hoja
teus & elatior. C. B. P. 466. como la del Brezo; y flor
Pluk. Alm. 107. t. 83. f. 6. amarilla.

Helianthemum tenuifo- Helianthemo lampiño, de-
lium, glabrum, erectum, lu- recho, con hoja delgada; y
teo flore. Bauh. hist. 2. p. 18. flor amarilla.
Tourn. p. 249.

Cast. Helianthemo calicino ó de tres hojuelas en el caliz.

Habita en la Europa Austral. *h*

Es *arbuscuto* de la altura de un pie, derecho; con ramas
opuestas y de color que tira á roxo.

Echa

Echa las *hojas* tambien opuestas, lineares, lisas, con su quilla obtusa por debaxo, y hojuelas amontonadas que salen de las axilas: los *pedunculos* terminales, solitarios, de una flor y apenas mas largos que las hojas: el *caliz* de tres hojuelas, liso é igual: la *corola* de cinco petalos, extendidos, de color amarillo-roxo y algo encarnados por la margen: diez y seis *estambres* cortisimos, amarillos y todos fértiles: el *pistilo* blanco: y el *estilo* cortísimo, con el *estigma* verrugoso. Es semejante á la especie siguiente.

Fumana.

17. *CISTUS suffruticosus, procumbens exstipulatus, foliis alternis linearibus margine scabris, pedunculis unifloris.* Jacq. austr. t. 252. Xara sufruticosa, tendida, sin estipulas; con hojas alternas, lineares, ásperas por su margen; y pedunculos de una flor.
- Cistus foliis duris, linearibus, confertis, petiolis unifloris, calycibus glabris.* Hall. helv. n. 1032. Xara con hojas duras, lineares, amontonadas; piecitos de una flor y lampiños.
- Chamae-Cistus VI.* Clus. Pequeña Xara, sexta. hist. 1. p. 75.
- Chamae-Cistus Ericæ folio, luteus, humilior.* C. B. Pequeña Xara, mas baxa, con hoja como la del Brezo; y flor amarilla. α P. 466.
- Helianthemum tenuifolium, glabrum, luteo flore, per humum sparsum.* Bauh. Helianthemo lampiño, tendido por el suelo, con hoja delgada; y flor amarilla. hist. 2. p. 18. Tourn. 249. X

Cast. Xara fumana.

Habita en Francia, Gotlandia y Suiza: en la Alcarria, Serrania de Cuenca: en Texadilla y otras muchas partes de España. *h*

Tiene cerca de diez y seis *estambres* fértiles, y otros tantos exteriores estériles: las *hojas* lisas y ásperas por su margen, con algunas espinitas muy menudas.

- Canus. 18. *CISTUS suffruticosus*, Xara sufruticosa, tendida,
procumbens exstipulatus, foliis oppositis aovatis vil- sin estipulas, con hojas
losis subtus tomentosus, floribus subumbellatis. Jacq. opuestas, aovadas al revés,
 Austr. t. 257. vellosas, por debaxo tomen-
 tudas; y flores casi en um-
 bela.
- Chamae-Cistus foliis Myr-* Xara pequeña, con hojas
ti minoris, incanis. C. B. P. como las del Myrto menor,
 466. y blanquecinas.
- Helianthemum foliis Myr-* Helianthemo con hojas
ti minoris, subtus incanis. como las del Myrto menor,
 Tourn. p. 249. y blanquecinas por debaxo.
- Chamae-Cistus foliis Myr-* Xara pequeña, con hojas
ti Tarentinae, canis & ci- como las del Myrto Tarenti-
neris. Bauh. hist. 2. p. 18. no, canas y cenicientas.
- Chamae-Cistus III.* Clus. Xara pequeña, tercera.
 hist. 1. p. 74.
- α *Helianthemum alpinum,* Helianthemo alpino, de
Serpillifolio nigricante & hoja como la del Sérpol, de
hirsuto. Segui. ver. 3. p. 195. color que tira á negro, y con
 t. 6. f. 2. pelo áspero. α

Cast. Xara de tomento blanco.

Habita en la Francia Narbonense: en el Piul de Rivas, lugar de Arganda y otras partes de la Alcarria. \hbar

Produce las *hojas* ovales ú aovadas al revés, obtusas, de color ceniciento pálido por encima, y por debaxo con tomento cano: la *umbela* terminal y de quatro flores.

La variedad α posee las *hojas* lanceoladas, obtusas, con tres rayas, y verdes por una y otra parte: y el *caliz* con dos hojuelas setáceas. *Govan*, *Haller*, *Scopoli* y *Jacquin* atribuyen esta variedad á la *Xara Oelandia*.

- Ita- 19. *CISTUS suffruticosus*, Xara sufruticosa, sin esti-
 licus. *exstipulatus, foliis opposi-* pulas, de hojas opuestas con
tis hispida, inferioribus pelo rígido; las inferiores
ovatis, superioribus lanceo- aovadas, las superiores lan-
latis, ramis patentibus. ceoladas; y ramas extendidas.

Helianthemum Serpilli- X Helianthemo de Italia, con
folio, villosa, flore pallido, X hoja como la del Sérpol, ve-
Italicum. Barr. rar. 510. t. X llosa; y flor pálida.
 366. X

Cast. Xara de Italia.

Habita en Italia. \mathcal{H}

Es arbusto de tallo derecho y del largo de un gema; con ramas opuestas, mas largas, extendidas, algo inclinadas, y de color rubio. Echa las hojas tambien opuestas, salpicadas por una y otra parte de pelos rígidos, casi mellizos y algo pestañosos; las inferiores con peciolo, aovadas, y las superiores casi sentadas: el racimo terminal: los cálices erizados: la corola pálida; y con petalos algo escotados. Acaso es variedad de la precedente?

Mari- 20. CISTUS *suffruticosus,* X Xara sufruticosa, sin esti-
 folius. *exstipulatus, foliis oppositis* X pulas, con hojas opuestas,
oblongis petiolatis planis, X oblongas, pecioladas, pla-
subius incanis. X nas; y por debaxo blanque-
 cinas.

Cistus caulibus duris, pro- X Xara de tallos duros, ten-
cumbentibus, foliis ellipti- X didos; hojas elípticas con
cis, hirsutis inferne, cum X pelo áspero por debaxo; y
calycibus tomentosis. Hall. X cálices tomentosos.
 helv. n. 1035. R.

Helianthemum luteum, X Helianthemo con flor ama-
Thymi durioris folio. Barr. X rilla; y hoja como la del
 rar. 521. t. 441. X Tomillo mas duro.

Cast. Xara con hoja de Maro.

Habita en Marsella, Verona y Suiza: en Aragon y otras partes de España. \mathcal{H}

Varia en las hojas lanceoladas y por encima lampiñas: en ovales y por encima algo pelosas; pero siempre se hallan con tomento denso, y muy blanco por debaxo.

An- 21. CISTUS *suffruticosus,* X Xara sufruticosa, sin esti-
 glicus. *exstipulatus procumbens,* X pulas, tendida; con hojas
foliis oppositis oblongis re- X opuestas, oblongas, revuel-
volutis pilosis, floribus ra- X tas, pelosas; y flores en ra-
cemosis. Huds. angl. 206. X cimo.

356 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Helianthemum alpinum, X Helianthemo alpino, de
folio Pilosellæ minoris, Fuchsii. Bauh. hist. 2. p. 18. X Fuchsio, con hoja como la
 de la Pelosilla menor.
 Tourn. p. 247. X

Cast. Xara de Inglaterra.

Habita en Inglaterra. *h*

Tiene el tallo obliquo y que apenas es del largo de medio pie: las hojas opuestas, lanceoladas y como las del *Hyosopo*, algo ásperas, y verdes por una y otra parte: las flores en racimo, blancas, inclinadas, y en el tiempo de su florecencia derechas.

Oelan- 22. *CISTUS suffruticosus*, X Xara sufruticosa, tendida,
 dicus. *procumbens exstipulatus, fo-* X sin estipulas; de hojas opues-
liis oppositis oblongis utrin- X tas, oblongas, lampiñas por
que glabris, petiolis ciliatis, X una y otra parte, con sus pe-
petalis emarginatis. Jacq. X ciolos pestañosos, y petalos
 austr. t. 399. X escotados.

Cistus caulibus duris, X Xara de tallos duros, ten-
procumbentibus, foliis con- X didos; hojas de dos en dos,
jugatis, ellipticis, subhir- X elípticas, con algun pelo ás-
sutis, petiolis confertis, X pero; peciolo amontonados,
unifloris, calycibus tomen- X de una flor; y cálices tomen-
tosis. Hall. helv. n. 1034. X tosos.
 Jacq. Gou. R.

Cistus alpestris. Jacq. X Xara alpestre.
 vind. 248. Scop. carn. ed. 2.
 n. 645. t. 23.

Cistus (alpestris) suffru- X Xara (*alpestre*) sufruti-
ricosus, procumbens, exstipu- X cosa, tendida, sin estipulas;
latus, foliis oppositis, cilia- X con hojas opuestas, pestaño-
ris, calycibus lævibus. Crantz. X sas; y cálices lisos.
 Austr. p. 103. t. 6. f. 1. Jacq.
 Gou. R.

Cistus (Seguieri) exsti- X Xara (*de Seguier*) sin es-
pulatus, foliis caulinis in- X tipulas, con las hojas infe-
ferioribus ovatis, oppositis, X riores del tallo aovadas,
revolutis, superioribus ex- X opuestas, revueltas; y las
pansis. Crantz. Austr. p. 104. X superiores extendidas.
 secundum Jacq. & Gou. R. X

Cistus suffruticosus, pro- X Xara sufruticosa, tendida,
cumbens, foliis nudis, oppo- X de hojas desnudas, opuestas,
sitis, viridibus, floribus sub- X verdes; flores casi en umbe-
umbellatis, calycibus hirsu- X la; y cálices con pelo áspero.
tis. Ger. prov. 396.

Cistus Helianthemus, flo- X Xara Helianthemo, con la
re parvo, luteo. Bauh. hist. 2. X flor pequeña y amarilla.
 p. 17.

Cast. Xara de Oenlandia.

Habita entre las peñas de Francia, Oenlandia, Suiza y Austria. $\frac{h}{2}$

Tiene el caliz rayado y veloso.

ESPECIES HERBACEAS Y SIN ESTIPULAS.

Tube- 23. CISTUS *exstipulatus* X Xara sin estipulas, peren-
 raria. *perennis, foliis radicalibus* X ne, con las hojas radicales
ovatis trinerviis tomentosis, X aovadas, de tres nervios, to-
caulinis glabris lanceolatis, X mentosas, las del tallo lam-
summis alternis. X piñas, lanceoladas, y las de
 mas arriba alternas.

Cistus perennis, foliis X Xara perenne, con hojas
humi appresis, villosis, sum- X apretadas al suelo, vellosas,
mis glabris. Sauv. monsp. X y las de mas arriba lampiñas.
 149.

Cistus folio Plantaginis. X Xara con hoja como la del
 C. B. P. 465. X Llantén.

Helianthemum Plantagi- X Helianthemo perenne, con
nis folio, perenne. Tourn. X hoja como la del Llantén.
 p. 250. Buxb. cent. 3. p. 33.
 t. 63.

Tuberaria major..... vel X Tuberaria mayor.....ó de
nostras. Bauh. hist. 2. p. 12. X Suiza.

Cast. Xara tuberaria.

Habita en Provenza y Pisa: en Cataluña, Aragon, Sierra morena, Extremadura, Galicia y otras partes de España. $\frac{u}{2}$

Gutta-
tus.

24. *CISTUS herbaceus ex-stipulatus*, foliis oppositis lanceolatis trinerviis, racemis ebracteatis. Huds. angl. Xara herbácea, sin estipulas, con hojas opuestas, lanceoladas, de tres nervios; y racimos sin bracteas.

204.

Cistus flore pallido, punicante macula insignito, C. B. P. 463. Xara con la flor pálida, y señalada con una mancha de color que tira al de flor de Granada.

Helianthemum flore maculoso. Col. eph. 2. p. 78. t. 77. Tourn. p. 250. Helianthemo con la flor manchada.

Cast. Xara goteada.

Habita en la Francia Narbonense, Italia é Inglaterra: en el Real Sitio del Escorial, en Andalucía, Murcia, Valencia, Extremadura, Aragon y Cataluña. ☉

Posee el tallo derecho, con pelos extendidos igualmente que en toda la planta: las hojas sentadas, con tres ó quatro oposiciones ó sean pares: el racimo filiforme, y comunmente sin bracteas; las flores derechas; pero pendulas despues de haber florecido: la base de los petalos con una mancha encarnada; y el caliz con dos hojuelas extendidas.

Canadensis.

25. *CISTUS herbaceus ex-stipulatus*, foliis omnibus alternis lanceolatis, caule ascendente. Xara herbácea, sin estipulas, con todas las hojas alternas, lanceoladas; y tallo ascendente.

Cast. Xara del Canadá.

Habita en el Canadá. Kalm. 26

Su traza es como la de la Xara *Helianthemo*; pero sus hojas son alternas.

ESPECIES HERBACEAS CON ESTIPULAS.

Ledi-
folius.

26. *CISTUS herbaceus*, erectus glaber stipulatus, floribus solitariis subsessilibus, folio ternato oppositis. Sauv. monsp. 178. Xara herbácea, derecha, lampiña, con estipulas; flores solitarias, casi sentadas y opuestas á la hoja de tres en rama.

Cis-

Cistus stipulis quaternis, foliis oblongis, caule erecto. X Xara con estipulas de quatro en quatro; hojas oblongas; y tallo derecho.
Hort. Cliff. 475.

Cistus Ledi folio. C. B. P. X Xara con hoja como la del Ledo.
465.

Helianthemum Ledi folio. X Helianthemo con hoja como la del Ledo.
Tourn. p. 249.

Cistus annuus, folio Ledi. X Xara annua, con hoja como la del Ledo.
Lob. ic. 118.

Cast. Xara con hoja de Ledo.

Habita en Mompeller: en los circuitos de Madrid, ALCARRIA y otras partes de España. ☉

Tiene el *caliz* mas largo que la corola, con tres hojuelas levantadas, y dos extendidas: y las *capsulas* de la longitud del *caliz*.

Salici-
folius.

27. *CISTUS herbaceus patulus villosus stipulatus, floribus racemosis erectis, pedicellis horizontalibus.* X Xara herbácea, extendida, vellosa, con estipulas; flores en racimo, derechas; y sus piececitos horizontales.
Hort. Ups. 144.

Cistus stipulis quaternis, foliis subovatis subtus tomentosis, caule procumbente. Hort. Cliff. 206. X Xara con estipulas de quatro en quatro; hojas casi aovadas, tomentosas por debajo; y tallo tendido.

Cistus folio Salicis. C. B. P. 465. X Xara con hoja como la del Sauce.

Helianthemum Salicis folio. Tourn. p. 249. X Helianthemo con hoja como la del Sauce.

Cistus annuus I. Clus. hist. 1. p. 76. X Xara annua, primera.

Helianthemum annuum, humile, foliis ovatis, flore fugaci. Segui. ver. 3. p. 297. X Helianthemo annuo, baxo, con hojas aovadas; y flor que se cae facilmente.
t. 6. f. 3. optima. X

Cast. Xara con hoja de Sauce.

Habita en Portugal: en los circuitos de Madrid: en la Mancha, Extremadura, Andalucia, Valencia, Aragon y Cataluña. ☉

Tiene la *capsula* mas larga que el *caliz*.

Nilo-
ticus.

28. *CISTUS herbaceus*, X Xara herbácea, derecha,
stipulatus erectus subto- X algo tomentosa, con estipu-
mentosus, floribus racemo- X las; flores en racimo, solita-
sis solitariis sessilibus op- X rias, sentadas y opuestas á
positifoliis. X las hojas.

Cast. Xara del Nilo.

Habita en Egipto. ☉

Arroja el tallo largo, un poco leñoso, del largo de un pie, derecho, rollizo y algo tomentoso: las ramas radicales, ascendentes, y mas cortas; las del tallo ácia su extremidad alternas, derechas y pocas: las hojas opuestas, pecioladas, elípticas, extendidas, algo tomentosas, venosas, y mas largas que los articulos: las *estipulas* de quatro en quatro, en forma de espada, la mitad mas cortas que la hoja y persistentes: el racimo terminal derecho, enxuto y apretado: las flores alternas, casi sentadas, solitarias, opuestas á la hoja semejante á las del tallo con dos estipulas: los *petalos* amarillos: el *caliz* derecho, de cinco hojuelas; las tres interiores con tres nervios, y puntiagudas; las dos exteriores lineares, mas cortas y extendidas. Se parece mucho á la Xara con hoja de Lodo; pero es mucho mayor y no lisa.

Ægyp-
tiacus.

29. *CISTUS herbaceus*, X Xara herbácea, derecha,
erectus stipulatus, foliis li- X con estipulas; hojas entre li-
neari-lanceolatis petiolatis, X neares y lanceoladas, con
calycibus inflatis corolla X peciolo; cálices inflados y
majoribus. Jacq. obs. 3. p. X mayores que la corola.
 17. t. 68. X

Cast. Xara de Egipto.

Habita en Egipto. *Jussieu.* ☉

Tiene las dos hojuelas exteriores del caliz pequeñas: las tres interiores arrimadas entre sí, que forman una vexiga aovada y que no se abre antes de madurarse el fruto: cinco *petalos* lanceolados, amarillos, cortísimos y encerrados: diez *estambres* pequeños: y las *ventallas* mayores del caliz con quatro nervios elevados y pestafiosos.

ESPECIES SUFRUTICOSAS Y CON ESTIPULAS.

Squa-
natus.

30. CISTUS *suffruticosus* X Xara sufruticosa, con es-
stipulatus, foliis obrectis, X tipulas; y hojas cubiertas de
squamis orbiculatis. X escamas redondas.

Cistus humilis, floribus X Xara baxa, con flores uni-
compactis in verticillos, mi- X das en verticilo; y hojas co-
noris Halimi foliis. Barr. ic. X mo las del Halimo menor.

328. Bocc. mus. 2. p. 76.
t. 64.

Cast. Xara con escamas.

Habita en Aranjuez, Cienpozuelos, Tarancon, Cataluña,
Aragon y otras partes de España. h

Echa las ramas derechitas, y de quatro lados por debaxo:
las *hojas* entre ovales y lanceoladas, gruesecitas, con
peciolo y opuestas, ó tres en ambos lados: las *estipulas*
muy menudas, sentadas, y que se marchitan: los *pe-*
dunculos rollizos y amontonados. Es *planta* toda cu-
bierta de escamas redondas, y deprimidas en su centro.

Lippii.

31. CISTUS *suffruticosus* X Xara sufruticosa, derecha,
erectus, foliis alternis op- X con hojas unas alternas y
positisque lanceolatis sca- X otras opuestas, lanceoladas,
bris, spicis secundis. X ásperas; y espigas ladeadas.

Cast. Xara de Lippio.

Habita en Egipto. h

Produce el *tallo* derecho, rollizo, velloso, blanquecino y
hendido en dos partes ó poco ramoso: las *ramas* deba-
xo de la horquilladura del tallo, laterales, sencillas y
blancas: las *hojas* á trechos alternas, y á trechos opues-
tas, pecioladas, obtusas, entre elípticas y lanceoladas,
ásperas, extendidas, y que encanecen por debaxo: las
estipulas entre angostas y lanceoladas, derechas y de
la longitud de los peciolo: los *racimos* con flores que
miran á un lado, opuestos á las hojas, derechos ó in-
clinados: las *flores* sin pedunculo y amontonadas: el *ca-*
liz aovado, con hojuelas alternadamente lineares: los
petalos aovados al revés, de color amarillo-roxo, y
apenas mayores que el caliz: diez *estambres* comun-
men-

362 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

mente mas cortos que la corola : el *germen* vellosos : los *frutos* obtusos , cubiertos con el caliz , sentados en la espiga , ladeados , y casi redondos.

- Surreianus 32. CISTUS *suffruticosus*, X Xara sufruticosa, tendida,
procumbens stipulatus, fo- X con estipulas; hojas entre
liis ovato-oblongis subpilo- X aovadas y oblongas, algo pe-
sis, petalis lanceolatis. Huds. X losas; y petalos lanceola-
 angl. 205. X dos.
Helianthemum vulgare, X Helianthemo vulgar, con
petalis florum perangustis. X los petalos de las flores muy
 Dill. elth. 277. t. 145. f. 174. X angostos.

Cast. Xara Surreiana.

Habita en el Condado Surreiano de Inglaterra, cerca de Croydon : en el circuito de Madrid, y huertas de Luche ácia S. Isidro : en los sotos y dehesas del Real Sitio de Aranjuez, camino para el mar de Antigola, y en sus contornos. *Quer. h*

- Numularius. 33. CISTUS *suffruticosus* X Xara sufruticosa, con es-
stipulatis, foliis inferiori- X tipulas; hojas inferiores re-
bis orbiculatis: superioribus X rondas, y las superiores ao-
ovatis. X vadas.
Helianthemum ad Num- X Helianthemo semejante á
mulariam accedens. Bauh. X la Numularia.
 hist. 2. p. 20. Tourn. p. 249. X

Cast. Xara como Numularia.

Habita en Mompeller. *h*

- Serpillifolius. 34. CISTUS *suffruticosus* X Xara sufruticosa, con es-
stipulatus, foliis oblongis, X tipulas; hojas oblongas; y
calycibus lævibus. Sauv. X cálices lisos.
 monsp. 148.
Chamæ-Cistus repens, X Pequeña Xara rastrera, con
Serpillifolia, lutea. C. B. P. X hoja de Sérpol; y flor ama-
 466. X rilla.
Helianthemum Serpilli- X Helianthemo con hoja co-
folio, flore majore, aureo, X mo la del Sérpol; flor mas
odorato. Tourn. p. 249. X grande, de color de oro, y
 X olorosa.

Cha-

Chamae-Cistus Serpillifolio nigricante & hirsuto, flore aureo, odorato. Bauh. hist. 2. p. 17. Pequeña Xara de hoja como la del Sérpol, negruzca, y con pelo áspero; flor de color de oro y olorosa.

Cast. Xara con hoja de Sérpol.
Habita en los Alpes de Austria y Stiria. \hbar

Gluti-
nosus. 35. CISTUS *suffruticosus stipulatus, foliis linearibus oppositis alternisque, pedunculis villosis glutinosis.* Xara sufruticosa, con estipulas; hojas lineares, opuestas unas, y otras alternas; y pedunculos con pelillos glutinosos.

Ger. prov. 394.
Chamae-Cistus Tragorigani folio, Hispanicus. Barr. rar. 513. t. 415. Pequeña Xara blanquecina, de España, con hoja como la del Tragorigano.

Helianthemum folio Thymi, incano. Bauh. hist. 2. p. 19. Tourn. p. 249. Helianthemo con hoja como la del Tomillo, blanquecina.

Cast. Xara glutinosa.
Habita en la Europa Austral; en la Mancha, Alcarria y Serrania de Cuenca. \hbar
Echa el tallo veloso y viscoso por arriba: las *hojas superiores* siempre alternas, y mas vellosas: el *racimo* de pocas flores, con pelillos glutinosos; los *petalos* pequeños y de color amarillo.

Thymi
folius. 36. CISTUS *suffruticulosus stipulatus procumbens, foliis linearibus oppositis brevissimis congestis.* Sauv. monsp. 148. Xara algo sufruticosa, tendida, con estipulas; hojas lineares, opuestas, cortisimas y amontonadas.

Chamae-Cistus luteus, Thymi folio, oliganthes. Barr. ic. 444. Pequeña Xara, con flores chicas, de color amarillo; y hoja como la del Tomillo.

Cast. Xara con hoja de Tomillo.
Habita en la Francia Narbonense: y en España. \hbar

- Pi-
losus. 37. *CISTUS suffruticosus*, Xara sufruticosa, algo le-
stipulatus erectiusculus, fo- vantada, con estipulas; ho-
liis linearibus subtus bisul- jas lineares, con dos sulcos
catis incanis, calycibus læ- por debaxo, blanquecinas;
vibus. Sauv. monsp. 147. y cálices lisos.
- Cistus suffruticosus, erec-* Xara sufruticosa, levanta-
tus, foliis majoribus petio- da, con las hojas mayores
latis, revolutis, subtus in- pecioladas, revueltas, blan-
canis, ceteris linearibus. quecinas por debaxo, y las
Ger. prov. 395. restantes lineares.
- Chamæ-Cistus foliis Thy-* Pequeña Xara, con hojas
mi, incanis. C. B. P. 466. como las del Tomillo y blan-
quecinas.
- Chamæ-Cistus IV.* Clus. Pequeña Xara, quarta.
hist. 1. p. 74.
- ^a *Cistus stipulis quaternis,* Xara con estipulas de qua-
foliis lineari-ovalibus, inca- tro en quatro; hojas entre li-
nis, calycibus tomentosis. neares y ovaless, blanqueci-
Sauv. monsp. 148. nas; y cálices tomentosos. ^a
- Helianthemum flore albo,* Helianthemo de flor blan-
folio angusto, hirsuto. Bauh. ca, y hoja angosta, con pe-
hist. 2. p. 17. lo áspero.
- ^B *Cistus foliis villosis, lan-* Xara de hojas vellosas,
ceolatis, axillis foliosis, sti- lanceoladas; axillas foliosas;
pulis subulatis. Sauv. monsp. y estipulas alesnadas. ^B
148.
- Helianthemum seu Cistus* Helianthemo ó Xara baxa,
humilis, folio Sampsi, con hoja como la de la Me-
capitulis valde hirsutis. jorana; y cabezuelas con mu-
Bauh. hist. 2. p. 20. cho pelo áspero.
- ^x *Cistus foliis minoribus* & Xara con hojas mas pe-
incanis. C. B. P. 466. Ger. queñas y blanquecinas. ^x
- Cistus omnino candicans,* Xara que del todo blan-
flore nunc albo, nunc palli- quea; con la flor unas veces
do. Bauh. hist. 2. p. 16. blanca y otras amarilla.

Cast. Xara pelosa.

Habita en Francia: en la Mancha, Extremadura, Anda-
lucia, Alcarria, Aragon y Cataluña. $\frac{h}{2}$

Tiene los tallos derechos: las *bracteas* solitarias y al la-
do de los piececitos.

- Racc- 38. CISTUS *suffruticosus*, Xara sufruticosa, con es-
 mosus. *stipulatus, foliis lanceola-* tipulas; hojas entre lanceo-
to-linearibus subtus tomen- ladas y lineares, y por de-
tosis. baxo tomentosas.
Cistus Lavendulæ folio, Xara con hoja como la del
Thyrsoides. Barr. rar. ic. 293. Espliego; y flores como en
 X panoja aovada.

Cast. Xara racimosa.

Habita en España. *h*

El tallo es algo tomentoso, y su estatura como la del Ro-
 mero. Echa las *hojas* lineares ó entre angostas y lan-
 ceoladas, algo largas y por debaxo ligeramente tomen-
 tosas: las *estipulas* lineares: los *racimos* larguissimos,
 terminales y ladeados: los *cálices* angulados y lisos.

- He- 39. CISTUS *suffruticosus* Xara sufruticosa, tendida,
 lian- *procumbens, stipulis lanceo-* con estipulas lanceoladas;
 t h c- *latis, foliis oblongis revo-* hojas oblongas, revueltas y
 mum. *lutis subpilosis. Fl. dan. t.* algo pelosas.
 101.

Cistus stipulis quaternis, Xara con estipulas de qua-
foliis oblongis utrinque nu- tro en cuatro; hojas oblon-
dis, caule procumbente. Hort. gas, desnudas en ambas
 Cliff. 206. partes; y tallo tendido.

Cistus foliis conjugatis, Xara con hojas de dos en
ellipticis, hirsutis, integerr- dos, elípticas, con pelo ás-
mis, petiolis unifloris sub- pero, enterisimas; piecitos
hirsutis. Hall. helv. n. 1033. con algun pelo áspero y de
 una flor.

Helianthemum vulgare, Helianthemo vulgar, con
flore luteo. Bauh. hist. 2. p. la flor amarilla.
 15. Tourn. p. 248.

Chamæ-Cistus vulgaris, Pequeña Xara vulgar, con
flore luteo. C. B. P. 465. Lo- la flor amarilla.
 es. prus. 43. t. 8.

Flos Solis. Dod. pempt. Flor del Sol.
 193.

Flos Solis, panax Chiro- Flor del Sol, panace Chi-
nium. Cam. epit. t. 501. ronio.

Cast. Xara Helianthemo.

Ha-

Habita entre pastos secos de Europa : en los circuitos de Madrid : en la Mancha , Extremadura , Valencia , Aragon , Alcarria y Cataluña. \hbar

Tiene los *petalos* casi redondos , enterisimos , de color amarillo-roxo , y con un anillo del mismo color mas subido que rodea el receptáculo : el *racimo* inclinado antes de florecer ; y las *hojas* salpicadas de pelillos claros.

- Hirtus. 40. *CISTUS suffruticosus* X Xara sufruticosa , con es-
stipulatus, foliis ovatis, ca- tipulas ; hojas aovadas ; y
lycibus hispidis. cálices erizados.
Cistus Ledon Rosmarini X Xara Ledo , con hojas co-
foliis, subtus incanis. C. B. mo las del Romero y blan-
P. 467. quecinas por debaxo.
Helianthemum foliis Ro- X Helianthemo con hojas co-
rismarini, splendentibus, mo las del Romero , relu-
subtus incanis. Tourn. p. cientes y por debaxo blan-
250. quecinas.
Helianthemum angusto X Helianthemo de Italia, ve-
Serpillifolio, villosum, flore lloso , con hoja como la del
aureo, Italicum. Barr. rar. Sérpol, angosta ; y flor de
511. t. 488. color de oro.
Ledon VIII. Clus. hist. 1. X Ledo octavo.
p. 80.

Cast. Xara áspera.

Habita en Narbona : en Andalucia , Extremadura y otras partes de España. \hbar

- Apen- 41. *CISTUS fruticosus* , X Xara fruticosa , extendida,
ninus. *stipulatus patulus, foliis* X con estipulas ; y hojas lan-
lanceolatis hirtis. X ceoladas con pelo áspero.
Helianthemum saxatile, X Helianthemo saxátil , con
foliis & caulibus incanis, X hojas y tallos blanquecinos,
oblongis, floribus albis. X oblongos ; y flores blancas.
Mentz. pug. 8. f. 3. Dill. X
elth. 170.
Helianthemum album, X Helianthemo de Alema-
Germanicum. Tabern. ic. X nia , con la flor blanca.
1062.

Cast. Xara apenina.

Habita en los montes apeninos de Italia. \hbar

Es *arbuscillo* del largo de un pie, ramoso y extendido. Tiene las *hojas* verdes, con pelo áspero por encima, y por debaxo blanquecinas; y las *flores* blancas.

Polio-
lius.

42. *CISTUS suffruticosus*, \times Xara sufruticosa, tendida,
stipulatus procumbens, fo- \times con hojas entre oblongas y
liis oblongo-ovatis incanis, \times aovadas, blanquecinas; cá-
calycibus lævibus, *petalis* \times lices lisos; y petalos aserra-
serratis. Huds. Angl. 205. \times dos.

Cistus humilis, *alpinus*, \times Xara baxa, alpina, mas
durior, *Polii nostratis fo-* \times dura; con hoja como la del
lio, *candicante*. Pluk. Alm. \times Polio de nuestro pais (*In-*
107. t. 23. f. 6. \times *glaterra*) y de color blanco
reluciente.

Chamae-Cistus montanus, \times Pequeña Xara montana,
Polii folio. Rai. Angl. 4. p. \times con hoja como la del Polio.
274. t. 274. f. 2.

Helianthemum montanum, \times Helianthemo montano, con
Polii folio, *incano*, *flore can-* \times hoja como la del Polio, blan-
dido. Dill. elth. 175. t. 145. \times quecina; y flor cándida.
f. 172. \times

Cast. Xara con hoja de Polio.

Habita en la Albufera de Sabrina de los Ingleses, en Brentdown. \hbar

Arabi-
bus.

43. *CISTUS suffruticosus* \times Xara sufruticosa, con es-
stipulatus, *foliis alternis* \times tipulas; hojas alternas, lan-
lanceolatis planis levibus. \times ceoladas, planas y lisas.
Amœn. Acad. 4. p. 275. cent. \times
39. \times

Cast. Xara de Arabia.

Habita en Arabia. \hbar

La historia de las *Xaras* se halla sumamente obscura, por la multitud de sus variedades; y se ilustrará, si los que tienen la ocasion de verlas determinan en cada una de ellas las circunstancias siguientes:

1. El tronco arborescente, fruticuloso, annuo, ó perenne.
2. El tallo derecho, ó tendido.

Las

368 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

3. Las *hojas* opuestas , ó alternas , con la figura de ellas.
4. Las *estipulas* de dos en dos , ó de quatro en quatro , ó ninguna.
5. El *pedunculo* de una ó muchas flores , desnudo , ó con brácteas.
6. La figura de los *petalos*.
7. Las *celdillas* y *ventallas* de las capsulas.
8. El *caliz* igual , ó desigual.

810. Género PROCKIA. Auctore. Cl. Brownio
in litteris ex America.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de tres hojuelas , aovadas , y rara vez con dos muy pequeñas en la base.

COR. ninguna.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos , capilares , de la longitud del caliz : con las *anteras* casi redondas.

PIST. *Germen* algo redondo , casi de cinco ángulos : *estilo* filiforme , del largo de los estambres : con el *estigma* algo obtuso.

PERIC. *Baya* de cinco ángulos.

SEM. muchas.

ESPECIE.

Crucis 1. PROCKIA. Brown. $\begin{matrix} \times \\ \times \end{matrix}$ Prockia.

Cast. Prockia de Santa Cruz.

Habita en la Isla de Santa Cruz. \hbar

Es *arbusto* que produce las *ramas* rollizas : las *hojas* alternas , con peciolo , aovadas , puntiagudas , aserradas y lampiñas : las *estipulas* lineares : algunas *flores* terminales , alternas ; y sus *piececitos* acompañados de brácteas lineares.

811. Género CORCHORUS. * *Tourn. t. 135.*

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de cinco hojuelas , entre lineares y lanceoladas , agudas , derechas , y que se caen quando las demas partes de la flor.
- COR.** *Petalos* cinco , oblongos , obtusos , mas angostos por debaxo , derechos y de la longitud del caliz.
- ESTAMB.** *Filamentos* numerosos , capilares , mas cortos que la corola : con las *anteras* pequeñas.
- PIST.** *Germen* oblongo , asurcado : *estilo* craso , corto : con el *estigma* hendido en dos partes.
- PERIC.** *Capsula* oblonga , de cinco celdillas y cinco ventallas.
- SEM.** muchas , anguladas y puntiagudas.
- OBS.** El *Corcoro siliquoso* tiene la *siliqua* linear , comprimida , de dos ventallas y dos celdillas.
 El *Corcoro capsular* y el *de pelo áspero* poseen las *capsulas* casi redondas y terminadas en seno obtuso.
 El *Corcoro de tres dientes* y el *Corcoro que abrasa* llevan tres *estilos* hendidos en dos partes.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 259.

La *flor* es rosácea ó que consta de muchos *petalos* puestos en cerco ; de cuyo caliz sale el *pistilo* que pasa á fruto cilindrico , de cinco *capsulas* (*celdillas*) , que se abre en cinco partes , y lleno de *simientes* anguladas.

E S P E C I E S .

- Oli-
torius. 1. CORCHORUS *capsu-* X Corcoro de *capsulas* oblon-
lis oblongis ventricosis , fo- X gas , *ventricosas* ; y aserra-
liorum serraturis infimis X duras *infirmas* de las *hojas*
setaceis. Gron. orient. 170. X con *cerdas*.
Corchorus foliorum infi- X Corcoro con las *aserradu-*
mis serraturis maximis re- X ras *infirmas* de las *hojas* muy
flexis. Hort. Cliff. 209. X grandes y *redobladas*.

370 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Corchorus sive Melochia. X Corcoro ó Melochia.
 Bauh. hist. 2. p. 982. Tourn. X
 p. 259.
Corchorus. Comm. hort. X Corcoro.
 47. t. 12. X

Cast. Corcoro de hortaliza ó sea hortaliza despreciable.

Habita en Asia, Africa y America. ☉

Posee el *tallo* liso y verde: las *estipulas* sencillas y roxas por su base: las *hojas* de tres nervios, aovadas y con dientes setáceos: las *capsulas* en forma de huso, de cinco celdillas, asurcadas, obtusas, ó con quatro ó cinco dientes.

Trilo- 2. CORCHORUS capsu- X Corcoro de capsulas con
 cularis *lis trilocularibus trivalvi-* X tres celdillas, tres ventallas,
bus triquetris, angulis bi- X y de tres caras; ángulos hen-
fidis scabris, foliis oblongis, X didos en dos partes, ásperos;
serraturis infimis setaceis. X hojas oblongas, y las aser-
 Jacq. hort. t. 173. X raduras de mas abaxo, setá-
 ceas.

Corchorus æstuans. Forsk. X Corcoro que abraza.
 Fl. Ægypt. IV. p. 101. X

Cast. Corcoro de tres celdillas.

Habita en la Arabia. Forsk. ☉

Arroja los *tallos* lisos, derechos, del largo de un pie, rollizos y verdes: las *estipulas* setáceas y pequeñas: las *hojas* alternas, con peciolo, rayadas, desnudas, ásperas por debaxo, lanceoladas, ondeadas y aserradas con dientes setáceos: los *pedunculos* casi opuestos á las hojas, cortos, hendidos en dos partes ó con dos flores: los *cálices* angulados: los *petalos* angostos y amarillos: las *capsulas* lineares, prismáticas, de tres caras, y sus ángulos estriados con una línea, ásperas y obtusas por su ápice.

Tri- 3. CORCHORUS capsu- X Corcoro de capsulas linea-
 dens. *lis linearibus teretiusculis* X res, algo rollizas, ásperas;
scabris, foliorum serraturis X y con las aserraduras mas
infimis setaceis. X baxas de las hojas setáceas.

Cor-

Corchorus Americana, an-
gusto barbato folio. Pluk. X Corcoro Americano, con
phyt. t. 127. f. 4. Burm. ind. X hoja angosta y barbada.
123. t. 37. f. 2.

Corchorus Americana, fo-
liis & fructu angustioribus. X Corcoro Americano, con
Tourn. p. 259. X hojas y fruto mas angostos.

Cast. Corcoro de tres dientes.

Habita en la India.

Echa el tallo liso y verde: las *estipulas* divididas en tres partes, y setáceas: las *hojas* con lineas algo profundas, lanceoladas, ondeadas, y aserradas con dientes setáceos: las *capsulas* lineares y ásperas: tres *estilos* muy apartados, y hendidos en dos partes.

Æs- 4. CORCHORUS capsu- X Corcoro con capsulas
tuans. lis oblongis trilobularibus X oblongas, de tres celdillas,
trivalvibus sexsulcatis sex- X tres ventallas, con seis sur-
cuspidatis, foliis cordatis: X cos y seis puntitas; hojas de
serraturis infimis setaceis. X figura de corazon, y las
Jacq. hort. t. 85. X aserraduras de abaxo setá-
ceas.

Alcea cibaria seu Corcho- X Alcea comestible, ó Cor-
rus Americana, Carpini fo- X cororo de America, con hojas
liis, sextuplici capsula lon- X como las del Carpe; y cap-
giore. Pluk. phyt. 127. f. 3. X sula mas larga, con seis cel-
dillas.

Corchorus Americana, Car- X Corcoro de America, con
pini folio, fructu longiore. X hoja como la del Carpe; y
Tourn. p. 259. X fruto mas largo.

Triumfetta subvillosa, fo- X Triumfetta algo vellosa,
liis rotundioribus, undulatis, X con hojas mas redondas, on-
atque dentatis, postremis in- X deadas y dentadas; y las de
setas inermes. Brown. jam. X mas abaxo que terminan en
232. t. 25. f. 1. X cerdas que no punzan.

Cast. Corcoro que abrasa.

Habita en la America mas caliente. $\frac{h}{2}$

Arroja el tallo algo áspero, de color que tira á purpúreo; con ramas apartadas: las *estipulas* setáceas: las *hojas* de tres nervios, entre de figura de corazon y aovadas con

con dientes setáceos: las *capsulas* lineares con seis ángulos comprimidos, acercados de dos en dos; y terminadas con dientes muy apartados, y en tres *estilos* hendidos en dos partes.

Cap-
sularis

5. CORCHORUS *capsularis subrotundis depressis rugosis, foliorum serraturis infimis setaceis*. Flor. Zeyl. 214.

Corchorus foliorum infimis serraturis minoribus. Hort. Cliff. 210.

Alcea olitoria seu Corchorus Americanus, praelongis foliis, capsula striata, subrotunda, brevi. Pluk. Alm. 18. t. 255. f. 4.

Gania sativa. Rumph. Amb. 5. p. 212. t. 78. f. 1.

Corcoco con las capsulas casi redondas, deprimidas, rugosas; y las aserraduras mas baxas de las hojas setáceas.

Corcoco con las aserraduras mas baxas de las hojas menores.

Alcea de hortaliza ó Corcoco de America, con hojas muy largas; capsula estriada, casi redonda y corta.

Gania que se siembra.

Cast. Corcoco capsular ó sea de capsula.

Habita en la India. ☉

Posee las *hojuelas del caliz* cóncavas, encorvadas, punteadas por defuera, mas cortas que la corola: y los *petalos* escotados.

Hir-
sutus.

6. CORCHORUS *capsularis subrotundis lanatis, foliis ovatis obtusis tomentos æqualiter serratis*. Jacq. Amer. 165.

Corchorus Americanus, lanuginosus, folio Chamedrys, siliqua tricapsulari, lanuginosa & subaspera. Breyn. prodr. 3. p. 56.

Guazuma, frutex Chamedryfolia, fructu lanuginoso, major & minor. Plum. gen. 30. ic. 104.

Corcoco con las capsulas casi redondas, lanudas; hojas aovadas, obtusas, tomentosas, y sus aserraduras (ó sean dientes) iguales.

Corcoco de America, lanuginoso, con hoja como la del Chamedrys; siliqua de tres capsulas, borrosa, y casi áspera.

Guazuma mayor y menor, Arbusto con hoja como la del Chamedrys; y fruto lanuginoso.

Cast.

Cast. Corcoro con pelo áspero.
Habita en la America Meridional.

Hirtus. 7. CORCHORUS capsulis oblongis cauleque pilosis, foliis oblongis æqualiter serratis. Corcoro con las capsulas oblongas y pelosas como el tallo; hojas oblongas, y sus aserraduras (ó sean dientes) iguales.

Corechorus foliis Ulmi, major. Plum. spec. 7. ic. 103. f. 2. Corcoro mayor, con hoja como la del Olmo.

Cast. Corcoro con pelo rígido.
Habita en la America Meridional.

siliquosus 8. CORCHORUS capsulis linearibus compressis bivalvibus, foliis lanceolatis æqualiter serratis. Corcoro con las capsulas lineares, comprimidas, de dos ventallas; hojas lanceoladas y sus aserraduras (ó sean dientes) iguales.

Corchorus folio Ulmi, minor. Plum. spec. 7. ic. 103. f. 1. Corcoro menor, con hoja como la del Olmo.

Corchorus coreta. Amœn. Acad. 5. p. 398. Corchoro coreta.

Corchoro affinis, Chamedryos folio, flore stamineo, seminibus atris, quadrangulis, duplici serie dispositis. Sloan. jam. 50. hist. 1. p. 145. t. 94. f. 1. Rai. Suppl. p. 516. Planta parecida al Corcoro, con hoja de Chamedrys; flor estambrosa; semillas negras, de quatro ángulos, y dispuestas en dos series.

Coreta foliis minoribus, ovatis, crenatis, floribus singularibus. Brown. jam. 147. Coreta con hojas mas pequeñas, aovodas, recortadas; y flores de una en una.

Cast. Corcoro siliquoso.

Habita en la America meridional. \bar{h}

Produce el tallo casi fruticoso, derecho, en panoja y algo vellosa: las hojas lanceoladas, ó entre aovodas y oblongas con aserraduras ó sean dientes iguales, y sin diente alargado en la base: los pedunculos de una flor, al lado de las hojas, y sin bráctas: los gérmenes con pelo ri-

374 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

rígido y áspero: las *siliquas* de dos ventallas y comprimidas: las *flores*, que vienen en la primavera, sin pétalos, de quatro estambres, y con el caliz de quatro hojuelas; las que vienen en otoño, de cinco pétalos, con muchos estambres: y el *caliz* de cinco hojuelas.

812. Género SEQUIERIA. *Loefl. it. 191.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* extendido, de cinco hojuelas, oblongas, cóncavas, de color y persistentes.

COR. ninguna; sino que sea el caliz.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, capilares, extendidos, y mas largos que el caliz: con las *anteras* oblongas y algo planas.

PIST. *Germen* oblongo, comprimido, por arriba membranoso y por un lado mas grueso: *estilo* cortísimo, puesto en el lado mas grueso del germen: con el *estigma* sencillo.

PERIC. *Capsula* oblonga, acompañada de una ala muy grande, mas gruesa por el lado mas recto, adornada en ambas partes de su base con tres aletas, de una celdilla, y que no se abre.

SEM. una sola, oblonga y lampiña.

ESPECIE.

Americana.

I. SEQUIERIA.

Sequiera aculeata. Jacq.

Amer. 170.



Sequiera.

Sequiera con agujones.

Cast. Sequiera de America.

Habita en la America Meridional, y en los caminos de Cartagena de Indias. \hbar

Tiene las *hojas* alternas, pecioladas, elípticas y escotadas: los *agujones* junto á las hojas y encorvados ácia atrás: las *flores* racimosas, blancas y fétidas.

813. Género TERNSTROMIA. *Mutis. Suppl. p. 39.*

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio interior* de una pieza , sobre el qual están echadas dos escamas muy pequeñas , partido en cinco lacinias , todas redondas , cóncavas y persistentes.
- COR.** de un *petalo* , á manera de campana , sin tubo : *borde* partido en cinco lacinias , alguna vez en seis , redondas , cóncavas , escotadas , y mas largas que el caliz.
- ESTAMB.** *Filamentos* numerosos , insertos en la base de la corola , mas cortos que ella , filiformes , y colocados en dos series : con las *anteras* lineares , derechas , y del largo de los filamentos.
- PIST.** *Germen* dentro de la flor , casi redondo : *estilo* cilindrico , de la longitud de los estambres : con el *estigma* en cabezuela.
- PERIC.** *Baya* acorchada , aovada , lisa , de dos celdillas , y sin ventallas.
- SEM.** de ocho en ocho , poco mas ó menos , convexâs , y por una parte planas.

ESPECIE.

Meridionalis.

I. TERNSTRONIA. Sup. X Ternstronia.

pl. p. 264.

Icon. Mutis. Amer. vol. I. X La figura que trae Mutis.

t. 9.

Cast. Ternstronia Meridional.

Habita en la nueva Granada. \bar{h}

Es *arbol* que arroja las *ramas* terminadas en ramitas mas sencillas , algo rigidas , con su corteza cenicienta : las *hojas* alternas , correosas , perennes , ovales , obtusas , casi escotadas , algo encorvadas ácia atrás por su margen , enterisimas , sin venas , y con el peciolo corto : los *pedunculos* axilares , gruesos , comprimidos y de dos filos , la mitad mas cortos que las hojas y cabizbaxos : el *caliz* rígido , y casi cartilaginoso : la *corola* blanca , partida ,
las

376 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

las mas veces, en cinco lacinias, rara vez en seis, globosa al principio, y despues en forma de campana: y la *baya* seca que hallandose madura se cae y rompe, sin ventallas, ni retener alguna estructura constante de ellas: las *semillas* de color de sangre, y con vello como seda.

814. Género ALSTONIA. *Mutis. Suppl. p. 39.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* baxo del germen, y apifiado con escamas aovadas, cóncavas, y muy obtusas; las de adentro gradualmente mayores, y como si formasen un caliz dividido en quatro ó cinco partes,

COR. de un *petalo*, mas corta que el caliz: *tubo* corto: *borde* extendido y partido en ocho ó diez lacinias iguales, colocadas en dos series, y alternadamente mas adentro, aovadas al revés, obtusas y enterisimas.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, insertos en el tubo, cortísimos, apifiados, muy lampiños; los exteriores mas largos, lineares y adelgazados por su ápice: con las *anteras* redondas y asurcadas.

PIST. *Germen* dentro de la flor, aovado y pequeño: *estilo* sencillo, del largo de la corola, filiforme y derecho: con el *estilo* entre en cabezuela y aovado al revés.

PERIC.

SEM.

ESPECIE.

Theas-
formis. 1. ALSTONIA. *Suppl. p. X* Alstonia.
264. *X*

Cast. Alstonia parecida al Thé.

Habita en la America Meridional. *Mutis. h*

Es *arbusto* muy lampiño, con traza como la del *Thé bohea*.

Echa las *hojas* alternas, con el peciolo muy corto, asurcadas, elipticas, algo obtusas, enteras por su base, aserradas obtusamente desde el medio hasta su ápice, rígidas y venosas: tres ó quatro *flores* axilares y sin pedunculo: el *caliz* muy lampiño, con escamas redondas, verdes, y por su margen membranosas: las *corolas* blancas y extendidas.

Las

Las hojas secas y mascadas tiñen la saliva de color que tira á verde , y tienen el gusto enteramente como el del Thé. Acaso podrían servir en lugar de él?

815. Género SPARRMANNIA. *Suppl. p. 41.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* baxo del germen , de quatro hojuelas iguales , lanceoladas , enteras y redobladas.

COR. *Petalos* quatro , iguales , en forma de cuña , planos , enteros , redoblados por arriba , apretados fuertemente en el receptáculo , y mas largos que el caliz.

Nectarios propios , filiformes , disformes , y mas cortos que los estambres , con las eminencias infladas , y de figura cónico-inversa.

ESTAMB. *Filamentos* muchos , separados , filiformes : los exteriores parecidos á los nectarios mas largos , pero mas cortos que la corola : con las *anteras* sentadas , entre de figura de corazon y aovadas.

PIST. *Germen* dentro de la flor , casi globoso , de cinco ángulos , y erizado : *estilo* filiforme , recto , pendulo dentro de los estambres , y mucho mas largo que ellos : con el *estigma* truncado y terminado en puntos carnosos y alargados.

PERIC. *Capsula* de cinco ángulos , erizada con cerdas mas largas , extendidas , rectas , rígidas , pelosas , puestas en los ángulos mayores , y terminadas en una espina transparente , recta , y que punza.

SEM. dos en cada celdilla , oblongas , lampiñas y aquilladas por un lado.

ESPECIE.

I. SPARRMANNIA. Sup-^X Sparrmannia.

Afri-
cana. pl. p. 265.

Cast. Sparrmannia de Africa.

Habita en Africa. *Sparrm.* $\frac{f}{h}$

Es *arbusto* que produce las *ramas* alternas , derechas , pelosas y rollizas : las *hojas* tambien alternas , con el *peciolo* largo , pendulas , de figura de corazon , aovadas , hendidas en algun lóbulo , aserradas , puntiagudas , con
nue-

378 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

nueve nervios, y por una y otra parte erizadas: los *peciolos* rollizos y pelosos: las *estipulas* laterales, alesnadas, pelosas y derechas: los *pedunculos* opuestos á las hojas, mas largos que los peciolos, derechos, pelosos, y terminados en umbela al modo que los *Geranios*, con su involucre de muchas hojuelas alesnadas y cortísimas: los *piececitos de las flores* pelosos: los *cálices* tambien pelosos, muy sencillos y sin arista: los *petalos* apretadamente redoblados y de color amarillo roxo: los *nectarios* amarillos: los *estambres* de color entre negro y purpúreo: los *pistilos* mucho mas largos que los *estambres*, y amarillos: la *capsula* erizada y de color obscuro; con las *semillas* negras.

Los *pedunculos* antes de florecer se hallan inclinados; pero en el estado de la florecencia se levantan con las flores cabizbaxas; y concluida aquella se enderezan las mismas flores para que madure mas bien el germen, del mismo modo que sucede en la *Dodecathea*.

La *yerba* es semejante á las especies de *Triunfetta*, ó mas bien á las de la *Còmersonia*. Los *pedunculos* y la *inflorescencia* se parecen á los de los *Geranios*: y el *fruto* al del *Hybisco*; pero con agujones como en las especies del *Geo*; por cuyas razones parece que esta planta participa de muchos generos.

816. Género VALLEA. Mutis. *Suppl.* p. 42.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de quatro ó cinco hojuelas, entre aovadas y lanceoladas, estriadas, de color y que se caen quando las demas partes de la flor.

COR. *Petalos* quatro ó cinco, aovados al revés, hendidos en tres partes y mayores que el caliz extendido.

Nectario: un *ribete* algo plano, ondeado por su margen, lustroso y de color.

ESTAMB. *Filamentos* muchos (*treinta hasta quarenta*), un poco planos, de color, encorvados, cortos, puestos en una serie, é insertos en el receptáculo debaxo del *nectario*: las *anteras* lineares, derechas y con dos agujeros en su ápice.

PIST.

PIST. *Germen* dentro de la flor, aovado: *estilo* algo rollizo y del largo de la flor: con el *estigma* hendido en quatro ó cinco partes y delgado.

PERIC. *Capsula* de quatro ó cinco ángulos, y con celdillás divididas en dos.

SEM. muchas.

ESPECIE.

Stipularis.

1. VALLEA. Suppl. p. 266. Vallea.

Icon. Mutis. Amer. vol. 7. t. 10. La figura que trae Mutis.

Cast. Vallea estipular.

Habita en clima frio de la nueva Granada. \bar{h}

Es arbol que sube á la altura de dos hombres, y echa las hojas alternas, pecioladas, de figura de corazon, enterisimas y por debaxo algo tomentosas: los *peciolos* mas cortos que las hojas: las *estipulas* sentadas, en forma de riñon, que abrazan el tallo, enterisimas y mayorcitas: la *panoja* dividida en tres partes y que termina las ramas; con las *flores* de color de sangre.

El número de las partes de la fructificacion es comunmente quaternario, y varía en el de quinario.

817. Género MYRISTICA. Suppl. p. 40.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* á manera de campana, hendido en cinco partes y baxo del germen.

COR. *Petalos* cinco, oblongos, enteros y mas largos que el caliz.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, filiformes, derechos y lampiños: con las *anteras* oblongas.

PIST. *Germen* aovado, dentro de la flor: *estilo* filiforme: con el *estigma* sencillo.

PERIC. *Bayu* en forma de poma, aovada y de una semilla.

SEM. una sola, grande, casi redonda, de varios colores por dentro, y cubierta por defuera con una cortecita casi en forma de red, membranosa y plana, con sus fi.

380 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

fibras irregulares, casi carnosas, y algo impresas en la misma semilla.

ESPECIE.

Officinalis.

1. MYRISTICA. Suppl. X Myristica.
 p. 265.
Le Muscadier. Sonnerat. El arbol de la Nuez moscada ó de especia.
 voy. t. 116. 117. 118.
Nux Myristica mas. Nuez Myristica, masculina.
 Rumph. Amb. vol. 2. p. 24. t. 5.
Nux moschata, fructu rotundo. Pluk. Alm. 265. t. 209. f. 1. Nuez moscada, con el fruto redondo.

Cast. Myristica oficial. Farm. Nux moschata.

Habita en la Isla de Banda. $\frac{h}{2}$

Es arbol que produce las *hojas* alternas, con peciolo, aovadas, agudas, venosas, lampiñas, enterisimas y blancuecinas por debaxo: los *pedunculos* axilares, cabizbaxos y de una flor: las *flores* pequeñas: el *fruto* de la magnitud y figura de una pera ó manzana comun pequeña, lampiño y de color entre amarillo y verde.

PROPIED. La nuez y la membrana que la cubre, llamada Macis en las oficinas, son anodinas, estomáticas, restringentes y corroborantes: se usan en la diarrea, y para corregir los flatos; y se suelen mezclar tambien con las especias.

818. Género CHRYSITRIX. Polyg. diac.

CAR. GEN. NAT.

Cabezuela pequeña lateral, dentro de la espata de dos hojuelas: la superior continuada desde el escapo, alesnada y recta: la inferior extendida, aovada, cóncava, aquillada y correosa.

CAL. Gluma de muchas ventallas apiñadas, oblongas, cartilaginosas, lampiñas, apretadas, y que se caen despues de la florecencia.

COR. Glumas ó pajas numerosisimas, que llenan el recep-

tá-

táculo, amontonadas en hacecillo uniforme, alesnadas, relucientes, mas largas que el caliz y persistentes.

ESTAMB. un *filamento* solo dentro de cada gluma, capilar, y de la longitud de ellas: con las *anteras* pegadas al ápice de cada filamento, alesnadas y pequeñas.

PIST. *Germen* uno solo en medio de la cabezuela y oblongo: *estilo* filiforme, de la longitud de las glumas y de los estambres: con el *estigma* hendido en cinco partes.

PERIC.

SEM.

ESPECIE.

Capensis.

I. CHRYSITRIX.



Chrysitrix.

Cast. Chrysitrix del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \mathcal{L}

Su *estatura* es como la del *Sisyrinchio*. Produce las *hojas* en forma de espada, lisas, y del largo de un palmo, ó de un pie: el *escapo* muy semejante á la hoja, comprimido, membranoso, y terminado en una espata de dos ventallas, la una recta, casi continuada del mismo escapo, y la otra mas abaxo aovada, y que se abre: la *flor* que sale de una margen superior del escapo á manera de un hacecillo de cerdas horizontal, de color de oro y coartado, con el periantio cartilaginoso.

ORDEN II.

DIGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON DOS PISTILOS.

819. Género PÆONIA. * *Tourn. t. 146.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* pequeño, de cinco hojuelas, casi redondas, cóncavas, redobladas, persistentes, y desiguales en su magnitud y direccion.

COR. *Petalos* cinco, casi redondos, cóncavos, mas angostos por su base, extendidos y muy grandes.

Es-

ESTAMB. *Filamentos* numerosos (cerca de trescientos), capilares y cortos: con las *anteras* oblongas, de quatro ángulos, derechas, grandes y de quatro celdillas.

PIST. *Gérmenes* dos, aovados, derechos, tomentosos: *estilo* ninguno: *estigmas* comprimidos, oblongos, obtusos y de color.

PERIC. *Capsulas* dos, entre aovadas y oblongas, entre redobladas y extendidas, tomentosas, de una celdilla, de una ventalla, y que se abren por dentro longitudinalmente.

SEM. muchas, ovales, lustrosas, de color y fixadas á la sutura que se abre.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 273.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco; de cuyo caliz de muchas hojuelas sale el pistilo, que pasa á fruto, en el qual se recogen como en cabezuela muchos cuernecillos doblados ácia abaxo, vellosos, que se abren longitudinalmente, y llenos de semillas casi globosas.

ESPECIES.

Officinalis.	1. PÆONIA <i>foliolis oblongis</i> . Hort. Cliff. 212. Mat. Med. 158.	Peonia con hojuelas oblongas.
α	<i>Pæonia officinalis</i> , <i>fæmina</i> . <i>Pæonia radice glandulosa</i> , <i>foliis duplicato-pinnatis</i> , <i>pinnis ellipticis</i> , & <i>trilobis</i> . Hall. helv. n. 1187.	Peonia oficial, femenina. α Peonia con la raiz glandulosa; hojas dos veces pinnadas; hojuelas elípticas y hendidas en tres lóbulos.
	<i>Pæonia fæminea</i> . Knorr. del. 1. t. R. 3. & t. R. 2. <i>floure pleno</i> .	Peonia femenina..... con la flor plena.
	<i>Pæonia communis seu fæmina</i> . C. B. P. 323. Tourn. p. 274.	Peonia comun ó femenina.
	<i>Pæonia fæmina</i> . Fuchs. hist. 202. Matthioli. 915.	Peonia femenina.

<i>Pæonia fœmina, vulgatiôr.</i> Bauh. hist. 3. p. 492.	Peonia femenina, mas vulgar.
<i>Pæonia fœmina, altera.</i> Dod. pempt. 195.	Otra Peonia femenina.
<i>Pæonia officinalis, masculina.</i>	Peonia officinal, masculina. β
<i>Pæonia foliis lobatis, ex ovato-lanceolatis.</i> Hall. helv. ed. 1. 311.	Peonia con hojas hendidas en lóbulos y entre aovadas y lanceoladas.
<i>Pæonia folio nigricante, splendido, que mas.</i> C. B. P. 323. Tourn. p. 273.	Peonia masculina, con la hoja de color que tira á negro y reluciente.
<i>Pæonia mas, procerior.</i> Bauh. hist. 3. p. 492.	Peonia masculina, mas alta.
<i>Pæonia mas.</i> Dod. pempt. 194.	Peonia masculina.

Cast. Peonia officinal.

Habita en los bosques de Ida y Suiza: en las dos Castillas, Cataluña, Aragon y otras muchas partes de España. ℞

Las flores despues de abiertas son regulares; pero con el calor se vuelven enteramente irregulares.

La *Peonia masculina* tiene las *hojas* menos disformes, y carece de glandulas.

PROPIED. La raiz y flores son anodinas, acarrean el sueño, antispasmodicas, algo astringentes, expelentes y emenagogas; se usan en las convulsiones y epilepsia.

Anomala.	2. <i>PCEONIA calyce folioso, capsulis glabris depressis.</i>	Peonia con el caliz folioso; capsulas lampiñas y deprimidas.
	<i>Pæonia fructibus quinque, glabris, patentibus.</i> Gmel. Sib. 4. p. 184. t. 72.	Peonia con cinco frutos, lampiños y extendidos.

Cast. Peonia anomala.

Habita en toda la Siberia. ℞

Se diferencia de la precedente por las *hojas anomalas*, ó sea divididas desigualmente; por las *hojuelas del caliz lanceoladas* en su ápice, y de la longitud de la corola

ó mas : por los *gérmenes* lampiños , y comunmente de cinco en cinco.

- Tenni-
folia. 3. *PÆONIA foliolis linearibus multipartitis*. Linn. Peonia con las hojuelas lineares, y divididas en muchas partes.
dec. 9. t. 5. Gmel. Sib. 4. p. 185. t. 73.
Pæonia laciniis foliorum linearibus. Zinn. goett. 127. Peonia con las lacinias de las hojas lineares.

Cast. Peonia de hoja delgada.

Habita en Ucrania y Siberia. ♀

Tiene muchas *hojas* en el tallo , y no tres ó quatro solamente como la *Peonia officinal* : tres *gérmenes* de color que tira á purpúreo , cubiertos tambien de pelos purpúreos y no blancos como en aquella.

820. Género CURATELLA. * *Loeff. it. 260.*

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de cinco hojuelas , casi redondas , cóncavas , con la quinta interior muy semejante á los petalos.
- COR.** *Petalos* tres ó quatro , casi redondos , cóncavos y de la figura del caliz.
- ESTAMB.** *Filamentos* muchos , filiformes , mas cortos que la corola : con las *anteras* casi redondas.
- PIST.** *Germen* dividido en dos partes , algo redondo : *estilos* dos , filiformes , derechos y de la longitud de los estambres : con los *estigmas* en cabezuela.
- PERIC.** *Capsula* de dos celdillas , partida en dos lóbulos casi redondos y de una caxita.
- SEM.** de dos en dos , oblongas y lustrosas.

E S P E C I E .

Ame-
ricana. **I. CURATELLA.** *Loeff.* X Curatela.
it. 260. X

Cast. Curatela de America.

Habita en la America Meridional. ♀

Su estatura es como la de la *Cocoloba*. Tiene las *hojas* alternas, casi sentadas y oblongas.

Es *arbusto* con traza casi como la del *Polygono arborescente*, de mediana altura, doblado por una y otra parte, de pocas ramas, con su corteza resquebrajada y vestida de escamas al modo que la del *Pino*. Echa las *hojas* en las ramitas de mas afuera, alternas, del largo de un gemo, oblongas, casi sentadas, variamente dobladas, algo ondeadas, venosas, ásperas, duras y ligeramente recortadas por su margen: los *peciolos* cortos, y por encima planos: las *flores* en racimo, laterales, que salen de las ramitas ó axilas antiguas, del largo de un dedo, sencillas, acompañadas por su base con una ú otra ramita y alternas: el *pedunculo comun* del largo de un dedo, con algun ángulo: el *parcial* con otros piececitos de la longitud de tres ó quatro lineas y filiformes: las *bracteas* pequeñas, oblongas, obtusas y debajo de los piececitos: el *periantio* convexo, con las quatro hojuelas exteriores de color sin pulimento: los *petalos* de la figura del calíz y blancos: el *germen* tomentoso: la *capsula* de dos lóbulos casi redondos, con pelo áspero y de una celdilla. *Loefl. loco citato.*

821. Género FOTHERGILLA. D. Garden.

Suppl. p. 42.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, á manera de campana, apretado, casi truncado, muy corto y persistente.

COR. ninguna.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, filiformes, largos, y por arriba mas gruesos: con las *anteras* menudas, derechas y de quatro ángulos.

PIST. *Germen* aovado, hendido en dos partes: *estilos* dos, alesnados, terminales y del largo de los estambres: con los *estigmas* sencillos.

PERIC. *Capsula* endurecida, de dos celdillas, y dividida en dos lóbulos de dos ventallas.

SEM. solitarias y oseas.

OBS. El *fruto* y *traza* son como de la *Hamamelis*.

TOM. IV.

Bb

ES-

ESPECIE.

Alni- folia.	I. FOTHERGILLA.	×	Fothergila.
	<i>Fothergilla Gardeni</i> . Syst.	×	Fothergila de Garden.
	pl. 610.	×	

Cast. Fothergila con hoja de Aliso.

Habita en la Carolina. *Garden*. \bar{h}

Es arbol con *traza* y *hojas* como las del *Aliso*. Produce las *hojas* alternas, pecioladas, en forma de cuña, enteras, aserradas por su ápice, con aserraduras (ó sean dientes) grandes y pocas, por encima verdes, por debajo canas; pero las mas tiernas con tomento blanco por debaxo: las *flores* blancas, espigadas, terminales y amontonadas casi en cabezuela oblonga: las *capsulas* grandes, aovadas, con mucho pelo áspero, agudas, de dos celdillas, y con las ventallas que se abren en quatro puntas quando las simientes están maduras. *Suppl.* p. 267.

822. Género CALLIGONUM. † Polygonoides.

Tourn. t. 478.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de cinco hojuelas, casi redondas, cóncavas y persistentes.

COR. ninguna.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, muy pequeños: con las *anteras* mellizas.

PIST. *Germen* aovado: *estilo* ninguno: *estigmas* dos, y obtusos.

PERIC. aovado, comprimido, estriado, erizado, con las puntas hendidas en dos partes, revueltas y persistentes.

SEM. de la misma hechura del pericarpio y cubierta.

OBS. La planta, cuyo carácter se ha descrito aqui, fue remitida á *Linneo* por *Gronovio*, quien aseguraba ser el *Polygonoide* de *Tournefort*; aunque la figura le quadra poco. Vean pues los que tengan la ocasion de lo-

lograrla viva, si es la misma ó no. *Tournefort* en su viaje describe la flor casi de esta manera.

CAL. pequeño, de cinco hojuelas lanceoladas y persistentes.

COR. de cinco *petalos*, aovados al revés y extendidos.

ESTAMB. *Filamentos* cinco, alesnados, mas largos que la corola: con las *anteras* casi redondas.

PIST. *Germen* dentro de la flor, aovado, puntiagudo: *estilo* apenas ninguno; y el *estigma* obtuso.

PERIC. como el del *Calligono*.

CARACT. GENER. DE TOURNEF.

POLYGONOIDES. COR. p. 47.

La flor es de un petalo, en forma de rueda y hendido en muchas partes; de cuyo centro sale el pistilo que pasa á fruto estriado, alado y con vello áspero.

ESPECIE.

Poly-
gonoi-
des.

I. CALLIGONUM.

Caligono.

Pterococcus aphyllus. Pterococco ó sea fruto con
Pall. it. app. p. 738. n. 109. alas y sin hojas.

t. S. sect. R.

Polygonoides Orientale, Polygonoide Oriental,
Ephedræ facie. Tourn. cor. con traza de Ephreda.

47. it. 3. p. 214. t. 214.

Cast. Caligono como Polygono.

Habita en el monte Ararat y en la Siberia. ¶

Pallas ha descrito de otra manera el *Polygonoide de Tournefort*, sacando su descripcion de las plantas vivas del modo que *Linneo* su *Caligono*, y *Tournefort* su *Polygonoide*.

Sigue el carácter del Pterococco del famoso Pallas it. t. 2.

app. p. 738. n. 109. t. 5. it. t. 3. p. 536. Vide

Linn. Gen. pl. ed. Reich. append.

pag. 570.

CAL. ninguno.

COR. de cinco *petalos*, blanquecinos y persistentes; con
Bb 2 el

388 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

el *inferior* un poco mayor, y los dos opuestos mas oblongos y mas pequeños.

ESTAMB. *Filamentos* diez, ó á lo mas doce, setáceos, mas gruesos por su base y tomentosos, de la longitud de la corola, derechos, que se marchitan juntos con la corola sin caerse al paso que vá creciendo el fruto: las *anteras* casi globosas y mellizas.

PIST. *Germen* cónico, de quatro caras, rara vez de tres, con ángulos hendidos en dos partes, y que crecen en alas del fruto: *estilos* tres, redoblados: con los *estigmas* en cabezuela.

FRUTO *Nuez* (*drupa*) oblonga, de quatro caras, con quillas alargadas en una cresta delgada, á la qual está pegada una ala redonda ó casi oval, ondeada, membranosa, estriada, y que se hiende desde el disco hasta su margen: con otras quatro *alas* al rededor de la nuez que se arriman entre sí, y la esconden ó cubren por todas partes.

SEM. *Almendra* (*nuez*) oblonga, de quatro caras, excavada profundamente entre los ángulos: con el *corculo central* que crece por el ápice de la nuez.

ORDEN III.

TRIGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON TRES PISTILOS.

823. Género DELPHINIUM. * *Tourn. t.* 241.

CAR. GEN. NAT.

CAL. ninguno.

COR. *Petalos* cinco, desiguales, puestos en cerco, de los quales el de mas arriba es mas obtuso que los restantes, y alargado por debaxo en un cuernecillo tubuloso, recto, largo y obtuso: los *restantes* entre aovados y lanceolados, extendidos y casi iguales.

Nectario hendido en dos partes, puesto dentro del cerco de los petalos en la parte superior, y alargado por debaxo en un tubo envuelto con el petalo de mas arriba.

ESTAMB. *Filamentos* muchos (*quince hasta treinta*), ales-

na-

nados , mas anchos por su base , muy pequeños , é inclinados ácia el petalo de mas arriba : con las *anteras* derechas y pequeñas.

PIST. *Gérmenes* tres , ó uno , aovados , y que rematan en estilos de la longitud de los estambres : con los *estigmas* sencillos y redoblados.

PERIC. *Capsulas* tres , ó una , entre aovadas y alesnadas , rectas , de una ventalla , y que se abren ácia dentro.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 426.

La *flor* es de muchos petalos , anomala ó sea que consta de muchos petalos desemejantes , de los cuales el superior se adelgaza en una colilla que abraza otro petalo hendido en dos partes , y que igualmente tiene una pequeña cola. El pistilo ocupa el centro de estos petalos , y pasa á fruto , en el qual , como en una cabezuela , se recogen las vaynas que se abren á lo largo y llenas de semillas anguladas.

ESPECIES QUE TIENEN UNA SOLA CAPSULA.

- | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Con-
solida. | 1. DELPHINIUM <i>necta-</i>
<i>riis monophyllis</i> , <i>caule sub-</i>
<i>diviso</i> . Knorr. del. 1. t. R.
17. Flor. dan. t. 683. Mat.
Med. 158. | Delphinio con los necta-
rios de una pieza ; y el tallo
subdividido. |
| | <i>Delphinium unisiliquum</i> ,
<i>caule brachiato</i> , <i>diffuso</i> , <i>flo-</i>
<i>ribus sparsis</i> . Hall. helv. n.
1203. | Delphinio con una siliqua ;
tallo en forma de aspa , di-
fuso ; y flores esparcidas. |
| | <i>Delphinium nectariis acu-</i>
<i>minatis</i> , <i>subcurvatis</i> , <i>pe-</i>
<i>dunculo longioribus</i> , <i>foliis</i>
<i>lineari-pinnatifidis</i> . D. Neck.
Gollop. p. 233. | Delphinio con los necta-
rios puntiagudos , algo en-
corvados , mas largos que el
pedunculo ; y hojas entre li-
neares y hendidas al través. |
| | <i>Consolida regalis</i> , <i>arven-</i>
<i>sis</i> . C. B. P. 142. | Consolida real , arvense. |
| | <i>Delphinium segetum</i> , <i>flo-</i>
<i>re cæruleo</i> . Tourn. p. 426. | Delphinio que nace entre
los sembrados , con la flor
cerúlea. |

Del-

- Delphinium vulgare*. Clus. X Delphinio vulgar.
 hist. 2. p. 205.
Flos Regius, sylvestris. Dod. pempt. 252. Flor Real, silvestre.

Cast. Delphinio consolida. *vulgo*: Espuela de Caballero.
Habita entre los sembrados de Europa: en los circuitos de Madrid: en Aragon, Cataluña, Valencia y en las mas provincias de España. ☉

Varia con la flor plena y en el color violado, roxo, cerúleo y blanco. Su semilla mata los insectos y con particularidad á los piojos.

- Ajacis.* 2. DELPHINIUM *nectariis monophyllis, caule simplici*. Hort. Cliff. 203. Delphinio con los nectarios de una pieza; y tallo sencillo.
Delphinium unisiliquum, caule recto, spicato. Hall. Delphinio con una siliqua; tallo recto y espigado.
 helv. n. 120.
Consolida regalis, hortensis, flore majore simplici (♂ minore). C. B. P. 142. Consolida real, hortense; con la flor mas grande, sencilla y (menor).
Consolida regalis, flore majore ♂ *multiplici*. C. B. P. 142. Consolida real, con la flor mayor, y multiplicada.
Delphinium hortense, flore majore (minore), simplici vel multiplici. Tourn. p. 427. Delphinio hortense, con la flor mayor (menor), sencilla ó multiplicada.
Flos regius. Dod. pempt. 252. Flor regia.
Delphinium sativum. Rivini. t. 123. Delphinio que se cultiva.

Cast. Delphinio de Ajax. *vulgo*: Espuela de Caballero mayor.

Habita en Suiza entre piedras, y en Alemania cerca de Herbor. ☉

Varia con la flor plena y de varios colores.

Acco-
niti.

3. DELPHINIUM *nectariis monophyllis antice quadridentatis, capsulis solitariis, ramulis unifloris.* Delphinio con nectarios de una pieza, con quatro dientes por delante; capsulas solitarias; y ramitas de una flor.

Delphinium Orientale, annuum, flore singulari. Delphinio Oriental, annuo, con flores de una en una.
Tourn. cor. 30.

Cast. Delphinio como Aconito.

Habita en los Dardaneles. Forsk. ☉

Su *estatura* es como la del *Delphinio de sembrados* ó del *Delphinio peregrino*, con la corola á manera de la del *Aconito*. Echa el *tallo* del largo de un pie, en panoja, ramoso y con vello blanquecino: las *hojas* entre ramosas, y hendidas en muchas partes, lineares, blanquecinas; con las de arriba solamente divididas en tres partes: las *flores* terminales, solitarias, pedunculadas, pequeñas, lividas; pero por dentro de color purpúreo y verde: el *nectario exterior* tubuloso, mas largo que las demas partes de la flor, muy obtuso en su ápice y alargado por su base; de suerte que el labio anterior horizontal está colocado en medio: el *nectario interior* que abraza los estambres por medio de un lóbulo obtuso que tiene á cada lado de su base; pero por delante y mas arriba sobresale desde el exterior con quatro dientes casi iguales, señalados por su margen con una linea de color purpúreo; el extremo de éste muy obtuso, algo craso, encorvado ácia atrás, con su cuello coartado: los *quatro petalos inferiores* entre aovados y lanceolados, iguales, de color que tira á verde, pero purpúreo por sus lados: los *estambres* de la longitud de los petalos, de color tambien purpúreo: y posee un solo *germen*.

ESPECIES CON TRES CAPSULAS.

Ambi- 4. DELPHINIUM *necta-* X Delphinio con los necta-
guum. *riis monophyllis, corollis* X rios de una pieza; corolas de
hexapetalis, capsulis ternis, X seis petalos; capsulas de tres
foliis multipartitis. X en tres; y hojas divididas en
muchas partes,

Delphinium elatius, sim- X Delphinio mas levantado,
plici flore. Clus. hist. p. 206. X con la flor sencilla.

Consolida regalis, flore X Consolida real, con la flor
minore. C. B. P. 142. X mas pequeña.

Cast. Delphinio ambiguo.

Habita en Mauritania. ☉

Su estatura es como la del *Delphinio de Ajax*, pero mas blanquecino. Tiene las *ramas* apartadas en el tallo sencillo: las *corolas* cerúleas, pero verdes por defuera: el *nectario* de una pieza, hendido en dos lóbulos algo agudos; y el *espolon* las mas veces con dos dientes en su remate; y varía con una hasta tres *capsulas*.

Po- 5. DELPHINIUM *necta-* X Delphinio con los necta-
regri- *riis diphyllis, corollis en-* X rios de dos piezas; corolas
num. *neapetalis, foliis multipar-* X de nueve petalos; hojas di-
titis obtusis. Hort. Cliff. 213. X vididas en muchas partes y
obtusas.

Delphinium nectariis di- X Delphinio con los necta-
phyllis, floribus solitariis, X rios de dos piezas; flores so-
foliis multipartitis, foliolis X litarias; hojas divididas en
linearibus acuminatis. Allion X muchas partes; y hojuelas
nicen. 200. Taur. p. 71. X lineares y puntiagudas.

Consolida regalis, latifo- X Consolida real, de hoja
lia, parvo flore. C. B. P. 142. X ancha, y flor pequeña.
Prodr. 74. t. 74. Moris. hist.

3. p. 466. sect. 12. t. 4. f. 3.

Delphinium latifolium, X Delphinio con hoja ancha;
parvo flore. Tourn. p. 426. X y flor pequeña.

Cast. Delphinio peregrino.

Habita en Italia, Sicilia, Malta y Palestina: en Andalu-
cia, Extremadura, y otras partes de España. ☉

Echa

Echa el tallo sencillo, con ramas en varitas desnudas, apretadas y rígidas: las hojas parecidas á las del *Delphinio de Ajax*: las brácteas alesnadas: la corola cerúlea: y ademas de los nectarios y de los quatro petalos inferiores lleva tambien otros dos petalos laterales, casi redondos, con uñas largas, los quales se inclinan ácia los petalos inferiores echandose sobre ellos: tres capsulas y los nectarios que carecen de labios ó bordes inclinados.

Gran-
a i flo-
rum.

6. DELPHINIUM *nectariis diphyllis, labellis integris, floribus subsolitariis, foliis compositis lineari-multipartitis*. Mill. dict. n. 6. ic. t. 250. f. 1. Gmel. Sib. 4. t. 78.

Delphinio con nectarios de dos piezas, y sus pequeños labios enteros; flores casi solitarias; hojas compuestas, lineares, y divididas en muchas partes.

Delphinium Lusitanicum, glabrum, Aconiti folio. Tournef. p. 426. Rolof. hort. 61. t. 3.

Delphinio de Portugal, lampiño, con hoja como la del Aconito.

Aconitum flore cæruleo, Lusitanicum. Virid. Lusit.

Aconito de Portugal, con la flor cerúlea.

Delphinium elatius, subincanum, perenne, floribus amplis, azureis. Amm. ruth. 175. Mill. dict. t. 119.

Delphinio mas levantado, algo blanquecino, perenne, con flores anchas y de color azul.

Cast. Delphinio de flor grande.

Habita en la Siberia, Portugal y Extremadura. 24

Tiene las capsulas blanquecinas.

Ela-
tum.

7. DELPHINIUM *nectariis diphyllis, labellis bifidis apice barbatis, foliis incisis, caule recto*. Mill. dict. n. 5. ic. t. 250. f. 2.

Delphinio con los nectarios de dos piezas, y sus pequeños labios hendidos en dos partes, y barbados por su ápice; hojas cortadas y tallo recto.

Delphinium nectariis diphyllis, foliis peltatis multipartitis acutis. Hort. Cliff. 213.

Delphinio con los nectarios de dos piezas; hojas abroqueladas, divididas en muchas partes, y agudas.

Del-

Delphinium trisiliquum, foliis semiquinquelobis, acutis serratis, petiolis interioribus quaternis, barbatis. Hall. helv. n. 1201. Delphinio con tres siliquas; hojas medio hendidas en cinco lóbulos, agudamente aserradas; piecitos interiores de quatro en quatro y barbados.

Delphinium perenne, Aconiti folio ampliori, floribus cœruleis. Gmel. Sib. 4. t. 77. Delphinio perenne, con hoja como la del Aconito, mas ancha; y flores de color cerúleo.

Aconitum cœruleum, hirsutum, flore Consolidæ regalis. C. B. P. 183. Aconito cerúleo, con pelo áspero; y flor como la de la Consolida real.

Delphinium perenne, montanum, villosum, Aconiti folio. Tourn. p. 426. Delphinio perenne, montano, veloso; con hoja como la del Aconito.

Aconitum Lycoctonum, cœruleum, calcari magno. Bauh. hist. 3. p. 657. Aconito Lycoctono, cerúleo; con el espolon grande.

* *Aconitum Lycoctonum*, flore Delphini Silesiaci. Clus. hist. 2. p. 94. Aconito Lycoctono, con la flor como la del Delphinio de Silesia. α

Cast. Delphinio elevado.

Habita en Silesia, Suiza y Siberia: en los Pirineos de Cataluña y Aragon, y montes de Jaca. 2

Staphisagria.

8. DELPHINIUM nectariis tetraphyllis petalo brevioribus, foliis palmatis, lobis obtusis. Mat. Med. 138. Delphinio con nectarios de quatro piezas, mas cortos que el petalo; hojas palmeadas, y lóbulos obtusos.

Delphinium nectariis diphyllis petalo brevioribus, foliis palmatis, lobis obtusis. Hort. Cliff. 213. Delphinio con nectarios de dos piezas, mas cortos que el petalo; hojas palmeadas, y lóbulos obtusos.

Staphisagria. C. B. P. 324. Estaphisagria.

Dod. pempt. 366. Matth.

1231. Bauh. hist. 2. p. 541.

Delphinium Platani folio, *Staphisagria dictum*. Tourn. p. 428. Delphinio llamado Estaphisagria, con hoja como la del Platano.

Cast.

Cast. Delphinio Estaphisagria. vulgo: Albarrás.

Habita en Istria, Dalmacia, Calabria, Pulla, Creta y Provenza. ☉

Tiene los lóbulos de las hojas hendidos en tres partes, y el cuernecillo del nectario muy corto y obtuso.

Varía con los lóbulos de las hojas puntiagudos, y el espolon ó cuernecillo del nectario de la longitud del pieceto.

PROPIED. La semilla es amarga y nauseosa: se usa para matar los piojos y otros insectos: promueve la saliva y suaviza el dolor de las muelas.

Puni-
eum.

9. DELPHINIUM *label-
lis bipartitis pilosis, necta-
rii cornu recto, foliis mul-
tipartitis, bracteis calycinis
nullis.* Suppl. p. 267.

Delphinio con los labios
pequeños del nectario divi-
didos en dos partes, pelosos;
el cuernecillo recto; hojas
divididas en muchas partes;
y sin bracteas como caliz.

Delphinium puniceum. Pall. it. vol. 3. p. 96.

Delphinio de color de flor
de Granada.

Cast. Delphinio de color de flor de Granada.

Habita en la Siberia. Pallas. ☉

Es muy semejante al *Delphinio elevado*; pero se diferencia por el tallo, peciolo y pedunculos vellosos: por los petalos de la corola iguales; por los pequeños labios ó bordes profundamente partidos y rectos, por el cuernecillo recto, liso, y de la longitud de los piecitos; y por carecer de bractea alesnada en uno y otro lado de la base de la corola.

824. Género ACONITUM. * Tourn. p. 239. 240.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio ninguno.

COR. Petalos cinco, desiguales, opuestos por pares: el superior de figura de capacete y tubuloso, vuelto ácia adentro, y que por su dorso mira ácia arriba, obtuso, con su ápice redoblado y puntiagudo: los dos laterales anchos, casi redondos, opuestos y arrimados entre
tre

396 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

tre sí: y los dos inferiores oblongos y que miran ácia abaxo.

Nectarios dos, recogidos debaxo del petalo superior, fistulosos, inclinados, con su boca obliqua, y la cola encorvada ácia atrás, y sentados en pedunculos alesnados y largos.

Escamitas seis, cortísimas, de color, y puestas en cerco con los nectarios.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, alesnados, muy pequeños, mas anchos por su base, é inclinados ácia el petalo superior: con las *anteras* derechas y pequeñas.

PIST. *Gérmenes* tres (ó cinco) oblongos, y que rematan en *estilos* de la longitud de los estambres: con los *estigmas* sencillos y redoblados.

PERIC. *Capsulas* otras tantas, entre aovadas y alesnadas, rectas, de una ventalla, y que se abren ácia adentro.

SEM. muchas, anguladas y rugosas.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 424.

La flor es de muchos petalos, anomala ó que consta de cinco petalos desemejantes, que en algun modo representan una cabeza armada con capacete ó yelmo, ó con cucurucho. El petalo superior parece que hace las veces de capacete ó cucurucho: los dos inferiores imitan aquella parte del yelmo que defiende la mexilla inferior; pero las alas aquella parte que forma las sienes: del medio de la flor salen dos estilos en forma de pie, recogidos en el petalo superior, como igualmente el pistilo que pasa á fruto, en el qual, como en una cabezuela, se recogen las vaynas membranosas, llenas de semillas anguladas y rugosas.

ESPECIES CON TRES CAPSULAS.

Ly-
cocto-
num.

1. ACONITUM *foliis* X Aconito con hojas palmea-
palmatis multifidis villosis X das, hendidas en muchas
sis. Gmel. Sib. 4. p. 188. t. X partes, y vellosas.
81. Jacq. Austr. t. 380. X

Aco-

Aconitum foliis hirsutis, semitriobis, lobis duplicato-trifidis. Hall. helv. n. 1200. Aconito de hojas con pelo áspero, medio hendidas en tres lóbulos; y estos dos veces hendidos en tres lacinias.

Aconitum foliis peltatis, multifidis, petalo supremo cylindraceo. Hort. Cliff. 213. Aconito con hojas abroqueladas, hendidas en muchas partes; y el petalo superior cilindráceo.

Aconitum Lycoctonum, luteum. C. B. P. 183. Tourn. p. 424. Aconito Lycoctono, de flor amarilla.

Aconitum Lycoctonum, luteum, majus. Dod. pempt. 429. Aconito Lycoctono, mayor, de flor amarilla.

Aconitum folio Platani, flore luteo pallescente. Bauh. hist. 3. p. 952. Aconito con hoja como la del Platano; y flor de color amarillo-pálido.

Aconitum Lycoctonum, floribus cæruleis. Flor. dan. t. 123. R. Aconito Lycoctono, con flores cerúleas. α

Cast. Aconito Lycoctono ó sea Matalobos.

Habita en los Alpes de Laponia, Suiza, Austria é Italia: en los Pirineos, y términos de la Villa de Olot de Cataluña: en los montes de Asturias, de Burgos y otras partes de España. 2

Napel-
lus. 2. ACONITUM foliorum laciniis linearibus, superne latioribus linea exaratis. Aconito con las lacinias de las hojas lineares, por arriba mas anchas, y con una linea excavada. Act. Stock. 1739. p. 41. t. 2. Jacq. Austr. t. 381. Mat. Med. 159.

Aconitum caule simplici, spica densa, petiolis unifloris, cassidis mucrone brevi. Hall. helv. n. 1197. Aconito con el tallo sencillo; espiga densa; piececitos de una flor; y la punta del capacete corta.

Aconitum cæruleum, seu Napellus primus. C. B. P. 183. Tourn. p. 425. Aconito cerúleo, ó Napello primero.

398 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Napellus. Dod. pempt. X Napelo.

442.

Aconitum magnum, *purpureo flore*, vulgo *Napellus*. X Aconito grande, con la flor purpúrea, vulgarmente llamado Napelo.

Bauh. hist. 3. p. 655.

Napellus verus. Lob. hist. X Napelo verdadero.

387.

Cast. Aconito Napelo.

Habita en Suiza, Baviera, Francia y Alemania: en Aragon, Asturias, montes de Burgos, y Pirineos de Cataluña, junto al lugar de Setcasas. ¶

PROPIED. La yerba es acre, nauseosa, corrosiva, drástica, convulsiva y vertiginosa: se usa (pero con mucha prudencia) en las calenturas intermitentes, dolores ciaticos, artríticos, reumáticos y escirros.

Pyrenai-cum.

3. *ACONITUM foliis multipartitis, laciniis linearibus incumbentibus squarrosis*. Pall. it. 2. p. 316. X Aconito con hojas partidas en muchas lacinias lineares, puestas unas encima de otras y esparramadas.

Aconitum Pyrenaicum, luteum, foliorum segmentis sibi invicem incumbentibus. X Aconito de Pirineos, con flor amarilla; y segmentos de las hojas echados unos sobre los otros.

Rai. Europ. 367.

Cast. Aconito de Pirineos.

Habita en la Siberia, Tartaria, y en los Pirineos. ¶ Tiene el racimo cabizbaxo antes de florecer.

ESPECIES CON CINCO CAPSULAS.

An. ho-
ra.

4. *ACONITUM floribus pentagynis, foliorum laciniis linearibus*. Jacq. Austr. X Aconito con flores de cinco pistilos; y lacinias de las hojas lineares.

t. 382. Mat. Med. 389.

Aconitum foliorum laciniis linearibus distinctis, ubique ejusdem latitudinis. X Aconito con las lacinias de las hojas lineares, separadas, y de una misma latitud en todas partes.

Hort. Cliff. 214.

Aconitum salutarium, X Aconito salutaris, ó An-
seu anthora. C. B. P. 184. thora.

Tourn. p. 425.

Anthora seu Antithora.

Anthora ó Antithora.

Cam. epit. 837. Riv. t. 126.

Mill. ic. t. 12.

Antithora flore luteo, Aco-

niti. Bauh. hist. 3. p. 660.

Antithora con la flor ama-
 rilla y como la del Aconito.

Cast. Aconito anthora.

Habita en los Pirineos de Suiza y de Saboya : en los de
 Cataluña cerca de Setcasas y de Puigcerdá ; en los mon-
 tes de Asturias , Burgos y otras partes de España. ¶

PROPIED. La raíz es amarga , acre y venenosa , purgante
 y antelmintica : y se usa en las calenturas exantemá-
 ticas ; pero con prudencia.

Varie-
 gatum. 5. ACONITUM floribus
pentagynis , foliorum laci-
niis semipartitis superne la-
tioribus.

Aconito con las flores de
 cinco pistilos ; lacinijs de las
 hojas medio partidas y mas
 anchas por arriba.

Aconitum foliis multifi-
dis , laciniis semipartitis
superne latis. Hort. Cliff.
 214.

Aconito con hojas hendi-
 das en muchas lacinijs me-
 dio partidas , y anchas por
 arriba.

Aconitum cæruleum , mi-
nus , sive Napellus minor.
 C. B. P. 183. Tourn. p. 245.

Aconito cerúleo , menor, ó
 Napelo menor.

Aconitum Lycoctonum ,
flore cæruleo , galea elatiori ,
radice bulbosa. Bauh. hist. 3.
 p. 659.

Aconito Lycoctono , con
 la flor cerúlea ; capacete mas
 elevado ; y raíz bulbosa.

Aconitum cæruleum , par-
vum. Dod. pempt. 441. Da-
 lech. hist. 1743.

Aconito cerúleo , pequeño.

Cast. Aconito de varios colores.

Habita en los montes de Italia y Bohemia : en el lugar
 de San Martin de Pimpollar : en los prados del Bajorno
 y en otras partes de España. ¶

- Cam-
marum 6. ACONITUM floribus X Aconito con flores casi de
subpentagynis, foliorum la- X cinco pistilos; lacinijs de las
ciniis cuneiformibus incisís X hojas en forma de cuña, cor-
acutis. Mill. dict. n. 9. X tadas y agudas.
- Aconitum caule ramoso, X Aconito con el tallo ramo-
paniculato, petiolis multi- X so, en panoja; piececitos de
floris, Cassidis mucrone lon- X muchas flores; y la punta
go. Hall. helv. n. 1198. X del capacete larga.
- Aconitum violaceum, seu X Aconito ó Napelo segun-
Napellus secundus. C. B. P. X do, con la flor de color de
183. Tourn. p. 425. X violeta.
- Aconitum Napello simi- X Aconito mas temprano, se-
le, sed minus cœruleum, pre- X mejante al Napelo; pero con
cocius. Bauh. hist. 3. p. 656. X flor de color menos cerúleo.
- Aconitum Lycoctonum, X Aconito Lycoctono del
Tauricum. Clus. hist. 2. p. 95. X monte Tauro.
- Aconitum purpureum, seu X Aconito ó Napelo tercero,
Napellus tertius. C. B. P. X con la flor purpúrea. α
183. Tourn. p. 425.
- Aconitum Lycoctonum X Aconito Lycoctono quinqu-
V. Neuvergensense. Clus. hist. X to, de Neuvergia.
2. p. 96.
- Aconitum cœruleo-purpu- X Aconito ó Napelo quarto,
reum, flore maximo, seu Na- X con la flor muy grande, y
pellus quartus. C. B. P. 183. X de color entre cerúleo y pur-
Tourn. p. 425. X púreo. β
- Aconitum Lycoctonum IX. X Aconito Lycoctono nono,
Judenvergensense. Clus. hist. 2. X Judenvergensense.
p. 97.

Cast. Aconito Cammaro.

Habita en Siria y monte Tauro: en los Pirineos de Cata-
luña, montes de Asturias, Burgos y otras partes de Es-
paña. 4

- Unci-
natum. 7. ACONITUM floribus X Aconito con flores casi de
subpentagynis, foliis mul- X cinco pistilos; hojas hendidas
tilobis, corollarum galea X en muchos lóbulos; y el ca-
longius extensa. X pacete de las corolas mas
X alargado.

Cast. Aconito ganchoso.

Ha-

Habita en Filadelfia. 2

Tiene las *hojas* hendidas en tres ó cinco lóbulos, desnudas, con ángulos y dientes: las *flores* cerúleas, de una en una, con el remate del capacete ganchozo, y extendido mucho mas que la misma uña del capacete.

ORDEN IV.

TETRAOYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON QUATRO PISTILOS.

825. Género TETRACERA. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de seis hojuelas, casi redondas, persistentes, extendidas, alternadamente mas afuera y mas cortas.

COR. ninguna (*Duda Linneo haberla visto*).

ESTAMB. *Filamentos* numerosos, sencillos, de la longitud del caliz y persistentes: con las *anteras* sencillas.

PIST. *Gérmenes* quatro, aovados, y que se apartan de entre sí: *estilos* alesnados y cortísimos: con los *estigmas* obtusos.

PERIC. *Capsulas* quatro, aovadas, redobladas, de una celdilla, de una ventalla, y que se abren por la sutura superior.

SEM. solitarias, casi redondas y envueltas.

ESPECIE.

Volu-
bilis.

1. TETRACERA. Hort. X Tetracera voluble.

Cliff. 214.

Petrea floribus spicatis, X *Petrea* con flores espiga-
scabris Laurifoliis. Amm. X das; hojas como las del Lau-
herb. 581. X rel, y ásperas.

Tetracera foliis amplis, X *Tetracera* con hojas an-
serratis, obovatis cum acu- X chas, aserradas, aovadas al
mine, capsulis bigeminis. X revés, con puntita; y capsu-
Brown. jam. 255. X las dos veces mellizas.

Cast. Tetracera voluble.

Habita en la America Meridional. †

TOM. IV.

Cc

Gé-

826. Género CARYOCAR. *Aut. D. Allamand.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de color, partido en cinco lacinias obtusas, cóncavas y que se caen quando las demas partes de la flor.

COR. *Petalos* cinco, ovales, cóncavos y grandes.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos, filiformes: con las *anteras* oblongas.

PIST. *Germen* globoso; *estilos* quatro, algunas veces menos: con los *estigmas* obtusos.

PERIC. *Drupa* carnosa, esférica y muy grande.

SEM. *Nueces* quatro, ó de una hasta quatro, ovales, de tres caras, con surcos en redecilla, y anguladas; con una *sutura* por una parte.

ESPECIE.

Nucci-
ferum.

I. CARYOCAR.



Caryocar.

Cast. Caryocar que lleva nueces.

Habita en las riberas del rio Berbice de America. $\frac{f}{n}$

Tiene el *caliz* y *corola* de color purpúreo: la *drupa* de la magnitud de una cabeza: las *nueces* comestibles, y del sabor de la *Almendra comun.* *Allamand.*

827. Género CIMICIFUGA.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de cinco hojuelas casi redondas, cóncavas, y que se caen al abrirse la flor.

COR. *Nectarios* quatro, en forma de petalos, de figura de jarrito, y cartilagosos.

ESTAMB. *Filamentos* veinte, filiformes: con las *anteras* mellizas.

PIST. *Gérmenes* de quatro hasta siete: *estilos* encorvados acia atrás: con los *estigmas* puestos á lo largo del estilo.

PE-

PERIC. *Capsulas* oblongas, y que se abren por una sutura lateral.

SEM. muchas, y cubiertas con escamas extendidas.

OBS. Varía sumamente en el número de las partes de la flor, tanto que ni el sexô, ni la proporcion son constantes.

E S P E C I E.

I. CIMICIFUGA.

Fœtid.
da.

Actæa (*Cimicifuga*) *racemis paniculatis, fructibus quadricapsularibus*. Sp. pl. 2. p. 722. Amœn. Acad. 2. p. 54. Amœn. Acad. 7. t. 6. f. 2. Gmel. Sib. 4. p. 181. t. 70.

X Cimicifuga ó sea planta que ahuyenta las Chinchas.
X *Actæa* (*que ahuyenta las Chinchas*) con racimos en panoja; y frutos de quatro capsulas.

Thalictroides fœtidissimum, Christophorianaë facie. Amm. ruth. 102.

X Planta como Thaliçtro, muy fetida, y con traza de Christophoriana.

Cast. Planta fétida que ahuyenta las Chinchas.

Habita en la Siberia. ♀

Es muy semejante á la *Actæa racimosa*.

PROPIED. La yerba es amarga, anodina y repelente: se usa en las enfermedades de nervios y lamparones.

ORDEN V.

PENTAGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON CINCO PISTILOS.

828. Género AQUILEGIA. * *Tourn. t. 242.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. ninguno.

COR. *Petalos* cinco, entre lanceolados y aovados, planos, extendidos é iguales.

Nectarios cinco, iguales, y alternados con los *petalos*: con su *cuernecillo* cada uno, mas ancho gradualmente por arriba, obliquo por su boca, ascendente ácia afuera, pegado por dentro en el receptáculo, y exten-

tendido por debaxo en un tubo largo, adelgazado, y en su remate obtuso.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, treinta hasta quarenta, alesnados y los exteriores mas cortos: con las *anteras* oblongas, derechas, y de la altura de los nectarios.

PIST. *Gérmenes* cinco, entre aovados y oblongos: que rematan en *estilos* alesnados, y mas largos que los estambres: con los *estigmas* derechos y sencillos.

Pajas diez, rugosas, cortas, que envuelven y separan los gérmenes.

PERIC. *Capsulas* cinco, separadas, cilindríceas, paralelas, rectas, puntiagudas, de una ventalla y que desde su remate se abren ácia adentro.

SEM. muchas, aovadas, aquilladas, y prendidas á la sutura que se abre.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 428.

La flor es de muchos petalos, anomala ó sea de muchos petalos desemejantes, de los quales algunos se hallan planos, y los demas en forma de cucurucho, colocados alternadamente: de cuyo centro sale el pistilo acompañado de estambres y que pasa á fruto, en el qual como en una cabezuela se recogen las vaynas membranosas, llenas de semillas aovadas y planas.

E S P E C I E S.

- vis- 1. AQUILEGIA *nectariis* X Aquilegia con los nectarios encorvados; tallo casi
cosa. *incurvis, caule subnudo sub-* X desnudo, con pelo viscoso,
unifloro viscoso-piloso, fo- X de una ó dos flores; y ho-
liis subtrilobis. X jas hendidas en tres ó quatro
X lóbulos.
- Aquilegia caule subnudo* X Aquilegia con el tallo casi
subunifloro, foliis ternatis, X desnudo, de una ó dos flo-
foliolis petiolatis sub- X res; hojas de tres en rama;
trilobis. Gov. illustr. 33. t. X y hojuelas pecioladas, hendi-
19. X das en tres ó quatro lóbulos.

Aqui-

Aquilegia montana, flore parvo, Thalictri folio. C. B. P. 144. Prodr. 75. Bauh. hist. 3. p. 484. Dalech. in Act. helv. 8. p. 146. t. 5. X
X *Aquilegia montana*, con la flor pequeña; y hoja como la del Thalicstro.

Aquilegia viscosa. Magn. monsp. 24. Hort. 21. X
X *Aquilegia viscosa*.

Aquilegia hirsuta, flore viscoso. Tourn. p. 428. X
X *Aquilegia* con pelo áspero; y flor viscosa.

Cast. *Aquilegia viscosa*.

Habita en Mompeller.

Es planta pequeña, y toda cubierta de pelos glandulosos. Tiene las *hojas radicales* partidas en tres lacinias, hendidas en tres lóbulos, una ó dos de tres en rama en el tallo, con sus hojuelas lanceoladas. Es variedad de la vulgar?

Vulgaris. 2. *AQUILEGIA nectariis incurvis.* Flor. dan. t. 695. Mat. Med. 160. X
X *Aquilegia* con nectarios encorvados.

Aquilegia foliis trilobatis, lobis petiolatis, tripartitis, subrotundis, obtuse dentatis. Hall. helv. n. 1195. X
X *Aquilegia* con hojas de tres lóbulos peciolados, partidos en otros tres, casi redondos, y con dientes obtusos.

Aquilegia sylvestris. C. B. P. 144. Tourn. p. 428. X
X *Aquilegia* silvestre.

Aquilegia. Dod. pempt. 181. X
X *Aquilegia*.

α *Aquilegia hortensis, simplex.* C. B. P. 144. Tournef. p. 428. X
X *Aquilegia hortense*, con la flor sencilla. α

Cast. *Aquilegia vulgar. vulgo*: Aguiluña ó Manto Real.

Habita en los bosques peñascosos de Europa: en las dos Castillas, Cataluña, Aragon, y otras muchas partes de España. 2℥

Varia con la *flor* multiplicada y de varios colores. Se halla en Siberia una variedad de *Aquilegia* constante y baxa; con la *flor* cerúlea, y las orillas de sus nectarios blancas. La *Aquilegia viscosa* de Mompeller producida de las semillas que Govan remitió á Linneo en nada se dife-

ferenciaba de la *Aquilegia vulgar*. *Syst. veg.* p. 420.
 PROPIED. Toda la planta es expelente, exantemática, y se
 usa en la ictericia, en el parto difícil y sarna.

- Alpina 3. *AQUILEGIA nectariis* X *Aquilegia* con los nectarios rectos, y mas cortos que el petalo lanceolado.
rectis petalo lanceolato brevioribus. Gmel. Sib. 4. p. 185.
Aquilegia foliis trilobatis, lobis tripartitis, linearibus, caule pauciflora. Hall. helv. n. 1196. *Aquilegia* con hojas hendidas en tres lóbulos partidos en otros tres, lineares; y tallo de pocas flores.
Aquilegia montana, magno flore. C. B. P. 104. Prodr. 75. Bauh. hist. 3. p. 484. *Aquilegia montana*, con lá flor grande.
 Tourn. p. 428.

Cast. *Aquilegia alpina*.

Habita en Suiza. ♂

Tiene las *hojas* dos veces de tres en rama, pequeñas: con las *hojuelas* hendidas en muchos lóbulos casi lineares y obtusos: los *cuernecillos del nectario* algo rectos, y la mitad mas cortos que los *petalos*, los cuales son lanceolados y larguissimos.

- Canadensis, 4. *AQUILEGIA nectariis* X *Aquilegia* con los nectarios rectos; y los estambres mas largos que la corola.
rectis, staminibus corolla longioribus. Mill. dict. n. 3. & ic. t. 47.
Aquilegia corolla simplici, nectariis fere rectis. Gron. virg. 59. *Aquilegia* con la corola sencilla; y los nectarios casi rectos.
Aquilegia pumila, præcox, Canadensis, Cor. Canad. 60. t. 60. *Aquilegia* muy pequeña, temprana, del Canadá.
Aquilegia præcox, Canadensis, flore externe rubicundo, medio luteo. Moris. hist. 3. p. 457. sect. 12. t. 2. f. 4. *Aquilegia* temprana, del Canadá, con la flor rubicunda por defuera, y en medio amarilla.

Cast. *Aquilegia* del Canadá.

Habita en la Virginia, Canadá y Dauria. *Pall. it.* 3. p. 230. ¶

829. Género NIGELLA. * *Tourn. t. 134.*

CAR. GEN. NAT.

- CAL. ninguno. (*sin que lo sean las hojas florales que se hallan en algunas especies.*)
- COR. Petalos cinco , aovados , planos , obtusos , extendidos , y mas encogidos por su base.
Nectarios ocho, puestos en cerco, y cortísimos, hendido cada uno en dos labios: el *labio exterior* mayor, colocado mas abaxo, hendido en dos partes, plano, convexo, y señalado con dos puntos: el *interior* mas corto, mas angosto, y que de aovado remata en una línea.
- ESTAMB. *Filamentos* numerosos, alesnados, y mas cortos que los petalos: con las *anteras* comprimidas, obtusas y derechas.
- PIST. *Gérmenes* algunos (*cinco hasta diez*) oblongos, convexos, comprimidos, derechos; y que terminan en *estilos* alesnados, angulados, larguísimos, pero revueltos y persistentes: con los *estigmas* pegados longitudinalmente.
- PERIC. *Capsulas* otras tantas, oblongas, comprimidas, puntiagudas, unidas ácia adentro por medio de una sutura, y que se abren por arriba tambien ácia dentro.
- SEM. muchas, anguladas y ásperas.
- OBS. La *Nigela Oriental* lleva diez pistilos rectos, mas largos que la corola; y las semillas ribeteadas con una membrana.
- La *Nigela de España* tiene tambien diez pistilos, pero iguales á la corola. R.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 258.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco, y adornada de una corola colocada entre los petalos y los estambres, compuesta de unos cuerpecitos en forma de cuernecillos. Del centro de la flor sale el pistilo que pasa á fruto membranoso, casi redondo ú oblongo, con muchos cuernecitos por arriba, de muchas capsulas, y lleno de semillas.

ESPECIES CON CINCO PISTILOS.

- Da-
masce-
na. 1. *NIGELLA floribus in-
volucro folioso cinctis*. Mill. dict. n. 2. t. 186. & ic. t. 187. f. 2. X Nigela de flores ceñidas con el involucro folioso.
- Nigella angustifolia, flore majore, simplici, cæruleo*. C. B. P. 145. Tourn. p. 258. X Nigela con hoja angostas; flor mayor, sencilla, y de color cerúleo.
- Melanthium Damascenum*. Dod. pempt. 304. X Melanthio Damasceno.
- Melanthium sylvestre*. Matth. 529. X Melanthio silvestre.
- α *Nigella flore majore, pleno, cæruleo*. C. B. P. 145. Tourn. p. 258. Knorr. del. 1. t. S. 21. X Nigela con la flor mayor, plena, y de color cerúleo. α

Cast. *Nigela Damascena*. vulgo: Arañuela.

Habita entre los sembrados de la Europa Austral: en Aragon, Cataluña, y otras muchas partes de España. ☉ El involucro acercado á la flor es de cinco hojuelas y mas largas que ella; y la corola las mas veces se halla multiplicada.

- Sativa. 2. *NIGELLA pistillis quinis, capsulis muricatis subrotundis, foliis subpilosiss*. Mill. dict. n. 3. & ic. t. 187. f. 1. X Nigela con pistilos de cinco en cinco; capsulas casi redondas con puntitas; y hojas algo pelosas.
- Nigella flore minore, simplici, candido*. C. B. P. 145. Tourn. p. 258. X Nigela con la flor mas pequeña, sencilla y cándida.
- Melanthium*. Dod. pempt. 303. X Melanthio.
- Melanthium sativum*. Camm. epit. 551. X Melanthio sativo.
- Nigella flore minore, pleno & albo*. C. B. P. 146. Tourn. p. 258. X Nigela con la flor mas pequeña, plena y blanca.

Cast.

Cast. *Nigella sativa*.

Habita en Alemania , Egipto y Creta. ☉

Ar-
ensis.

3. *NIGELLA pistillis quinis , petalis integris , capsulis turbinatis* . Scop. *Nigella con pistilos de cinco en cinco ; petalos enteros ; y capsulas de figura cónica al revés.* carn. 2. n. 657.

Nigella flore foliis nudo , pistillis corollam æquantibus . Roy. Lugdb. 481. *Nigella con la flor desnuda de hojas ó sea sin involucro ; y pistilos que igualan á la corola.*

Nigella flore nudo , siliquarum cornubus longissimis . Hall. helv. n. 1194. *Nigella con la flor desnuda ó sea sin involucros ; y cuernecillos de las siliquas larguissimos.*

Nigella arvensis , cornuta . C. B. P. 145. Tourn. p. 258. *Nigella arvense , con cuernecitos.*

Melanthium sylvestre . Dod. pempt. 303. *Melanthio sylvestre.*

Cast. *Nigella arvensis* . *vulgo* : Ajenuz , Neguilla.

Habita entre los sembrados de Alemania , Francia é Italia : en Aragon , Cataluña , Alcarria , y otras muchas partes de España. ☉

La *capsula* de esta especie es mas angosta por debaxo , y la de la precedente mas ventricosa , y en una y otra lo contrario por arriba. Varía con seis ó siete *pistilos*.

ESPECIES CON DIEZ PISTILOS.

Hispa-
nica.

4. *NIGELLA pistillis de- nis corollam æquantibus* . Sauv. monsp. 253. *Nigella con pistilos de diez en diez , é iguales á la corola.*

Nigella latifolia , flore majore , simplici , cæruleo . C. B. P. 145. Prodr. 75. Moris. hist. 3. p. 516. sect. 12. t. 18. f. 8. Tourn. p. 258. *Nigella con hoja ancha ; flor mas grande , sencilla , y de color cerúleo.*

Cast. *Nigella* de España.

Habita en España y Mompeller. ☉

410 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Orien-
talis.

5. NIGELLA *pistillis de-* X Nigela con pistilos de diez
nis corolla longioribus. Hort. X en diez , y mas largos que la
Cliff. 215. X corola.
- Nigella Chalepensis, lu-* X Nigela de Alepo , con flor
tea, corniculis longioribus. X amarilla , y cuernecitos mas
Moris. hist. 3. p. 516. sect. X largos.
12. t. 18. f. 10. Rai. app. X
525. X

Cast. Nigela Oriental.

Habita cerca de Alepo. ☉

830. Género REAUMURIA. *Hasselquist.*

CAR. GEN. NAT.

- CAL. *Periantio* de cinco hojuelas alesnadas , apartadas ,
puntiagudas , persistentes , y con otras mas pequeñas
apñadas.
- COR. *Petalos* cinco , oblongos , iguales , sin uñas , apenas
mayores que el caliz y encorvados ácia atrás por su
ápice.
- Neñarios* cinco , en las junturas de los petalos ; formados
de una laminita medio lanceolada , pegada al lado
inferior de los petalos , y opuesta á una de las má-
genes pestañosas.
- ESTAMB. *Filamentos* numerosos , de la longitud del caliz :
con las *anteras* casi redondas.
- PIST. *Germen* algo redondo : *estilos* cinco , filiformes , rec-
tos , acercados , del largo de los estambres : con los
estigmas sencillos.
- PERIC. *Capsula* aovada , de cinco celdillas y cinco ventan-
llas.
- SEM. numerosas , oblongas y lanudas por una y otra parte
con la lana levantada.
- Periantio* persistente , de cinco hojuelas , con otras mas
pequeñas por su base : *corola* dos veces mayor : *esti-*
los cinco , cortos : y *capsula* de una celdilla. *Wern.*

ESPECIE.

I. REAUMURIA.

Reaumuria. Forsk. Flor. Ægypt. cent. 4. p. 101.

Sedum Siculum, vermiculatum, flore Saxifragæ albæ, semine villosa. Bocc. Sic. t. 6. f. 7.

Sedum minus, arborescens, vermiculatum. Lob. ic. 380.

Sedum minus, fruticosum. C. B. P. 284.

Kali vermiculatum, albo & *amplo Sedi rosei flore*. Barr. ic. 888.

Kali Arabicum, primum genus. Rauw. it. 37. t. 37. C. B. P. 289.

Reaumuria.
Reaumuria.

Sedo de Sicilia, con hojas como gusanillos; flor como la de la Saxifragia blanca; y semilla vellosa.

Sedo menor, arborescente; con hojas como gusanillos.

Sedo menor, fruticoso.

Kali con hojas como gusanos; flor como la del Sedo roseo, blanca y ancha.

Kali de Arabia, primer género.

Cast. Reaumuria con hojas como gusanillos.

Habita en las playas del mar de Egipto, Siria y Sicilia.

D. Roque. ☉

Produce las *hojas* esparcidas, lineares, carnosas, conve-xâs por debaxo, agudas, sentadas, extendidas y salpicadas de puntitos como gotas de rocío: las *flores* terminales, sentadas entre las hojas, y mayores ácia el remate: con las *corolas* blancas; constituyendo su *nectario* una lámina pestañosa, pégada en una y otra parte de los lados de los petalos: y *tiene* el *germen* dentro de la flor.

831. Género BRATHYS. *Mutis. Suppl. p. 43.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de cinco hojuelas, lanceoladas, agudas y persistentes.

COR. *Petalos* cinco, lanceolados, y al doble mas largos que el caliz.

Es-

412 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

ESTAMB. *Filamentos* muchos (*mas de veinte*) capilares, y del largo del caliz: con las *anteras* mellizas.

PIST. *Germen* dentro de la flor, aovado: *estilos* cinco, abiertos y filiformes: con los *estigmas* en cabezuela.

PERIC. *Capsula* aovada, con cinco convexidades, y de una celdilla.

SEM. muchas y casi redondas.

ESPECIE.

Juni-
perina.

1. BRATHYS. Suppl. 268. \times Brathys.

Cast. Brathys como Enebro.

Habita en la Nueva Granada. Mutis. \times

Es *arbusto* con traza media entre el Brezo y Enebro, muy ramoso y derecho; con las *ramas* cubiertas de hojas.

Echa las *hojas* opuestas, muy amontonadas, lineares y rígidas, agudas, sin que punzen, del largo de una pulgada y perennes: las *flores* que terminan las ramas y algunas juntas y sentadas.

ORDEN VI.

HEXAGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON SEIS PISTILOS.

832. Género STRATIOTES. * Aloides.

Boerb. Lugdb. 2. p. 172.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Espata* de dos piezas, arrimadas entre sí, compresas, obtusa, aquillada por una y otra parte, persistente, y con una flor.

Periantio de una pieza, dividido en tres partes, derecho, y que se cae quando las demas partes de la flor.

COR. *Petalos* tres, de figura de corazon al revés, entre derechos y extendidos, y al doble mayores que el caliz.

ESTAMB. *Filamentos* veinte, de la longitud del periantio, insertos en el receptácula: con las *anteras* sencillas.

PIST. *Germen* debaxo de la flor: *estilos* seis, divididos en dos

dos partes , del largo de los estambres : con los *estigmas* sencillos.

PERIC. *Capsula* cubierta , oval , adelgazada por una y otra parte , de seis caras y seis celdillas.

SEM. muchas , oblongas , encorvadas y casi aladas.

ESPECIES.

Aloi-
es. 1. STRATIOTES *foliis* Estratiote con hojas entre
ensiformi-triangularis ciliato- de figura de espada y trian-
aculeatis. Fl. dan. t. 337. gulares; y agujones pestaño-
sos.

Aloides. Boerh. Lugdb. 2. Planta como Aloe.
p. 132.

Aloe palustris. C. B. P. Aloe palustre.
236.

Cast. Estratiote como Aloe.

Habita en aguas limpias y poco corrientes de la Europa Septentrional. ¶

Vió *Linneo* que todas las *flores* de esta especie eran hermafroditas ; pero *Bergen*, *Zinnio* y *Fabricio* observaron en Alemania *flores* masculinas y femeninas en distintos pies : á *Linneo* envió tambien una *flor* masculina *Screber* quien en la hermafrodita observó las *anteras* estériles.

Alis-
moides 2. STRATIOTES *foliis* Estratiote con hojas de fi-
cordatis. Flor. Zeyl. 223. gura de corazon.
Forsk. Ægypt. cent. 4. p.
101.
Ottel-ambel. Rheed. Ma- Ottel-ambel,
lab. 11. p. 95. t. 46.

Cast. Estratiote como Alisma.

Habita en la India. ¶

Tiene la *espata* de una pieza , con cinco ángulos membranosos y longitudinales. No pudo *Linneo* exâminar la *flor* , por no tener mas que un exemplar de ella.

Forskæhl observó en esta planta seis *estambres* solamente , y seis *estilos* hendidos en dos partes. R.

Acoro-
ides. 3. STRATIOTES *foliis* } Estratiote de hojas en for-
ensiformibus planis glaber- } ma de espada, planas, muy
rimis, spatha apice barba- } lampiñas; y la espata con
ta. Suppl. p. 268. } pelos en su remate.
Acorus marinus. Rumph. } Acoro marino.
 Amb. vol. 6. p. 191. t. 75. }
 f. 2. }

Cast. Estratiote como Acoro.

Habita entre las Islas de Zeylan. Koenig.

Écha la raiz rastrera, algo ramosa y articulada como la del *Acoro*: las *hojas* arraygadas, amontonadas, lineares, planas, riveteadas, redondas en su ápice, enterisimas, algo aserradas ácia su remate, un poco correosas, del largo de quatro pies, con la margen elevada, obtusa y muy lampiña: las *vaynas* membranosas, muy tier-nas, pegadas á las hojas: el *escapo* entre las hojas, muy sencilló, solitario, derecho, filiforme, grueso ácia la flor, lampiño, desnudo, de tres ó quatro pies de lar-go y con una flor: la *espata* linear, comprimida, de color entre obscuro y verde, y de dos hojuelas ó piezas membranosas, plegadas, obtusas, con su quilla ácia el remate adornada de fibras delgadas: la *flor* en cima del germen: el *periantio* de tres hojuelas mas cor-tas que la corola, cóncavas, membranosas, de color verde obscuro, y salpicadas con puntitos de color de sangre: tres *petalos* lineares, agudos, ondeados con pliegues transversales, marchitos, blancos, teñidos de roxo, señaladamente en sus ápices: apenas ningun *fila-mento*: doce *anteras* lineares, puntiagudas, comprimi-das, alternativamente mas cortas, señaladas por defue-rra con puntitos de color de sangre, verdes en el lado interior y con pelo áspero: el *germen* baxo de la flor, linear, comprimido, con escamas apifiadas por todas partes, hendidas en flecos; verde y por su base de color amarillo-roxo: la *drupe* aovada, comprimida, cubierta de fibras, de la magnitud de un huevo de gallina, con quatro ó seis celdillas, y catorce ó mas simientes.

ORDEN VII.

POLYGYNIA. DE LAS MISMAS FLORES CON MAS DE SEIS PISTILOS.

833. Género DILLENIA. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de cinco hojuelas, casi redondas, cóncavas, correasas, grandes y persistentes.

COR. *Petalos* cinco, casi redondos, cóncavos, algo correasos y grandes.

ESTAMB. *Filamentos* numerosisimos, y que forman como un globo: con las *anteras* oblongas y derechas.

PIST. *Gérmenes* veinte (*poco mas ó menos*), entre aovados y oblongos, puntiagudos, comprimidos y por la parte de adentro unidos: *estilos* ninguno: *estigmas* lanceolados, planos ácia fuera, grandes, persistentes y que juntos forman una estrella.

PERIC. casi redondo, cubierto por defuera con otras tantas *capsulas* oblongas, longitudinales, divididas por medio de un surco: con un *receptáculo* ácia dentro, columnar, muy grande y pulposo.

SEM. numerosas, muy pequeñas y anidadas baxo de las capsulas.

E S P E C I E.

Indica.	1. DILLENIA. Hort. Cliff.	X	Dillenia.
	221.		
	<i>Songium.</i> Rumph. Amb.	X	Songio.
	2. p. 14. t. 45.		
	<i>Syalita.</i> Rheed. Malab. 3.	X	Syalita.
	p. 39. t. 38. 39. Rai. hist.	X	
	1707.		
	<i>Malva rosea Malabarica,</i>	X	Malva rosea de Malabár,
	<i>Syalita dicta.</i> Pluk. mant.	X	llamada Syalita.
	124. Burm. ind. 124.		
	<i>Cast.</i> Dillenia Indica.		
	<i>Habita</i> en Malabár. <i>h</i>		

416 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Acaso es de este mismo género el *Sangio*. Rumph. Amb.
2. p. 46?

834. Género ILLICIUM. Ellis. Act. Angl. 1770.

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de seis hojuelas; las tres inferiores ovales y las tres superiores alternativamente más angostas, como si fuesen pétalos, y que se caen quando las demás partes de la flor.
- COR.** *Petalos* veinte y siete, dispuestos en tres cercos; los nueve inferiores obtusos y cóncavos, los nueve del medio más cortos y más angostos, y los nueve de más adentro aun más cortos y más angostos.
- ESTAMB.** *Filamentos* muchos (treinta), cortos y deprimidos: con las *anteras* derechas, oblongas, obtusas y escotadas.
- PIST.** *Gérmenes* muchos (veinte), dispuestos en cerco, que rematan en *estilos* cortísimos y extendidos: con los *estigmas* en el lado más alto del estilo y oblongos.
- PERIC.** *Capsulas* muchas, aovadas, comprimidas, duras, extendidas en cerco y de dos ventallas.
- SEM.** solitarias, aovadas, algo comprimidas y lustrosas.

E S P E C I E S.

- Ani-
satum. 1. ILLICIUM *floribus* Ilicio con flores de color
flavescentibus. Mat. Med. amarillo-roxo.
161.
Somo, vulgo Skimmi.
Kœmpf. Amœn. 88o. t. 881. *Somo, vulgo Skimmi.*

Cast. Ilicio anisado. *Farm.* Anisum stellatum.

Habita en la Tartaria, Japon, China y Filipinas. $\frac{f}{2}$

PROPIED. El fruto es aromático, algo dulce y de sabor de anis: estomático, carminativo, diurético, pectoral; y se usa en el cálculo y en la tos.

- Flori-
danum 2. ILLICIUM *floribus ru-* Ilicio con flores encarna-
bris. Ellis. act. Angl. 1770. *das.*
vol. 6. p. 524. t. 12.

Cast.

Cast. Ilicio de la Florida.

Habita.

Tiene las flores encarnadas, y los frutos muy olorosos.

835. Género LIRIODENDRON. * Tulipifera.

Catesb. 48.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Involucro* propio, de dos hojuelas, con tres ángulos, planas, y que se caen quando las demas partes de la flor.

Periantio de tres hojuelas, oblongas, cóncavas, extendidas, en forma de petalos y que se caen quando las demas partes de la flor.

COR. *Petalos* seis, puestos en forma de campana, de hechura de espatula, obtusos, acanalados por su base y los tres exteriores que se caen facilmente.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos, mas cortos que la corola, lineares, é insertos en el receptáculo de la fructificacion: con las *anteras* tambien lineares, pegadas longitudinalmente á los lados del filamento.

PIST. *Gérmenes* numerosos, puestos en figura de cono: *estilo* ninguno: *estigma* globoso en cada germen.

PERIC. en forma de pifia.

SEM. numerosas, terminadas en una escama lanceolada, y que arrojan un ángulo agudo junto á la base de la escama en el lado interior, comprimidas por su base y agudas.

ESPECIES.

- Tulipifera. 1. LIRIODENDRON fo-
liis lobatis. Hort. Cliff. 223. } Liriodendro con hojas di-
Trew. ehret. t. 10. } vididas en lóbulos.
Tulipifera arbor Virgi-
niana. Herm. Lugdb. 612. } Arbol de la Virginia, que
t. 613. } lleva flores como Tulipas.

418 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

- Tulipifera Virginiana*, X Arbol de la Virginia, que
tripartito Aceris folio, me- lleva flores como Tulipas,
dia lacinia velut abscissa. X con hoja como la del Arce,
 Pluk. Alm. 379. t. 117. f. 5. X partida en tres lacinias, y la
 & t. 248. f. 7. Catesb. car. 1. X del medio como si fuese cor-
 p. 43. t. 48. Rai. hist. 1798. X tada al través.
 Duham. arb. tom. 2. t. 102. X
- α *Tulipifera Caroliniana*, X Arbol de la Carolina, que
foliis productioribus, magis lleva flores como Tulipas,
angulosis. Pluk. Alm. 379. X con hojas mas extendidas y
 t. 68. f. 3. X mas angulosas. α

Cast. Liriodendro que lleva Tulipas.
 Habita en la America Septentrional. h

- Lilli- 2. LIRIODENDRON fo- X Liriodendro con hojas lance-
 fera. *liis lanceolatis.* Burm. ind. X ceoladas.
 124. X
Sampacca montana. X Sampacca montana.
 Rumph. Amb. 2. p. 204. t. X
 69. X

Cast. Liriodendro que lleva Azucenas.
 Habita en Amboina. h

836. Género MAGNOLIA. † Plum. 7. Dill. elth. 168.

CAR. GEN. NAT.

- CAL. *Periantio* de tres hojuelas, aovadas, cóncavas, en forma de petalos y que se caen quando las demas partes de la flor.
- COR. *Petalos* nueve, oblongos, cóncavos, obtusos y mas angostos por su base.
- ESTAMB. *Filamentos* numerosos, cortos, puntiagudos, comprimidos, é insertos en el receptáculo comun de los pistilos baxo de los gérmenes: con las *anteras* lineares, y pegadas en embas partes de las márgenes de los filamentos.
- PIST. *Gérmenes* numerosos, entre aovados y oblongos, que cubren al receptáculo que es á manera de maza: *estilos* encorvados ácia atrás, torcidos y muy cortos: con

INSER. EN EL REC. CON MAS DE VI. PIST. 419

con los *estigmas* vellosos y puestos á lo largo del estilo.

PERIC. *Cono* aovado, cubierto de *capsulas* comprimidas, casi redondas, algo apañadas, amontonadas, agudas, de una celdilla, de dos ventallas, sentadas, que se abren ácia fuera y persistentes.

SEM. solitarias, algo redondas, reducidas á baya, y que por medio de un hilo cuelgan del seno de cada escama del cono.

ESPECIES.

- Gran-
diflora.
1. **MAGNOLIA** *foliis lanceolatis perennantibus.* Magnolia con hojas lanceoladas y perennes.
Magnolia foliis lanceolatis, persistentibus, caule erecto arboreo. Mill. dict. n. Magnolia con hojas lanceoladas, persistentes; tallo derecho y arboreo. & ic. t. 172.
Magnolia altissima, flore ingenti, candido. Catesb. Magnolia altissima, con la flor grande y cándida. car. 2. p. 61. t. 61.
Magnolia maximo flore, foliis subtus ferrugineis. Magnolia con la flor muy grande; y hojas por debaxo de color ferrugineo. Trew. ehret. t. 33.
Magnolia altissima, Laurocerasi folio, flore ingenti, candido. Amœn. Angl. t. 14. Magnolia altissima, con hoja como la del Lauro real; flor grande y candida. Cast. Magnolia de flor grande.
 Habita en la Florida y Carolina. $\frac{h}{2}$
 Tiene las *hojas* correosas, y las mas antiguas con vello de color que tira á purpúreo.
- Glan-
ca.
2. **MAGNOLIA** *foliis ovato oblongis, subtus glaucis.* Magnolia con hojas entre aovadas y oblongas, y de color garzo por debaxo.
Magnolia Laurifolio, subtus albicante. Dill. elth. 207. Magnolia con hoja como la del Laurel y blanquecina por debaxo. t. 168. f. 205. Catesb. car. 1. P. 39. t. 39. Trew. ehret. t. 9.

420 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Tulipifera Virginiana, \times Arbol de Virginia que lle-
Laurinis foliis aversa par- \times va flores como Tulipas; de
te rore cæruleo tinctis, \times hojas como las del Laurel,
ni-baccifera. Pluk. Alm. 379. \times teñidas por su envés con un
 t. 68. f. 4. \times rocío de color cerúleo; y con
 \times bayas en forma de cono.

Cast. Magnolia de color garzo.

Habita en la Virginia, Pensilvania y Carolina. \hbar

Acu- 3. MAGNOLIA *foliis* \times Magnolia con hojas entre
 minata *ovato-oblongis acuminatis*. \times aovadas y oblongas, y pun-
 \times tiagudas.

Magnolia foliis ovato- \times Magnolia con hojas entre
lanceolatis, acuminatis, an- \times aovadas y lanceoladas, pun-
nuis, petalis obtusis. Mill. \times tiagudas, annuas; y petalos
 dict. n. 4. \times obtusos.

Magnolia flore albo, fo- \times Magnolia con la flor blan-
lio majore, acuminato, haud \times ca; hoja mas grande, pun-
albicante. Catesb. car. 3. p. 15. \times tiaguda, y no blanquecina.
 t. 15. \times

Cast. Magnolia puntiaguda.

Habita en Pensilvania. \hbar

Tripe- 4. MAGNOLIA *foliis lan-* \times Magnolia con hojas lan-
 tala. *ceolatis, petalis exteriori-* \times ceoladas; y petalos exterior-
bus dependentibus. \times res que cuelgan.

Magnolia amplissimo flo- \times Magnolia con la flor muy
re albo, fructu coccineo. Ca- \times ancha, blanca; y fruto coc-
 tesb. car. 2. p. 80. t. 80. \times cineo.

Cast. Magnolia de tres petalos.

Habita en la Carolina. \hbar

Tiene las flores de la magnitud de la *Magnolia de flor grande*; y las hojas muy anchas.

837. Género MICHELIA. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de tres hojuelas, en forma de pétalos, oblongas, cóncavas, y que se caen quando las demas partes de la flor.

COR. *Petalos* quince, lanceolados, y los exteriores mayores.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, alesnados, cortísimos: con las *anteras* derechas y agudas.

PIST. *Gérmenes* numerosos, apiñados en espiga oblonga: *estilos* ninguno: *estigmas* redoblados y obtusos.

PERIC. *Bayas* otras tantas, globosas, de una celdilla, y dispersas en racimo.

SEM. quatro, por una parte convexâs, y por la otra anguladas.

E S P E C I E S.

- Cham-
paca. 1. MICHELIA *foliis lanceolatis*. Flor. Zeyl. 144. Michelia con hojas lanceoladas.
Osborn. it. 93. Sampacca. Rumph. amb. 2. p. 199. t. 67. 68. Sampacca.
Champacam. Rheed. mal. 1. p. 31. t. 19. Rai. hist. 1641. Champacam.
Burm. Ind. 124.
- Cast. Michelia Champaca.
Habita en la India. \hbar
Posee las flores amarillas y muy olorosas.
- Tsiam
paca. 2. MICHELIA *foliis lanceolato-ovatis*. Mechelia con hojas entre lanceoladas y ovoides.
Michelia Evonymoides. Michelia parecida al Evonymo ó Bonetero.
Burm. Ind. 124. Sampacca *sylvestris*. Rumph. amb. 2. p. 202. t. 68. Sampacca silvestre.
- Cast. Michelia tsiampacca.
Habita en la India. \hbar

422 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Echa las *flores* de color blanquecino que tirá á amarillo, y menos olorosas: las *hojas* mas anchas ó entre lanceoladas y aovadas, con piececito y vello como seda.

838. Género UVARIA. †

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de tres hojuelas, planas, aovadas, agudas y persistentes.
COR. *Petalos* seis, lanceolados, sin uñas, extendidos y mas largos que el caliz.
ESTAMB. *Filamentos* ninguno: *anteras* numerosas, truncadas, oblongas; y que cubren el germen en el qual están sentadas.
PIST. *Germen* aovado, y cubierto con las anteras: *estilos* numerosos, del largo de ellas, y que terminan la cabezuela: con los *estigmas* obtusos.
PERIC. *Bayas* numerosas, separadas, globosas, con pedunculo, y fixadas en el *receptáculo* oblongo.
SEM. muchas.

ESPECIES.

- Zeylanica. 1. UVARIA *foliis integerrimis.* Uvaria con hojas enterisimas.
Funis Musarius. Rumph. X Cuerda con flor como la
amb. 5. p. 78. t. 42. X de la Musa ó Pisang.
Narum-panel. Rheed. X Narum-panel.
mal. p. 2. p. 11. t. 9. Rai. X
hist. 1636. X

Cast. Uvaria de Zeylan.

Habita en la India. $\frac{h}{2}$

Veanse las especies de Cananga. *Rumph. amb. 2. t. 65. y 66. f. 2.*

- Ja-ponica 2. UVARIA *foliis serratis.* Uvaria con hojas aserradas.

Frutex viscosus, procumbens, folio Telephii vulgaris æmulo, fructu racemoso. X Arbusto viscoso, tendido, con hoja semejante á la del Telephio vulgar; y fruto racimoso. X
 Kœmf. Amœn. 476. t. 477. X

Cast. Uvaria del Japon.
 Habita en el Japon. *h*

839. Género ANNONA. † Guanabanus. Plum. 10.

CAR. GEN. NAT.

- CAL. *Periantio* de tres hojuelas, pequeñas, de figura de corazon, cóncavas y puntiagudas.
 COR. *Petalos* seis, de figura de corazon, sin uñas, y los tres alternos interiores mas pequeños.
 ESTAMB. *Filamentos* apenas ninguno: *anteras* muy numerosas, y sentadas en el receptáculo.
 PIST. *Germen* algo redondo y prendido en el receptáculo casi redondo: *estilos* ninguno: *estigmas* obtusos, numerosos, y que cercan todo el germen.
 PERIC. *Baya* muy grande, casi redonda, cubierta con una corteza escamosa, y de una celdilla.
 SEM. muchas, duras, entre aovadas y oblongas, puestas en cerco y anidadas.

ESPECIES.

- Muricata. 1. ANNONA *foliis ovali-lanceolatis glabris nitidis planis, pomis muricatis.* X Annona con hojas entre ovales y lanceoladas, lampiñas, lustrosas, planas; y pomas con puntitas. X
 Jacq. obs. 1. p. 10. t. 5. Merian. sur. t. 14. X
Annona foliis oblongo-ovatis, nitidis, fructibus spinis mollibus tumentibus obsitis. X Annona con hojas entre oblongas y aovadas, lustrosas; y frutos cercados con espinas blandas é hinchadas. X
 Brown. jam. 254. X
Annona Indica, latifolia, fructu squamoso, aspero. X Annona de Indias, con hoja ancha; y fruto escamoso y áspero. X
 Pluk. alm. 31. t. 134. f. 2. X

Annona Indica, fructu conoideo viridi, squammis veluti aculeato. Pluk. alm. 32. t. 135. f. 5. Annona de Indias, de fruto como un cono, verde, y con agujones como si fuesen escamas.

Annona maxima, foliis latis, splendidibus, fructu maximo, viridi, conoideo, tuberculis seu spinulis inno-centibus aspero. Sloan jam. 203. hist. 2. p. 166. t. 225. Annona muy grande, con hojas anchas, relucientes; fruto muy grande, verde, que se acerca á la figura có-nica, y áspero con tubercu-los ó espinitas que no ofen-den.

Annona. Comm. hort. 1. p. 133. t. 69. Annona,

Guanabanus fructu mol-liter aculeato. Plum. gen. 43. t. 143. f. 1. Guanabano de fruto con agujones blandos.

Cast. Annona de puntitas.

Habita en la America mas caliente. \bar{h}

Tiene la corola de tres petalos, ásperos por defuera: el nectario tambien de tres petalos mas pequeños, lisos, blancos por defuera, y encarnados por dentro: el fruto de figura de corazon, con puntitas vueltas ácia atrás, y que no es comestible.

Squam
mosa.

2. ANNONA foliis oblon-gis subundulatis, fructibus obtuse subsquammatibus. Jacq. obs. 1. p. 13. t. 6. f. 1. Annona con hojas oblon-gas, algo ondeadas; y fru-tos con algunas escamas ob-tusas.

Annona Indica, fructu ex viridi luteo, cortice squam-mato, aspero, nucleis nigri-cantibus, parvis. Pluk. alm. 31. t. 134. f. 3. Annona de Indias, de fru-to entre verde y amarillo, áspero por su corteza esca-mosa; y almendras peque-ñas, de color que tira á negro.

Annona foliis oblongo-ovatis, undulatis, venosis, floribus tripetalis, fructibus mammillatis. Brown. jam. 256. Annona con hojas entre oblongas y aovadas, ondea-das, venosas; flores de tres petalos; y frutos con teti-llas.

Anona tuberosa. Rumph. amb. 1. p. 138. t. 46. Anona tuberosa.

Anona foliis odoratis, minoribus, fructu conoide, squamoso, parvo, dulci. Sloan. jam. 205. hist. 2. p. 168. t. 227. Anona con hojas olorosas, mas pequeñas; fruto de figura casi de cono, escamoso, pequeño y dulce.

Rai. dendr. 77.

Atamaram. Rheed. mal. Atamaram.

3. p. 21. t. 29.

Guanabanus foliis odoratis, fructu subrotundo squamoso. Plum. gen. 46. Guanabano con hojas olorosas; fruto casi redondo y escamoso.

Cast. Annona escamosa. *vulgo*: Chirimoya. Los Franceses llaman á esta especie Pommier de canelle. Manzano de Canela.

Habita en la America Meridional. $\frac{1}{2}$

Echa el fruto casi aovado, con puntas carnosas, algo apinadas y obtusas: las *hojas* olorosas: las *flores* de seis petalos y no de tres como creyó *Brown*. *Jacq.* El fruto es muy estimado tanto en America como en Europa.

Reticulata. 3. ANNONA *foliis lanceolatis, fructibus ovariis, reticulato-areolatis.* *Jacq.* Annona con hojas lanceoladas; frutos aovados, y en quadritos á manera de red. obs. 1. p. 14. t. 6. f. 2.

Anona maxima, foliis oblongis, angustis, fructu maximo, luteo, conoide, cortice glabro in areolas angulares distincto. Sloan. jam. 264. hist. 2. p. 167. t. 226. Anona muy grande, con hojas oblongas, angostas; fruto muy grande, amarillo, casi de figura cónica, con su corteza lampiña y dispuesta en quadritos angulares.

Catesb. car. 2. p. 62. t. 62.

Rai. dendr. 77.

Anona. Rumph. amb. 1. Anona.

p. 136. t. 45.

Anona--maram. Rheed. Anona-maram.

mal. 3. p. 23. t. 30. 31. (*non Catesbæi*).

Guanabanus fructu aureo & molliter aculeato. Plum. gen. 43. Guanabano con el fruto de color de oro, y con agujones blandos.

Cast. Annona de redecilla. *vulgo*: otra Chirimoya.

Ha.

Habita en la America Meridional. \hbar

Pa-
lustris.

4. ANNONA foliis oblongis obtusiusculis glabris, fructibus areolatis. Annona de hojas oblongas, algo obtusas, lampiñas y frutos con quadritos ó sean tablillas.

Annona uliginosa, foliis nitidis, ovatis, fructibus areolatis, odoratis. Brown. Annona que nace en sumideros, con hojas lustrosas, aovadas; frutos olorosos y con quadritos.

Annona aquatica, foliis Laurinis atro-virentibus, fructu minore, conoide, luteo, cortice glabro in areolas distincto. Sloan. jam. 205. hist. 2. p. 169. t. 228. f. 1. Rair. dendr. 78. Annona aquatica, con hojas como las del Laurel, de color verde que tira á negro; fruto menor, que se acerca á la figura de cono, amarillo; con su corteza lampiña dividida en quadritos.

Annona Americana, juxta fluviorum ripas innascens, Pyriformi fructu. Pluk. alm. 32. t. 240. f. 6. Annona de America, que nace junto á las riberas de los rios, con el fruto en forma de Pera.

Guanabanus palustris, fructu laevi, viride. Plum. mss. Guanabano palustre, con fruto liso y verde.

Cast. Annona palustre.

Habita en America junto á las aguas. \hbar

Gla-
bra.

5. ANNONA foliis lanceolato-ovatis, fructibus conoidibus glabris. Forsk. Annona con hojas entre lanceoladas y aovadas; frutos casi de figura cónica, y lampiños.

Annona maxima, foliis latis, fructu maximo, luteo conoide, cortice glabro. Castesb. car. 2. p. 64. t. 64. Annona muy grande, de hojas anchas, fruto muy grande, amarillo, casi de figura cónica, con la corteza lampiña.

Cast. Annona lampiña.

Habita en la Carolina. \hbar

Tri-
oba.

6. ANNONA *foliis lanceolatis, fructibus trifidis.* Annona con hojas lanceoladas; y frutos hendidos en tres partes.

Anona fructu lutescente, lævi, scrotum arietis referente. Catesb. car. 2. p. 85. t. 85. Trew. ehr. t. 5. Duham. arb. 1. p. 56. t. 19. Anona con el fruto de color que tira á amarillo, liso, y que se parece al escroto del carnero.

Cast. Annona de tres lóbulos.

Habita en la Carolina. *h*

Assia-
tica.

7. ANNONA *foliis lanceolatis glabris nitidis lineatis.* Flor. Zeyl. 225. Annona con hojas lanceoladas, lampiñas, lustrosas y rayadas.

Guanabanus fructu purpureo. Plum. spec. 43. ic. 143. f. 2. Ganabano con el fruto púreo.

Cast. Annona de Asia.

Habita en Zeylan. *h*

Afri-
cana.

8. ANNONA *foliis lanceolatis pubescentibus.* Hort. Cliff. 222. Annona con hojas lanceoladas y vellosas.

Guanabanus fructu subcœruleo. Plum. gen. 43. Guanabano con el fruto casi cerúleo.

Guanabanus Perseæ folio. Trew. ehret. t. 49? Guanabano con hoja como la de la Persea.

Cast. Annona de Africa.

Habita en Africa. *h*

Hexa-
petala.

9. ANNONA *floribus hexapetalis.* Suppl. p. 270. Annona con flores de seis petalos.

Cast. Annona de seis petalos.

Habita en la China. *h*

Se cultiva en la India Oriental, y es arbol que produce las hojas elipticas y lampiñas: el *caliz* de tres hojuelas y menudo: seis *petalos* iguales y oblongos. No conoció *Linneo* el fruto de esta especie.

840. Género ANEMONE. * *Tourn. t. 147.* Anemonoides.

Dill. gen. 4. Vaill. A. G. 1719. Anemone-Ranunculus.

Dill. gen. 4. Hepatica. *Dill. gen. 5.*

Pulsatilla. Tourn. t. 148.

CAR. GEN. NAT.

CAL. ninguno.

COR. *Petalos* en dos ó tres séries , tres en cada una , y algo oblongos.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos , capilares , la mitad mas cortos que la corola : con las *anteras* mellizas y derechos.

PIST. *Gérmenes* numerosos , recogidos en cabezuela : *estilos* puntiagudas : con los *estigmas* obtusos.

PERIC. ninguno. *Receptaculo* globoso ú oblongo , con puntitos excavados.

SEM. muchas , puntiagudas , y que retienen el estilo.

OBS. La *Hepatica de Dillenio* tiene el caliz de tres hojuelas , pero apartado de la flor ; por lo que debe llamarse involucreo.

La *Pulsatilla de Tournefort* posee el involucreo foliaceo ó como si fuese de hojas , hendido en muchas partes ; y las *semillas* con cola y pelosas.

La *Anemonoide de Dillenio* y la *Hepatica del mismo autor* se hallan con las *semillas* desnudas y sin la cola plumosa.

CARACTERES GENERICOS DE TOURN.

ANEMONE, p. 275.

La *flor* es rosácea ; de cuyo centro sale el pistilo que pasa á fruto oblongo con muchas *semillas* , arimadas al exe ó receptáculo , y envueltas en una caliptra ó sea membrana lanuginosa.

PULSATILLA. p. 284.

La flor es rosácea; de cuyo centro sale el pistilo cercado de estambres, que pasa á fruto, en el qual, como en una cabezuela, se recogen las semillas, terminadas en un capilamento delgado.

ESPECIES.

He-
patica.

1. ANEMONE *foliis trilobis integerrimis*. Mat. Med. Anemone con hojas hendidas en tres lóbulos enterisimos.
 161. Flor. dan. t. 610.
Hepatica. Hall. helv. n. Hepatica.
 1156. Knorr. del. 1. t. L. 13.
Ranunculus tridentatus, vernalis, flore simplici vel pleno, cæruleo vel violaceo, &c. Tourn. p. 286. 287. Ranunculo de primavera, con tres dientes; con la flor sencilla ó plena, de color cerúleo ó de violeta &c.
Trifolium Hepaticum, flore simplici & pleno, violaceo vel cæruleo &c. C. B. P. Trifolio Hepatico, con la flor sencilla y plena, de color cerúleo ó de violeta &c.
 330.

Cast. Anemone hepatica. Farm. Hepatica nobilis seu Herba Trinitas.

Habita en bosques pedregosos de Europa: en Cataluña, Aragon: en las dos Castillas y otras partes de España. 4

PROPIED. Es astringente y tónica: se usa en la hipocondria, hernia, y en las obstrucciones del vaso.

ESPECIES LLAMADAS PULSATILAS, CON INVOLUCRO EN EL PEDUNCULO; Y SEMILLAS CON COLA.

Patens

2. ANEMONE *pedunculo involucreto, foliis digitatis multifidis*. Gmel. Sib. 4. p. 195. Anemone con involucro en el pedunculo; hojas en forma de dedos, y hendidas en muchas partes.

Pulsatilla folio Anemones secunda, sive subrotundo. C. B. P. 94. Prodr. 94. Tourn. p. 284. Pulsatila con hoja como la de la Anemone segunda, casi redonda.

Pulsatilla Anemones folio dissecto, lanuginosa, flore majore, dilute luteo, patente. Amm. ruth. 104. Pulsatila lanuginosa, con hoja como la de la Anemone, cortada; flor mas grande, extendida y de color amarillo claro.

Cast. Anemone extendida.

Habita en Tobolsko de Siberia, en la Lusacia inferior y en la Silesia. 24

Echa las hojas radicales entre de tres en rama y en forma de dedos; con sus hojuelas sentadas, laciniadas y puntiagudas; la hojuela intermedia partida en tres lacinias y las laterales en dos: el escapo de una flor, y mas corto que las hojas: el involucreo apartado y veloso: la corola blanca, vellosa por debaxo; y los estambres amarillos.

Sulphurea 3. ANEMONE *pedunculo involucrato, foliis triplicato-pinnatis pilosis planis acute incis, seminibus caudatis.* Anemone con involucreo en el pedunculo; hojas tres veces pinnadas, pelosas, planas, agudamente cortadas; y semillas con cola.

Anemone tubis caudatis, involucris multifidis, foliis hirsutis, pinnatis, pinnis acute lobatis. Hall. helv. n. 1148. R. Anemone de pistilos con cola; involucros hendidos en muchas partes; hojas con pelo áspero, pinnadas; y hojuelas hendidas en lóbulos agudos.

Pulsatilla lutea, Apii hortensis folio. C. B. P. 177. Tourn. p. 284. Pulsatila con la flor amarilla; y hoja como la del Apio hortense.

Pulsatilla lutea. Cam. epit. 393. Pulsatila de flor amarilla.

Pulsatilla lutea, Apii hortensis folio, secunda Dalechampii. Bauh. hist. 3. p. 411. Pulsatila segunda de Dalechampion, con la flor amarilla; y hoja como la del Apio hortense.

Cast.

Cast. Anemone de color de azufre.

Habita en Suiza. 24

Se diferencia de la *Anemone de primavera* por los petalos mas agudos y por dentro amarillos.

Bal-
densis.

4. ANEMONE *foliis biter-*
ternatis hirsutis.

Anemone seminibus lana-
tis, foliis caulinis ternatis,
triplicato-trifidis, lobulis
lanceolatis, acute trifidis bi-
fidisve. Hall. helv. n. 1151.

Anemone alpina, alba, mi-
nor. C. B. P. 176. Prodr. 94.

Anemone de hojas biter-
nadas, y con pelo áspero.

Anemone con las semillas
lanudas; hojas del tallo de
tres en rama, tres veces hen-
didas en tres: lóbulos lan-
ceolados, y hendidos agu-
damente en otros dos ó tres.

Anemone alpina, menor;
con la flor blanca.

Cast. Anemone baldense.

Habita en los Alpes Aquilienses, Apeninos, de Suiza, y
en el monte Baldo. 24

El D. Turra distingue esta especie de la *Anemone alpina*
como muy diversa; por ser quatro veces mas peque-
ña, mas débil, y con menos pelo áspero; por las *hojas*
radicales dos veces de tres en rama, cortadas, y no
decompuestas. La planta de *Bursero* que trae *Bauhi-*
no es diferente de esta.

Ver-
nalis.

5. ANEMONE *peduncu-*
lo involucrato, foliis pinna-
tis, flore erecto. Oed. dan.
t. 29.

Anemone tubis caudatis,
involucris multifidis, foliis
pinnatis, pinnis latis, loba-
tis. Hall. helv. n. 1147. t. 21.

Pulsatilla involucro pilo-
so nitido. Flor. Lapp. 223.

Pulsatilla Apii folio, ver-
nalis, flore majore. C. B. P.
177. Prodr. 94. Tourn. p. 28.
Hall. puls. 63. t. 9.

Anemone con involucro
en el pedunculo; hojas pin-
nadas; y flor levantada.

Anemone de pistilos con
cola, involucros hendidos en
muchas partes; hojas pinna-
das; hojuelas anchas y hen-
didas en lóbulos.

Pulsatilla con el involucro
peloso y reluciente.

Pulsatilla de primavera,
con hoja como la del Apio;
y flor mas grande.

Cast.

Cast. Anemone de primavera.

Habita en tierras estériles de Suecia, Suiza y Alemania; en Castilla la vieja, en Hoyoquesero y otras partes de España. 26

- pul- 6. ANEMONE *peduncu-* X Anemone con involucre
satilla. *lo involucrato, petalis rec-* X en el pedunculo; petalos
tis, foliis bipinnatis. Mat. X rectos; y hojas dos veces
Med. 162. Fl. dan. 153. X pinnadas.
Knorr. del. 2. t. A. 7.
- Anemone tubis caudatis,* X Anemone de pistilos con
involucris unifoliis, multi- X cola; involucros de una hoja
fidis, foliis linearibus hir- X hendida en muchas partes;
sutis, pinnis tri-et quinqu- X hojas lineares con pelo áspe-
partitis. Hall. helv. n. 1146. X ro, y hojuelas divididas en
tres y en cinco partes.
- Pulsatilla foliis decompo-* X Pulsatila con hojas decom-
sitis, pinnatis, flore nutante, X puestas y pinnadas; flor in-
limbo erecto. Sauv. monsp. X clinada y su borde derecho.
254.
- Pulsatilla folio crassiore,* X Pulsatila con hoja mas
X *et majore flore.* C. B. P. 177. X crasa; y flor mas grande.
Tourn. p. 284. Hall. puls. 62.
t. 8.
- Pulsatilla.* Cam. epit. X Pulsatila.
398. Dod. pempt. 443.
- Anemone flore minori, pa-* X Anemone palustre, con la
lustris. C. B. P. 176. Hall. X flor mas pequeña.

Cast. Anemone pulsatila.

Habita en las selvas áridas y cerros abrigados de la Europa boreal: en los Pirineos de Cataluña, villa de Camprodon y lugar de Setcasas.

Varía con las flores blancas.

PROPIED. Es acre, corrosiva y vexigatoria. Su agua des-
xilada se tiene por excelente para limpiar y encarnar
las úlceras inveteradas.

- Pracensis. 7. ANEMONE pedunculata involucrata, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis. Flor. dan. t. 611. Anemone con involucre en el pedunculo; petalos redoblados por su ápice; y hojas dos veces pinnadas.
- Pulsatilla flore minore, nigricante. C. B. P. 177. Tourn. p. 284. Hall. puls. 66. t. 12. Pulsatilla con la flor mas pequeña, y de color que tira á negro.
- Pulsatilla flore clauso, caeruleo. Bauh. hist. 3. p. 410. Pulsatilla con la flor cerrada, y de color cerúleo.
- Pulsatilla flore clauso, obsoleto, petalis reflexis. Helw. puls. 65. t. 11. Pulsatilla con la flor cerrada, desfigurada; y petalos redoblados.

Cast. Anemone pratense.

Habita en los prados abrigados y ásperos de Scania y Alemania. 2

ESPECIES LLAMADAS ANEMONE DE TALLO CON HOJAS,
Y SEMILLAS CON COLA.

- Alpina. 8. ANEMONE foliis caulinis ternis connatis supra decompositis multifidis, seminibus hirsutis caudatis. Jacq. austr. t. 85. Anemone con las hojas del tallo de tres en tres, unidas por su base, sobredecompuestas; semillas con pelo aspero y cola.
- Anemone foliis triplicatopinnatis, acute circumserratis, caulinis ternatis, tubis caudatis. Hall. helv. n. 1149. Anemone con hojas tres veces pinnadas, agudamente aserradas por su contorno, las del tallo de tres en rama; y pistilos con cola.
- Anemone Burseriana. Scop. carn. ed. 2. n. 664. Anemone de Bursero.
- Anemone caule involucrato, seminibus pilosis, caudatis. Crantz. austr. p. 105. n. 8. t. 3. f. 2. Anemone con involucre en el tallo; semillas pelosas y con cola.
- Anemone sylvestris, secunda. Clus. hist. 1. p. 245. Anemone silvestre, segunda.

434 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Pulsatilla flore albo. C. B. X Pulsatilla con la flor blanca.
 P. 177. Lob. ic. 182. Bauh. ca.
 hist. 3. p. 419. Tourn. p. 484.

* *Anemone alpina, alba, major.* C. B. P. 176. Prodr. 94. X Anemone alpina, mayor,
 Burs. IX. 80. X con la flor blanca. *

Cast. *Anemone alpina.*

Habita en los Alpes de Stiria, Suiza, Austria y Silesia. ¶
 Tiene las *hojas del tallo* lanudas por su base: las *del involucro* sobredecompuestas, como las radicales: la *flor* de la magnitud de la *Tulipa*, blanca, por defuera algo violada y vellosa.

Coro- 9. ANEMONE *foliis radicalibus ternato-decompositis, involucro folioso.* Has- X Anemome con las hojas
 naria. selq. 477. Hill. anat. 12. X radicales entre de tres en
 X rama y decompuestas; y el
 X involucro folioso ó como si
 X fuese hoja.

Anemone tenuifolia, simpliciflore. C. B. P. 174. n. X Anemone con hoja delgada;
 de 2. hasta 12. X y flor sencilla.

* *Anemone tenuifolia, multiplex, rubra.* C. B. P. 176. X Anemone con hoja delgada;
 X flor multiplicada y de
 X color encarnado. *

Anemone. Cam. epit. 386. X Anemone.

Cast. *Anemone de coronas.*

Habita en Oriente y fue transportada de Constantinopla. ¶

Hor- 10. ANEMONE *foliis digitatis, seminibus lanatis.* X Anemone con hojas divi-
 tensis. X didas como en dedos; y se-
 X millas lanudas.

Anemone seminibus lanatis, foliis radicalibus trilobatis & multifidis, caulinis ovato-lanceolatis. Hall. helv. X Anemone con las semillas
 n. 1152. X lanudas; hojas radicales hen-
 X didas en tres lóbulos y en
 X muchas partes; y las del ta-
 X llo entre aovadas y lanceola-
 X das.

Anemone foliis digitatis, lobis incisís, petalis lanceolatis, numerosis. Ger. prov. 380. Anemone con hojas divididas como en dedos, lóbulos cortados; petalos lanceolados y numerosos.

Anemone hortensis, latifolia. C. B. P. 176. Anemone hortense, de hoja ancha.

Anemone Geranii rotundo folio, purpurascens. C. B. P. 173. Tourn. p. 276. Anemone con la flor de color purpúreo; hoja como la del Geranio y redonda.

Anemone hortensis, latifolia III. Clus. hist. 1. p. 249. Anemone hortense, tercera, de hoja ancha.

Anemone Italica, latiusculis spinosis foliis. Bauh. hist. 3. p. 402. Anemone de Italia, con hojas espinosas y algo anchas.

Anemone I. Dod. pempt. 434. Anemone primera.

Cast. Anemone hortense.

Habita en Italia y Suiza. 2

Tiene el involucreo con sus hojuelas lanceoladas: y nueve petalos rayados y vellosos por defuera.

Pal-
mata. 11. ANEMONE *foliis cordatis sublobatis, calyce hexaphyllo colorato.* Anemone con hojas de figura de corazon, algo hendidas en lóbulos; y el caliz de seis hojuelas de color.

Pulsatilla foliis palmatis. Hort. Cliff. 224. Pulsatilla con hojas palmeadas.

Anemone Cyclaminis seu Malvæ folio, lutea. C. B. P. 173. Moris. hist. 2. p. 425. sect. 4. t. 25. f. 3. Tournef. p. 275. Anemone con hoja como la del Panporcino, ó de la Malva; y flor amarilla.

Anemone latifolia, flava. C. B. P. 176. Tourn. p. 265. Anemone de hoja ancha; y flor de color amarillo-roxo.

Anemone hortensis, latifolia I. Clus. hist. 1. p. 248. Anemone hortense, primera, de hoja ancha.

Cast. Anemone palmeada.

Habita en Portugal cerca del rio Tajo: en Extremadura, Aranjuez, Alcarria, Asturias y otras partes de España. 2

436 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Tiene el *caliz* dividido en seis partes, velloso, de color y no apartado de la flor.

ESPECIES CON LA FLOR DESNUDA, Y SEMILLAS SIN COLA.

Sibirica. 12. ANEMONE caule *X* Anemone con el tallo de
unifloro, involucre folioso *X* una flor; involucre como si
obtus. Gmel. Sib. 4. p. 199. *X* fuese hoja, y obtuso.
 n. 41. *X*

Cast. Anemone de Siberia.

Habita en la Siberia. Gmel. 24

Echa las *hojas* de tres en rama: las *hojuelas* entre cortadas y palmeadas, pestañosas; y sus *peciolos* con pelo áspero: el *escapo* desnudo y peloso: el *involucre* debajo de la flor y dividido en tres lóbulos laciniados: la *flor* extendida, de seis petalos casi redondos, y de color leonado: los *estambres* de color amarillo-roxo: las *cabezuelas* de los pistilos casi redondas y con puntitas.

Sylvestris 13. ANEMONE pedunculo *X* Anemone con el pedunculo
nudo, seminibus subrotundis hirsutis muticis. *X* desnudo; semillas casi redondas,
 con pelo áspero y sin arista ó sea sin cola.

Anemone seminibus lanatis, foliis digitatis, hirsutis, floribus pentapetalis. *X* Anemone de semillas lanudas; hojas divididas como en dedos, con pelo áspero; y flores de cinco petalos.
 Hall. helv. n. 1150.

Anemone sylvestris, alba, major. C. B. P. 176. Tourn. p. 277. *X* Anemone silvestre, mayor, con la flor blanca.

Anemone sylvestris I. *X* Anemone silvestre, primera.
 Clus. hist. 1. p. 244.

Anemone alba, magna, plurima parte anni florens. *X* Anemone grande, con la flor blanca, y que florece la mayor parte del año.
 Bauh. hist. 3. p. 411.

α *Anemone sylvestris, alba, minor.* C. B. P. 176. Prodr. *X* Anemone silvestre, menor, con la flor blanca. α
 93. Burs. IX. 79. Tournef. P. 277. *X*

Cast.

Cast. Anemone silvestre.

Habita en Alemania y Suiza: en las faldas de los montes Pirineos, de los de Avila, y otros muchos de España. ¶

Varía sumamente en el color y multiplicacion de sus flores.

- Virgi-
niana. 14. ANEMONE *pedunculis alternis longissimis, fructibus cylindricis, seminibus hirsutis muticis.* Anemone con pedunculos alternos, larguissimos; frutos cilindricos; semillas con pelo áspero y sin cola.
- Anemone caule ramoso, petalis lanceolatis.* Roy. Anemone con el tallo ramoso; y petalos lanceolados. Lugdb. 488. Gron. virg. 165.
- Anemone Virginiana, tertiae Mathioli similis, parvo flore.* Herm. Lugdb. 643. Anemone de Virginia, semejante á la tercera de Mathiolo; y flor pequeña. Parad. 18. t. 18. Tourn. p. 277.

Cast. Anemone de Virginia.

Habita en la Virginia. ¶

Produce el tallo desnudo, terminado en hojas de tres en tres, y de tres en rama, con la del medio hendida en tres lóbulos, aguda, aserrada; las laterales partidas en dos y hendidas tambien en lóbulos aserrados: el pedunculo que sale del centro de los peciolo, largo y desnudo: la flor pequeña: con los petalos aovados, de color verde, y como si fuesen un caliz: la cabezuela de los pistilos alargada, cilindrica, y que se deshace en semillas con pelo áspero. De cerca la base del pedunculo sale y sigue un tallo terminado en otro pedunculo que lleva flor, y consta de dos hojas opuestas; y asi continua en adelante.

- Deca-
petala. 15. ANEMONE *caule unifloro, flore decapetalo, foliis ternatis lobatis radicalibus.* Anemone con el tallo de una flor de diez petalos; hojas de tres en rama, hendidas en lóbulos y radicales.

438 FLORES HERMAF. DE XX.º Ó MAS EST.

Anemone foliis ternatis, foliolis trilobis, punctatis, pedunculo simplici, flore unico, decapetalo. Arduin, spec. 2. p. 27. t. 12.
 Anemone con hojas de tres en rama; hojuelas hendidas en tres lóbulos, punteadas; pedunculo sencillo; y una sola flor de diez petalos.

Cast. Anemone de diez petalos,

Habita en el Brasil. ¶

Su estatura es como la de la *Anemone de Virginia*, pero pequeña. Echa las *hojas* radicales de tres en rama, con peciolo corto: las *hojuelas* casi aovadas, obtusas, hendidas en tres lóbulos, ó cortadas: el *tallo* muy sencillo, y del largo de medio pie: el *involucro* con una flor, dividido en tres partes hendidas en muchas lacinias lineares, agudas, y lisas: el *pedunculo* del largo del involucro, y con pelo áspero; la *flor* pequeña, blanca, de diez petalos lanceolados y persistentes, con los interiores poco mas pequeños: los *estambres* mas cortos que la corola: el *germen* en cabezuela, cónico y veloso: y los *estigmas* puntiagudos y lisos.

Pensilvanica.

16. ANEMONE *caule dichotomo, foliis sessilibus amplexicaulibus, infimis ternis trifidis incis.*
 Anemone con el tallo ahorquillado; hojas sentadas, que abrazan el tallo, las de mas abaxo de tres en tres, hendidas en tres partes y cortadas.

Cast. Anemone de Pensilvania.

Habita en el Canadá. D. Hope. ¶

Es muy semejante á la *Anemone ahorquillada*; pero se diferencia por las hojas de tres en tres (y no de dos en dos) en la primera division del tallo, sentadas, mas venosas, y menos horizontales: por las *flores* todas blancas (sin ser rubicundas por debaxo), y mayores: por las *anteras* de color amarillo-roxo (no leonadas): por el *fruto* globoso, con los ápices de las semillas alesnados, y que sobresalen (y no con puntita rígida, menuda y encorvada ácia atrás) como en la *Anemone ahorquillada*.

Dicho-
toma.

17. ANEMONE caule dichotomo, foliis sessilibus omnibus oppositis amplexicaulibus trifidis incis. Amoen. acad. 1. p. 155. Gmel. Sib. 4. p. 197. Linn. dec. 29. t. 15.

Anemone con el tallo ahorquillado; hojas sentadas, todas opuestas, que abrazan el tallo, hendidas en tres partes y cortadas.

Cast. Anemone ahorquillada.
Habita en el Canadá y Siberia. ¶

Es muy semejante á la precedente; pero tiene la raiz que se arrastra lexos: todas las hojas opuestas y horizontales: las corolas por debaxo de color que tira á purpúreo: las anteras de color leonado; y las semillas desnudas; pero con una punta muy pequeña encorvada ácia atrás.

Trifolia.

18. ANEMONE foliis ternatis ovatis integris serratis, caule unifloro. Gmel. Sib. 4. p. 199. n. 39.

Anemone con hojas de tres en rama, aovadas, enteras, aserradas; y tallo de una flor.

Anemone trifolia, flore albo. Bauh. hist. 3. p. 412.

Anemone con hojas de tres en rama; y flor blanca.

Anemone trifolia. Dod. pempt. 436.

Anemone con hojas de tres en rama.

Cast. Anemone de tres en rama.
Habita en Francia. ¶

Quinquefolia.

19. ANEMONE foliis quinatis ovalibus serratis, caule unifloro.

Anemone con hojas de cinco en rama, ovales, aserradas; y tallo de una flor.

Ranunculus nemorum, Fragariaefoliis, Virginianus. Pluk. alm. 310. t. 106. f. 3.

Ranunculo de bosques, de Virginia; con hojas como las de la Fresera.

Cast. Anemone de cinco en rama.
Habita en la Virginia y Canadá. Kalm. ¶

440. FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Nemo- 20. ANEMONE *seminibus acutis, foliolis incisís, caule unifloro.* Oed. dan. t. 549. X Anemone con las semillas agudas; hojuelas cortadas; y tallo de una flor.

Anemone seminibus nudis, caule unifloro, foliis caulinis quinquepartitis, lobis tripartitis incisís. Hall. helv. n. 1154. X Anemone con las semillas desnudas; tallo de una flor; hojas del tallo divididas en cinco lóbulos partidos en otros tres y cortados.

Anemone seminibus acutis, petalis ellipticis, foliis serratis. Scop. carn. ed. 2. n. 660. X Anemone con las semillas agudas; petalos elípticos; y hojas aserradas.

Anemone nemorosa, flore majore. C. B. P. 176. X Anemone de bosques, con la flor mas grande.

Ranunculus phragmites, albus, vernus. Bauh. hist. 3. p. 412. Tourn. p. 285. X Ranunculo fragmíte, de primavera, con la flor blanca.

Ranunculus sylvarum. Clus. hist. 1. p. 247. X Ranunculo de las selvas.

Cast. Anemone de bosques.

Habita en los bosques ásperos de Europa. 24

Apen- 21. ANEMONE *seminibus acutis, foliolis incisís, petalis lanceolatis numerosis.* Huds. angl. 209. X Anemone con las semillas agudas; hojuelas cortadas; petalos lanceolados y numerosos.

Ranunculus nemorosus, flore cæruleo, foliis majoribus (vel minoribus) Apennini montis. Mentz. pug. t. 8. f. 2. Tourn. p. 185. X Ranunculo de bosques, del monte Apenino; con la flor cerúlea; y hojas mas grandes (ó mas pequeñas).

Anemone Geranii Robertiani folio, cærulea. C. B. P. 174. Tourn. p. 277. X Anemone con hoja como la del Geranio de Roberto; y flor cerúlea.

Anemone hortensis, tenuifolia, simplici flore, prima. Clus. hist. 1. p. 254. X Anemone hortense, primera, con hoja delgada; y flor sencilla.

Cast. Anemone apenina.

Habita en los montes Apeninos: en Roma é Inglaterra:

en

en las faldas de los montes Pirineos de Cataluña, de los de Avila, y otras partes de España. ¶

Ranunculoides.

22. ANEMONE *seminibus acutis, foliolis incis, petalis subrotundis, caule subbifloro*. Fl. dan. t. 140. Anemone con las semillas agudas; hojuelas cortadas; petalos casi redondos; y tallo con una ó dos flores.

Ranunculus nemerosus, luteus. C. B. P. 178. Tourn. p. 285. Ranunculo de bosques, con la flor amarilla.

Ranunculus phragmites, luteus, nemerosus. Bauh. hist. 3. p. 413. Ranunculo fragmite, de bosques, con flor amarilla.

Cast. Anemone como ranunculo.

Habita en los prados boscosos de la Europa boreal. ¶

Narcissiflora.

23. ANEMONE *floribus umbellatis, seminibus depresso-ovalibus, nudis*. Jacq. austr. t. 159. Crantz. austr. t. 3. f. 1. Anemone con flores en umbela; semillas entre deprimidas y ovales, y desnudas.

Anemone seminibus nudis, rotundis, planis, foliis septifidis, imbricatis, floribus umbellatis. Hall. helv. n. 1155. Anemone con las semillas desnudas, redondas, planas; hojas hendidas en siete laciniadas, apañadas; y flores en umbela.

Ranunculus montanus, hirsutus, albus, altior. C. B. P. 183. Tourn. p. 290. Ranunculo montano, mas alto, con pelo áspero; y flor blanca.

Ranunculus montanus, hirsutus, humilior, Narcissiflore. C. B. P. 182. Tourn. p. 290. Ranunculo montano, mas baxo, con pelo áspero; y flor como la del Narciso.

Ranunculi montani II. species altera. Clus. hist. 2. p. 235. Otra especie segunda de Ranunculo montano.

Caryophyllata alpina, quinquefolia. C. B. P. 322. Caryophyllata alpina, con hojas de cinco en rama.

Cast. Anemone con flor de Narciso.

Habita en los alpes y montes de Austria, Suiza, Siberia y

442 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

y Silesia : en los de Asturias , de Burgos y otras partes de España. ¶

Tiene la *hoja del tallo* de tres en rama ; y las *hojuelas* hendidas en tres partes : las *corolas* en forma de salvia , blancas y con pelo áspero por defuera. *Haller.*

Fasciculata.

24. ANEMONE *floribus umbellatis congestis , foliis multifidis.* † Anemone con flores en umbela , amontonadas ; y hojas hendidas en muchas partes.

Ranunculus Orientalis , Ranunculo Oriental , con *Aconiti Lycostoni folio , flore magno , albo.* Tourn. cor. Lycostono ; flor grande y 20. it. 3. p. 92. t. 92. X blanca.

Cast. Anemone en hacecillo.

Habita en Oriente y en los montes cerca del lago Baical. *Georg. it. 1. p. 221.*

Es muy parecida á la especie antecedente ; pero no tiene bastantes caractéres para distinguirse de ella , mientras que faltan los de las semillas. *Haller* cree ser variedad de la precedente.

Thalictroides.

25. ANEMONE *floribus umbellatis , foliis caulinis simplicibus verticillatis , radicalibus biternatis.* Mill. Anemone con flores en umbela ; hojas del tallo sencillas , verticiladas ; y las radicales biternadas. *dict. n. 8.*

Ranunculus nemorosus , Ranunculo de bosques, de *Aquilegiæ foliis , Virginia-nus , Asphodeli radice.* Pluk. Virginia , con hojas parecidas á las de la Aquilegia ; y alm. 310. t. 106. f. 4. raiz como la del Asphodelo.

Thalicttrum caule unifloro , ex eodem puncto foliis quatuor simplicibus instructo. Thalictro con el tallo de una flor , y adornado de cuatro hojas sencillas , que *Gron. virg. 62.* salen de un mismo punto. ¶

Cast. Anemone como Thalictro.

Habita en la Virginia y Canadá.

Tiene las *hojuelas del involucre* pecioladas.

La variedad de la planta del Canadá , cogida por el *Doct.*

Kalm , arroja la *raiz* tuberosa : las *hojas radicales* con

pe-

peciolos largos, dos veces de tres en rama; sus *hojuelas* casi de figura de corazon y anguladas: el *escapo* poco mas alto que las hojas, terminado con quatro hojas sencillas semejantes á las hojuelas radicales, y colocadas en peciolos largos: los *pedunculos* terminales, amontonados ó en hacecillo, sencillos, iguales y de una flor; á veces uno solo, dos, tres, y hasta cinco: las *corolas* blancas; con los *petalos* aovados, obtusos y extendidos: los *estambres* de color amarillo-roxo: y los *pistilos* en cabezuela aovada, con puntitas duras.

841. Género ATRAGENE.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de quatro hojuelas, ovales, extendidas, obtusas y que se caen quando las demas partes de la flor.

COR. *Petalos* doce, lineares, muy angostos por su base, obtusos y extendidos.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, cortísimos: con las *anteras* oblongas, puntiagudas y mas cortas que el caliz.

PIST. *Gérmenes* muchos, oblongos: *estilos* vellosos: con los *estigmas* sencillos y del largo de las anteras.

PERIC. ninguno.

SEM. muchas y que rematan en una cola pelosa.

OBS. La *Atragene del Cabo de Buena-esperanza* consta de veinte *petalos*, poco mas ó menos.

E S P E C I E S.

Alpina

1. ATRAGENE *foliis duplicato-ternatis serratis*, *petalis exterioribus quaternis*. Gmel. Sib. 4. p. 194. Jacq. austr. t. 241. Atragene con hojas dos veces de tres en rama, aserradas; y petalos exteriores de quatro en quatro.

Clematis foliis compositis decompositis, foliolis ternatis, serratis. Mill. ic. t. 284. Clematide de hojas compuestas y decompuestas; hojuelas de tres en rama y aserradas.

Cle-

444 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Clematis alpina, *Geranii* X Clematide alpina, con ho-
folia. C. B. P. 300. Prodr. X jas como las del Geranio.
 135. Pluk. alm. 109. t. 84.
 f. 7. Moris. hist. 3. sect. 15.
 t. 2. f. ultima. Tourn. p. 294. X

Cast. Atragene alpina.

Habita en el monte Baldo : en los de Austria y Sibe-
 ria. h 2

Echa las *hojas* dos veces de tres en rama , cortadas y radi-
 cales : los *escapos* de una flor : los quatro *petalos* exte-
riores lanceolados , grandes ; y los *interiores* lanceola-
 dos , ó aovados al revés y pequeños.

Ca-
pensis

2. ATRAGENE *foliis* X Atragene con hojas de tres
ternatis , *foliolis incisis* X en rama ; hojuelas cortadas,
dentatis , *petalis exteriori-* X dentadas ; y petalos exterior-
bus quinis. Berg. cap. 148. X res de cinco en cinco.

Pulsatilla foliis trifidis, X Pulsatila con hojas hendi-
dentatis , *flore incarnato* , X das en tres partes , dentadas ;
pleno. Burm. afr. 148. X flor encarnada y plena.

Pulsatilla Apii folio, *ri-* X Pulsatila con hoja como la
gido , *flore magno*. Herm. X del Apio , rígida ; y flor gran-
 afr. 18. X de.

Cast. Atragene del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. h 2

Produce el *escapo* sencillo y del largo de un gema : el *in-*
volucro en medio del *escapo* , compuesto de *estipulas*
ventricosas , aovadas , vellosas y como si fuesen *hojas* :
 las *hojas* de tres en rama ; con las *hojuelas* en forma de
 cuña , hendidas en tres partes , agudas , dentadas y des-
 nudas ; y la intermedia con el peciolo mas largo : cerca
 de veinte *petalos* blancos , de los quales los seis inferior-
 res son mas anchos , vellosos por debaxo y de color que
 tira á purpúreo : la *cabezuela* de las *semillas* aovada y
 con pelo áspero.

Zey-
lanica.

3. ATRAGENE *cirrhis* X Atragene de cirrhos con
diphyllis , *petalis exteriori-* X dos hojuelas ; y petalos exte-
bus quaternis. Flor. Zeyl. X riores de quatro en quatro.
 226. X

Atra-

Atragene. Amoen. acad. 1. X Atragene.

p. 105.

Clematis Zeylanica, *flo-* Clematide de Zeylan, con
ribus obsoletis, parvis. Herm. flores desfiguradas y peque-
Zeyl. 35. ñas.

Cast. Atragene de Zeylan.

Habita en Zeylan. *h*

Es planta que arroja tallos y que trepa:

eni-
lia.

4. ATRAGENE *foliis* X Argemone de hojas dos
duplicato-pinnatis, pinnulis X veces pinnadas, con hojue-
linearibus integris. Suppl. X las lineares y enteras.
p. 270. X

Cast. Atragene con hoja delgada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

842. Género CLEMATIS. * *Dill. elth.* 73.

Clematitis. *Tourn. t.* 150. *Viticella.*

Dill. gen. 14.

CAR. GEN. NAT.

CAL. ninguno.

COR. *Petalos* quatro, oblongos y laxos.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, alesnados y mas cortos que la corola: con las *anteras* pegadas al lado de ellos.

PIST. *Gérmenes* muchos, casi redondos, comprimidos; y que rematan en *estilos* alesnados, mas largos que los estambres: con los *estigmas* sencillos.

PERIC. ninguno. *Receptáculo* en cabezuela y pequeño.

SEM. muchas, casi redondas, comprimidas y adornadas con el *estilo* de varias figuras.

OBS. La *Clematide de Tournefort* tiene los *petalos* lanceolados; y las *semillas* con una cerda larguísima y vellosa.

La *Clematide Flamula* posee ocho *pistilos*: las *semillas* redondas, y con una pluma larguísima.

La *Clematide viticela* echa los *petalos* que se acercan

446 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

á la figura de delta : las *semillas* derechas , con una punta ganchosa y desnuda ; y cinco *petalos*.

La *Clematide de Virginia* y *Dioica* tienen el sexô dioico.

CLEMATITIS. Tourn. p. 293.

La *flor* es rosácea , que consta comunmente de quatro *petalos* y carece de *caliz* ; del centro de la *flor* sale el *pistilo* que pasa á *fruto*, en el qual, como en una *cabezuela*, se recogen las *semillas*, que rematan en un *capilamento* delgado y casi *plumoso*.

ESPECIES QUE TREPAN.

- | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cir-
rhosa. | 1. CLEMATIS foliis simplicibus, caule cirrhis oppositis scandente, pedunculis unifloris lateralibus. | Clematide con hojas sencillas; tallo que trepa con zarcillos opuestos; pedunculos de una flor y laterales. |
| | Clematidis peregrina, foliis Pyri incis. C. B. P. 300. Tourn. p. 293. | Clematide peregrina, con hojas como las del Peral y cortadas. |
| | Clematis altera, Bætica. Clus. hist. 1. p. 123. | Otra Clematide de Andalucía. |
| | Clematidis peregrina, foliis Pyri incis, nunc singularibus, nunc ternis. Tourn. cor. 20. | Clematide peregrina, con hojas como las del Peral, cortadas, unas veces de una en una, y otras de tres en tres. |

Cast. Clematide con zarcillos.

Habita entre Medina-sidonia y Gibraltar: y en otras partes de Andalucía, junto á las corrientes de las aguas, que cubre y deprime los árboles.

Posee los *zarcillos* opuestos y separados de las hojas: estas comunmente sencillas, aserradas, con peciolo, aovadas y que salen de unos mismos nudos del tallo: los *pedunculos* axilares, de una flor, con un *caliz* debajo, apartado, emisférico y menudo.

Viti-
cella. 2. CLEMATIS foliis com-
positis decompositisque, fo-
liolis ovatis sublobatis in-
tegerrimis. Hort. Cliff. 225. Clematide de hojas com-
puestas y decompuestas, con
hojuelas aovadas, unas casi
hendidas en lóbulos y otras
enterisimas.

Clematidis cœrulea vel
purpurea, repens. C. B. P. Clematide rastrera, con
la flor cerúlea, ó purpúrea.
300. Tourn. p. 294.

Clematidis altera. Clus. Otra Clematide.
hist. 1. p. 122. Cam. epit.
696.

Clematidis cœrulea, flore
pleno. C. B. P. 301. Tourn. Clematide con la flor
plena y de color cerúleo.
p. 294.

Cast. Clematide viticela.

Habita entre los vallados de Italia: en el Real Sitio de
Aranjuéz: montes de Sierramorena: arenales de la Ri-
vera de los molinos del Robledillo y otras partes de
España.

Tiene las hojas florales aovadas; y los petalos que se
acercan á la figura de delta, ó por arriba mas anchos.

Viorna 3. CLEMATIS foliis com-
positis decompositisque, fo-
liolis quibusdam trifidis. Clematide de hojas com-
puestas y decompuestas, con
algunas hojuelas hendidas en
tres partes.
Gron. virg. 62.

Flammula scandens, flore
violaceo, clauso. Dill. elth. Flamula trepadora, con
la flor de color de violeta y
cerrada.
144. t. 188. f. 444.

Clematis purpurea, re-
pens, petalis florum coria-
ceis. Rai. hist. 1928. Clematide purpúrea, ras-
trera, con los petalos cor-
reosos.

Cast. Clematide Viorna.

Habita en la Virginia y Carolina.

Crispa 4. CLEMATIS foliis sim-
plicibus ternatisque, folio-
lis integris trilobisve. Mill. Clematide de hojas senci-
llas y de tres en rama, con
hojuelas enteras, ó hendidas
en tres lóbulos.
diſt. n. 15.

Clematis flore crispo. Dill. elth. 86. t. 73. f. 84. Clematide con la flor rizada.

Cast. Clematide rizada.

Habita en la Carolina.

Orientalis.

5. CLEMATIS *foliis compositis, foliolis incisis angulatis lobatis cuneiformibus, petalis interne villosis*. Mill. dict. n. 11. Clematide de hojas compuestas, con hojuelas cortadas, anguladas, hendidas en lóbulos, en forma de cuña; y petalos vellosos por dentro.

Clematis Orientalis, Apii folio, flore è viridi flavescente, posterius reflexo. Tournef. cor. 20. Clematide Oriental, con hoja como la del Apio; flor de color entre verde y amarillo-roxo, y redoblada ácia atrás.

Flammula scandens, Apii folio, glauco. Dill. elth. 144. t. 119. f. 145. Flamula trepadora, con hoja como la del Apio, y de color garzo.

Cast. Clematide Oriental.

Habita en Oriente y Rusia. Pall. it. 2. p. 492.

Posee las flores cabizbaxas, con los petalos encorvados ácia atrás, y por encima vellosos.

Virginiana.

6. CLEMATIS *foliis ternatis, foliolis cordatis sublobato-angulatis scandentibus, floribus dioicis*. Amoen. acad. 4. p. 274. Clematide de hojas de tres en rama, con hojuelas de figura de corazon, entre casi hendidas en lóbulos y anguladas, trepadoras; y flores dioicas.

Clematis Virginiana, Pannonicæ similis. Pluk. mant. 51. t. 389. f. 4. Clematide de Virginia, semejante á la de Pannonia.

Clematis Floridensis, flore albo, odoratissimo. Albin. anat. 1. p. 79. t. 7. Clematide de la Florida, con la flor blanca y muy olorosa.

Clematis aquatica, trifoliata, late scandens, floribus albis, odoratis. Gron. virg. 62. n. 270. Clematide aquatica, que trepa lexos, con hojas de tres en rama; flores blancas y olorosas.

Cast.

Cast. Clematide de Virginia.

Habita en la America Septentrional. \hbar

La flor femenina tiene estambres; pero con las anteras que carecen de polvillo.

Dioica 7. CLEMATIS foliis ternatis integerrimis, floribus dioicis. Amoen. acad. 6. p. 398. Mill. dict. n. 13. Clematide con hojas de tres en rama, enterisimas; y flores dioicas.

Clematis scandens, foliis quinquenerviis, ovatis, nitidis, pinnato-ternatis. Brown. jam. 255. Clematide trepadora, con hojas de cinco nervios, acovadas, lustrosas, entre pinnadas y de tres en rama.

Clematis prima, seu sylvestris, latifolia, foliis ternis. Sloan. jam. 84. hist. 1. p. 199. t. 128. f. 1. Clematide primera ó silvestre, con hojas de tres en rama y anchas.

Cast. Clematide dioica.

Habita en la America mas caliente.

Vi- 8. CLEMATIS foliis pin- talba. natis, foliolis cordatis scandentibus. Jacq. aust. t. 308. Clematide de hojas pinnadas, con hojuelas de figura de corazon y trepadoras.

Clematis latifolia, integra. Bauh. hist. 2. p. 125. Clematide con hojas anchas y enteras.

Clematis tertia. Cam. epit. 697. Clematide tercera.

α Clematis latifolia, dentata. Bauh. hist. 2. p. 125. Clematide con hoja ancha y dentada. α

Vitalba. Dod. pempt. 404. Vidalba.

β Clematis sylvestris, latifolia. C. B. P. 300. Tourn. p. 298. Clematide silvestre, de hoja ancha. β

Cast. Clematide vidalba.

Habita en las cercas de la Europa austral: en Aragon, Cataluña y otras muchas partes de España. \mathcal{Z}

Tiene los petalos correosos: y varía con las hojuelas enteras ó cortadas.

Flam- 9. CLEMATIS *foliis in-* X Clematide con las hojas
mula. *ferioribus pinnatis lacinia-* X inferiores pinnadas, lacinia-
tis, summis simplicibus in- X das, y las de mas arriba sen-
tegerrimis lanceolatis. Hort. X cillas, enterisimas y lanceo-
Cliff. 225. Knorr. del. 1. t. X ladas.

C. 9.

Clematis caule scandente, X Clematide con el tallo tre-
foliis pinnatis, trilobatis. X pador; hojas pinnadas y
Hall. helv. n. 1143. X hendidas en tres lóbulos.

Clematis foliis pinnatis, X Clematide de hojas pinna-
foliolis alternis, caulinis fle- X das, con hojuelas alternas,
xuosis, scandentibus. Ger. X las del tallo ondeadas y que
prov. 382. X trepan.

Clematis sive Flammula X Clematide ó Flamula ras-
repens. C. B. P. 300. Tourn. X trera.
p. 293.

Clematis sive Flammula X Clematide ó Flamula tre-
scandens, tenuifolia, alba. X padora, con hoja delgada;
Bauh. hist. 2. p. 227. X y flor blanca.

Flammula. Dod. pempt. X Flamula.
404. Dalech. hist. 1171. X

Cast. Clematide Flamula.

Habita en los vallados de Mompeller y Suevia: en Mont-
serrat y otras partes de Cataluña. ¶

Hexa- 10. CLEMATIS *foliis* X Clematide de hojas com-
petala. *compositis, foliolis ovatis* X puestas con hojuelas aova-
serratis, pedunculis diphyll- X das, aserradas; pedunculos
lis, corolla patente hexape- X de dos hojuelas; corola ex-
tala. Suppl. p. 271. X tendida y de seis petalos.

Cast. Clematide de seis petalos.

Habita en la Nueva Zeelanda. Back.

Tiene las flores de color que tira á amarillo.

ESPECIES LEVANTADAS.

Ma- 11. CLEMATIS *foliis pin-* X Clematide con hojas pin-
ritima. *natis linearibus, caulibus* X nadas, lineares; tallos sen-
simplicibus hexagonis. X cillos, y de seis lados.

Cle-



Clematis maritima ; re-
pens. C. B. P. 300. Prodr. 135. Tourn. p. 294. Clematide maritima , ras-
trera.

Cast. Clematide maritima.

Habita en las playas del mar Adriático , de Venecia , y Mompeller : en las de Barcelona desde el fuerte de San Carlos ácia el Castillo de Móngat. ¶

Produce el tallo compuesto de muchos sármientos tendidos y otros derechos : las *hojuelas* opuestas , pinnadas , comunmente con cinco pares de hojuelas apartadas , lineares , algo rígidas , casi sentadas , lisas , indivisas , ó rara vez hendidas en dos ó tres partes. Algunos autores como *Magnol* y *Raio* la tienen por variedad de la *Clematide flamula* ; pero *Linneo* la juzgó por variedad de la *recta*.

Recta. 12. CLEMATIS *foliis pinnatis , foliolis ovato-lanceolatis integerrimis , caule erecto , floribus pentapetalis tetrapetalisque.* Hort. Cliff. 225. Jacq. austr. t. 391. Clematide de hojas pinnadas , con hojuelas entre acovadas y lanceoladas , enterisimas ; tallo derecho ; flores unas de cinco petalos y otras de quatro.

Flammula recta. C. B. P. 300. Tourn. p. 294. Flamula recta.

Clematis sive Flammula surrecta, alba. Bauh. hist. 3. p. 127. Tourn. p. 294. Clematide ó Flamula levantada , con la flor blanca.

Flammula. Cam. epit. 698. Clus. hist. 1. p. 124. Flamula.

Cast. Clematide recta.

Habita en los collados de Austria , Pannonia , Tartaria , Mompeller y Suiza : en el Real Sito de Aranjuez : en el lugar de Fuenfria , junto á la Cartuja del Paular de Segovia y otras partes de España. ¶

Tiene las *umbelas* levantadas , enxutas y rígidas.

In-
regri-
folia.

13. *CLEMATIS foliis simplicibus sessilibus ovato-lanceolatis, floribus cernuis.* Hort. Cliff. 225. Jacq. austr. t. 363. Clematide con hojas sencillas, sentadas, entre aovadas y lanceoladas; y flores cabizbaxas.

Clematis cœrulea, erecta. C. B. P. 300. Tourn. p. 294. Clematide derecha, con la flor cerúlea.

Clematis cœrulea, Pannonica. Clus. hist. 123. Clematide de Pannonia, con la flor cerúlea.

Cast. Clematide con hoja entera.

Habita en Hungria y Tartaria. ¶

Posee los *petalos* correosos.

PROPIED. Todas las especies de este género comunmente son acres y carrosivas.

843. Género THALICTRUM. * Tourn. t. 270.

CAR. GEN. NAT.

CAL. ninguno; sino que sea la corola.

COR. *Petalos* quatro, casi redondos, obtusos, cóncavos, y que se caen al abrirse.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, mas anchos por arriba, comprimidos, mas largos que la corola: con las *anteras* oblongas y derechas.

PIST. *Gérmenes* muchos, comunmente con piececito, casi redondos: *estilo* ninguno: y *estigmas* gruesecitos.

PERIC. ninguno.

SEM. muchas, asurcadas, aovadas, y sin cola.

OBS. El *Thalictro tuberoso* y el de *cuernecillos* tienen la corola de cinco *petalos*.

El *Thalictro con hoja de Aquilegia* y el *torcido* poseen las semillas con piececito, pendulas, de tres caras y aladas.

El número de los estambses y pistilos es tambien diverso en diferentes especies.

CARAC. GENER. DE TOURN. p. 270.

La flor es rosácea ó que consta de muchos *petalos* puestos en cerco; de cuyo centro sale un monton de estambres que

que ciñe al pistilo , el qual pasa á fruto , en que se recogen las capsulas, como en una cabezuela, unas veces con alas y otras sin ellas, llenas de una semilla oblonga.

E S P E C I E S.

Alpi-
num. 1. **TALICTRUM** caule *simplicissimo subnudo , racimo simplici terminali.* Fl. dan. t. 11. Thalictro con el tallo muy sencillo , casi desnudo ; racimo sencillo y terminal.

Talictrum montanum, minimum, præcox, foliis splendentibus. Moris. hist. 3. p. 325. sect. 9. t. 20. f. 14. Thalictro montano , muy pequeño , temprano , con hojas resplandecientes.

Cast. Thalictro alpino.

Habita en los alpes de Lapponia y Auvernia. ¶

Tiene doce estambres , ocho pistilos ; y el racimo sencillo , con flores cabizbaxas.

Fœtidum. 2. **THALICTRUM** caule *paniculato filiformi ramosissimo folioso.* Mill. dict. n. 8. Thalictro de tallo en panocha , filiforme , muy ramoso y con hojas.

Talictrum foliis patulis, pubescentibus, trilobatis, floribus nutantibus , petalis subhirsutis. Hall. helv. n. 1140. Thalictro de hojas extendidas , vellosas , hendidas en tres lóbulos ; flores inclinadas ; y petalos con algun pelo áspero.

Talictrum minimum, fœtidissimum. C. B. P. 337. Prodr. 147. Bauh. hist. 3. p. 488. Burs. XIX. 49. Moris. hist. 3. p. 325. sect. 9. t. 20. f. 13. Pluk. alm. 367. t. 65. f. 4. Tourn. p. 271. Thalictro muy pequeño y fetidisimo.

Cast. Thalictro fétido.

Habita en Mompeller y Suiza &c. ¶

Tiene el olor de pescado rancio.

454 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Tuberorum.

3. **THALICTRUM floribus pentapetalis**, radice tuberosa. Mill. ic. t. 265. f. 2. Thalictro con flores de cinco petalos; y raiz tuberosa.

Thalicttrum minus, Asphodeli radice, magno flore. Tourn. p. 271. Thalictro menor, con la raiz como la del Asphodelo; y flor grande.

Ranunculus Thalictri folio, Asphodeli radice. Moris. hist. 2. p. 438. sect. 4. t. 28. f. 13. Ranunculo con hoja semejante á la del Thalictro; y raiz como la del Asphodelo.

Oenanthe Hederæ foliis. C. B. P. 163. Enanthe con hojas como las de la Yedra.

Cast. Thalictro tuberoso.

Habita en Aragon, Cataluña y Pirineos. ¶

Cornuti.

4. **THALICTRUM floribus pentapetalis**, radice fibrosa. Roy. Lugdb. p. 436. Thalictro con flores de cinco petalos; y raiz fibrosa.

Thalicttrum Canadense. Corn. Canad. 186. Thalictro del Canadá.

Thalicttrum majus, foliis Aquilegiæ, flore albo. Moris. hist. 3. p. 325. Thalictro mayor, con hojas como las de la Aquilegia; y flor blanca.

Cast. Thalictro de Cornuto,

Habita en el Canadá. ¶

Dioicum.

5. **THALICTRUM floribus dioicis**. Mill. dict. n. 9. Thalictro con flores masculinas en un pie de planta, y femeninas en otro.

Cast. Thalictro dioico.

Habita en el Canadá. Kalm.

Produce el tallo casi del largo de un pie y recto: las flores de quatro petalos, blancos; con quarenta estambres tambien blancos, y las anteras de color amarillo-roxo: las hojuelas cabizbaxas, con cuya nota se distingue facilmente: las flores femeninas con los estilos setáceos, y mas largos que en las demas especies.

Minus.

6. *THALICTRUM foliis sexpartitis , floribus cernuis.* Fl. dan. t. 244.

Thaliçtro con hojas divididas en seis partes ; y flores cabizbaxas.

Thaliçtrum foliis patulis , imis obtuse trilobis , supremis acutis , panicula diffusa , floribus nutantibus. Hall. helv. n. 1139.

Thaliçtro con hojas extendidas , las de abaxo hendidas en tres lóbulos obtusos , las de mas arriba agudas ; panoja difusa ; y flores inclinadas.

Thaliçtrum minus. C. B. P. 335. Dod. pempt. 58. Tourn. p. 271.

Thaliçtro menor.

Thaliçtrum minus , sive Rutæ pratensis genus minus , semine striato. Bauh. hist. 3. p. 487.

Thaliçtro menor , ó género menor de Ruda pratense , con la semilla estriada.

Cast. Thaliçtro menor.

Habita en los prados de Europa ; en los contornos de Madrid , junto al arroyo brifigal , y otras partes de España. 24

Se conoce tambien por los ápices de las hojas de color purpúreo , y por una telilla de color cerúleo que tiene en el tallo.

Sibiricum.

7. *THALICTRUM foliis tripartitis , foliolis subreflexis argute incisís , floribus cernuis.*

Thaliçtro de hojas divididas en tres partes , con hojuelas algo redobladas , agudamente cortadas ; y flores cabizbaxas.

Thaliçtrum alpinum , minus , saxatile , Rutæ folio , staminibus luteis. Segui. ver. 1. p. 476. t. 11 ?

Thaliçtro alpino , menor , saxátil ; con hoja como la de la Ruda ; y estambres amarillos.

Cast. Thaliçtro de Siberia.

Habita en la Siberia. Gmel.

Su traza es como la del *Thaliçtro menor* , ó como la del *Thaliçtro que tira á color purpúreo* ; pero sus hojuelas son seis veces mas pequeñas , de color garzo como el de la *Ruda* , ó el de la *Fumaria*. Tiene el tallo verde , con mucha panoja y obscura en sus divisiones.

THA-

456 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Pur-
puras-
cens.

8. THALICTRUM foliis tripartitis, caule foliis duplo altiore, floribus cernuis.

Thalictro con las hojas divididas en tres partes; tallo dos veces mas alto que las hojas; y flores cabizbaxas.

Thalictrum Virginianum, elatius, glaucum, staminibus purpurascens. Morris. hist. 3. p. 324.

Thalictro de Virginia, mas levantado, de color garzo, con los estambres de color que tira á purpúreo.

Cast. Thalictro de color que tira á purpúreo.

Habita en el Canadá. \mathcal{L}

Posee los cálices casi purpúreos: quatro petalos: catorce estambres; y ocho pistilos: el tallo que tambien tira á purpúreo y sin telilla, la mitad mas pequeño que el Thalictro menor, y sin el color purpúreo en el ápice de las hojuelas.

Angustifolium.

9. THALICTRUM foliis lanceolato-linearibus integerrimis. Amœn. Acad. 3. p. 48.

Thalictro con hojuelas entre lanceoladas y lineares, y enterisimas.

Thalictrum pratense, angustissimo folio. C. B. P. 337. Prodr. 146. Pluk. alm. 364. t. 65. f. 6. Tourn. p. 251.

Thalictro pratense, con hoja muy angosta.

Cast. Thalictro de hoja muy angosta.

Habita en Alemania. \mathcal{H}

Tiene quatro petalos: diez y seis estambres: siete pistilos; y es parecido al Thalictro de color amarillo-roxo.

Flavum.

10. THALICTRUM caule folioso sulcato, panicula multiplici erecta. Hort. Cliff. 226.

Thalictro de tallo con hojuelas, asurcado; panoja multiplicada, y derecha.

Thalictrum foliis erectis, lobulis acute trilobis, spica ascendente. Hall. helv. n. 1138.

Thalictro con hojas derechas, lóbulos hendidos agudamente en otros tres; y la espiga ascendente.

Thalictrum nigrius, caule & semine striato. Bauh. hist. 3. p. 487.

Thalictro de color mas negro; con el tallo y semilla estriados.

Tha-

Thalictrum majus, siliqua angulosa aut striata. Thaliétro mayor, con la siliqua angulada ó estriada.

C. B. P. 336. Tourn. p. 270.

Thalictrum magnum. Dod. Thaliétro grande.

pempt. 58.

Thalictrum flavum, speciosum. Thaliétro hermoso, de color amarillo-roxo.

Thalictrum caule anguloso, foliis linearibus bifidis trifidisque, panicula multiplici erecta. Mill. dict. n. 2. Thaliétro con el tallo anguloso; hojas lineares, hendidas en dos partes y en tres; panoja multiplicada y derecha.

Thalictrum majus, flavum, floribus luteis, seu glauco folio. C. B. P. 136. Thaliétro mayor, de color amarillo-roxo; con flores amarillas; ú hoja de color garzo.

Tourn. p. 270.

Thalictrum speciosissimum, glaucum, semine & caule striato. Bauh. hist. 3. Thaliétro muy hermoso, de color garzo; con la semilla y tallo estriados.

p. 486.

Thalictrum magnum, tertium. Dod. pempt. 58. Thaliétro grande, tercero.

Cast. Thaliétro de color amarillo-roxo.

Habita en lugares algo húmedos de la Europa Septentrional: en el Soto-luzon, prados de la Cartuja del Paular de Segovia, montes de Guadalaxara: en Aragon, Cataluña y otras partes de España. ¶

Posee quatro *petalos*: veinte y quatro *estambres*; y diez hasta diez y seis *pistilos*.

Sim-plex. II. THALICTRUM caule folioso simplicissimo angulato. Oed. dan. 244. Fl. do. Thaliétro de tallo con hojas, muy sencillo y angulado.

Suec. 2. p. 490.

Cast. Thaliétro sencillo.

Habita en Suecia y Dinamarca. ¶

Se diferencia del Thaliétro amarillo-roxo en quanto es la mitad mas pequeño: por las flores inclinadas con los petalos verdes: por los catorce filamentos de color que tira

458 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

ra á purpúreo : por la *panoja* mas rala; y por las *hojas* mas angostas.

- Lu-
cidum. 12. **THALICTRUM** cau-
le folioso sulcato, foliis li-
nearibus carnosis. Dalib. y carnosas,
par. 162. Thalictro de tallo con ho-
jas, asurcado ; hojas lineares
- Thalicttrum minus, lucidum, Libanotidis coronariæ foliis.* Pluk. alm. 363. t. 65. f. 5. Thalictro menor, lustroso,
con hojas como las de la Li-
banotide de coronas.
- Thalicttrum minus, alterum, Parisiensium, foliis crassioribus & lucidis.* Tournef. p. 271. Otro Thalictro menor, de
los de Paris, con hojas mas
crasas y lustrosas.
- Thalicttrum V, vel pratense I.* Clus. hist. 1. p. 233. Thalictro quinto, ó pra-
tense primero,
234.

Cast. Thalictro lustroso,

Habita en París y en España,

Acaso es planta bastante distinta del *Thalictro de color amarillo-roxo*? Parece variedad suya.

- Aqui-
legifo-
lium. 13. **THALICTRUM** fruc-
tibus pendulis triangulari-
bus rectis, caule tereti. Jacq. Thalictro con los frutos
pendulos, triangulares, rec-
tos ; y tallo rollizo.
austr. t. 318.
- Thalicttrum foliis triplicato-pinnatis, patulis, obtuse, trilobatis, stipulis ovatis, paniculis umbellatis.* Hall. Thalictro con hojas tres
veces pinnadas, extendidas,
hendidas en tres lóbulos ob-
tusos; estipulas aovadas; y
panojas en umbela.
helv. n. 1141.
- Thalicttrum majus, florum staminibus purpurascen-
tibus.* C. B. P. 337. Thalictro mayor, con los
estambres de las flores de co-
lor que tira á purpúreo.
- Thalicttrum alpinum, Aquilegiæ foliis, florum staminibus purpurascen-
tibus.* Tourn. p. 270. Thalictro alpino, con ho-
jas como las de la Aquilegia;
y los estambres de las flores
de color que tira á purpúreo.

Thalictrum majus, foli-
culis angulosis, caule laevi. Thalicthro mayor, con los
Bauh. hist. 3. p. 487. foliculos angulosos; y tallo
X liso,

Cast. Thalicthro con hoja de Aquilegia.

Habita en Scania, Suiza, Austria é Ingria; en la Alcarria, montes de Burgos, de Asturias, Cataluña y otras partes de España. ¶

Tiene quatro *petalos*; cinquenta hasta sesenta *estambres*; y siete hasta diez y seis *pistilos*.

Con-
trum

14. THALICTRUM fruc-
tibus pendulis triangula-
ribus contortis, caule sub-
ancipiti. Thalicthro con frutos pen-
dulos, triangulares, torci-
dos; y tallo casi de dos filos.

Thalictrum hybridum, se-
minibus contortis. Amoenit. Thalicthro hybrido, con las
acad. 3. p. 47. semillas torcidas.

Cast. Thalicthro torcido.

Habita en la Siberia. Demidoff. ¶

Tiene quatro *petalos*; sesenta *estambres*: ocho *pistilos*, y es semejante á la antecedente, pero mas baxa; y con flores blancas.

Petalo-
dum.

15. THALICTRUM sca-
po subumbellato, florum fi-
lamentis oblanceolatis colo-
ratis anthera latioribus. Thalicthro con el escapo
casi en umbela; filamentos
de las flores lanceolados al
revés, de color, y mas an-
chos que la antera.

Cast. Thalicthro con estambres como petalos.

Habita en Dauria. Pall. it. 3. p. 231. ¶

Echa dos hojas radicales sobredecompuestas; pero mucho menores que las restantes; con las *hojuelas* aovadas, obtusas, y las mas veces hendidas en tres lóbulos: el *escapo* del largo de un pie, poco mas ó menos, estriado, sin hojas, bien que alguna vez se halla con una decompuesta, y un pedunculo lateral: las *flores* amontonadas, y casi en umbela terminal: el *caliz* redondeado y de quatro *hojuelas* que se caen quando las demas partes de la flor: numerosos *estambres*; con sus *filamentos*
mem^s

460 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

membranosos, mas ensanchados por arriba y encarnados; con las *anteras* mas angostas: y los *gérmenes* setados.

Stam-
neum.

16. THALICTRUM *staminum filamentis petaliformibus lanceolatis.* Suppl. p. 271. Thalictro con los filamentos de los estambres en forma de petalos, y lanceolados

Cast. Thalictro estambroso.

Habita en la Siberia.

Echa la *raiz* fibrosa y negra: el *tallo* del largo de un pie sencillo, las mas veces con un solo ramo, algo es- triado, y por su base de color de violeta: las *hojas* entre triternadas y pinnadas; dos ó tres *radicales* y una sola en el tallo: las *hojuelas* pequeñas, aovadas, obtusas, y las de mas afuera divididas en tres partes: la *panoja* blanca y amontonada: los *pedunculos* de una flor: los *filamentos* como si fuesen petalos, lanceolados, de color, nerviosos y extendidos: con las *anteras* muy angostas. Acaso es variedad de la antecedente?

Styloi-
deum.

17. THALICTRUM *foliis tripartito-pinnatis, stylis basi alatis.* Suppl. p. 271. Thalictro con hojas entre divididas en tres partes, y pinnadas; y estilos alados por su base.

Cast. Thalictro con estilos alados.

Habita en la Siberia. 2

Produce el *tallo* con una ú otra hoja: las *hojas radicales* y del tallo divididas en tres partes dos veces pinnadas; las *hojuelas* casi de figura de corazon, con tres ó cinco dientes: y la *panoja* terminal.

844. Género ADONIS. * *Dill. gen. 4.*

CAR. GEN. NAT.

- CAL. *Periantio* de cinco hojuelas, obtusas, cóncavas, un poco de color, y que se caen quando las demas partes de la flor.
- COR. *Petalos* cinco hasta quince, oblongos, obtusos y lustrosos.
- ESTAMB. *Filamentos* muchos, cortísimos, alesnados: con las *anteras* oblongas, y dobladas ácia adentro.
- PIST. *Gérmenes* numerosos, recogidos en cabezuela: *estilos* ninguno: *stigma* agudo y redoblado.
- PERIC. ninguno. *Receptáculo* oblongo y espigado.
- SEM. numerosas, irregulares, anguladas, gibosas por su base, redobladas en su ápice, que sobresalen, y sin arista.

ESPECIES.

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. ADONIS <i>floribus pentapetalis, fructibus ovatis.</i> Knorr. del. 2. t. A. 12.</p> | <p>X Adonis con flores de cinco petalos; y frutos aovados.</p> |
| <p><i>Adonis sylvestris, flore phæniceo, ejusque foliis longioribus.</i> C. B. P. 178.</p> | <p>X Adonis silvestre, con la flor de color de datil; y sus hojas mas largas.</p> |
| <p><i>Ranunculus arvensis, foliis Chamæmeli, flore phæniceo.</i> Tourn. p. 291.</p> | <p>X Ranunculo arvense, con hojas como las de la Manzanilla; y flor de color de datil.</p> |
| <p><i>Adonis flore pallido.</i> Cam. epit. 648.</p> | <p>X Adonis con la flor pálida.</p> |
| <p><i>Adonis.</i> Matth. 906.</p> | <p>X Adonis.</p> |

Cast. Adonis de verano.

Habita entre los sembrados de la Europa austral: en los contornos de Madrid, Aragon, Catalufia, y otras partes de España. ☉

Es muy parecida á la *Adonis de otoño*. Varía con las flores de color amarillo-blanco; con una mancha negra ó de color violado por dentro en su base; y con cinco hasta ocho petalos.

ADO-

462 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

<p>At- tunna- lis.</p>	<p>2. ADONIS floribus octopetalis, fructibus subcylindricis. Hort. ups. 156.</p>	<p>Adonis con las flores de ocho petalos ; y frutos cilindricos.</p>
<p>α</p>	<p>Adonis flore majore. C.B. P. 178.</p>	<p>Adonis con la flor grande. α</p>
	<p>Adonis hortensis, flore minore, atrorubente. C. B. P. 178.</p>	<p>Adonis hortense, con flor mas pequeña, y de color entre negro y roxo.</p>
	<p>Ranunculus arvensis, foliis Chamæmeli, flore minore, atro-rubente. Tourn. p. 291.</p>	<p>Ranunculo arvense, con hojas como las de la Manzanilla ; flor mas pequeña, de color entre negro y roxo.</p>
	<p>Eranthemum. Dod.pempt. 260.</p>	<p>Eranthemo.</p>
	<p>Flos Adonis. Clus. hist. 1. p. 336.</p>	<p>Flor de Adonis.</p>

Cast. Adonis de Otoño.

Habita entre los sembrados de la Europa austral : en los circuitos de Madrid : Real Sitio de Aranjuez y otras partes de España. ○

Tiene una sola flor y las ramas estériles.

<p>-Ver- nalis.</p>	<p>3. ADONIS flore dodecapetalo, fructu ovato. Mill. ic. t. 14.</p>	<p>Adonis con flor de doce petalos ; y fruto aovado.</p>
	<p>Adonis radice perenni, flore dodecapetalo. Hall.helv. n. 1157.</p>	<p>Adonis con la raiz perenne ; y flor de doce petalos.</p>
	<p>Adonis (Helleborus) perennis, petalis plus octo. Crantz. austr. p. 110.</p>	<p>Adonis (Eleboro) perenne, con mas de ocho petalos.</p>
	<p>Adonis seminibus æqualibus, apice crassioribus, infra apicem stylatis, hirsutis. Gou. illustr. 33.</p>	<p>Adonis de semillas iguales, con pelo áspero, mas gruesas por su ápice, y con un punzoncito baxo de él.</p>
	<p>Adonis apennina. Jacq. austr. t. 44. Syst. veg. 427.</p>	<p>Adonis del monte apennino.</p>
	<p>Helleborus niger, tenuifolius, Buphthalmi flore. C. B. P. 186.</p>	<p>Eleboro negro, con hoja delgada ; y flor como la del Buphthalmo.</p>

Ranunculus fœnicula- X Ranunculo con hojas pa-
ceis foliis, *Hellebori nigri* X recidas á las del Hinojo; y
radice. Tourn. p. 291. X raiz como la del Eleboro ne-
 gro.

Bupthalmum. Dod. pemp. X Buphalmo.
 261. X

Cast. Adonis de primavera.

Habita en cerros abrigados de Oelandia, Prusia, Bohe-
 mia y Suiza: en la Serrania de Cuenca, y en las faldas
 de los Pirineos de Cataluña y otras partes de España. ¶
 Es hermana de la *Adonis apenina*, como la de verano lo
 es de la de otoño.

Tiene el tallo salpicado de pelos; con las ramas que sa-
 len de su parte inferior: el pedunculo cortísimo: las
 hojas menos pinnadas: el caliz de color gris, estria-
 do, veloso y cóncavo: las mas veces doce petalos, lan-
 ceolados y una sola flor. Es planta de primavera.

Apen-
 mina.

4. ADONIS *floribus pent-* X Adonis con flores de cinco
decapetalis, *fructu ovato*. X hasta diez petalos; y fruto
 Pall. it. 2. p. 93. & 388. X aovado.

Adonis seminibus angu- X Adonis de semillas angu-
latis, *acuminato-mucrona-* X ladas, agudas con punta
ris, *glabris*. Gou. illustr. X rigida y lampiñas.
 p. 33. R.

Helleborus niger, *Feru-* X Eleboro negro, de hojas
laceus, *caule geniculato*, X como las de la Ferula; tallo
flore magno, *Tulipæ mino-* X con nudos; y flor grande
ris instar. Mentz. pug. t. 3. X como la de la Tulipa menor.
 f. 1. X

Cast. Adonis apenina.

Habita en la Siberia y montes Apeninos. ¶

Es planta de muchas flores; con ramas tambien floríferas
 y muy semejante á la especie antecedente. Produce el
 tallo con puntos harinosos y relucientes; y las ramas
 que salen de las axilas superiores: el pedunculo mas
 largo que el de la especie antecedente: las hojas mas
 divididas, mas anchas y mas lustrosas que las de aque-
 lla: el caliz de color entre amarillo y verde, lampiño,
 sin

sin venas y plano: las mas veces quince *petalos* aovados y apiñados; y los *estambres* muy redoblados.

- Ca- 5. ADONIS *floribus de-* Adonis con flores de diez
pensis- *capetalis, fructibus depres-* petalos; frutos deprimidos;
sis, foliis duplicato-terna- hojas dos veces de tres en
tis, foliolis serratis corda- rama, con sus hojuelas aser-
tis. Bergius. cap. 149. radas y de figura de corazon.
- Adonis foliis biternatis,* Adonis de hojas biterna-
foliolis subcordatis. Suppl. das, con hojuelas casi de fi-
p. 272. gura de corazon.
- Actæa trifoliata, hirsu-* Actea de tres en rama, con
ta, foliis scabris, flore sul- pelo áspero; hojas ásperas;
phureo, rariore. Burm. afr. flor mas clara y de color de
147. t. 51. azufre.
- Ranunculus Æthiopicus,* Ranunculo de Etiopia,
foliis rigidis, floribus ex- con hojas rígidas; y flores
luteo virescentibus. Comm. de color que de amarillo ti-
hort. 1. p. 1. t. 1. Rai. Sup- ra al de verde.
pl. p. 316.
- Imperatoria Ranunculoi-* Imperatoria Africana, pa-
des, Africana, enneaphyllos, recida al Ranunculo, con
Laserpitii lobatis foliis, ri- nueve hojuelas hendidas en
gidis, margine spinosis. lóbulos, como las del Laser-
Pluk. alm. 198. t. 95. f. 2. picio, rígidas, y por su mar-
gen espinosas.

Cast. Adonis del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ¶

Posee las *hojas* dos veces de tres en rama y radicales; las *hojuelas* casi de figura de corazon, aserradas, rígidas; y los *peciolos* con pelo áspero: los *escapos* sin hojas, rollizos, pelosos y terminados en una umbela compuesta: los *involucros universales y parciales* de seis hojuelas, lanceoladas: tres *pedunculos* parciales, exteriores; tres *interiores* y uno *central* con una flor, y los restantes con cuatro: el *caliz* de cinco hojuelas, entre aovado y oblongo, cóncavo y blanquecino: diez *petalos* lanceolados, blancos y al doble mas largos que el caliz: muchos *filamentos* lineares, la mitad mas cortos que los *petalos*; con dos *anteras* aovadas y pequeñas:

mu-

muchos *pistilos* amontonados en cabezuela: los *estilos* doblados ácia fuera, del largo de los estambres; con los *estigmas* obtusos.

Vease la *Imperatoria menor* parecida al *Ranunculo de hoja como la del Esfondilio*, con pelo áspero. *Pluk. mant.* 108.

Filia. 6. ADONIS *foliis bipin-*X *Adonis* de hojas dos ve-
natis, *foliolis linearibus*X ces pinnadas, con hojuelas
pinnatifidis. Suppl. p. 271. X lineares y hendidas al través.

Cast. Adonis hija.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Parece hija de la *Adonis del Cabo de Buena-esperanza*, á la qual se asemeja tanto, que nada se diferencia en el tallo, en la umbela, caliz, petalos, estambres y pistilos.

Tiene las *hojas de la umbela* pinnadas como las del *Dauco*: las *hojas parciales inferiores* con el peciolo mas largo: las *hojas propias* hendidas al través; y las *hojuelas* desigualmente dentadas.

Vesi-
 aatoria 7. ADONIS *foliis biter-*X *Adonis* de hojas biterna-
natis, *foliolis serratis gla-*X das, con hojuelas aserradas,
bris, *floribus decapetalis.*X lampiñas; y flores de diez
 Suppl. p. 272. X petalos.

Cast. Adonis vexigatoria.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Los Africanos usan las hojas para vexigatorios.

845. Género RANUNCULUS. * *Tourn. t.* 149.

Ficaria. *Dill. gen.* 5. Ranunculoides.

Vaill. A. G. 1719.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de cinco hojuelas, aovadas, cóncavas, algo de color, y que se caen quando las demas partes de la flor.

COR. *Petalos* cinco, obtusos, lustrosos y con uñas pequeñas.

Nectario: un hoito sobre la uña de cada petalo.

ESTAMB. *Filamentos* muchos, la mitad mas cortos que la corola: con las *anteras* derechas, oblongas, obtusas y mellizas.

PIST. *Gérmenes* numerosos, recogidos en cabezuela: *estilos* ninguno: *estigmas* redoblados y muy pequeños.

PERIC. ninguno: el *receptáculo* con pedunculos muy menudos abraza las semillas.

SEM. muchas, irregulares, de figura incierta, desnudas y redobladas por su ápice.

OBS. El caracter esencial de este género consiste en el nectario. Las restantes partes de la fructificacion son siempre inconstantes; por lo que desconociendose el nectario ha habido tanta confusion en este género.

Este *nectario* en algunas especies es un poro desnudo; en otras ceñido con una margen cilindrúcea; y en otras cerrado con una escamita escotada.

La *Ficaria* tiene el *caliz* de tres hojuelas y muchos *petalos*.

El *Ranunculo hederaceo* posee solamente cinco *estambres*.

El *encorvado* tiene las *semillas* con cola en forma de espada; y el *caliz* con apéndices en su base.

El *escelerato* ó sea *malvado* produce el *receptáculo* alesnado; y el *fruto* en espiga corta.

En algunas especies se hallan las *semillas* casi redondas, y en otras deprimidas y erizadas.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 285.

La *flor* es rosácea ó que consta de muchos *petalos* puestos en cerco, y de un *caliz* comunmente hendido en muchas partes. Del centro de la flor sale el *pistilo* que pasa á *fruto* casi globoso, ó cilindrúceo, ó en espiga, á cuyo *exe* ó *receptáculo* se arriman muchas *semillas* las mas veces desnudas.

ESPECIES CON HOJAS SENCILLAS.

Flam-
mula.

1. RANUNCULUS *foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato.* Flor. dan. Ranunculo de hojas entre ovadas y lanceoladas, con peciolo; y tallo inclinado.

t. 575.

Ranunculus longifolius, palustris, minor. C. B. P. Ranunculo palustre, menor y de hoja larga.

180. Tourn. p. 292.

Ranunculus longifolius, aliis Flammula. Bauh. hist. Ranunculo de hoja larga, llamado por otros Flammula.

3. App. 864.

Flammula ranunculus. Flamula ranunculo.

Dod. pempt. 432.

Ranunculus palustris, foliis serratis. C. B. P. 180. Ranunculo palustre, con hojas aserradas.

Dod. pempt. 432. Tourn. p.

292.

Cast. Ranunculo flamula ó sea que aplicado inflama.

Habita entre pastos húmedos de Europa: en la Real Casa de Campo: circuitos del Real Sitio de Aranjuez: en Aragon, Cataluña y otras partes de España. ♀

Rep-
tans.

2. RANUNCULUS *foliis linearibus, caule repente.* Ranunculo con hojas lineares; y tallo rastrero.

Flor. lapp. 236. t. 3. f. 5.

Ranunculus caule reptante, foliis linearibus, fasciculatis. Hall. helv. n. 1183. Ranunculo con el tallo rastrero; hojas lineares y en hacesillo.

Ranunculus repens, foliis gramineis, è singulis geniculis radices agens. Amm. Ranunculo rastrero, con hojas como de grama, y que de cada nudo echa raices.

ruth. 80. t. 13. f. 1.

Cast. Ranunculo rastrero.

Habita en las riberas de las lagunas de Suecia, Rusia, Suiza y Alemania.

Es muy semejante á la antecedente y acaso variedad de ella.

Lin- 3. RANUNCULUS *foliis* X Ranunculo con hojas lan-
gua. *lanceolatis, caule erecto.* Fl. ceoladas; y tallo derecho.
dan. t. 755.

Ranunculus erectus, ramosus, foliis ensiformibus, subserratis. Hall. helv. n. Ranunculo derecho, ramoso, con hojas en forma de espada y algo aserradas.
1181.

Ranunculus longifolius, palustris, major. C. B. P. Ranunculo palustre, mayor, con hoja larga.
186. Tourn. p. 292.

Ranunculus longo folio, maximus, Lingua Plinii. Ranunculo muy grande, con hoja larga, llamado Lengua por Plinio.
Bauh. hist. 3. App. 865.

Ranunculus lanceolatus, major. Tabern. ic. 48. Ranunculo mayor, con hojas lanceoladas.

Ranunculus flammeus, latiori Plantaginis folio, marginibus pilosis. Pluk. Ranunculo que inflama, de hoja como la del Llantén mas ancha y con sus márgenes vellosas. α
alm. 312. Tourn. p. 292.

Cast. Ranunculo lengua.

Habita en los fosos y aguas cenagosas de la Europa Boreal: en las aguas detenidas del rio Guadiana y otras partes de España. 2

Es comunmente de la altura de pie y medio, y produce el tallo ramoso y folioso: sus hojas ásperas, con algun diente y pelos cortos apretados: los pedunculos opuestos á las hojas y de una flor.

Nodi- 4. RANUNCULUS *foliis* X Ranunculo de hojas aovadas, con peciolo; y flores
florus. *ovatis petiolatis, floribus sessilibus.* Dalib. paris. 164. sentadas.

Ranunculus Parisiensis, pumilus, Plantaginellæ folio. Pet. gaz. 40. t. 25. f. 4. Ranunculo de París, enano, con hoja como la de la Plantaginela.
Vaill. act. 1719. p. 52. t. 4. f. 4.

Ranunculus Siculus, folio rotundo, vix serrato. Pet. Ranunculo de Sicilia, con hoja redonda y algo aserrada. α
gaz. 39. t. 24. f. 9.

Cast. Ranunculo nodifloro.

Habita en París y lugares pantanosos de Sicilia.

Gramineus

5. RANUNCULUS foliis lanceolato-linearibus indivisis, caule erecto levissimo paucifloro. Ranunculo con hojas entre lanceoladas y lineares, indivisas; tallo derecho, muy liso, y de pocas flores.

Ranunculus gramineo folio, bulbosus. C. B. P. 181. Tourn. p. 291. Ranunculo bulboso, con hoja como la de la Grama.

α Ranunculus montanus, gramineo folio. C. B. P. 180. Tourn. p. 291. Ranunculo montano, con hoja como la de la Grama. α

β Ranunculus montanus, folio gramineo, multiplex. C. B. P. 181. Tourn. p. 292. Ranunculo montano, con la flor multiplicada; y hoja como la de la Grama. β

Cast. Ranunculo gramineo.

Habita en prados descubiertos de Francia: en Monserat, cerca de la hermita de San Jayme: en los Pirineos de Cataluña: en Aragon y otras partes de España. 2

Tiene las hojas algo nerviosas ó estriadas: el tallo rollizo sin estrias; y una, hasta tres flores amarillas.

Pyre-naeus.

6. RANUNCULUS foliis linearibus indivisis, caule erecto striato subbifloro. Ranunculo de hojas lineares, indivisas; tallo derecho, estriado, y con una ó dos flores. Jacq. miscel. austr. 1. p. 154. t. 18. f. 1.

Ranunculus foliis linearibus, caule subnudo, radice fasciculata, comosa. Ger. prov. 384. Ranunculo con hojas lineares; tallo casi desnudo; y raiz en hacecillo con mucha cabellera.

Ranunculus alpinus, pumilus, gramineo folio, flore albo. Tourn. p. 292. Ranunculo alpino, enano; con hoja como la de la Grama; y flor blanca.

Ranunculus pumilus, Gramineis foliis. Bauh. hist. 3. p. 866. Ranunculo enano, con hojas como las de la Grama.

Cast. Ranunculo pirineo.

Habita en los Pirineos. Govan. 2

Tiene la raiz casi bulbosa, y cubierta de una redecilla con

470 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

con raicitas en hacecillo : el *tallo* derecho , filiforme , del largo de un dedo , con una ú otra hoja : las *hojas* radicales y del tallo lineares , indivisas , enterisimas , lisas , derechas , y del largo de una pulgada : una ó dos *flores* terminales , con pedunculo , pequeñas y blancas : el *fruto* casi redondo ; y las *semillas* tambien casi redondas , y que rematan en punta rígida.

Par-
na
ssi-
folius.

7. RANUNCULUS *foliis* X Ranunculo de hojas casi
subovatis nervosis lineatis X aovadas , nerviosas , raya-
integerrimis petiolatis , flo- X das , enterisimas , con pecio-
ribus umbellatis. Gov. illust. X lo ; y flores en umbela.

p. 34.

Ranunculus montanus , X Ranunculo montano , con
Graminis Parnassi folio. X hoja como la de la Grama
Tourn. p. 286. X del Parnaso , ó sea de la Par-
X nasia.

Cast. Ranunculo con hoja de Parnasia.

Habita en la Europa austral : en la Suiza y Pirineos.

La *yema radical* produce dos *hojas* lanceoladas , membranosas y que salen sobre la haz de la tierra : las *demás* *hojas* aovadas , obtusas , correosas , con nervios , enterisimas , vellosas por encima , envueltas , señaladamente en la base , y con peciolo largo : el *tallo* muy sencillo , indiviso y sin hojas : el *involucro* terminal , de dos *hojuelas* : los *pedunculos* con dos hasta quatro flores , y vellosos : el *caliz* de color que tira á purpúreo : la *corola* blanquecina , y con nervios de color purpúreo.

Am-
plexi-
caulis.

8. RANUNCULUS *foliis* X Ranunculo con hojas aovadas ,
ovatis acuminatis amplexi- X puntiagudas , que
caulibus , caule multifloro, X abrazan el tallo de muchas
radice fasciculata. Hort. Cliff. X flores ; y raiz en hacecillo.

229.

Ranunculus montanus , X Ranunculo montano , con
folio Plantaginis. C. B. P. X hoja como la del Llantén.
180. Moris. hist. 2. p. 444. X
sect. 4. t. 30. f. 36. Tourn. X
p. 292. X

INSER. EN EL REC. CON MAS DE VI. PIST. 471

Ranunculus dulcis, foliis X Ranunculo dulce, con ho-
latis Rapistri, perfoliatis, X jas anchas como las del Ra-
floribus albis. Mentz. pug. X pistro, perfoliadas; y flores
 t. 8. f. 8. X blancas.

Cast. Ranunculo que abraza el tallo.

Habita en Suiza, montes Apeninos y Pirineos. ¶

Bul- 9. RANUNCULUS *foliis* X Ranunculo con hojas ao-
 latus. *ovatis serratis, scapo nudo* X vadas, aserradas; escapo
unifloro. Hort. Cliff. 229. X desnudo y de una flor.

Ranunculus latifolius, bul- X Ranunculo de hoja ancha,
latus, Asphodeli radice. C. X con ampollas; y raiz como
 B. P. 181. X la del Asphodelo.

Ranunculus Lusitanicus. X Ranunculo de Portugal.
 Dod. pempt. 429.

Ranunculus grumosa ra- X Ranunculo primero, con
dice, primus. Clus. hist. 1. X la raiz grumosa.
 p. 238.

* *Ranunculus latifolius, bul-* X Ranunculo autumnal, de
latus, autumnalis, flore ple- X hoja ancha, con ampollas;
no & prolifero. Moris. hist. X flor plena y prolifera. *
 2. p. 247. sect. 4. t. 31. f. 49.
 50. 51.

Ranunculus Lusitanicus, X Ranunculo de Portugal,
folio subrotundo, parvo flo- X con hoja casi redonda; y flor
re. Tourn. p. 286. X pequeña.

Cast. Ranunculo con ampollas.

Habita en Creta y Portugal: en Galicia, Extremadura y
 Andalucía. ¶

Fi- 10. RANUNCULUS *fo-* X Ranunculo con hojas de fi-
 caria. *liis cordatis angulatis pe-* X gura de corazon, anguladas,
tiolatis, caule unifloro. Oed. X con peciolo; y tallo de una
 dan. t. 499. X flor.

Ficaria. Hall. helv. n. 1160. X Ficaria.

Chelidonia rotundifolia, X Celidonia menor, con ho-
minor. C. B. P. 309. X ja redonda.

Chelidonium minus. Fuch. X Celidonia menor.
 hist. 866. X

472 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Scrophularia minor, sive Escrophularia menor, ó
Chelidonium minus, vulgo dictum. Bauh. hist. 3. p.468. Celidonia menor, llamada
 asi vulgarmente.

Chelidonia rotundifolia, Celidonia mayor, con ho-
 major. C. B. P. 309. Prodr. ja redonda.
 137.

Cast. Ranunculo ficaria.

Habita en lugares pedregosos, sombríos y esponjosos de
 Europa: en los bosques del Real Sitio de S. Ildefonso:
 prados de Bustarviejo: montes de Avila, de Galicia,
 Aragon, Cataluña y otras partes de España. 2

Thora. II. RANUNCULUS fo- Ranunculo de hojas en
 liis reniformibus subtrilo- forma de riñon, con dos ó
 bis crenatis, caulino sessi- tres lóbulos recortados; la
 li, floralibus lanceolatis, del tallo sentada; las flora-
 caule subbifloro. Scop. carn. les lanceoladas; y tallo de
 ed. 2. n. 685. una ó dos flores.

Ranunculus foliis infe- Ranunculo con las hojas
rioribus subrotundo—reni- inferiores casi entre redon-
formibus, crenatis, florali- das y en forma de riñon,
bus lanceolatis, integerrimis, recortadas; las florales lan-
caule inferne nudo. ceoladas, enterisimas; y ta-
 Jacq. vind. 249. obs. 1. p.25. llo desnudo por debaxo.
 t. 13.

Aconitum pardalianches Aconito pardalianche, primo-
 I. seu Thora major. C. B. P. mero, ó Thora mayor.
 184.

Ranunculus Cyclaminis Ranunculo mayor, con
folio, Asphodeli radice, ma- hoja como la del Panporci-
ior. Tourn. p. 285. no; y raiz como la del As-
 phodelo.

Thora foliis Cyclaminis. Thora con hojas como las
 Bauh. hist. 3. p. 650. del Panporcino.

Aconitum pardalianches, Otro Aconito pardalian-
 alterum, seu Thora minor. che, ó Thora menor. α
 C. B. P. 184.

Ranunculus Cyclaminis folio, *Asphodeli radice*, minor. Tourn. p. 286. Ranunculo menor, con hoja como la del Panporcino; y raiz como la del Asphodelo.

Thora minor. Cam. epit. 826. Thora menor.

Limeum Pardalianches genus, uno tantum folio. Dalech. hist. 2738. Limeo género de Pardalianche, con una hoja solamente.

Cast. Ranunculo thora.

Habita en los alpes de Suiza y en los Pirineos. ¶

Tiene el caliz de color y redoblado.

ESPECIES CORTADAS Y DIVIDIDAS.

Cre-
cus. 12. RANUNCULUS foliis radicalibus reniformibus crenatis sublobatis, caulibus tripartitis lanceolatis integerrimis, caule multifloro. Ranunculo con las hojas radicales en forma de riñon, recortadas, casi hendidas en lóbulos, las del tallo divididas en tres partes, lanceoladas, enterisimas; y tallo de muchas flores.

Ranunculus Asphodeli radice, Creticus. C. B. P. 181. Tourn. p. 290. Ranunculo de Creta, con raiz como la del Asphodelo.

Ranunculus Creticus, latifolius. Clus. hist. 1. p. 239. Ranunculo de Creta, con hoja ancha.

Cast. Ranunculo de Creta.

Habita en Creta. ¶

Cassu-
vicus. 13. RANUNCULUS foliis radicalibus subrotundo-cordatis crenatis, caulibus digitatis dentatis, caule multifloro. Reyg. ged. 1. p. 143. n. 4. Ranunculo con las hojas radicales entre casi redondas y de figura de corazon, recortadas; las del tallo divididas como en dedos, dentadas; y tallo de muchas flores.

474 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Ranunculus rotundifolius, *vernus*, *sylvaticus*, *major*, *vel Cassubicus*, *foliis Thora sive Calthæ*. Breyn. prod. 1. 445. Tourn. p. 285. X Ranunculo de primavera, silvático, mayor, ó de Casubia, con hojas redondas como las de la Thora ó de la Caltha.

Cast. Ranunculo de Casubia.

Habita en Dantzick, Casubia y Siberia. 2

Auricomus

14. *RANUNCULUS foliis radicalibus reniformibus crenatis incisís, caulinis digitatis linearibus, caule multifloro*. Flor. dan. t. 665. X Ranunculo con las hojas radicales en forma de riñon, afestonadas y cortadas; las del tallo divididas como en dedos, lineares; y tallo de muchas flores.

Ranunculus foliis radicalibus integris & semitrilobatis, rotunde crenatis, caulinis multipartitis, linearibus, integerrimis. Hall. helv. n. 1177. X Ranunculo de hojas radicales enteras, y medio hendidas en tres lóbulos, con festones redondos; las del tallo divididas en muchas partes, lineares y enterisimas.

Ranunculus rotundifolius, vernus, sylvaticus. Bauh. hist. 3. p. 341. R. X Ranunculo de primavera silvático, con hoja redonda.

Ranunculus nemorosus seu sylvaticus, folio subrotundo. C. B. P. 178. Tourn. p. 285. X Ranunculo de bosques ó de selvas, con hoja redonda.

Ranunculus auricomus: *Ranunculus dulcis Tragi*. Lob. ic. 669. X Ranunculo penacho de oro: Ranunculo dulce de Trago.

Ranunculus I. sylvestris. Dalech. hist. 1028. X Ranunculo silvestre, primero.

Cast. Ranunculo penacho de oro.

Habita entre pastos algo húmedos de Europa. 2

Tiene una hoja radical de figura de corazon.

Abor-
ivus. 15. RANUNCULUS fo-
liis radicalibus cordatis cre-
natis, caulinis ternatis an-
gulatis, caule subtrifloro.

Ranunculus foliis radica-
libus reniformibus crenatis,
petiolatis, caulinis paucis,
digitatis, sessilibus. Gron.
virg. 166.

Ranunculus Virginianus,
flore parvo, molliore folio.
Herm. lugdb. 514.

Cast. Ranunculo abortivo.
Habita en la Virginia y Canadá.

See-
eratus 16. RANUNCULUS fo-
liis inferioribus palmatis,
summis digitatis, fructibus
oblongis. Gmel. Sib. 4. p. 203.
t. 83. f. 4. Fl. dan. t. 571.

Ranunculus foliis levi-
bus, semitrilobatis, rotundo
serratis, fructu ovato. Hall.
helv. n. 1175.

Ranunculus palustris,
Apii folio, laevis. C. B. P.
180. Tourn. p. 291.

Ranunculus palustris,
flore minimo. Bauh. hist. 3.
p. 858.

Ranunculus palustris I.
Dod. pempt. 426.

Cast. Ranunculo malvado.

Habita en los fosos y balsas de Europa : en los circuitos
de Madrid , Soto-luzon y de Migas-calientes : en Cata-
luña , Aragon y otras partes de España. ○

Llábase Ranunculo malvado por ser la especie mas corro-
siva de las que tiene este género. Llábase tambien Her-
ba Sardonía y Apium risus , porque se parece al Apio
en

Ranunculo con hojas ra-
dicales de figura de corazon,
recortadas , las del tallo de
tres en rama , anguladas ; y
tallo de dos ó tres flores.

Ranunculo de hojas radi-
cales en forma de riñon , re-
cortadas , con peciolo , pocas
en el tallo , divididas como
en dedos y sentadas.

Ranunculo de Virginia ,
con la flor pequeña ; y hoja
mas blanda.

Ranunculo con las hojas
inferiores palmeadas, las de
mas arriba divididas como en
dedos ; y frutos oblongos.

Ranunculo de hojas lisas
medio hendidas en tres ló-
bulos , redondas y aserra-
das ; y fruto aovado.

Ranunculo palustre , liso ;
y con hoja como la del Apio.

Ranunculo palustre , con
flor muy pequeña.

Ranunculo palustre , pri-
mero.

476 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

en las hojas , y mata haciendo torcer la lengua ; de modo que parece se rie el sugeto que la ha comido ; de lo qual y por crecer muy abundante en Cerdeña , provino tambien á esta planta el nombre de *Sardonio* ó de *Riso Sardonio*.

- Aconitifolius. 17. RANUNCULUS foliis omnibus quinatis lanceolatis , inciso--serratis . Hort. Cliff. 229. Ranunculo con todas las hojas de cinco en rama, lanceoladas , entre cortadas y aserradas.
- Ranunculus albus , simpliciflore . Bauh. hist. 3. App. 859. Ranunculo con la flor sencilla y blanca.
- Ranunculus montanus , Aconitifolio , albus , flore minore. C. B. P. 182. Tourn. p. 290. Ranunculo montano , con hoja como la del Aconito ; flor mas pequeña y blanca.
- Ranunculus montanus IV. Clus. hist. 1. p. 236. Ranunculo montano , quarto.
- Ranunculus montanus , folio Aconitifolio , flore albo , multiplici. C. B. P. 179. Tourn. p. 290. Ranunculo montano , con hoja como la del Aconito ; flor blanca y multiplicada.
- Ranunculus pleno flore , albo. Clus. hist. 1. p. 236. Ranunculo con la flor plena y blanca.

Cast. Ranunculo con hoja de Aconito.

Habita en los alpes de Suiza , Austria y Pirineos. 24

Es semejante al *Ranunculo con hoja de Platano* ; pero tiene las *hojas* partidas en cinco lacinias hasta su peciolo ; y el *tallo* la mitad mas corto.

- Platanifolius. 18. RANUNCULUS foliis palmatis levibus incisiss , caule erecto , bracteis linearibus. Oed. dan. t. III. Gov. illustr. 35. Ranunculo con hojas palmadas , lisas , cortadas ; tallo derecho y bracteas lineares.
- Ranunculus montanus , Aconitifolio , albo flore , major. C. B. P. 182. Tourn. p. 290. Ranunculo montano , con hoja como la del Aconito ; flor blanca y mayor.

Ranunculus flore albo, alpinus, major. Bauh. hist. 3. App. 861. Ranunculo alpino, mayor, con la flor blanca.

Ranunculus montanus, albus. Dalech. hist. 1021. Ranunculo montano, con la flor blanca.

Cast. Ranunculo con hoja de Platano.

Habita en los montes alpinos de Alemania, Italia, y en los Pirineos. ¶

Su estatura es como la del *Ranunculo de hoja como la del Aconito*, con flores igualmente blancas; pero no tiene las *hojas* compuestas, sino verdaderamente palmeadas, menos crasas, y mas cortadas; y las *flores* mas grandes.

Illyricus.

19. RANUNCULUS *foliis ternatis integerrimis lanceolatis.* Jacq. austr. t. 222. Pall. it. 3. p. 584. Ranunculo con hojas de tres en rama, enterisimas y lanceoladas.

Ranunculus foliis tripartitis, laciniis linearibus, caule multifloro, radice tuberosa. Sauv. monsp. 181. Ranunculo de hojas divididas en tres partes, con laciniias lineares; tallo de muchas flores; y raiz tuberosa.

Ranunculus lanuginosus, angustifolius, grumosa radice, major & minor. C. B. P. 181. Tourn. p. 289. Ranunculo lanuginoso, mayor y menor, con hoja angosta; y raiz grumosa.

Ranunculus Illyricus, major. Clus. hist. 3. p. 240. Ranunculo mayor, de Iliria.

Ranunculus grumosa radice IV. Clus. hist. 1. p. 140. Ranunculo quatro, con la raiz grumosa.

Cast. Ranunculo de Iliria.

Habita en Oelandia, Hungria, Narbona, Italia y Austria. ¶

Asiaticus.

20. RANUNCULUS *foliis ternatis biternatisque, foliolis trifidis incisiss, caule inferne ramoso.* Mill. dict. n. 11. & ic. t. 216. Ranunculo con hojas de tres en rama y biternadas; hojuelas hendidas en tres partes, cortadas; y tallo ramoso por debaxo.

- Ranunculus foliis tripartitis laciniatis, caule inferne ramoso, radice tuberosa.* Hort. Cliff. 230. Ranunculo con hojas divididas en tres partes, laciniadas; tallo ramoso por debaxo; y raiz tuberosa.
- Ranunculus grumosa radice, ramosus.* C. B. P. 181. Tourn. p. 287. Ranunculo ramoso; y con la raiz grumosa.
- Ranunculus Asiaticus, polyclonos, seu grumosa radice, secundus.* Bauh. hist. 3. App. 863. Clus. hist. 1. p. 241. Ranunculo de Asia, segundo, con muchos tallos; y la raiz grumosa.
- Ranunculus grumosa radice, flore flavo, vario.* C. B. P. 181. Tourn. p. 287. Ranunculo con la raiz grumosa; flor de color amarillo-roxo y vario. α
- Ranunculus grumosa radice, flore albo.* C. B. P. 181. Tourn. p. 287. Ranunculo con la raiz grumosa; y flor blanca. β
- Ranunculus grumosa radice, flore albo, leviter crenato.* C. B. P. 181. Ranunculo con la raiz grumosa; flor blanca, y ligeramente recortada. χ
- Ranunculus grumosa radice, flore niveo.* C. B. P. 181. Ranunculo con la raiz grumosa; y flor de color de nieve. λ
- Ranunculus grumosa radice, flore phæniceo, minimo, simplici.* C. B. P. 181. Ranunculo con la raiz grumosa, flor muy pequeña, sencilla y de color de datil. ν
- Ranunculus Asphodeli radice, flore sanguineo.* C. B. P. 181. Ranunculo con la raiz como la del Asphodelo; y flor de color de sangre. ϕ
- Ranunculus (sanguineus) foliis ternatis biternatisque, foliolis trifidis, obtusis, caule simplici.* Mill. dict. n. 10. Ranunculo (de color de sangre) con hojas de tres en rama y biternadas; hojuelas hendidas en tres partes, obtusas; y tallo sencillo.
- Ranunculus Asphodeli radice, flore subphæniceo rubente.* C. B. P. 181. Ranunculo con raiz como la del Asphodelo; y flor casi de color de datil que tira á roxo. γ

» *Ranunculus Asphodeli radice, prolifer, miniatus.* C. B. P. 181. Ranunculo con la raíz como la del Asphodelo, proli-fero; y la flor con puntitos de color de minio. »

Cast. Ranunculo de Asia.

Habita en Asia y Mauritania. ¶

Tiene el tallo derecho, ramoso, veloso y rollizo, del mismo modo que los pedunculos: las hojas de mas abaxo sencillas, hendidas en lóbulos, cortadas, agudas, y por debaxo velosas como los peciolos: las de mas arriba divididas en tres partes, y dos veces de tres en rama; y el caliz sin ser redoblado. Su flor sirve para ramilletes y coronas, y se cultiva en los jardines.

Ranunculus.

21. *RANUNCULUS foliis supradecompositis, caule simplicissimo unifloro, radice tuberosa.* Ranunculo de hojas sobredecompuestas; tallo muy sencillo con una hoja y una flor; y la raíz tuberosa.

Roy. lugdb. 491.

Ranunculus caule unifloro, foliis imbricatis pinnatis, pinnis lobatis, lobis obtuse palmatis. Hall. helv. n. 1165. Ranunculo de tallo con una flor; hojas apiñadas, pinnadas; y hojuelas hendidas en lóbulos obtusamente palmados.

Ranunculus Rutaceo folio, flore suave rubente. C. B. P. 181. Moris. hist. 2. p. 448. sect. 4. t. 31. f. 54. Ranunculo con hoja como la de la Ruda; y flor que tira á roxo delicado.

Tourn. p. 289.

Ranunculus præcox, primus, Rutæ folio. Clus. hist. 1. p. 232. folia bona sed flos alienus. Haller. Ranunculo temprano, primero, con hoja como la de la Ruda.

Cast. Ranunculo con hoja de Ruda.

Habita en los alpes de Austria, Delfinado y Suiza. ¶

Tiene la flor blanca.

- Gla- 22. RANUNCULUS ca- X Ranunculo de cálices con
cialis. *lycibus hirsutis, caule bi-* X pelo áspero; tallo de dos flo-
floro, foliis multifidis. Oed. X res; y hojas hendidas en
dan. t. 19. X muchas partes.
- Ranunculus foliis pulpo-* X Ranunculo con hojas pul-
sis, repetito trilobatis, caly- X posas, hendidas varias veces
cibus villosis. Hall. helv. X en tres lóbulos; y cálices ve-
n. 1166. X llosos.
- Ranunculus caule bifloro,* X Ranunculo con el tallo de
calyce hirsuto. Fl. lapp. 233. X dos flores; y cáliz con pelo
t. 3. f. 1. X áspero.
- Ranunculus montanus,* X Ranunculo montano, con
purpureus, calyce villosus. X la flor purpúrea; y caliz ve-
Bauh. hist. 3. p. 862. Scheuch. X lloso.
alp. 339. t. 20. f. 1.
- Ranunculus alpinus, Co-* X Ranunculo alpino, con
riandri folio, flore albo-pur- X hoja como la del Cilantro; y
purascente. Barr. ic. 456. X flor de color que de blanco
X tira á purpúreo.

Cast. Ranunculo que nace entre el yelo.

Habita en los alpes de Laponia, Suiza y Delfinado. ¶

- Ni- 23. RANUNCULUS ca- X Ranunculo con el caliz
valis. *lyce hirsuto, caule unifloro,* X con pelo áspero; tallo de
foliis radicalibus palmatis, X una flor; hojas radicales pal-
caulinis multipartitis sessi- X meadas; las del tallo dividi-
libus. Fl. lapp. 232. t. 3. f. 2. X das en muchas partes, y sin
Jacq. austr. t. 325. 326. X peciolo.
- Ranunculus uniflorus, fo-* X Ranunculo de una flor,
liis glabris, reniformibus, se- X con hojas lampiñas, en forma
miquinquelobis. Hall. helv. X de riñon, y medio hendidas
n. 1168. X en cinco lóbulos.
- Ranunculus subhirsutus,* X Ranunculo con algun pe-
caule subunifloro, foliis ra- X lo áspero; tallo de una ó dos
dicalibus palmatis, caulinis X flores; hojas radicales pal-
multipartitis sessilibus. X meadas; las del tallo dividi-
Crantz. austr. 116. t. 4. f. 3. X das en muchas partes y sin
X peciolo.

INSER. EN EL REC. CON MAS DE VI. PIST. 481

Ranunculus minimus, alpinus, luteus. Bauh. hist. 3. p. 861. f. interior. Ranunculo alpino, muy pequeño, con flor amarilla.

* *Ranunculus pygmaeus.* Fl. lapp. 232. t. 3. f. 3. Ranunculo pigmeo. *

Cast. Ranunculo que nace entre la nieve.

Habita en los alpes de Laponia y Suiza. ¶

Es planta toda lampiña.

Al-
pestris 24. RANUNCULUS *folios radicalibus subcordatis obtusis tripartitis, lobis trilobatis, caulino lanceolato integerrimo, caule subunifloro.* Jacq. austr. t. 110. Pall. it. 2. p. 568. Ranunculo de hojas radicales casi de figura de corazón, obtusas, partidas en tres lóbulos divididos en otros tres; la del tallo lanceolada y enterisima; y el tallo con una ó dos flores.

Ranunculus uniflorus, foliis laevibus, semitrilobis, rotundo-serratis, caulinis linguulatis. Hall. helv. 1167. Ranunculo de una flor; hojas lisas, medio hendidas en tres lóbulos, redondas y aserradas; y las del tallo en forma de lengüeta.

Ranunculus alpinus, humilis, rotundifolius, flore majore vel minore. C. B. P. 181. Tourn. p. 290. Ranunculo alpino, baxo, con hoja redonda; y flor mas grande (ó mas pequeña).

Ranunculus alpinus, humilis, albus, folio subrotundo. Segui. ver. 1. p. 489. t. 12. f. 1. Ranunculo alpino, baxo, con la flor blanca; y hoja casi redonda.

¶ *Ranunculi montani prima & secunda species.* Clus. hist. 1. p. 234. Primera y segunda especie de Ranunculo montano.

Cast. Ranunculo alpestre.

Habita en los alpes de Austria y Suiza. ¶

Posee el caliz redoblado y lampiño: los petalos blancos, y hendidos en dos lóbulos.

482 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

- Lappo-
nicus. 25. RANUNCULUS fo-
liis tripartitis lobatis obtu-
sis, caule subnudo unifloro. Ranunculo con hojas di-
vididas en tres partes, hendi-
das en lóbulos, obtusas; tallo
casi desnudo, y de una flor.
Flor. dan. t. 144.
Ranunculus caule unifolio Ranunculo de tallo con
unifloro, foliis tripartitis. una hoja, de una flor; y ho-
Fl. lapp. 251. t. 3. f. 4. jas divididas en tres partes.

Cast. Ranunculo de Laponia.
Habita en los alpes de Laponia.

- Mons-
pelias-
cus. 26. RANUNCULUS fo-
liis tripartitis crenatis, cau-
le simplici villosa subnudo Ranunculo con hojas di-
vididas en tres partes, recor-
tadas; tallo sencillo, vello-
so, casi desnudo; y de una
unifloro. Sauv. monsp. 181. † flor.
Ranunculus saxatilis, mag. Ranunculo saxátil, con la
no flore. C. B. P. 182. Prædr. flor grande.
96. Tourn. p. 291.

Cast. Ranunculo de Mompeller.
Habita en Mompeller.

- Bul-
bosus. 27. RANUNCULUS ca-
lycibus retroflexis, pedun-
culis sulcatis, caule erecto Ranunculo con los cáli-
ces doblados ácia atrás; pe-
dunculos asurcados; tallo
multifloro, foliis compositis. derecho, con muchas flores;
y hojas compuestas.
Flor. dan. 551.
Ranunculus radice sub-
rotunda, foliis hirsutis, sep-
tilobis, lobis petiolatis. Hall. Ranunculo con la raíz ca-
si redonda; hojas con pelo
áspero, y hendidas en siete
helv. n. 1174. lóbulos peciolados.
Ranunculus bulbosus. Lob. Ranunculo con la raíz bul-
bosa.
ic. 666.
Ranunculus pratensis, ra-
dice verticilli modo rotunda. Ranunculo pratense, con
la raíz redonda á modo de
C. B. P. 179. Tourn. p. 289. una rodaja.
Ranunculus tuberosus, Ranunculo tuberoso, ma-
major. Bauh. hist. 3. p. 417. yor.

Cast. Ranunculo bulboso.
Habita en prados y pastos de Europa: en el circuito de
Ma-

INSER. EN EL REC. CON MAS DE VI. PIST. 483

Madrid, prados de Soto-luzon y Migas-calientes: en Aragon, Cataluña, y otras muchas partes de España. 24

Re-
pens, 28. RANUNCULUS ca-
lycibus patulis, pedunculis
sulcatis, sarmentis repen-
tibus, foliis compositis.
Gmel. Sib. 4. p. 206.

Ranunculus caule reptan-
te, radicato, foliis semitri-
lobatis, lobis petiolatis. Hall.
helv. n. 1173.

Ranunculus foliis ternatis,
foliolis petiolatis trifidis,
medio productiore, caule
multifloro. Hort. Cliff.
230.

Ranunculus pratensis, repens,
hirsutus. C. B. P. 179.
Tourn. p. 289.

Ranunculus repens, flore
luteo, simplici. Bauh. hist. 3.
p. 419.

Ranunculus hortensis I.
Dod. pempt. 425.

Ranunculus rectus, foliis
pallidioribus, hirsutis. Bauh.
hist. 3. p. 417. Petiu. t. 38.
Haller.

Ranunculo con los cálices
abiertos; pedunculos asur-
cados; sarmientos ó sean vást-
agos rastreros; y hojas com-
puestas.

Ranunculo con el tallo
rastrero, que echa raices; y
hojas medio hendidas en tres
lóbulos peciolados.

Ranunculo con hojas de
tres en rama; hojuelas pecio-
ladas, hendidas en tres par-
tes, con la del medio mas
extendida; y tallo de mu-
chas flores.

Ranunculo pratense, ras-
trero, con pelo áspero.

Ranunculo rastrero, con
la flor amarilla y sencilla.

Ranunculo hortense, pri-
mero.

Ranunculo recto, de ho-
jas mas pálidas y con pelo
áspero.

Cast. Ranunculo rastrero.

Habita en lugares cultivados de Europa: en el circuito
de Madrid: prados y dehesas de Soto-luzon y de Mi-
gas-calientes: en Aragon, Cataluña y otras muchas
partes de España. 24

Varia con la flor doble, en cuyo caso se llama vulgar-
mente Boton de oro.

484 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

- Poly-
anthe-
mos. 29. RANUNCULUS ca-
lycibus patulis , pedunculis
sulcatis , caule erecto , foliis
multipartitis. Fl. Suec. 467. Ranunculo con los cálices
abiertos; pedunculos asurca-
dos; tallo derecho; y hojas
divididas en muchas partes.
Ranunculus ramosus, mul-
tiflorus , foliis semi-septilo-
bis, lobis tridentatis, acutis. Ranunculo ramoso, con
muchas flores; hojas medio
hendidadas en siete lóbulos,
Hall. helv. n. 1171. con tres dientes y agudos.
Ranunculus polyanthe-
mos, simplex. Lob. ic. 666. Ranunculo de muchas flo-
res y sencillas.
Tourn. p. 289.
Ranunculus sylvestris . Ranunculo silvestre.
Tabern. ic. 42. hist. 117.

Cast. Ranunculo de muchas flores.

Habita en la Europa boreal entre gramas: en los circui-
tos de Madrid: dehesas de Soto-luzon y de Migas-ca-
lientes. Quer. 4

- Acris. 30. RANUNCULUS ca-
lycibus patulis , pedunculis
teretibus , foliis tripartito-
multifidis , summis lineari-
bus. Knorr. del. 1. t. H. Ranunculo con los cálices
abiertos; pedunculos rolli-
zos; hojas divididas en tres
partes hendidas en muchas,
y las de mas arriba lineares.
Ranunculus foliis hirsu-
tis, semitrilobatis, lobis la-
teralibus bipartitis , foliis
caulinis semitrilobis. Hall. Ranunculo de hojas con
pelo áspero, medio hendidas
en tres lóbulos, con los late-
rales partidos en dos; y las
hojas del tallo medio hen-
didadas en tres lóbulos.
helv. n. 1160.
Ranunculus Napellifo-
lius. Crantz. austr. p. 114. Ranunculo con hoja como
la del Napelo.
n. 10. t. 4. f. 2. cum prece-
dente conjungit. R.
Ranunculus pratensis , Ranunculo pratense, de-
erectus , acris. C. B. P. 178. recho y acre.
Tourn. p. 289.
Ranunculus rectus , non Ranunculo recto, que no
repens , flore simplici luteo. es rastrero, con la flor sen-
Bauh. hist. 3. p. 416. cilla y amarilla.

Ranunculus hortensis. X Ranunculo hortense.
 Dod. pempt. 426.

Ranunculus hortensis, X Ranunculo hortense, le-
erectus, flore pleno. C. B. P. vantado, con la flor ple-
 179. Tourn. p. 290. Knorr. na. α
 del. t. H. 2.

Cast. Ranunculo acre. vulgo: Otro boton de oro.

Habita en prados y entre pastos de Europa: en Cataluña,
 Aragon y otras partes de España. ♀

Lanu- 31. RANUNCULUS ca- X Ranunculo con los cálices
 gino- *lycibus patulis*, pedunculis X abiertos; pedunculos rolli-
 sus. *teretibus*, caule petiolisque X zos; tallo y peciolo con pe-
hirsutis, foliis trifidis loba- X lo áspero; hojas hendidas en
tis crenatis holosericeis. Oed. X tres partes, con lóbulos, re-
 dan. t. 397. X cortadas, y cubiertas como
 de seda.

Ranunculus foliosus, ra- X Ranunculo folioso, ramo-
mosus, erectus, foliis semi- X so, derecho; de hojas me-
trilobatis, hirsutis, vaginis X dio hendidas en tres lóbulos,
sericeis. Hall. helv. n. 1172. X con pelo áspero; y vaynas
 cubiertas como de seda.

Ranunculus tomentosus, X Ranunculo tomentoso, con
calycibus retroflexis, foliis X los cálices redoblados; hojas
radicalibus tripartitis, lo- X radicales divididas en tres
*bis incis*is, caulinis multi- X partes, con lóbulos, corta-
partitis sessilibus. Ger. prov. X dos; las del tallo divididas
 387. X en muchas partes y sentadas.

Ranunculus montanus, la- X Ranunculo montano, la-
nuginosus, foliis Ranuncu- X nuginoso, con hojas como
li pratensis repentis. C. B. X las del Ranunculo pratense
 P. 182. Prodr. 96. Tourn. X rastrero.
 p. 291.

Ranunculus magnus, val- X Ranunculo grande, con
de hirsutus, flore luteo. X mucho pelo áspero, y flor
 Bauh. hist. 3. p. 417. X amarilla.

Ranunculus montanus, subhirsutus, Geranii folio. Ranunculo montano, con algun pelo áspero, y hoja como la del Geranio... *Ranunculus montanus, subhirsutus larifolius.* Prodr. 96. Tourn. p. 290. Ranunculo montano, con algun pelo áspero, y hoja ancha. ^a

Ranunculus nemorosus, hirsutus, foliis Caryophyllatæ. Loes. prus. 220. t. 71. Ranunculo de bosques, con pelo áspero, y hojas como las de la Caryophyllata.

Cast. Ranunculo lanuginoso.

Habita en Mompeller, Suiza, Alemania, Austria, Catniola y Lusacia. ^u

Tiene el tallo alto, derecho y con pelo rígido: las hojas como las del Aconito ó del Ranunculo acre; pero mas cortadas: las semillas agudas y comprimidas: los pedunculos largos y rollizos; y una mancha pálida en los pliegues de las hojas, las quales con el tacto se manifiestan mas crasas.

Chærophyl-
lus.

32. RANUNCULUS *ca-lycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto unifloro, foliis compositis lineari—multifidis.* Guett. stamp. 275. Ranunculo con los cálices doblados ácia atrás; pedunculos asurcados; tallo derecho, de una flor; hojas compuestas, entre lineares y hendidas en muchas partes.

Ranunculus foliis compositis, caule simplici, villosa, subnudo, unifloro, radice tuberosa. Zinn. Gætt. 129. Ranunculo con hojas compuestas; tallo sencillo, velloso, casi desnudo, de una flor; y raiz tuberosa.

Ranunculus grumosa radice, folio Ranunculi bulbosi. C. B. P. 181. Prodr. 96. Ranunculo con la raiz grumosa; y hoja como la del Ranunculo bulboso.

Ranunculus Chærophyllos, Asphodeli radice. C. B. P. 181. Barr. ic. 581. Tourn. p. 289. Ranunculo Cherophylo, con la raiz como la del Asphodelo.

Ranunculus montanus, leptophyllos, Asphodeli radice. Col. ecphr. 1. p. 312. t. 311. Ranunculo montano, con hoja delgada; y raiz como la del Asphodelo.

Cast.

Cast. Ranunculo Cherophylo.

Habita en Francia é Italia : en los contornos de Madrid, en el barranco de Cantarranas y de San Bernardino. 24

Par-
vulus.

33. RANUNCULUS *hirtus, foliis trilobis incisís, caule erecto subunifloro.* X Ranunculo con pelo rígido ; hojas hendidas en tres lóbulos, cortados ; tallo derecho , y de una ó dos flores. Gmel. it. 2. p. 196.

Ranunculo arvensis, parvus, folio trifido. C. B. P. 179. Tourn. p. 289. X Ranunculo arvense , pequeño , con hoja hendida en tres partes.

Ranunculus saxatilis, minimus, hirsutus. C. B. P. 182. Prodr. 96. X Ranunculo saxátil , muy pequeño , con pelo áspero.

Ranunculus minimus, Apulus. Col. ecphr. 314. t. 316. X Ranunculo muy pequeño, de Pulla.

Cast. Ranunculo pequeñito.

Habita en Mompeller , en Italia y Rusia.

Produce el tallo solitario, con pelo rígido, filiforme, de la longitud de un dedo hasta medio pie : pocas hojas , pecioladas , sencillas , hendidas en tres partes , dentadas y con pelo áspero : la flor casi mas grande que las hojas y amarilla : el caliz membranoso y veloso.

Ar-
vensis.

34. RANUNCULUS *seminibus aculeatis, foliis superioribus decompositis linearibus.* Hort. Cliff. 229. X Ranunculo de semillas con aguijones ; hojas superiores decompuestas ó sean compuestas de otras compuestas y lineares.

Ranunculus seminibus aculeatis, foliis tripartitis, lobis longe petiolatis, bipartitis seu tripartitis, acute incisís. Hall. helv. n. 1176. X Ranunculo de semillas con aguijones ; hojas divididas en tres partes ; lóbulos con peciolo largos, dos ó tres veces partidos, y agudamente cortados.

Ranunculus arvensis, echinatus. C. B. P. 179. Bauh. hist. 3. App. 859. Tournef. p. 289. X Ranunculo arvense , erizado.

488 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Ranunculus sylvestris, X *Ranunculo silvestre*, ter-
terius. Dod. pempt. 427. Xcero,

Cast. *Ranunculo arvense.*

Habita en los sembrados de la Europa austral: en el cir-
 cuito de Madrid en huertas y campos de labor; y es
 frecuente en las demas provincias de España. ☉

Muri-
 catus.

35. RANUNCULUS se- X *Ranunculo de semillas con*
minibus aculeatis, foliis sim- X *aguijones; hojas sencillas,*
plicibus lobatis obtusis gla- X *hendidias en lóbulos, obtu-*
bris, caule diffuso. Roy. X *sas, lampiñas; y tallo difu-*
 lugdb. 491. X *so.*

Ranunculus palustris, echi- X *Ranunculo palustre, eri-*
natus. C. B. P. 180. Prodr. X *zado.*
 95. Bauh. hist. 3. p. 858. To-
 urn. p. 286.

Ranunculus Creticus, echi- X *Ranunculo de Creta, eri-*
natus, latifolius. Alp. exot. X *zado, con hoja ancha.*
 263. t. 262.

Ranunculus Apulei qui- X *Ranunculo de Apuleio,*
busdam. Clus. hist. 1. p. 233. X *llamado asi por algunos.*

Cast. *Ranunculo de puntitas.*

Habita en fosos y lugares húmedos de la Europa austral:
 en los contornos de Madrid: en Aragon: en las dos Cas-
 tillas, Cataluña y otras muchas partes de España. ☉

Parvi-
 florus.

36. RANUNCULUS se- X *Ranunculo de semillas con*
minibus muricatis, foliis sim- X *puntitas; hojas sencillas, la-*
plicibus laciniatis acutis X *ciniadas, agudas, con pelo*
hirsutis, caule diffuso. X *áspero; y tallo difuso.*

Ranunculus hirsutus, an- X *Ranunculo annuo, con*
nuus, flore minimo. Pluk. X *pelo áspero; y flor muy pe-*
 alm. 311. t. 55. f. 1. Rai. X *queña.*
 angl. 3. p. 248. t. 12. f. 1.

Moris. hist. 2. p. 440. sect. 4.
 t. 28. f. 21.

Cast. *Ranunculo de flor muy pequeña.*

Habita en la Europa austral. ☉

Se diferencia del *Ranunculo de puntitas* por la flor pe-
 que-

quefia ; por el *tallo* mas postrado ; por las *hojas* profundamente laciniadas ; y por las *semillas* que tienen tuberculos (y *no agujones*) por el lado solamente.

Orientalis. 37. RANUNCULUS *seminibus spinoso--subulatis recurvis, calycibus reflexis, foliis multifidis.* Ranunculo con semillas entre espinosas y alesnadas, encorvadas ácia atrás ; cálices redoblados ; y hojas hendidas en muchas partes.

Cast. Ranunculo Oriental.
Habita en Oriente.

Grandiflorus. 38. RANUNCULUS *caule erecto bifolio, foliis multifidis, caulinis alternis sessilibus.* Roy. lugdb. 492. Ranunculo de tallo derecho, con dos hojas alternas, sentadas ; y las restantes hendidas en muchas partes.
Ranunculus Orientalis, Aconiti folio, flore maximo. Tourn. cor. 22. Ranunculo Oriental, con hoja como la del Aconito ; y flor muy grande.

Cast. Ranunculo de flor grande.
Habita en Oriente. *h*

Falcatus. 39. RANUNCULUS *foliis filiformi-ramosis, seminibus falcatis, scapo nudo unifloro.* Jacq. virid. 250. Austr. t. 48. Ranunculo con hojas filiformes, ramosas ; semillas arqueadas ; escapo desnudo y con una flor.
Myosurus foliis ramosis. Hort. Cliff. 117. Myosuro ó sea cola de raton, con hojas ramosas.
Melampyrum luteum, minimum. C. B. P. 234. Melampiro muy pequeño, con flor amarilla.
Ranunculus Ceratocephalus seminibus falcatis in spinam adactis. Moris. hist. 2. p. 440. sect. 4. t. 28. f. 22. Tourn. p. 287. Ranunculo Ceratocephalo (ó sea de cabezuela con astitas), con semillas arqueadas y dispuestas en espiga.

Cast. Ranunculo arqueado.
Habita entre los sembrados de la Europa austral y de Oriente : en el circuito de Madrid : en la Mancha, Casti-

490 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

tilla la vieja, Aragon, Cataluña y otras partes de España. ☉

- Hederaceus. 40. RANUNCULUS foliis subrotundis trilobis integerrimis, caule repente. Hort. Cliff. 231. Ranunculo con hojas casi redondas, hendidas en tres lóbulos enterisimos; y tallo rastrero.
- Ranunculus aquaticus, Hederaceus, luteus. C. B. P. 180. Moris. hist. 2. p. 441. sect. 4. t. 29. f. 29. Ranunculo aquatico, como Yedra; y con flor amarilla.
- Ranunculus aquaticus, Hederaceus, flore albo, parvo. Tourn. p. 286. Ranunculo aquatico, como Yedra, con la flor blanca y pequeña.
- Ranunculus Hederaceus, rivulorum, se extendens, atramacula notatus. Bauh. hist. 3. p. 782. Ranunculo como Yedra, de los riachuelos, que se extiende, y señalado con una mancha negra.

Cast. Ranunculo como Yedra.

Habita en aguas vadosas ó someras de Inglaterra, Flandes, Alemania y Siberia.

- Aquatilis. 41. RANUNCULUS foliis submersis capillaceis, emersis peltatis. Gmel. Sib. 4. p. 207. Ranunculo con hojas de adentro del agua capiláceas, y las de afuera abroqueladas.
- Ranunculus fluitans, petiolis unifloris, foliis imis capillaribus, laciniis divergentibus. Hall. helv. n. 1163. Ranunculo flotante, con piecitos de una flor; hojas de mas abaxo capilares, y sus lacinias divergentes.
- Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo. C. B. P. 180. Tourn. p. 291. Ranunculo aquatico, con hoja redonda y capilar.
- Ranunculus aquaticus, albus, tenuifolius. Bauh. hist. 3. p. 781. Ranunculo aquatico, con la flor blanca; y hoja delgada.
- Ranunculus trycophyllos, aquaticus, medio luteus. Col. ecphr. 1. p. 315. t. 316. Ranunculo aquatico, con hojas como cabellos; y flores amarillas en medio.

- * *Ranunculus fluitans*, *petiolis unifloris*, *foliis capillaceis longissimis*, *laciniis parallelis*. Hall. *helv. n. 1161*.
 Oed. dan. t. 376. Ranunculo flotante, con piecitos de una flor; hojas muy largas, capilares, y laciniis paralelas. α
- Ranunculus aquatilis*, *albus*, *fluitans*, *Peucedani foliis*. Herm. *lugdb. 517*. Tourn. p. 291. Ranunculo aquatico, flotante, con la flor blanca; y hojas como las del Peucedano.
- Millefolium aquaticum*, *foliis fœniculi*, *Ranunculi flore* & *capitulo*. C. B. P. 141. Milenrama aquatica, con hojas como las del Hinojo; flor y cabezuela como las del Ranunculo.

Cast. Ranunculo aquatico.

Habita en fosos y riachuelos de Europa: en Soto-luzon, Real Sitio del Escorial: en Cataluña, Aragon y otras muchas partes de España.

Vease el *Ranunculo aquatico de hoja como la del Cotyledon*, con ombliigo. *Col. ephr. 1. p. 315. t. 316.* al qual tendria *Linneo* con *Vaillant* por especie de este género, si *Michael Angelo Till* en el Catálogo de plantas de su jardin de Pisa, p. 83. no lo tuviese por especie de *Hydrocotile*, de lo qual podrán asegurarse los que tengan la ocasion de observar esta planta viva.

Pensylvania.

42. RANUNCULUS *caulycibus reflexis*, *caule erecto*, *foliis ternatis trifidis incisissimis subtus pilosis*. *Suppl. p. 272.* Ranunculo con los cálices redoblados; tallo derecho; hojas de tres en rama, hendidas en tres partes, cortadas, y por debaxo pelosas.

Cast. Ranunculo de Pensilvania.

Habita en Pensilvania. ☉

Produce el tallo derecho, ramoso, rollizo, y con pelos extendidos: las hojas de tres en rama, algo rayadas, y por debaxo pelosas igualmente que los peciolos: las hojuelas hendidas en tres partes, agudas, cortadas y aserradas: los pedunculos rollizos, lisos y esparcidos: el caliz redoblado, con sus hojuelas aovadas y cóncavas: cinco petalos amarillos, y casi de la magnitud del caliz: los estambres pequeños, y del largo de la corola: la cabe-

zue-

492 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

zuela de los gérmenes aovada y mas larga que la corola : las semillas aovadas , comprimidas , y terminadas en punta rígida.

846. Género TROLLIUS. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. ninguno.

COR. Petalos cerca de catorce, casi aovados, que se caen quando las demas partes de la flor, colocados de tres en tres, en tres series exteriores, y cinco en una serie de mas adentro.

Nectarios nueve, lineares, planos, encorvados y horadados por su base ácia dentro.

ESTAMB. Filamentos numerosos, setáceos y mas cortos que la corola : con las anteras derechas.

PIST. Gérmenes numerosos, sentados y en forma de columna : estilos ninguno : estigmas terminados en punta rígida y mas cortos que los estambres.

PERIC. Capsulas numerosas, recogidas en cabezuela, aovadas, con su punta encorvada ácia atrás.

SEM. solitarias.

ESPECIES.

Euro-
pæus.

1. TROLLIUS *corollis* X Trolio con las corolas cer-
conniventibus, nectariis lon- X radas ó sea con los petalos
gitudine staminum. Fl. dan. X arrimados entre sí ; y necta-
t. 133. Knorr. del. 2. t. 4. X rios de la longitud de los es-
tambres.

Helleborus flore clauso X Heleboro con la flor cer-
erecto petiolato, caule sim- X rada, derecha, con pedun-
plicissimo. Fl. suec. 474. X culo ; y tallo muy sencillo.
510.

Helleborus foliis angula- X Heleboro con hojas angu-
tis, multifidis, flore globoso. X ladas, hendidas en muchas
Roy. lugdb. 484. X partes ; y flor globosa.

Ranunculus montanus, X Ranunculo montano, con
Aconiti folio, flore globoso. X hoja como la del Aconito ; y
C. B. P. 182. X flor globosa.

Hcl-

INSER. EN EL REC. CON MAS DE VI. PIST. 493

Helleborus niger, *Ranunculi folio*, *flore globoso*, *majore*. Tourn. p. 272. Heleboro negro, con hoja como la del Ranunculo; flor globosa y mas grande.

Ranunculus flore globoso. Dod. pempt. 430. Ranunculo con la flor globosa.

Cast. Trolio de Europa.

Habita en los alpes y montes que están al pie de ellos, de Suecia, Alemania é Inglaterra: en los de Burgos, Liebana, Asturias, Pirineos de Cataluña junto á Set-casas y otras partes de España. ¶

Tiene las *corolas* cerradas y de color amarillo-roxo: los *nectarios* del mismo color y no mas largos que los estambres: los *gérmenes* y *pistilos* derechos.

Asia-ticus. 2. TROLLIUS *corolla patula*, *nectariis staminibus longioribus*. Trolio con la corola abierta; y los nectarios mas largos que los estambres.

Trollius humilis, *flore patulo*. Buxb. cent. 1. p. 15. t. 22. Trolio baxo, con la flor abierta.

Helleborus niger, *Orientalis*, *Ranunculi folio*, *flore nequaquam globoso*. Tourn. cor. 20. Heleboro negro, Oriental, con hoja como la del Ranunculo; y flor que no es globosa.

Cast. Trolio de Asia.

Habita en la Siberia y Capadocia. ¶

Posee los *nectarios* de color leonado: las *corolas* abiertas y de color amarillo subido: los *gérmenes* ó *pistilos* doblados ácia atrás y casi tendidos.

847. Género ISOPYRUM. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. ninguno.

COR. *Petalos* cinco, aovados, iguales, extendidos y que se caen quando las demas partes de la flor.

Nectarios cinco, iguales, tubulosos, cortísimos, hendidos por su boca en tres lóbulos, con el exterior mayor,

494 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

yor, é insertos en el receptáculo dentro de los petalos.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos, capilares y mas cortos que la corola: con las *anteras* sencillas.

PIST. *Gérmenes* muchos, aovados: *estilos* sencillos, de la longitud del germen: con los *estigmas* obtusos y de largo de los estambres.

PERIC. *Capsulas* muchas, encorvadas ácia atrás, á manera de media luna y de una celdilla.

SEM. muchas.

OBS. Es muy parecido á las especies de *Heleboro*; pero tiene su traza muy diversa.

El *Isopyro* como el *Thaliótro* posee solamente uno, dos ó tres *gérmenes*.

ESPECIES.

Fumarioides 1. ISOPYRUM *stipulis subulatis, petalis acutis.* Isopyro con estipulas alenadas; y petalos agudos.

Gmel. sib. 4. p. 191.

Helleborus Fumariæ foliis. Amm. ruth. 74. t. 12. Heleboro con hojas como las de la Fumaria.

Cast. Isopyro como Fumaria.

Habita en los bosques sombríos de Siberia. ☉

Tiene las flores amarillas. Vease la *Aquilegia con cuernozuelos*; y hojas como las de la *Moscatelina*; planta pequeña de la Isla de Cheusan. *Pluk. amalth.* 3. p. 360. f. 3.

Thaliótroides 2. ISOPYRUM *stipulis ovatis, petalis obtusis.* Isopyro con estipulas aovadas; y petalos obtusos.

Thaliótrum Batrachioides, flore albo, Italicum. Boc. mus. 84. t. 79. f. 1.

Thaliótro como *Ranunculo*, de Italia, con la flor blanca.

Ranunculus nemorosus,

Thaliótri folio. C. B. P. 178. Ranunculo de bosques sombríos, con hoja como la del Thaliótro.

Rai. hist. 584. Moris. hist. 2. p. 437. sect. 4. t. 28. f. 12.

Thaliótrum montanum, præcox. Tourn. p. 271. Thaliótro montano, temprano.

INSER. EN EL REC. CON MAS DE VI. PIST. 495

Ranunculus præcox, se-
cundus, *Thalictri folio*.
 Clus. hist. 333.

Ranunculo temprano, se-
 gundo, con hoja como la del
 Thalicthro.

Cast. Isopyro como Thalicthro.

Habita en los alpes de Italia y de Grenoble: en los cam-
 pos de Viena y de Carniola, en lugares sombríos.

Es planta de primavera.

3. ISOPYRUM *stipulis* *obsoletis*. Hall. helv. n. 1190. Isopyro con estipulas des-
 figuradas.

Aquilegia montana, par-
 vo flore, *Thalictri folio*.
 C. B. P. 144. Prodr. 75.
 Bauh. hist. 3. p. 484. Rai.
 hist. 707. Moris. hist. 3. p.
 458. sect. 12. t. 11. f. 5.
 Tourn. p. 428.

Aquilegia montana, con
 la flor pequeña; y hoja como
 la del Thalicthro.

Cast. Isopyro como Aquilegia.

Habita en los alpes de Suiza, de Trento y Apeninos. 2

848. Género HELLEBORUS. * Tourn. t. 144.

CAR. GEN. NAT.

CAL. ninguno; sino que sea la corola, persistente en algu-
 nas especies.

COR. Petalos cinco, casi redondos, obtusos y grandes.

Nectarios muchos, cortísimos, puestos en cerco, de
 una pieza, tubulosos, por abaxo mas angostos, con
 su boca derecha, escotada, hendida en dos labios,
 y el interior mas corto.

ESTAMB. Filamentos numerosos, alesnados: con las ante-
 ras comprimidas, mas angostas por abaxo y dere-
 chas.

PIST. Gérmenes seis, poco mas ó menos, y comprimidos:
 estilos alesnados: con los estigmas gruesecitos.

PERIC. Capsulas comprimidas, con dos quillas; la quilla
 inferior mas corta, la superior convexa y que se
 abre.

SEM. muchas, redondas y fixadas á una sutura.

El *Heleboro de invierno* se despoja de sus pétalos, pero las restantes especies los retienen volviéndose verdes.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 271.

La flor es rosácea ó que consta de muchos pétalos puestos en cerco; de cuyo centro sale el pistilo, ceñido al rededor de su base con muchos cuernecillos echados entre los estambres y pétalos, y que pasa á fruto, en el qual, como en una cabezuela, se recogen las vaynas membranosas, que rematan en una astita, y se abren longitudinalmente, llenas de semillas casi redondas ú aovadas.

ESPECIES.

- Hymalis.* 1. HELLEBORUS *flore* X Heleboro con la flor pue-
folio insidente. Jacq. austr. ta sobre la hoja.
 t. 202.
- Helleborus Ranunculoi-* X Heleboro temprano, como
des, præcox, tuberosus, flore X Ranunculo, tuberoso; y con
luteo. Moris. hist. 3. p. 459. la flor amarilla.
 sect. 12. t. 2. f. 4.
- Aconitum unifolium, lu-* X Aconito de una hoja, bul-
teum, bulbosum. C. B. P. boso; y con flor amarilla.
 183. Hall. anat. t. 11.
- Helleborus niger, tube-* X Heleboro negro, tubero-
rosus, Ranunculi folio, flo- X so, con hoja como la del Ra-
re luteo. Tourn. p. 272. nunculo; y flor amarilla.
- Ranunculus cum flore in* X Ranunculo con la flor en
medio folio, radice tubero- X medio de la hoja; y raiz tu-
sa. Bauh. hist. 3. p. 414. berosa.
- Aconitum luteum, minus.* X Aconito menor, con la
 Dod. pempt. 440. flor amarilla.

Cast. Heleboro de invierno.

Habita en Lombardia, Suiza, Italia, Austria y montes Apeninos. 2

Produce el *escapo* muy sencillo; con una *hoja* horizontal y terminal: una sola *flor* tambien terminal, sentada, derecha y amarilla.

Niger. 2. HELLEBORUS *scapo subbifloro subnudo, foliis pedatis*. Mat. med. 163. Jacq. austr. t. 201. Knorr. del. 1. t. N. 6. Heleboro con el escapo de una ó dos flores, casi desnudo; y hojas ramosas.

Helleborus scapo florifero subnudo, petiolo communi bipartito. Hort. Cliff. 227. Heleboro con el escapo que lleva las flores casi desnudo; y el peciolo comun dividido (*por arriba*) en dos partes. (*es lo mismo que ramoso ó que el fol. pedatum*).

Helleborus nectariis obsubulatis, filamentis staminum duplobrevioribus. Scop. carn. ed. 2. n. 696. Heleboro con los nectarios alesnados al revés, y los filamentos de los estambres al doble mas cortos.

Helleborus niger, flore Roseo. C. B. P. 186. Heleboro negro, de flor como Rosa.

Helleborus niger, angustioribus foliis. Tourn. 272. Heleboro negro, con hojas mas angostas.

Helleborus niger, legitimus. Clus. hist. 274. Heleboro negro, legitimo.

Cast. Heleboro negro. Farm. Helleborus niger.

Habita en lugares ásperos de Austria, de Florencia y en los montes Apeninos. ¶

Tiene todas las *hojas* radicales, correosas, consistentes y que permanecen todo el invierno: el *escapo* con rudimento de una hoja, hendido en dos ramitas, sin hojas, de dos flores y con brácteas: las *flores* en verticilo; blancas; pero marchitandose se vuelven purpúreas.

PROPIED. La raiz es acre, algo amarga, casi nauseosa y fétida: excelente purgante, expelente y emenagoga: se usa en la melancolia, hypocondria, mania y clorosis; y en las ulceras de la cabeza y mexillas de los infantes.

Vi. 3. HELLEBORUS *caule bifido, ramis foliosis bifloris, foliis digitatis*. Jacq. austr. t. 106. Knorr. del. 1. t. N. 5. Heleboro con el tallo hendido en dos partes; ramas foliosas, de dos flores; y hojas divididas como en dedos.

498 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Helleborus caule æquali folioso, foliis radicalibus caulem tandem superantibus. Hort. cliff. 227.

Heleboro con el tallo igual, folioso; y hojas radicales que hallandose del todo crecidas superan al tallo.

Helleborus foliis multipartitis, serratis, caule paucifloro. Hall. helv. n. 1192.

Heleboro con hojas divididas en muchas partes, aserradas; y tallo de pocas flores.

Helleborus niger, hortensis, flore viridi. C. B. P. 185. Tourn. p. 272.

Heleboro negro, hortense, con la flor verde.

Veratrum nigrum II. Dod. pempt. 385.

Veratro negro, segundo.

Helleborus niger, vulgaris, flore viridi vel herbaeco, radice diuturna. Bauh. hist. 3. p. 636.

Heleboro negro, vulgar, con la flor verde, ó del color de la yerba; y raiz que dura mucho tiempo.

Cast. Heleboro verde.

Habita en los montes Uganeos: en los de Avila y Castilla la vieja: en los de Leon, Galicia, Asturias, Burgos, Valencia, Aragon, Cataluña y otros de España. Posee todas las hojas radicales: el escapo sin hojas, hendido en dos ramitas foliosas, con dos flores inclinadas y verdes: y varía en el número de los pistilos.

Fce. tidus. 4. HELLEBORUS caule multifloro folioso, foliis pedatis.

Heleboro con tallo de muchas flores, folioso; y hojas ramosas.

Helleborus caule infero angustato multifolio multifloro, foliis caule brevioribus. Hort. cliff. 227.

Heleboro de tallo angostado por debaxo, con muchas flores; y muchas hojas mas cortas que él.

Helleborus ramosus, multiflorus, foliis multipartitis, serratis, stipulis ovato-lanceolatis, coloratis. Hall. helv. n. 1193.

Heleboro ramoso, con muchas flores; hojas divididas en muchas partes, aserradas; estipulas entre aovadas y lanceoladas, y de color.

INSER. EN EL REC. CON MAS DE VI. PIST. 499

Helleborus niger, fœtidus. C. B. P. 185. Tourn. p. 272. Heleboro negro, fétido.

Helleboraster maximus. Lob. ic. 679. Falso-Heleboro, muy grande.

Veratrum nigrum, tertium. Dod. pempt. 386. Veratro negro, tercero.

Helleborus niger, trifolius. Moris. hist. 3. p. 460. sect. 12. t. 4. f. 7. Heleboro negro, con hojas de tres en rama.

Cast. Heleboro fétido.

Habita en Alemania, Suiza y Francia: en Cataluña, Aragon, las dos Castillas y abunda en otras partes de España. ♀ ♂

Tiene todas las *hojas* en el tallo, y ninguna ácia la raiz.

Tri-folius. 5. HELLEBORUS *scapo unifloro*, *foliis ternatis*. Amœn. acad. 2. p. 356. t. 4. f. 18. Fl. dan. t. 566. Heleboro con el escapo de una flor; y hojas de tres en rama.

Cast. Heleboro con hojas de tres en rama.

Habita en las selvas y bosques sombríos del Canadá, Siberia é Islandia.

Tiene la *flor* menuda, blanca y semejante á la de la *Parnasia*.

849. Género CALTHA. * Populago. Tourn. t. 145.

CAR. GEN. NAT.

CAL. ninguno.

COR. *Petalos* cinco, aovados, planos, extendidos, grandes y que se caen quando las demas partes de la flor.

ESTAMB. *Filamentos* numerosos, filiformes y mas cortos que la corola: con las *anteras* comprimidas, obtusas y derechas.

PIST. *Gérmenes* cinco hasta diez, oblongos, comprimidos, derechos: *estilos* ninguno: *estigmas* sencillos.

PERIC. *Capsulas* otras tantas, cortas, puntiagudas, extendi-

500 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

didas, con dos quillas y que se abren por la sutura superior.

SEM. muchas, casi redondas, ribeteadas y fixadas á la sutura superior.

CARACTER GENERICO DE TOURNEFORT.

POPULAGO. P. 254.

La flor es rosácea ó que consta de muchos petalos puestos en cerco; de cuyo centro sale el pistilo que pasa á fruto membranoso, en el quai, como en una cabezuela, se recogen muchas vaynas dobladas ácia abaxo, y llenas de semillas oblongas.

ESPECIE.

Pa-	1. CALTHA. Flor. dan.	X	Caltha.
lustris.	t. 668. Knorr. del. 1. t. H. 2.	X	
	<i>Caltha palustris</i> , flore	X	Caltha palustre, con flor
	<i>simplici</i> . C. B. P. 276.	X	sencilla.
	<i>Caltha palustris</i> . Bauh.	X	Caltha palustre.
	hist. 3. p. 470.	X	
	<i>Populago flore majore</i> .	X	Populago con la flor mas
	Tourn. p. 273.	X	grande.
α	<i>Populago major</i> (& mi-	X	Populago mayor (y me-
	nor). Tabern. ic. 750.	X	nor). α
β	<i>Caltha</i> (major & minor),	X	<i>Caltha</i> (mayor y menor),
	<i>foliis orbiculato-cordatis</i> ,	X	con hojas entre redondas y
	<i>crenatis, flore majore</i> & mi-	X	de figura de corazon, recor-
	<i>nore</i> . Mill. dict. n. 12.	X	tadas; y flor mas grande, ó
		X	mas pequeña. β
χ	<i>Caltha palustris</i> , flore	X	Caltha palustre, con la
	<i>pleno</i> . C. B. P. 276. Tabern.	X	flor plena..... ó multiplica-
	751. <i>flore multiplicato</i> .	X	da. χ
	Bauh. hist. 3. 470.	X	
δ	<i>Populago flore pleno</i> .	X	Populago con la flor ple-
	Tourn. p. 273.	X	na. δ

Cast. *Caltha palustre. vulgo*: Yerba centella.

Habita en lugares húmedos de Europa: en los montes de Avila, de la Cartuja del Paular de Segovia, en los Pirineos de Cataluña y otras muchas partes de España. 24

850. Género HYDRASTIS. *Ellisii à nobiliss.*

virgine Americ. Warneria. Mill.

ic. 190. t. 285.

CAR. GEN. NAT.

CAL. ninguno.

COR. *Petalos tres, aovados y regulares.*

ESTAMB. *Filamentos numerosos, lineares, comprimidos y poco mas cortos que la corola: con las anteras tambien comprimidas y obtusas.*

PIST. *Gérmenes numerosos, aovados y recogidos en cabezuela aovada: estilos cortísimos: con los estigmas algo anchos y comprimidos.*

PERIC. *Baya compuesta de granitos oblongos.*

SEM. *solitarias y oblongas.*

ESPECIE.

Cana- densis.	1. HYDRASTIS.	X	Hydrastide.
	<i>Warneria Canadensis</i> .	X	Warneria del Canadá.
	Mill. <i>ic. 190. t. 285.</i>	X	
	<i>Hydrophyllum verum Ca-</i>	X	Hydrophylo verdadero de
	<i>nadensium. Sp. pl. 3. p. 784.</i>	X	los del Canadá.

Cast. Hydrastide del Canadá.

Habita en aguas del Canadá. ♀

Es semejante al *Hydrophylo*. Tiene las *hojas* de dos en dos, con peciolo, escotadas por su base, aserradas y palmeadas; con sus *lóbulos* acompañados de otro en ambos lados.

851. Género DRIMYS. *Suppl. p. 43. Forst. gen. n. 42. Forst. Act. vps. vol. 3. p. 181.*

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* debaxo del germen, de una pieza, entero, y que se abre en tres lacinias ó lóbulos.
- COR.** *Petalos* seis, ó doce, ovales y extendidos.
- ESTAMB.** *Filamentos* numerosos, mas gruesos por arriba y cortos: *anteras* ovales, mellizas y con lóbulos arriados por su ápice.
- PIST.** *Gérmenes* quatro, ú ocho, aovados al revés y en forma de maza: *estilos* ninguno: *estigmas* con uno ó tres dientes.
- PERIC.** *Bayas* quatro, ú ocho, aovadas al revés, con piecico corto y de quatro simientes.
- SEM.** dos, ó quatro, aovadas y casi de tres caras.
- Forster* distingue este género del de la *Winterana*.

E S P E C I E S.

Grana-
densis. 1. DRIMYS. *pedunculis*^X *axillaribus elongatis trifidis*, *pistillis octo*. *Suppl. p. 269.* Drimys con pedunculos axilares, alargados, hendidos en tres partes; y ocho pistilos.

Cast. Drimys de la Granada.

Habita en la nueva Granada. *Mutis. h.*

Pensó *Linneo* que esta planta fuese variedad de la siguiente, causada por el clima mas caliente.

Produce las *ramas* mas largas: las *hojas* oblongas, mas largas, por debaxo de color mas garzo; de suerte que casi son blanquecinas: los *pedunculos* axilares, solitarios, de dos en dos, ó de tres en tres, filiformes, alargados; pero mas cortos que las hojas y hendidos en tres partes mas arriba de su mitad: los *piecitos* de una flor: el *caliz* como en la especie siguiente: los *petalos* tambien como en la especie siguiente; pero en número de doce, mas oblongos y mayores; y los *interiores* mas pequeños que los de afuera: los *estambres* igualmente que en la especie siguiente: ocho *gérmenes* cuyo nú-

INSER. EN EL REC. CON MAS DE VI. PIST. 503

número rara vez varía: *pistilos* y *bayas* otros tantos: *semillas* de una en una, ó de dos en dos y lustrosas. Su *corteza* tiene tambien el sabor como el de la siguiente especie.

Win-
teri.

2. DRIMYS *pedunculis aggregatis terminalibus*, *pistillis quatuor*. Suppl. p. 269. Drimys con pedunculos agregados, terminales; y quatro pistilos.

Drimys Winterii. Forst. Drimys de Winter.

gen. n. 42. Forst. Act. ups. vol. 3. p. 181. Medical. obs. vol. 5. p. 41. t. 1. f. bona. Mill. fasc. f. pulcherrima.

Periclymenum rectum, *foliis Laurinis*, *cortice aromatico, acri*. Act. Angl. anno 1693. n. 204. p. 922. t. 1. Periclymeno recto, con hojas como las del Laurel; y corteza aromática y acre.

Cast. Drimys de Winter.

Habita en la America austral, en los valles expuestos al Sol. Forst. $\frac{h}{2}$

Es *arbol* siempre verde.

Esta especie produce la verdadera corteza Winterana ó Magelanica, la qual es muy acre, crasa, lisa y cenicienta por defuera, por dentro fibrosa y de color moreno; pero se halla menos amarga y aromática que la corteza llamada Canela blanca, y su olor se acerca al de la corteza de cascarilla. Se tiene por excelente antiscorbutica.

Axil-
laris.

3. DRIMYS *pedunculis ternis axillaribus*, *pistilo unico*. Suppl. p. 270. Drimys con pedunculos de tres en tres, axilares; y un solo pistilo.

Drimys axillaris. Forst. Drimys axilar.

gen. n. 42. Forst. Act. ups. vol. 3. p. 182.

Cast. Drimys axilar.

Habita en los bosques sombríos de la nueva Zeelandia.

Forster.

Flo-

504 FLORES HERMAF. DE XX. Ó MAS EST.

Florece en el mes de Noviembre, y tiene mucha afinidad con la *Michelia*.

El sabor de toda la planta y señaladamente de la corteza es acerrimo.

852. Género UNONA. *Suppl. p. 44.*

CAR. GEN. NAT.

- CAL. *Periantio* de tres hojuelas, menudo, agudo y apretado.
- COR. *Petalos* seis, lanceolados, sin uñas, gibosos en su base por defuera, excavados por dentro, y juntos en forma de jarrito.
- ESTAMB. *Filamentos* ninguno: *anteras* innumerables, oblongas y amontonadas en globo dentro del jarrito de la corola.
- PIST. *Gérmenes* cubiertos con las anteras: *estilos* diez, pocas ó menos, setáceos, acercados, y casi mas largos que las anteras: *estigmas*.
- PERIC. *Bayas* muchas, con piececito, puestas en umbela, divergentes, aovadas y gibosas.
- SEM. dos, aovadas, muy lampiñas, desmochadas por su base, y la una encima de la otra.
- OBS. Parece que corresponderia mejor á la clase *Gynandria*, aunque tiene mucha afinidad con la *Annona*.

ESPECIE.

- Dis-
creta. 1. UNONA. *Suppl. p. 270.* X Unona.
Peyricoboom. Surinam. X Peyricoboom. (Llamada
X asi por los de Surinam).

Cast. Unona discreta.

Habita en Surinam. Dalberg. \bar{n}

Es arbol con ramas en varitas, angostas y dobladizas. Produce las *hojas* en dos órdenes, alternas, como las del *Aligustre*, lampiñas, enterisimas y del largo de un dedo, con los peciolo cortísimos: los *piececitos* de las bayas dentro de la corola y en umbela.

La

INSER. EN EL REC. CON MAS DE VI. PIST. 505

La flor es como la de la *Annona* ; pero el fruto diverso ,
purpúreo , sabroso y aromático.

N O T A.

La *Unona* , *Annona* y *Gylopia* son muy semejantes en
el carácter de la flor , y tienen los *estambres* sentados en
el germen ; por cuya razon deberian colocarse mas bien
en la clase *Gynandria*.

CLASE XIV.

DIDYNAMIA. DE LAS FLORES HERMAFRODITAS DE CUATRO ESTAMBRES, CON LOS DOS MAS CORTOS.

ORDEN I.

GYMNSPERMIA. DE LAS MISMAS FLORES CON CUATRO SEMILLAS DESNUDAS.

FLORES CON LOS CALICES CASI HENDIDOS EN CINCO PARTES.

Géneros.

Caracteres sobresalientes.

- 853 AIUGA. COROLA con el labio superior muy pequeño : y *estambres* mas largos que él.
- 854 TEUCRIUM. COROLA con el labio superior partido mas allá de su base y apartado donde se recogen los *estambres*, ó sin labio superior.
- 855 SATUREIA. COROLA con sus lacinias casi iguales : y los *estambres* apartados.
- 857 HYSSOPUS. COROLA con la lacinia intermedia del labio inferior recortada : *estambres* rectos y apartados.
- 858 NEPETA. COROLA con la lacinia intermedia del labio inferior recortada : la *garganta* redoblada por su margen : y los *estambres* acercados.
- 859 LAVANDULA. CALIZ aovado , con algun diente, y sostenido de una bractea:

corola resupinada (*): y los *estambres* dentro del tubo de ella.

- 860 **SIDERITIS**. **ESTAMBRES** dentro del tubo de la *corola* : y el *estigma* mas corto que envuelve al otro.
- 861 **MENTHA**. **COROLA** casi igual , hendida en quatro lacinias , y la mas ancha escotada : *estambres* derechos y apartados.
- 862 **PERILLA**. **CALIZ** con su lacinia superior cortisima : *estambres* apartados : *estilos* dos y unidos.
- 863 **GLECOMA**. **CALIZ** hendido en cinco partes : y cada par de las *anteras* arriado en forma de cruz.
- 864 **LAMIUM**. **COROLA** con el labio superior entero , arqueado , el inferior hendido en dos lóbulos ; y la *garganta* dentada en ambas partes por su margen.
- 865 **GALEOPSIS**. **COROLA** con el labio superior algo recortado , arqueado , y el inferior con dientes encima.
- 866 **BETONICA**. **CALIZ** con aristas : *corola* con el labio superior ascendente , algo plano ; y *tubo* cilindrico.
- 867 **STACHYS**. **COROLA** con el labio superior arqueado , el inferior redoblado por sus lados ; la *lacinia* intermedia mayor y escotada : y los *estambres* , despues de haber echado el polvillo , vueltos ácia los lados.
- 868 **BALLOTA**. **CALIZ** en forma de salvilla , con cinco dientes y diez estrias: *co-*
ro-

(*) Es la *corola* cuyo labio superior mira al suelo , y el inferior al cielo. *Nota*: En la pag. 88 de la Explicacion de la *Filosofia Botánica* se halla equivocada esta definicion , diciendo que el labio superior mira al cielo y el inferior al suelo.

- rola* con el labio superior recortado y cóncavo.
- 869 MARRUBIUM. CALIZ en forma de salvilla, rígido y con diez estrias: *corola* con el labio superior hendido en dos partes, linear y recto.
- 870 LEONURUS. ANTERAS salpicadas de puntitos lustrosos.
- 871 PHLOMIS. CALIZ angulado: *corola* con el labio superior echado sobre el inferior, comprimido y veloso.
- 872 MOLUCCELLA. CALIZ en forma de campana, ampliado, mas ancho que la *corola*, y espinoso.

FLORES CON LOS CALICES HENDIDOS
EN DOS LABIOS.

- 882 SCUTELLARIA. CALIZ entero por su boca, y despues de haber florecido, cerrado con su cobertera.
- 875 THYMUS. CALIZ de dos labios, y su garganta cerrada con pelillos.
- 880 OCYMUM. CALIZ con el labio superior redondo, y el inferior hendido en quatro partes: *corola* resupinada, con un labio hendido en quatro partes, y el otro indiviso: y *filamentos* exteriores que arrojan por su base un apendice.
- 883 PRUNELLA. FILAMENTOS ahorquillados, con uno de los dos ramitos que lleva en su remate la antera: y el *estigma* hendido en dos partes.
- 884 CLEONIA. FILAMENTOS ahorquillados, con uno de los dos ramitos que lleva en su ápice la antera: y el *estigma* hendido en quatro partes.

881. TRICHOSTEMA. . COROLA con el labio superior arqueado : y los *estambres* larguissimos.
- 877 DRACOCEPHALUM. COROLA con su garganta inflada ; y el labio superior cóncavo.
- 874 ORIGANUM.. . . . ESPIGAS de quatro lados, con escamas apiñadas, que recogen los cálices.
- 873 CLINOPODIUM. . INVOLUCRO de muchas cerdas, colocado debaxo del verticilo.
- 856 THYMBRA. CALIZ casi cilindrico , de dos labios, señalado por una y otra parte con una linea vellosa : y *estilo* medio hendido en dos lacinias.
- 879 MELITTIS. CALIZ mas ancho que el tubo de la corola : la *corola* con el labio superior plano , el inferior recortado : y las *anteras* cruzadas.
- 876 MELISSA.. . . . CALIZ árido , casi plano por encima, con el labio superior algo levantado : *corola* con el labio superior casi arqueado, hendido en dos partes ; y el inferior con el lóbulo del medio de figura de corazon.
- 878 HORMINUM. CALIZ en forma de campana, con quatro lacinias casi iguales , la quinta mayor y escotada : y la *corola* con el labio superior cóncavo.
- 885 PRASIMUM. BAYAS quatro , y de una semilla.
- 886 PHRYMA. SEMILLA una sola.

ORDEN II.

ANGIOSPERMIA. DE LAS MISMAS FLORES CON LAS SEMILLAS
CUBIERTAS.

FLORES CON LOS CALICES HENDIDOS
EN DOS PARTES.

- 931 OBOLARIA. CALIZ hendido en dos partes: *corola* hendida en quatro lacinias, y á manera de campana: *capsula* de una celdilla, de dos ventallas, con muchas simientes: y *estambres* que salen de las divisiones de la *corola*.
- 932 OROBANCHE. CALIZ hendido en dos partes: *corola* boquiabierta: *capsula* de una celdilla, de dos ventallas, con muchas simientes; y una *glandula* puesta debaxo del germen.
- 922 HEBENSTREITIA. CALIZ dos veces escotado, y hendido por debaxo: *corola* con un labio ascendente y hendido en quatro partes: *capsula* de dos semillas: y *estambres* insertos en la margen del borde de la *corola*.
- 903 TORENIA. CALIZ de dos labios, el superior con tres puntas: *filamentos inferiores* con un ramito estéril: y *capsula* de dos celdillas.
- 952 ACANTHUS. CALIZ de dos hojas, y hendido en dos partes: *corola* de un labio, inclinada, hendida en tres lacinias: y *capsula* de dos celdillas.
- 914 PREMNA. CALIZ de dos lóbulos: *corola* hendida en quatro partes: *ba-ya*

ya de quatro celdillas: y *simientes* solitarias.

911 CRESCENTIA. . . . CALIZ dividido en dos partes iguales: *corola* gibosa: *baya* con piececito, de una celdilla: y con muchas *simientes* de dos caxitas.

946 CASTILLEJA. *Suppl. p. 47.* PERIANTIO de una pieza, tubuloso, y que se hende longitudinalmente: *corola* boquiabierta, y el labio inferior con dos glandulas tubulosas: *capsula* de dos celdillas con el disepimento opuesto, y de muchas *simientes*.

FLORES CON LOS CALICES HENDIDOS
EN TRES PARTES.

910 HALLERIA. CALIZ hendido en tres partes: *corola* hendida en quatro lacinias: *filamentos* mas largos que la *corola*: *baya* debaxo del caliz, y de dos celdillas. (No vió Linneo el fruto).

FLORES CON LOS CALICES HENDIDOS
EN QUATRO PARTES.

920 SELAGO. CALIZ hendido en quatro lacinias: *corola* con el tubo capilar: *borde* casi igual: y con una ó dos *simientes*.

935 LIPPIA. CALIZ de quatro dientes, casi redondo, derecho, comprimido y membranoso: *capsula* recta, de una celdilla, con dos ventallas, y dos *simientes*; y la *una* de dos caxitas.

891 LATHRÆA. CALIZ hendido en quatro partes: *glandula* deprimida, colocada en

- en la base de la sutura del ger-
men : y *capsula* de una celdi-
lla.
- 887 BARTSIA. CALIZ de dos lóbulos , escota-
do , de color : *corola* menos de
color que el caliz , con el labio
superior mas largo que aquel :
y *capsula* de dos celdillas.
- 889 EUPHRASIA. CALIZ hendido en quatro partes,
cilindrico : *capsula* de dos cel-
dillas , entre aovadas y oblon-
gas : las *anteras* inferiores es-
pinosas en un lóbulo por su
base.
- 888 RHINANTHUS. CALIZ hendido en quatro laci-
nias , ventricoso : *capsula* de
dos celdillas , obtusa y com-
primida.
- 890 MELAMPYRUM. CALIZ hendido en quatro partes:
corola con el labio superior
comprimido , y muy plegado
por su margen : *capsula* de dos
celdillas , obliqua , que se abre
por una parte : *semillas* dos y
gibosas.
- 892 SCHWALBEA. CALIZ hendido en quatro lóbu-
los , con el superior muy pe-
queño , y el inferior muy gran-
de y escotado.
- 939 BARLERIA. CALIZ dividido en quatro par-
tes : los dos *estambres* mu-
cho mas pequeños : *capsula* de
quatro ángulos , de dos celdi-
llas? de dos ventallas , elásti-
ca , sin uñas : y con dos *si-
mientes*.
- 917 LOESELIA. CALIZ hendido en quatro partes:
corola con todas las lacinias la-
deadas : *estambres* opuestos al
petalo : y *capsula* de tres cel-
dillas.

912 GMELINA. CALIZ de quatro ó cinco dientes: *corola* hendida en quatro lacinias, á manera de campana: las dos *anteras* divididas en dos partes, y las otras dos sencillas: y *drupa* con la nuez de dos caxitas.

915 LANTANA. CALIZ con quatro dientes poco manifiestos: *estigma* gancho-so y refracto: y *drupa* con la nuez de dos celdillas.

FLORES CON LOS CALICES HENDIDOS
EN CINCO PARTES.

950 AVICENNIA. CALIZ dividido en cinco partes: *corola* de dos labios, el superior quadrado: *capsula* correosa, de figura que se acerca á la de rombo: y con una *simiente*.

893 TOZZIA. CALIZ de cinco dientes: *capsula* de una celdilla, globosa: y con una *simiente*.

928 LIMOSELLA. CALIZ hendido en cinco partes: *corola* hendida en cinco lacinias iguales: *estambres* acercados por pares: *capsula* de una celdilla, con dos ventallas: y muchas *simientes*.

925 BROWALLIA. CALIZ de cinco dientes: *corola* con el borde hendido en cinco partes, igual, abierto, y con su ombligo cerrado: *anteras* las dos mayores; y *capsula* de una celdilla.

919 LINDERNIA. CALIZ partido en cinco lacinias: *corola* boquiabierta, con el labio superior cortísimo: los dos *estambres inferiores* con un diente terminal; la *antera*

- casi lateral : y *capsula* de una celdilla.
- 929 VANDELLIA. CALIZ hendido en quatro ó cinco laciniás : *corola* boquiabierto : los dos *filamentos exteriores* que salen del disco del labio de la *corola* : *anteras* unidas en pares : *capsula* de una celdilla : y con muchas *simientes*.
- 897 GESNERIA. CALIZ hendido en cinco partes, sentado en el germen : *corola* encorvada ácia dentro y ácia atrás : *capsula* baxo del caliz, y de dos celdillas.
- 905 SCROPHULARIA.. CALIZ hendido en cinco laciniás : *corola* casi globosa , resupinada : y *capsula* de dos celdillas.
- 930 STEMODIA. CALIZ partido en cinco laciniás : *corola* de dos labios : *estambres* quatro , y cada *filamento* hendido en dos laciniás ; con dos *anteras* : y *capsula* de dos celdillas.
- 906 CELSIA. CALIZ partido en cinco laciniás : *corola* en forma de rueda : *filamentos* barbados : y *capsula* de dos celdillas.
- 927 SIBTHORPIA. CALIZ partido en cinco laciniás : *corola* dividida en cinco partes iguales : *estambres* en pares apartados : *capsula* comprimida , orbicular , y de dos celdillas , con su disepimento transversal.
- 918 CAPRARIA. CALIZ partido en cinco laciniás : *corola* en forma de campana, hendida en cinco partes , aguda : *capsula* de dos ventallas, de dos celdillas : y con muchas *simientes*.

- 907 DIGITALIS. CALIZ partido en cinco lacinias: *corola* en forma de campana, hendida en cinco partes, ventricosa: *capsula* aovada y de dos celdillas.
- 908 BIGNONIA. CALIZ hendido en cinco partes, en forma de cubilete: *corola* con su garganta á manera de campana, hendida en cinco lacinias, y por debaxo ventricosa: *siliqua* de dos celdillas: con las *simientes* membranosas y aladas.
- 938 RUELLIA. CALIZ partido en cinco lacinias: *corola* casi en forma de campana: *estambres* por pares acercados: y *capsula* que se abre por sus dientes elásticos.
- 924 BUCHNERA. CALIZ de cinco dientes poco manifiestos: *corola* con el borde hendido en cinco lóbulos iguales y de figura de corazon: y *capsula* de dos celdillas.
- 923 ERINUS. CALIZ de cinco hojuelas: *corola* con el borde hendido en cinco lóbulos iguales, escotados, y el labio superior muy corto y redoblado: con la *capsula* de dos celdillas.
- 913 PETRÆA. CALIZ partido en cinco lacinias, muy grande y de color: *corola* en forma de rueda: *capsula* de dos celdillas, puesta en el fondo del caliz: con las *simientes* solitarias.
- 921 MANULEA. CALIZ dividido en cinco partes: *corola* con el borde partido en cinco lacinias alesnadas, y las quatro superiores mas arrimadas: *capsula* de dos celdillas, y con muchas *simientes*.

- 516 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,
 898 ANTIRRHINUM. . CALIZ de cinco hojuelas: *corola* con su base nectarífera, que sobresale ácia fuera: y *capsula* de dos celdillas.
- 899 HEMIMERIS. *Suppl. p. 45.* COROLA en forma de rueda, con una lacinia mayor de figura de corazon al revés: un *hoyuelo nectarífero* en las lacinias: *capsula* de dos celdillas, con la una mas gibosa.
- 951 COLUMNEA. CALIZ partido en cinco lacinias: *corola* con el labio superior arqueado, entero y sobre su base giboso: *anteras* unidas: y *capsulas* de dos celdillas.
- 895 GERARDIA. CALIZ hendido en cinco partes: *corola* de dos labios, el inferior partido en tres lóbulos escotados, y el del medio partido en otros dos: *capsulas* de tres celdillas, y que se abre.
- 894 PEDICULARIS. . . CALIZ hendido en cinco partes: *capsula* de dos celdillas, obliqua, que remata en punta rígida: y *semillas* cubiertas con una telilla.
- 937 MIMULUS. CALIZ de cinco dientes, prismático: *corola* boquiabierta, con el labio superior muy doblado por sus lados: *capsula* de dos celdillas: y con muchas *simientes*.
- 934 DODARTIA. CALIZ de cinco dientes: *corola* con el labio inferior al doble mas largo: *capsula* de dos celdillas y globosa.
- 896 CHELONE. CALIZ partido en cinco lacinias: *rudimento* de un quinto filamento puesto entre los estambres de mas arriba: y *capsula* de dos celdillas.

- 936 SESAMUM. CALIZ partido en cinco lacinias: *corola* en forma de campana, hendida en cinco lóbulos, con el de mas abaxo mayor: *rudimento* de un quinto filamento: *estigma* lanceolado: y *capsula* de quatro celdillas.
- 902 MARTYNIA. CALIZ hendido en cinco partes: *corola* boquiabierta: *capsula* leñosa, con corteza y pico como anzuelo, de cinco celdillas y dos ventallas.
- 901 CRANIOLARIA. CALIZ de la flor doble: el *periantio* de quatro hojuelas: *espata* de una pieza: *corola* con el tubo larguísimo: y *capsula* como la de la *Martynia*.
- 953 PEDALIUM. CALIZ partido en cinco lacinias: *corola* casi boquiabierta, con el borde hendido en cinco partes: *nuez* corchosa, de quatro ángulos, con espinas, de dos celdillas: y *simientes* de dos en dos.
- 926 LINNÆA. CALIZ doble, el del fruto de quatro hojuelas: el de la flor partido en cinco lacinias y encima del germen: *corola* en forma de campana: *baya* seca, y de tres celdillas.
- 949 BONTIA. CALIZ partido en cinco lacinias: *corola* de dos labios, con el inferior partido en tres lacinias y revuelto: *drupa* aovada, con su ápice obliquo; y *semilla* una sola.
- 910 CORNUTIA. CALIZ de cinco dientes: *estambres* mas largos que la *corola*: *estilo* larguísimo: y *baya* de una semilla.
- 944 CLERODENDRUM. CALIZ hendido en cinco partes,
en

- en forma de campana : *corola* con el tubo filiforme , y borde partido en cinco lacinias iguales : *estambres* larguissimos , puestos entre las lacinias muy abiertas : y *baya* de una semilla.
- 943 VOLKAMERIA. . . CALIZ hendido en cinco partes: *corola* con las lacinias ladeadas : *baya* de dos simientes : y éstas con dos caxitas.
- 909 CITHAREXYLUM. CALIZ de cinco dientes, en forma de campana : *corola* entre de figura de embudo y de rueda, con sus lacinias vellosas por encima, é iguales : *baya* de dos simientes ; y *estas* de dos caxitas.
- 942 OVIÉDA. CALIZ hendido en cinco partes: *corola* con el tubo cilindrico , encima del germen y larguissimo : *baya* globosa y de dos semillas.
- 947 VITEX. CALIZ de cinco dientes : *corola* con el borde hendido en seis lacinias : y *baya* de quatro semillas.
- 948 AMASONIA. *Suppl.* p. 48. *COROLA* tubulosa , con el borde pequeño , y hendido en cinco partes : *nuez* aovada y de una caxita.
- 941 DURANTA. CALIZ hendido en cinco partes, encima del germen : *baya* de quatro semillas : y *estas* de dos caxitas.
- 904 BESLERIA. CALIZ partido en cinco lacinias: *baya* casi globosa , y con muchas simientes.
- 940 MILLINGTONIA. *Suppl.* p. 45. CALIZ con su margen redoblada: *corola* larguissima, con el *borde* hendido en qua-

quatro partes: *anteras* divididas en dos lacinias, y como vainas.

FLORES CON LOS CALICES HENDIDOS
EN MUCHAS PARTES.

- 933 HYOBANCHE. . . . CALIZ de siete hojuelas: *corola* boquiabierta, y sin labio inferior: *capsula* de dos celdillas, y con muchas simientes.
- 945 THUNBERGIA. *Suppl. p. 46.* CALIZ doble, el exterior de dos hojuelas, y el interior partido en muchas lacinias.
- 900 CYMBARIA. CALIZ con diez dientes: *capsula* de figura de corazon, y de dos celdillas.

FLORES CON MUCHOS PETALOS.

- 954 MELIANTHUS. . . . CALIZ de cinco hojuelas, y la inferior gibosa: *petalos* quatro, con un nectario debaxo de los inferiores; y *capsula* de quatro celdillas.

CLASE XIV.

DIDYNAMIA. DE LAS FLORES HERMAFRODITAS DE CUATRO ESTAMBRES, CON LOS DOS MAS CORTOS.

CARACTER CLASICO NATURAL.

Flores de dos labios y personadas ó sean en forma de mascarilla de Tournefort: de un petalo irregulares de Rivino.

CAL. *Periantio* de una pieza, derecho, tubulado, persistente y hendido en cinco segmentos desiguales.

COR. de un *petalo*, derecha, cuya base tubulosa contiene miel, y hace las veces de nectario: *borde* comunmente boquiabierto: *labio superior* recto: *labio inferior* extendido, hendido en tres lacinias, y la del medio mas ancha.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, lineares, insertos en el tubo de la corola, é inclinados ácia su dorso, de los quales dos intermedios y próximos son mas cortos: todos paralelos, de la longitud de la corola y rara vez mas altos: con las *anteras* cubiertas (comunmente) por el labio superior de la corola, y arrimadas entre sí en pares.

PIST. *Germen* las mas veces dentro de la flor: *estilo* uno solo, filiforme, doblado ácia dentro del mismo modo que los filamentos, puesto entre ellos, algo mas largo y encorvado ligeramente por su extremidad: con los *estigmas* las mas veces hendidos en dos partes.

PERIC. ninguno, ó alguno, y comunmente de dos celdillas.

SEM. (*si no hay pericarpio*) quatro, recogidas en el seno del caliz que hace las veces de *capsula* ó de *pericarpio*; pero (*si existe algun pericarpio*) muchas, fixadas en el receptáculo colocado en medio del mismo pericarpio.

OBS.

OBS. *La flores de esta familia se hallan derechas en su mayor parte ; pero un poco inclinadas en ángulo agudo , para que se cubran mas facilmente las anteras , y la lluvia no estorbe la caida del polen sobre el estigma.*

El caracter esencial de estas flores consiste en tener quatro estambres , y hallarse los dos próximos mas cortos , acercados entre sí , y recogidos dentro de la corola desigual ; con un solo estilo.

CLASE XIV.

DIDYNAMIA. DE LAS FLORES HERMAFRODITAS DE CUATRO ESTAMBRES, CON LOS DOS MAS CORTOS.

ORDEN I.

Gymnospermia. DE LAS MISMAS FLORES CON CUATRO SEMILLAS DESNUDAS.

853. Género AIUGA. * Bugula. *Tourn. t. 98.*

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de una pieza , corto , persistente y medio hendido en cinco partes casi iguales.
- COR.** de un *petalo* , boquiabierto : *tubo* cilindráceo , encorvado : *labio superior* muy pequeño , derecho , hendido en dos partes y obtuso : *labio inferior* grande , extendido , hendido en tres partes y obtuso , con la *lacinia del medio* de figura de corazón al revés ; y las *laterales* pequeñas.
- ESTAMB.** *Filamentos* cuatro , alessnados , derechos , mas largos que el labio superior ; y de ellos *los dos* mas cortos : con las *anteras* mellizas.
- PIST.** *Germen* dividido en quatro partes : *estilo* filiforme , de la misma direccion y longitud de los estambres : *estigmas* dos , delgados , de los cuales el *inferior* es mas corto.
- PERIC.** ninguno. El *caliz* cerrado fomenta las semillas en su seno.
- SEM.** cuatro , y algo oblongas.

CARACT. GENER. DE TOURNEF.

BUGULA. p. 208.

La flor es de un petalo , y de un labio dividido en tres partes ; de las cuales la del medio se halla hendida en dos , con dos dientecitos que ocupan el lugar del labio superior.

perior. Del caliz sale el pistilo acompañado de quatro embriones, que pasan á otras tantas semillas, casi redondas, recogidas en una capsula que fue caliz de la flor. A estas notas se añade las de las flores dispuestas en verticilo.

ESPECIES.

Orientalis.

1. AIUGA *floribus resupinatis*. Sabb. hort. 3. t. 100.

Teucrium staminibus tubo corollæ brevioribus. Roy. lugdb. 306.

Bugula Orientalis, villosa, flore inverso, candido, cum oris purpureis. Tourn. cor. 14.

α *Bugula Orientalis, villosa, flore inverso, cæruleo, alba macula notato*. Tourn. cor. 14. Dill. elth. 60. t. 53. f. 61.

Aiuga con las flores resupinadas.

Teucrio con los estambres mas cortos que el tubo de la corola.

Bugula Oriental, vellosa, con la flor inversa, candida, y sus orillas purpúreas.

Bugula Oriental, vellosa, de flor inversa, cerúlea, y señalada con una mancha blanca. α

Cast. Aiuga Oriental.
Habita en Oriente. ♀

Pyramidalis.

2. AIUGA *tetragonopyramidalis villosa, foliis radicalibus maximis*. Mat. Med. 165. Fl. dan. t. 166.

Bugula foliis obtuse dentatis, caule simplici. Mill. dict. n. 2.

Phillochnois. Reneal. spec. 125.

Aiuga con la espiga entre de quatro lados y piramidal, vellosa, y las hojas radicales muy grandes.

Bugula de hojas con dientes obtusos; y tallo sencillo.

Phillochnoide.

Cast. Aiuga piramidal.
Habita en Suecia, Suiza y Alemania. ♂

Alpina

3. AIUGA *caule simplici, foliis caulinis radicalibus æquantibus*. Gunn. norv. n. 1099.

Aiuga con el tallo sencillo; y hojas del tallo iguales á las de la raiz.

Bu-

524 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Bugula foliis oblongo-ovatis, caulibus decumbentibus, verticillis distantibus. Mill. n. 2. X Bugula con hojas entre oblongas y aovadas; tallos tendidos y verticilos apartados.

Bugula folio maximo, flore pallide cœruleo. Boerh. lugdb. 1. p. 184. X Bugula con hoja muy grande; y flor de color cerúleo pálido.

Bugula alpina, maxima. Tourn. p. 209. X Bugula alpina, muy grande.

Cast. Aiuga alpina.

Habita en los alpes de Suiza y Austria. Jacq. 24
Se diferencia de la precedente, por las *hojas radicales* apenas mayores que las restantes: por tener diez *flores*, y no tres en ambos lados, y éstas de color cerúleo subido y no blancas: por las *bracteas* verdes y no de color.

Genevensis. 4. AIUGA *foliis tomentos lineatis, calycibus hirsutis.* Scop. carn. ed. 2. n. 717. X Aiuga de hojas tomentosas, rayadas; y cálices con pelo áspero.

Bugula foliis angulosis, hirsutis, calycibus villosis. Hall. helv. n. 283. X Bugula de hojas angulosas, con pelo áspero; y cálices vellosos.

Bugula montana. Riv. 140. f. 2. R. X Bugula montana.

Consolida media, Genevensis. Bauh. hist. 3. p. 432. X Consolida media, de Ginebra.

Bugula sylvestris, villosa, flore cœruleo. Tourn. p. 209. X Bugula silvestre, vellosa; con la flor cerúlea.

Bugula carneo flore. Clus. hist. 2. p. 43. X Bugula con la flor de color de carne.

Cast. Aiuga de Ginebra.

Habita en los prados expuestos y collados de Europa: y en el pinar del lugar de Hoyoquesero y otras partes de España. 24

Tiene las *hojas de abaxo* mas angostas que las de la *piramidal*; y las *florales* hendidas comunmente en lóbulos.

Rep-
tans.

5. <i>AIUGA stolonibus rep- tantibus</i> . Knorr. del. 2. t. A.	Aiuga con los pimpollos ó vástagos rastreros.
8. Sabb. Hort. rom. 8. t. 99.	
<i>Bugula flagellifera</i> , fo- liis <i>ovatis</i> , <i>dentatis</i> . Hall.	Bugula que lleva vástagos, con hojas aovadas y denta- das.
helv. n. 282.	
<i>Teucrium foliis obverse ovatis crenatis</i> , <i>caule sim- plicissimo</i> , <i>stolonibus rept- atricibus</i> . Hort. Cliff. 301.	Teucro con hojas aova- das al revés, recortadas; ta- llo muy sencillo; y vástagos rastreros.
<i>Consolida media</i> , <i>pratens- is</i> , <i>cærulea</i> . C. B. P. 260.	Consolida media, praten- se, con la flor cerúlea.
<i>Bugula</i> . Dod. pempt. 135.	Bugula.
Riv. t. 75. Tourn. p. 209.	
<i>Consolida media</i> , <i>quibus- dam Bugula</i> . Bauh. hist. 3.	Consolida media, llamada Bugula por algunos.
P. 430.	

Cast. Aiuga rastrera. *vulgo*: Consuelda media ó Bugula.
Habita en la Europa mas austral: en Cataluña, en Santa
Cruz de Montada de Galicia y otras partes de Espa-
ña. ¶

PROPIED. Es amarga, astringente, vulneraria, resoluti-
va y aperitiva.

854. Género TEUCRIUM. * Tourn. t. 93. Polium.
Tourn. t. 98. Chamædrys. Tourn. t. 97.
Chamæpithys. Tourn. t. 98.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, medio hendido en cinco
partes, agudo, casi igual, giboso por su base en un
lado y persistente.

COR. de un *petalo*, boquiabierta: *tubo* cilindráceo, corto,
y que remata en una garganta encorvada: el *labio*
superior derecho, agudo, partido profundamente
mas allá de su base; con sus *lacinias* apartadas por
los lados: el *labio inferior* extendido, hendido en
tres partes, con sus *lacinias laterales* de la figura
del

del labio superior, derechitas, y la del medio muy grande, y casi redonda.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, alesnados, mas largos que el labio superior de la corola, ascendentes entre su division, y que sobresalen: con las *anteras* pequeñas.

PIST. *Germen* dividido en quatro partes: *estilo* filiforme, de la direccion y magnitud de los estambres: con dos *estigmas* delgados.

PERIC. ninguno. El *caliz* sin mudarse fomenta en su fondo las semillas.

SEM. quatro, y casi redondas.

OBS. El *labio superior de la corola* dividido hasta mas allá de su base y abierto, manifiesta como si aquella careciese de labio superior.

El *Teucro de Tournefort* tiene el *caliz* en forma de campana y una lacinia del labio inferior de la corola cóncava.

El *Polio de Tournefort* posee las *flores* amontonadas en cabezuelas, y que terminan las ramas.

El *Chamædrys* del mismo autor tiene las *flores* en las axilas de las hojas y el *caliz* tubulado.

El *Escordio de Tournefort* y de *Rayo* despide el olor de ajo.

El *Maro de Boerhave* produce las *hojas* como las del *Sérpol*, y tiene el olor acre.

Y la *Iva de Dillenio* se halla con el *caliz* muy giboso por debaxo.

CARACTERES GENERICOS DE TOURN.

TEUCRIUM. p. 207.

La *flor* es de un petalo, labiada, cuyos estambres ocupan el lugar del labio superior; pero el inferior se divide en cinco partes, con la del medio mas ancha y excavada á manera de cuchara, y las demas opuestas en el cuello de la flor. Del *caliz* en forma de campana, sale el pistilo acompañado de quatro embriones, que pasan á otras tantas semillas, casi redondas, recogidas en la capsula en forma de campana que fue *caliz* de la flor.

POZIJUM. p. 206.

La *flor* es de un petalo , labiada , cuyos estambres ocupan el lugar del labio superior ; pero el inferior se divide en cinco partes del mismo modo que en las flores del *Camedrys*. Del caliz sale el pistilo , acompañado de quatro embriones , que pasan á otras tantas semillas recogidas en una capsula que antes fue caliz de la flor. A estas notas se añaden las de las flores unidas en cabezuela , y puestas sobre las ramitas y tallos.

CHAMÆDRYS. p. 204.

La *flor* es de un petalo , labiada , cuyos estambres ocupan el lugar del labio superior ; pero el inferior se divide en cinco partes con la del medio mas ancha , excavada á manera de cuchara , y alguna vez hendida en dos partes , y las restantes opuestas en el cuello de la flor. Del caliz sale el pistilo acompañado de quatro embriones , que pasan á otras tantas semillas , casi redondas , y recogidas en una capsula que fue caliz de la flor. A éstas notas se añaden las de las flores que nacen en las axilas de las hojas , y que tienen el caliz tubuloso.

CHAMÆPITHYS. p. 208.

La *flor* es de un petalo , con un labio dividido en tres partes , de las cuales la del medio está hendida en dos , con dientecitos que ocupan el lugar del labio superior. Del fondo de la flor sale el pistilo acompañado de quatro embriones , que pasan á otras tantas semillas oblongas , recogidas en una capsula que fue caliz de la flor. A estas notas se añade la de nacer las flores en las axilas de las hojas y no en verticilo.

ESPECIES.

- Cam-
panu-
latum. 1. **TEUCRIUM foliis** X Teucrio con hojas hendi-
multifidis, floribus latera- X das en muchas partes; flores
libus solitariis. Schreb. uni- X laterales y solitarias.
lab. p. 31. n. 19.
- Teucrium foliis cuneifor-* X Teucrio de hojas en for-
mibus trifidis, laciniis di- X ma de cuña, hendidas en
visis, floribus solitariis. X tres partes, con sus lacinias
Roy. lugdb. 306. X divididas; y flores solitarias.
- Teucrium calyce campa-* X Teucrio laciniado, con el
nulato, laciniatum, flore X caliz en forma de campana;
parvo, subcæruleo. Boerh. X flor pequeña y de color casi
lugdb. 1. p. 181. X cerúleo.
- Iva moschata, flore albo.* X Iva moscada, con la flor
Riv. monopet. t. 24. X blanca.
- α *Teucrium supinum, pe-* X Teucrio de Pulla, echado,
renne, palustre, apulum, gla- X perenne, palustre y lampi-
brum, foliis laciniatis, flo- X ño, con hojas laciniadas; y
re albo. Till. pis. 193. t. 49. X flor blanca. α
f. 1. Allion. Tourn. p. 53. X

Cast. Teucrio de campana.

Habita en lugares algo húmedos de Oriente y de Pulla. X

Es planta muy semejante al Teucrio botrys; pero lampiña.

Echa las *flores* solitarias, con los *pedunculos* mas cor-
tos que ellas: los *cálices* en forma de campana, sin que
sean gibosos por su base: las *corolas* blancas, relucien-
tes y echadas sobre la hoja: los *tallos* mas *crecidos* pos-
trados y rastreros: las *hojas* dos veces hendidas en tres
partes; y las *semillas* ásperas.

- Orien-
tale. 2. **TEUCRIUM foliis** X Teucrio con hojas hendi-
multifidis, floribus racemo- X das en muchas partes; y flo-
sis. X res racimosos.
- Teucrium foliis multifidis,* X Teucrio con hojas hendi-
linearibus, racemo compo- X das en muchas partes, line-
to, pedicellis brevibus. X res; racimo compuesto; y
Schreb. unilab. p. 30. n. X piececitos cortos.
17. R. X

Teucrium Orientale, angustifolium, laciniatum, flore magno, subcæruleo. Teucrio Oriental, de hoja angosta, laciniada; flor grande, y de color casi cerúleo.
 Tourn. cor. 14. Comm. rar. 25. t. 25. Riv. monop. t. 19.

Cast. Teucrio Oriental.

Habita en Oriente.

Botrys

3. **TEUCRIUM foliis multifidis, floribus axillaribus ternis pedunculatis.** Teucrio con hojas hendidas en muchas partes; flores axilares, de tres en tres, y con pedunculo.
 Sabb. hort. 3. t. 91.

Chamædrys foliis pinnatis, pinnis dentatis, trilobatis, verticillis paucifloris. Chamedrys de hojas pinnadas; hojuelas dentadas, con tres lóbulos; y verticilos de pocas flores.
 Hall. helv. n. 289.

Teucrium foliis multifidis, verticillis dimidiatis. Teucrio con hojas hendidas en muchas partes; y verticilos demediados.
 Schreb. unilab. 32. n. 20.

Chamædrys laciniatis foliis. Camedrys con hojas laciniadas.
 Lob. hist. 209. ic. 385.

Iva moschata, folio multifido. Iva moscada, con hoja hendida en muchas partes.
 Riv. monop. t. 14.

Botrys Chamædryoides. Botrys parecido al Chamedrys.
 C. B. P. 138.

Chamæpitys altera. Otra Chamepitys.
 Dod. pempt. 46.

Cast. Teucrio Botrys.

Habita en lugares abrigados y cultivados de Alemania, Francia, Suiza é Italia: en las serranias de Cuenca: en varias partes de la Alcarria, especialmente en las cercanias del rio Guadiela: en Aragon, Cataluña y otros sitios de España. ⊙

Cha-
mæpi-
thys.

4. **TEUCRIUM** *foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus lateralibus solitariis, caule diffuso*. Mat. med. 165. Fl. dan. t. 733. X Teucro con hojas hendidas en tres partes, lineares, enterisimas; flores sentadas, laterales, solitarias; y tallo difuso.

Bugula foliis imis linearibus, caulinis tripartitis. Hall. helv. n. 284. X Bugula con las hojas de abaxo lineares, y las del tallo partidas en tres lacinias.

Chamæpitys vulgaris, odorata, flore luteo. Bauh. hist. 3. 295. X Camepitys vulgar, olorosa, con la flor amarilla.

Chamæpitys lutea, vulgaris, sive folio trifido. C. B. P. 249. Tourn. p. 208. X Camepitys de flor amarilla, vulgar, ó con hoja hendida en tres partes.

Chamæpitys I. Dod. pempt. 46. Riv. t. 24. X Camepitys primera.

Chamæpitys vulgaris, folio trifido, flore Roseo, Lusitanica. Tourn. p. 208. X Camepitys vulgar, de Portugal, con hoja hendida en tres partes; y flor de color de Rosa. α

Cast. Teucro Camepitys. *vulgo*: Pinillo.

Habita en los campos de Italia, Francia, Inglaterra, Hungría, Suiza y Alemania: en los contornos de Madrid: en Cataluña, Aragon y es comun en las mas provincias de España. ○

PROPIED. *Es resinosa, aromática y amarga, tónica y estomática, resolvente, expelente y emenagoga: se usa en el reumatismo, en los dolores artríticos y de la gota.*

Nisso-
lianum

5. **TEUCRIUM** *foliis trifidis quinquefidisque filiformibus, floribus pedunculatis solitariis oppositis, caule decumbente*. Mill. dict. n. 8. X Teucro con unas hojas hendidas en tres partes, y otras en cinco, filiformes; flores pedunculadas, solitarias, opuestas; y tallo tendido.

Teucrium supinum, annuum, Lusitanicum, foliis laciniatis. Tourn. p. 208. X Teucro de Portugal, anual, tendido, con hojas laciniadas.

Cha-

Chamedrys multiflora, tenuifolia, Hispanica. Moris. *Chamedrys* de España, con muchas flores; y hojas delgadas. *hist. 3. p. 423. sect. 11. t. 22. f. 19. Tourn. p. 205.*

Cast. Teucro de Nissolio.

Habita en Portugal, Extremadura y Galicia. ☉

6. TEUCRIUM foliis tripartitis trifidis linearibus, floribus racemosis, caule hirto. Ger. prov. 276. Teucro con hojas partidas en tres lacinias hendidas en otras tres, lineares; flores racimosas; y tallo con pelo áspero.

Teucrium floribus axillaribus solitariis pedunculatis, calycibus aristatis, foliis linearibus trifidis integerimis sessilibus. Gou. Teucro de flores axilares, solitarias, pedunculadas; cálices con arista; hojas lineares, hendidas en tres partes enterisimas y sentadas. *hort. 271.*

Teucrium supinum, perenne, foliis laciniatis. Tourn. p. 208. Teucro echado, perenne, con hojas laciniadas.

Chamæpitys spuria, multifido folio, Lamii flore. C. B. P. 250. *Camepitys* espuria, con hoja hendida en muchas partes; y flor como la del Lamio.

Pseudo-Chamæpitys. Clus. Falsa-Camepitys. *hist. 2. p. 185.*

Chamæpitys alia. Cam. Otra *Camepitys*. *epit. 680.*

Cast. Teucro falsa-Camepitys.

Habita en Portugal y Francia: en el Real Sitio de Aranjuez, en la Mancha, Extremadura, Andalucía, Alcarria y otras muchas partes de España. ☿

Iva. 7. TEUCRIUM foliis subtricuspidatis linearibus, floribus sessilibus lateralibus solitariis. Teucro con hojas casi de tres puntas, lineares; flores sentadas, laterales y solitarias.

Chamæpitys moschata, foliis serratis. C. B. P. 249. *Camepitys* moscada, con hojas aserradas. *Tourn. p. 208.*

532 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Chamæpitys spuria, prior, *sive Anthyllis altera*. Dod. *Camepitys espuria*, prima, ú otra Antilide. *pempt. t. 47. Clus. hist. 2. p. 186.*

Cast. Teucro iva.

Habita en la Francia Narbonense, Mompeller y Portugal en Andalucia, Extremadura: en el Real Sitio de Aranjuez y otras muchas partes de España. ☉

Mauritanicum.

8. TEUCRIUM *foliis pinnato-multifidis, caule simplicissimo erecto, bracteis subulato-palmatis.* Teucro con hojas enteropinnadas y hendidas en muchas partes; tallo muy sencillo y derecho; bracteas alesnadas y palmeadas.

Teucrium foliis multifidis, linearibus, floralibus mucronatis, racemo simplici. Teucro con hojas hendidas en muchas partes, lineares, las florales terminadas en punta rígida; y racimo sencillo. *Schreb. unilab. 30. n. 16. R.*

Teucrium Delphinii folio, non ramosum. Teucro con hoja como la del Delphinio, sin que sea ramoso. *Shaw. 575. t. 575. icon monstrosa.*

Cast. Teucro de Mauritania.

Habita en Mauritania. ♀

Fruticans.

9. TEUCRIUM *foliis integerrimis ellipticis subtus tomentosis, floribus lateralibus solitariis pedunculatis.* Teucro con hojas enteras, elípticas, tomentosas por debaxo; flores laterales, solitarias y pedunculadas. *Sabb. hort. 3. t. 96.*

Teucrium fruticans, Bæticum. Teucro fruticoso, de Andalucia. *Dill. elth. t. 284. f. 366. 368. Clus. hist. 1. p. 348. Barr. rar. 348. t. 512.*

Teucrium peregrinum, folio sinuoso. Teucro peregrino, con hoja sinuosa. *C. B. P. 247.*

Teucrium Bæticum. Teucro de Andalucia. *Bauh. hist. 3. p. 291. Tourn. p. 208.*

Cast. Teucro fruticoso.

Habita en lugares marítimos de Sicilia : en Andalucía, cerca de Gibraltar y cercanías de Cadiz : en la Mancha, Extremadura y otras partes de España, *h*

Lati-
folium.

10. TEUCRIUM *foliis integerrimis rhombeis acutis villosis, subtus tomentosis.* Hort. ups. 159. Teucrio con hojas enterísimas, de figura de rombo, agudas, vellosas y por debaxo tomentosas.

Teucrium fruticans, Bæticum, ampliore folio. Dill. elth. 379. t. 284. f. 388. Teucrio fruticoso, de Andalucía, con hoja mas ancha.

Teucrium Bæticum, humilius & ramosius, folio subrotundo. Hort. angl. t. 3. Teucrio de Andalucía, mas baxo y mas ramoso, con hoja casi redonda.

Teucrium Bæticum, flore cæruleo. Riv. monop. t. 18. Teucrio de Andalucía, con la flor cerúlea.

Teucrium Hispanicum, latiore folio. Tourn. p. 208. Teucrio de España, con hoja mas ancha.

Cast. Teucrio de hoja ancha.

Habita en Andalucía. *h*

Es variedad de la precedente. R.

Cre-
tium.

11. TEUCRIUM *foliis lanceolato-linearibus integerrimis, floribus racemosis ternis.* Teucrio con hojas entre lanceoladas y lineares, enterísimas; flores racimosas, y de tres en tres.

Teucrium pedunculis axillaribus solitariis trifloris, calycibus tomentosis, foliis linearibus integerrimis subtus incanis. Gou. hort. 272. Teucrio con pedunculos axilares, solitarios, de tres flores; cálices tomentosos; hojas lineares, enterísimas, y blanquecinas por debaxo.

Teucrium (Hyssopifolium) foliis linearibus integerrimis acuminatis subtus niveis, racemo floribus ternatis solitariisque, calycibus spinosis. Schreb. unilab. 28. n. 11. Teucrio (con hoja de Hyssopo) de hojas lineares, enterísimas, puntiagudas, de color de nieve por debaxo; racimo con flores de tres en tres sostenidas de un mismo pedunculo, y solitarias ó de una en una; y cálices espinosos.

534 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Polium angustifolium, Polio de Creta, con hoja
Creticum. C. B. P. 221. angosta.

Teucrium frutescens, Teucro frutescente, con
Sthæcadis Arabicæ folio & hoja y traza como las del
facie. Tourn. cor. 14. Cantueso de Arabia.

Rosmarinum Sthæcadis Romero con traza como
facie. Alp. exot. 103. t. 102. la del Cantueso.

Cast. Teucro de Creta.

Habita en Creta y Egipto. \hbar

Tiene los cálices espinosos.

Ma- 12. TEUCRIUM foliis Teucro de hojas enterisi-
rum. integerrimis ovatis acutis mas, aovadas, agudas, con
petiolatis subtus tomentosis, peciolo, tomentosas por de-
floribus racemosis secundis. baxo; flores racimosas y la-
Mat. Med. 166. Sabb. hort. deadas.
3. t. 90.

Teucrium foliis omnibus Teucro con todas las ho-
parvis integerrimis, margi- jas pequeñas, enterisimas, re-
ne revolutis, spicis fere se- vueltas por su margen; es-
condis, floribus solitariis pigas casi ladeadas; flores so-
pedunculatis. Medic. act. pa- litarias y con pedunculo.
lat. vol. 3. phys. pag. 207.

Teucrium foliis ovatis, Teucro con hojas aova-
integerrimis subtus incanis, das, enterisimas, blanque-
floribus racemosis oppositis. cinas por debaxo; flores ra-
Schreb. unilab. p. 36. n. 28. cimosas y opuestas.

Chamædrys maritima, in- Camedrys maritima, blan-
cana, frutescens, foliis lan- quecina, frutescente, con ho-
ceolatis. Tourn. p. 205. jas lanceoladas.

Marum Cortusi. Bauh. Maro de Cortuso.
hist. 3. p. 242. Riv. monop.
t. 23.

α *Chamædrys Cretica, sax-* Camedrys Cretica, saxá-
atilis, tenuifolia, foliis sub- til, con hojas delgadas y
tus incanis. Tourn. p. 206. blanquecinas por debaxo. α
Schreb.

Cast. Teucro maro. Farm. Marum verum.

Habita en las Islas Eras ó Yeras, y en el Reyno de
Valencia. \hbar

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 535

Tiene los tallos derechos, algo fruticosos y rígidos: las hojas con peciolo y agudas: y las flores á veces ladeadas. Toda la planta arroja un olor muy subido, y como si fuese de espíritu de *sal armoniacá*. Resiste mucho al frío y prevalece en el sereno.

PROPIED. *Es algo amarga, y despide el olor agudísimo: se observa muy resolvente y nervina, expelente, vulneraria, diuretica, emenagoga, errhina, cordial y tónica. Se usa con admirables efectos en la cachexia, hydropesia y asma: en la pérdida de memoria, sopor isterico y esputo de sangre.*

Multi-
florum

13. *TEUCRIUM foliis ovatis superne glabris serrato-dentatis, floribus racemosis, verticillis sexfloris.*

Teucrium foliis ovatis aut integris, aut superius bivel-tridentatis, glabris, bracteis sessilibus, magnis, cochleatis, ovato-lanceolatis, integerrimis. Medic. act. pal. v. 3. phys. p. 208.

Teucrium foliis ovalibus, antice dentatis, floralibus integerrimis, petiolatis, verticillis racemosis, caule ramosissimo. Schreb. vert. uni. lab. 36. n. 26.

Teucrium foliis verticillatis pedunculatis senis, calycibus inferne ventricosis, foliis ovatis glabris apice serratis. Gou. hort. 272.

Teucrium foliis ovatis, acutis, denticulatis, floribus solitariis. Zinn. Goett. 291.

Teucrio con hojas aovadas, por encima lampiñas, entre aserradas y dentadas; flores racimosas; y verticilos de seis flores.

Teucrio de hojas aovadas, enteras ó por arriba con dos ó tres dientes, y lampiñas; bracteas sentadas, grandes, excavadas como cuchara, entre aovadas y lanceoladas, y enterisimas.

Teucrio con hojas ovales, por arriba dentadas; las florales enterisimas, con peciolo; verticilos en racimo; y tallo muy ramoso.

Teucrio de flores verticilladas, con pedunculo, de seis en seis; cálices ventricosos por debaxo; hojas aovadas, lampiñas y aserradas en su ápice.

Teucrio de hojas aovadas, agudas, con dientecitos; y flores solitarias.

536 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES.

Chamaedrys multiflora, tenuifolia, Hispanica. Tourn. p. 205. *Camedrys* de España, con muchas flores; y hojas delgadas.

Cast. Teucrio de muchas flores.

Habita en España. \bar{h}

Laxmanni.

14. *TEUCRIUM foliis ovato-oblongis integerrimis sessilibus, floribus solitariis sessilibus.* \bar{h} Teucrio con hojas entreoavadas y oblongas, enterisimas, sentadas; flores solitarias y sin pedunculo.

Cast. Teucrio de Laxman.

Habita en la Siberia. D. Laxman.

Posee el tallo del largo de medio pie y veloso: las hojas con tres nervios: las flores solitarias, laterales y ladeadas.

Sibiricum.

15. *TEUCRIUM foliis ovatis serratis, pedunculis solitariis trifloris, intermedio sessili, bracteis linearilanceolatis.* Schreb. unilab. p. 28. n. 12. Teucrio con hojas oavadas, aserradas; pedunculos solitarios, de tres flores, la intermedia sentada; y bracteas entre lineares y lanceoladas.

Teucrium Chamaedryos folio, flore parvo, purpureo. Gmel. mss. Teucrio con hoja como la del *Camedrys*; flor pequeña y purpúrea.

Cast. Teucrio de Siberia.

Habita en la Siberia. \bar{h}

Echa las hojas desnudas por una y otra parte, oavadas y aserradas: dos bracteas puestas baxo la division de los pedunculos, lanceoladas, terminadas en punta rígida, enterisimas y de la longitud del caliz.

Salicifolium.

16. *TEUCRIUM foliis lanceolato-ellipticis obtusiusculis integerrimis, calycibus quadrifidis solitariis.* Schreb. unilab. 26. sub Aiuaga. Teucrio con hojas entre lanceoladas y elípticas, algo obtusas, enterisimas; cálices hendidos en quatro partes y solitarios.

Chamæpitys Orientalis, X Camepitys Oriental, con
Salicis folio. Tourn. cor. 14. X hoja como la del Sauce.
 Schreb. dec. pl. 1. p. 17. t. 9. X

Cast. Teucro con hoja de Sauce.

Habita en Oriente. D. Schreb. 24

Arroja los tallos del largo de un palmo, poco mas ó menos, difusos, algo rollizos, vellosos, con su base perenne: las hojas opuestas, entre ovales y lanceoladas, algo obtusas, enterisimas, desnudas, sin ser lustrosas, derechas, nerviosas y mas largas que los entrenudos: las flores opuestas, y con el pedunculo muy corto: los cálices tubulosos, medio hendidos en quatro partes y angostos: las corolas tres veces mas cortas que las hojas, sin rudimento de labio superior, y sin dientes laterales en su base.

Asia-
 ticum.

17. TEUCRIUM *foliis lanceolatis repando—serratis basi rectangulis, floribus solitariis*. Schreb. unilab. p. 38. n. 31. Teucro con hojas lanceoladas, ondeadas en su margen, aserradas, rectangulas por su base; y flores solitarias.

Teucrium foliis erectis, lanceolatis, horizontalibus, crenatis, crenis reflexis, floribus solitariis secundis. Medic. act. pal. vol. 3. Phys. y ladeadas.

p. 204. t. 10.

Chamedrys fruticosa, Lusitanica, Melissa folio, minore, flore purpureo. Tourn. Camedrys fruticosa, de Portugal, con hoja como la del Torongil, mas pequeña; y flor purpúrea.

Cast. Teucro de Asia.

Habita en la India Oriental?

Posee el tallo derecho, recto, del largo de un pie, de quatro lados, de color que tira á obscuro, desnudo, con ramas cortas y opuestas en forma de asa: las hojas primeras lanceoladas, en ángulo recto por su base, con peciolo, rugosas, con aserraduras obtusas ó agudamente recortadas, y sus festones separados por medio de un ángulo recto, blandas, extendidas, algo rugosas por encima, de

338 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

de color verde subido , por debaxo tomentosas , con venas en redecilla y de color verde pálido: las flores axilares solitarias , con pedunculo corto y ladeadas: el caliz como el de la *Albahaca* ó el de la *Escutelaria*: el labio superior de hechura de corazon , y su margen vuelta ácia atrás y aguda: el inferior de quatro dientes iguales: la corola blanca y algo encarnada , sin labio superior: el inferior hendido en tres lacinias , con la intermedia mayor , encorvada ácia atrás , escotada y algo recortada: los estambres apenas mas largos que la garganta: los filamentos blancos y pelosos: las anteras obscuras , con el polvillo de color de azafran: dos estigmas puntiagudos y apenas mas largos que los estambres.

Cu-
bense.

18. *TEUCRIUM foliis cuneatis serrato-incisis glabris in petiolum attenuatis, floribus solitariis pedunculatis.* Jacq. amer. 172. t. 183. f. 74. obs. 2. p. 5. t. 30. Schreb. unilab. p. 29. n. 13.

Teucrium Americanum, Chamædryos folio, flore albo. Mill. dict. n. 16.

Teucrio de hojas en forma de cuña , entre aserradas y cortadas , lampiñas , adelgazadas en peciolo ; flores solitarias y con pedunculo.

Teucrio de America , con hoja como la del *Camedrys*; y flor blanca.

Cast. Teucrio de Cuba.

Habita en lugares algo húmedos de la Isla de Cuba. ♂ ♀ Tiene el tallo derecho , lampiño , sin olor ; y las flores blancas.

Ar-
duini.

19. *TEUCRIUM foliis ovatis serratis, racemo spicato tereti sessili terminali.* Schreb. unilab. p. 40. n. 37.

Teucrium foliis ovatis, crenatis, subhirsutis, petiolatis, caulibus terminatis spica flavescente, pilosa. Ard. spec. 1. p. 12. c. 3.

Teucrio con hojas aovadas , aserradas ; racimo en espiga , rollizo , sentado y terminal.

Teucrio de hojas aovadas , recortadas , con algun pelo áspero y pecioladas ; tallos terminados en una espiga pelosa , y de color que tira á amarillo-roxo.

Cast.

Cast. Teucro de Arduino.

Habita

Produce los tallos sufruticosos, con vello obscuro igualmente que toda la planta: la espiga terminal, semejante á la del Teucro de Ircania; pero mas corta, y de color que tira á amarillo-roxo.

20. TEUCRIUM foliis
ovato-lanceolatis serratis,
caule erecto, racemo tereti
terminali, verticillis hexa-
phyllis. Pall. it. 2. p. 569.

Schreb. unilab. p. 41. n. 39.

Chamædrys Canadensis,

Urticæ folio, subtus inca-
no. Tourn. p. 205.

Teucro de hojas entre aovadas y lanceoladas, aserradas; tallo derecho; racimo rollizo, terminal; y verticilos con seis hojuelas.

Camedrys del Canadá, con hoja como la de la Ortiga, y blanquecina por debaxo.

Cast. Teucro del Canadá.

Habita en el Canadá. ¶

La planta traida del Canadá tiene las hojas mas angostas, con aserraduras iguales, tomentosas por debaxo y planas: la espiga compuesta de verticilos ó de flores esparcidas con su bractea muy pequeña debaxo de cada una; pero la planta hortense posee las hojas mayores, con aserraduras desiguales y apenas vellosas por debaxo: las flores en racimo casi espigado, compuesto de verticilos de seis flores y seis hojuelas, con bracteas aserradas.

21. TEUCRIUM foliis

ovatis inæqualiter serratis,
racemis terminalibus. Gron.

virg. 64. Schreb. unilab. p.

41. n. 38.

Teucro de hojas aovadas, con aserraduras desiguales; y racimos terminales.

Virg-
nicum.

540 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Teucrium foliis cordatis, longe petiolatis, profunde & inaequaliter crenatis, racemo florum brevissimo, crassissimo, terminali. Medic. in act. pal. vol. 3. Phys. p. 212. R. Teucro de hojas de figura de corazon, con peciolo largo, profunda y desigualmente recortadas; racimo de las flores cortísimo, muy grueso y terminal.

Teucrium Virginianum, Melissophyllum, floribus caeruleis. Pluk. alm. 363. t. 318. f. 1. sed male flores bilabiatis fecit Pictor. R. Teucro de Virginia, con hoja como la del Torongil y flores de color cerúleo.

Cast. Teucro de Virginia.

Habita en la Virginia.

Tiene el tallo vellosos, y de color que tira á roxo.

Hirca-
nicum.

22. *TEUCRIUM foliis cordato-oblongis obtusis, caule brachiato dichotomo, spicis longissimis terminalibus sessilibus spiralibus.* Schreb. unilab. p. 40. n. 36. Teucro de hojas entre de figura de corazon y oblongas; tallo con ramas opuestas en forma de aspa, ahorquillado; espigas larguissimas, terminales, sentadas y espirales.

Teucrium foliis cordatis, crenatis, rugosis, spicis florum longissimis, cylindricis, bracteis linearibus. Medic. in act. pal. vol. 3. phys. p. 206. Teucro con hojas de figura de corazon, recortadas, rugosas; espigas de las flores larguissimas, cilindricas; y bracteas lineares.

Teucrium foliis cordatis, crenatis, petiolatis, spicis oblongis, densissimis. Hall. comment. Goett. tom. 2. p. 343. t. 13. Arduin. sp. 13. t. 4. Teucro de hojas de figura de corazon, recortadas, con peciolo; espigas oblongas y muy densas.

Cast. Teucro de Ircania.

Habita en Ircania. 26

Echa las hojas como las de la *Betonica officinal*: las espigas larguissimas y que salen de las últimas ahorquilladuras del tallo; con flores por todas partes, espesas, y amontonadas espiralmente.

23. *TEUCRIUM foliis cordatis serratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto.* Fl. dan. t. 485.

Teucrio de hojas de figura de corazon, aserradas, con peciolo; racimos laterales, ladeados; y tallo derecho.

Scorodonia. Riv. monop.

Escorodonia.

t. 12.

Chamædrys fruticosa, sylvestris, Melissa folio. Toron. p. 205.

Camedrys fruticosa, silvestre, con hoja como la del Torongil.

Scordium alterum, sive Salvia sylvestris. C. B. P. 247.

Otro Escordio, ó Salvia silvestre.

Salvia agrestis sive sphacelus. Dod. pempt. 291.

Salvia agreste, ó Esphacelus.

Cast. Teucrio escorodonia.

Habita en lugares arenosos de Alemania, Suiza, Francia, Inglaterra y Flandes: en los contornos de Madrid: Reales Sitios del Escorial y San Ildefonso: en Bustarviejo, Cataluña, Aragon y otras muchas partes de España. Tiene las corolas blancas; y los filamentos de color que tira á purpúreo.

24. *TEUCRIUM foliis ovatis rugosis inciso-crenatis incanis, caulibus erectis, racemis rectis secundis.* Jacq. hort. t. 94.

Teucrio con hojas aovadas, rugosas, entre cortadas y hendidas en festones, blanquecinas; tallos derechos; racimos rectos y ladeados ó con flores que miran á un lado.

Teucrium foliis parvis, cordato-ovatis, rugosis, crenatis, crenis reflexis, floribus racemosis, racemis omnibus secundis. Medic. act. pal. vol. 3. phys. p. 205. 271. t. II. R.

Teucrio con hojas pequeñas, entre de figura de corazon y aovadas, rugosas, recortadas, con sus festones redoblados; flores en racimos y todos ladeados.

Teucrium Creticum. Clus.

Teucrio de Creta.

hist. I. p. 348.

Chamædrys fruticosa, insularum Sthæcadum, Melissæ folio, minore, pomum redolens. Tourn. p. 205. secundum Schreber. P. Gerard. &c. R.

Camedrys fruticoso, de las Islas Eras, que huele á manzana, con hoja como la del Torongil, pero mas pequeña.

Cast. Teucrio de Marsella.

Habita en Creta y en la Francia austral, señaladamente en Villafranca. *h*

Arroja los tallos sufruticosos y casi del largo de un pie: las hojas aovadas ó entre de figura de corazon y aovadas, rugosas, algo obtusas, pequeñas, redobladas en su margen, venosas por debaxo y con aserraduras desiguales: los racimos terminales y ladeados: las flores opuestas, con pedunculo: los cálices casi como los de la *Escutelaria*, con el labio superior casi de figura de corazon, extendido y agudo: la corola de color que tira á purpúreo, con el labio inferior muy cóncavo: y el olo como el de la *Nepeta*.

Scordium.

25. TEUCRIUM *foliis oblongis sessilibus dentato-serratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuso.* Mat. med. 166. Fl. dan. t. 593.

Teucrio con hojas oblongas, sentadas, entre dentadas y aserradas; flores mellizas, axilares, con pedunculo; y tallo difuso.

Chamædrys foliis mollibus, hirsutis, ellipticis, crenatis, vertillis paucifloris. Hall. helv. n. 288.

Camedrys de hojas blandas, pelosas, elípticas, recortadas; y verticilos de pocas flores.

Chamædrys palustris, canescens, sive Scordium officinarum. Tourn. p. 205.

Camedrys palustre, con pelo blanco, ó Escordio de las oficinas.

Scordium officinarum, C. Escordio de las oficinas.
B. P. 247. Cam. epit. 588.
Dod. pempt. 162. Riv. t. 11.
Bauh. hist. 3. p. 292.

Cast. Teucrio Escordio.

Habita en lugares aguanosos de Europa: en la Real Casa del Campo: junto al arroyo de Cantarranas mas allá de San

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 543

San Bernardino : en Miraflores , Alcarria , Castilla la vieja , Aragon , Cataluña , y otras muchas partes de España. 26

PROPIED. Es amarga y acre , de olor de Ajo , y promueve la leche ; es tambien balsámica , tónica , antiputredinosa , alexiteria , antifebril , resolvente , expelente , diaphoretica , antelmintica y ayuda á las funciones vitales : se usa en la gangrena , calenturas , peste y úlceras.

26. *TEUCRIUM foliis cuneiformi--ovatis incis*
crenatis petiolatis , floribus
ternis , caulibus procumben-
tibus subpilosus. Mat. Med.
167. Sabb. hort. 2. t. 88.

Chamædrys foliis firmis ,
ovatis , crenatis , verticillis
paucifloris. Hall. helv. n. 286.

Teucrium foliis oblongis ,
basi integerrimis , profunde
serratis , verticillis dimidia-
tis , caulibus procumbenti-
bus , pilosis. Schreb. unilab.

32. n. 21.

Chamædrys major , re-
pens. C. B. P. 248. Dod.
pempt. 143. Tourn. p. 204.
t. 98.

Chamædrys vulgo vera
existimata. Bauh. hist. 3. p.
288.

" *Chamædrys minor , re-*
pens. C. B. P. 248. Dod.
pempt. 43. Tourn. p. 205.

Chamædrys. Fuchs. hist.
335. ic. 498. Clus. hist. 1.
P. 351.

Teucrio de hojas entre de figura de cuña y aovadas, cortadas, con festones y peciolo ; flores de tres en tres ; tallos tendidos y algo pelosos.

Camedrys con hojas firmes, aovadas, recortadas ; y verticilos de pocas flores.

Teucrio con hojas oblongas, enterisimas por su base, profundamente aserradas ; verticilos demediados ; tallos tendidos y pelosos.

Camedrys mayor , rastro.

Camedrys tenido vulgarmente por el verdadero.

Camedrys menor , rastro. "

Camedrys.

Chamædrys alpina, *hir-^βsuta*, *repens*. Moris. hist. 3. p. 422. Rai. hist. 3. p. 282. Schreb. *Camedrys alpino*, con pelo áspero, y rastrero. ^β

Cast. Teucrio Camedrys.

Habita en Alemania, Suiza y Francia: en la Sierra de Miraflores, Alcarria, Serranias de Cuenca, Aragon, Cataluña y otras muchísimas partes de España. ¶

Tiene las *bractæas* aserradas: la *corola* purpúrea, con el labio plano, y algo hendido en tres partes.

PROPIED. La yerba es amarga, balsámica, tónica, estomática, expelente y emenagoga: se usa en los dolores artríticos y de gota: en el catarro, chlorosis y en las escrofulas.

Lucidum. 27. TEUCRIUM *foliis ovatis acute inciso-serratis glabris, floribus axillaribus ternis, caule erecto lævi.* Teucrio con hojas aovadas, entre agudamente cortadas y aserradas, lampiñas; flores axilares, de tres en tres; tallo derecho y liso. Syst. veg. 440.

Teucrium foliis ellipticis, obtuse crenatis, sessilibus, splendidibus, fragilibus, foliis floralibus dentatis, verticillis sex aut quatuor floribus. Teucrio con hojas elípticas, obtusamente recortadas, sin peciolo, resplandecientes, frágiles; hojas florales dentadas; y verticilos de seis ó quatro flores. Medic. act. pal. vol. 3. phys. p. 211. t. 12. f. 7. 8. 9.

Chamædrys alpina, frutescens, folio splendente. Camedrys alpino, fruticoso, con hoja reluciente. Mag. hort. 52. t. 52. Tourn. p. 205.

Cast. Teucrio lustroso.

Habita en los valles alpinos de Saboya, y en el monte Lachin de Provenza. Gerard. ¶

Produce la *raiz* con pimpollos ó renuevos, de los quales salen los *tallos* rectos, lampiños y de color que tira á negro; con las *hojas* pecioladas, oblongas, agudamente recortadas, nerviosas, lampiñas, y mas cortas que los

los entrenudos : las flores axilares , mellizas en ambos lados , purpúreas ; y los cálices de color pardo.

Se diferencia del *Teucro Camedrys* , por el tallo del largo de un pie , derecho y lampiño y no del largo de un palmo , difuso , y peloso como aquel. *Syst. veg.* 440.

- Flam. 28. TEUCRIUM *foliis cordatis obtuse serratis , bracteis integerrimis concavis , caule fruticoso , floribus racemosis ternis.* Sabb. hort. 3. t. 89. Teucro con hojas de figura de corazon , obtusamente aserradas ; bracteas enterisimas , cóncavas ; tallo fruticoso ; flores en racimo , y de tres en tres.
- Teucro. *Teucroium.* C. B. P. 247. Bauh. hist. 2. p. 290. Riv. monop. t. 10. Camedrys frutescente , llamado vulgarmente Teucro.
- Chamædrys frutescens , Teucroium vulgo.* Tourn. p. 305. Teucro vulgar , fruticoso , primero.
- α *Chamædrys fruticosa, Cretica , purpureo flore.* Tourn. p. 205. Barr. 318. ic. 896. Schreb. Camedrys fruticoso , de Creta , con la flor purpúrea. α

Cast. Teucro amarillo-roxo.

Habita en Italia , Sicilia , Malta y Mompeller : en el Reyno de Valencia y Andalucia , Sierra-morena , y otros terrenos incultos y áridos de España. 24

PROPIED. *Son las mismas , con corta diferencia , que las del Teucro Camedrys.*

- Mon- 29. TEUCRIUM *corymbos terminali , foliis lanceolatis integerrimis , subtus tomentosis.* Scop. carn. ed. 2. n. 723. Teucro con el corimbo terminal ; hojas lanceoladas , enterisimas , y por debaxo tomentosas.

546 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Teucrium corymbis terminalibus, glabris, foliis petiolatis, ellipticis, margine revolutis, subtus tomentosis, caule procumbente. Schreb. unilab. p. 50. n. 57. Teucro con los corimbos terminales, lampiños; hojas pecioladas, elípticas, revueltas en su margen, tomentosas por debaxo; y tallo tendido.

Chamædrys foliis ellipticis, integerrimis, contractis, subtus incanis, floribus capitatis. Hall. helv. n. 285. Camedrys con hojas elípticas, enterisimas, encogidas, blanquecinas por debaxo; y flores en cabezuela.

Polium montanum VIII. Clus. hist. 1. p. 363. R. Polio montano, octavo.

Polium Lavandulae folio. C. B. P. 220. Tourn. p. 206. Polio con hoja como la del Espliego.

Polium recentiorum femina, Lavandulae folio. Lob. ic. 488. Polio femenino de los modernos, con hoja como la del Espliego.

Cast. Teucro montano. 24

Habita en lugares secos de Alemania, de Mompeller, Ginebra, Suiza y de París: en la Alcarria: montes de la Virgen de Monserrat y otras partes de España. 24

Tiene las flores blancas: las hojas lanceoladas y apartadas.

Supinum. 30. TEUCRIUM *corymbis terminali, foliis linearibus margine revolutis*. Teucro con el corimbo terminal; hojas lineares, y revueltas por su margen.

Polium montanum, repens. C. B. P. 221. Tourn. p. 206. Polio montano, rastrero.

Polium montanum, supinum, minimum. Lob. ic. 488. Polio montano, echado y muy pequeño.

Cast. Teucro echado.

Habita en el campo de Viena.

Posee las flores blancas: las hojas lineares, enterisimas, agudas y amontonadas. Es muy parecido á la especie antecedente.

Py-
renai-
cum. 31. TEUCRIUM *corymbo terminali, foliis cuneiformi-orbiculatis crenatis.* Teucrio con el corimbo terminal; hojas entre de figura de cuña y redondas y recortadas.

Teucrium foliis cuneiformibus, crenatis, corymbo terminali, foliolis floralibus linearibus. Roy. lugdb. 305. Teucrio con hojas en forma de cuña, recortadas; corimbo terminal; y hojuelas florales lineares.

Teucrium corymbis terminalibus, foliis cuneiformi-orbiculatis, crenatis, pilosis. Schreb. unilab. 41. n. 40. Teucrio con los corimbos terminales; hojas entre de figura de cuña y redondas, recortadas y pelosas.

Polium pyrenaicum, supinum, Hederæ terrestris folio. Tourn. p. 206. Polio pirenaico, echado, con hoja como la de la Yedra terrestre.

Polium saxatile, purpureum, Chamædryoides, ampla coma. Bocc. mus. 2. t. 61. Polio saxátil, parecido al Camedrys, con la flor purpúrea; y el corimbo ancho.

Cast. Teucrio de Pirineos. 2

Habita en los Pirineos de Cataluña, Aragon, montes de Leon, Burgos, Asturias y otras partes de España. 2

Po-
lum. 32. TEUCRIUM *capitulis subrotundis, foliis oblongis obtusis crenatis tomentosis sessilibus, caule prostrato.* Hort. Cliff. 302. Teucrio con las cabezuelas casi redondas; hojas oblongas, obtusas, recortadas, tomentosas, sin peciolo; y tallo postrado.

Teucrium floribus subcapitatis, foliis linearibus sessilibus tomentosis apice crenatis. Gou. hort. 270. Teucrio con flores casi en cabezuela; hojas lineares, sentadas, tomentosas y recortadas por su ápice.

* *Polium montanum, luteum.* C. B. P. 220. Tourn. p. 206. Moris. hist. 3. p. 455. sect. 11. t. 2. f. 1. Polio montano, con la flor amarilla. *

β *Polium montanum, album.* C. B. P. 221. Tourn. p. 206. Polio montano, con la flor blanca. β

548 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

- Polium montanum*, *al-* Polio montano, mayor, con
bum, *serratifolium*, *latifo-* la flor blanca; hoja ancha y
lium, *majus*. Barr. obs. 326. aserrada..... y menor.
 ic. 1074. & minus ejusdem
 obs. 329. f. 1078. Schreb.
- χ *Polium montanum*, *supi-* Otro Polio mantano, echa-
num, *alterum*. C. B. P. 221. do. χ
 Tourn. p. 206.
- α *Polium maritimum*, *su-* Polio maritimo, de Vene-
pinum, *Venetum*. C.B.P.221. cia, echado. α
 Moris. hist. 3. sect. 11. t. 2.
 f. 12. Tourn. p. 206.
- Polium montanum* V. Polio montano, quinto.
 Clus. hist. 1. p. 362.
- * *Hyssofum Dioscoridis*. Hysopo de Dioscorides.
 Col. ecphr. 1. p. 59. t. 67.

Cast. Teucrio polio. vulgo: Zamarilla.

Habita en el monte Libano, Italia, Narbona y Portugal: en los circuitos de Madrid: en Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragon y otras muchas partes de España. 24

PROPIED. *Es diuretico y emenagogo: se aprecia en la hysteresia, ictericia y mordeduras venenosas.*

Las especies baxo del nombre de *Polio*, en el dia confundidas y distintas de sus variedades, deben inquirirse por los Botánicos, en su suelo natural.

- Capi- 33. TEUCRIUM *capitu-* Teucrio de cabezuelas con
 tatuni. *lis pedunculatis, foliis lan-* pedunculo; hojas lanceola-
ceolatis crenatis tomentosis, das, recortadas, tomento-
caule erecto. sas; y tallo derecho.
- Polium dassyphyllum*, Polio con hoja densa, to-
Gnaphaloides, *flore albo.* mentosa, ó como el Gnafa-
 Barr. rar. 324. ic. 1047. lio; y flor blanca.
 Schreb. R.
- α *Polium maritimum, erect-* Polio maritimo, de Mom-
tum, *Monspeliacum*. C. B. peller, levantado. α
 P. 221. Tourn. p. 206.

Polium (capitatum) caule erecto, diffuso, foliis linearilanceolatis, crenatis, corymbis terminalibus lateralibusque. Mill. dict. n. 5. Polio (en cabezuela) con el tallo derecho, difuso; hojas entre lineares y lanceoladas, recortadas; corimbos terminales y laterales.

Polium Monspeliacum. Polio de Mompeller. Bauh. hist. 3. p. 699.

Cast. Polio en cabezuela.

Habita en la Siberia y Francia: en los contornos de Madrid: en Alicante, Reyno de Valencia, Murcia, Andalucía y otras partes de España. ¶

Su traza es como la del Oregano mejorana; pero es tomentoso, y de hoja angosta.

Pu-
milum.

34. TEUCRIUM capitulis terminalibus sessilibus, foliis linearibus planis quadrifariam confertis, caule procumbente tomentoso. Teucrio con cabezuelas terminales, sentadas; hojas lineares, planas, amontonadas en quatro órdenes; tallo tendido y tomentoso.

Amœn. acad. 4. p. 276. Schr. unilab. p. 48. n. 53.

Polium Hispanicum, montanum, pumilum, Rosmarini folio, flore rubro. Tourn. Polio de España, montano, muy pequeño, con hoja como la del Romero; y flor encarnada.

Polium montanum, pumilum, rubrum, viridi-Stæchadis folio, caule tomentoso. Barr. ic. 1092. Polio montano, muy pequeño, con la flor encarnada; hoja como la del Cantueso, verde; y tallo tomentoso.

* *Polium montanum, pumilum, angusto viridique folio, caule incano.* Barr. rar. 357. ic. 1093. Schreb. R. Polio montano, muy pequeño, con hoja angosta y verde; y tallo blanquecinoso. no. a

Cast. Teucrio enano.

Habita en terrenos de Alicante, de Elda y de Monfort: en el Reyno de Andalucía y otras partes de España. ¶ Schreber tiene por nueva especie la planta citada de Tournefort, y la llama:

Teu-

Teucrium (*Libanotis*) *spicis subrotundis, foliis confertis, linearibus, revolutis, integerrimis cauleque tomentosis*. Schreb. unilab. 48. n. 52. R. Teucro (*Libanotide*) con espigas casi redondas; hojas amontonadas, lineares, revueltas, enterisimas, y tomentosas igualmente que el tallo.

Spino-
sum.

35. **TEUCRIUM** *spinosum, calycibus labio superiore ovato, corollis resupinatis, pedunculis geminis*. Loeffl. it. 147. Teucro espinoso, con el labio superior en los cálices ovado; corolas resupinadas; y pedunculos mellizos.

Teucrium ramulis spinulentibus, corollis resupinatis, pedunculis axillaribus geminis. Schreb. unilab. 38. n. 32. Teucro con ramitas que se reducen á espinas; corolas resupinadas; pedunculos axilares y mellizos.

Chamædrys multifida, spinosa, odorata. Grisl. hist. 20. Tourn. p. 208. Camedrys hendido en muchas partes, espinoso y de olor.

Chamædrys spinosa. C.B. P. 248. Prodr. 117. f. 117. Moris. hist. 3. p. 423. sect. 8. t. 22. f. 17. Camedrys espinoso.

Teucrium mucronatum. Sp. pl. 2. p. 793. n. 31. Teucro que remata en punta rígida. α


Scordium spinosum, odoratum. Corn. canad. 123. Barr. rar. 319. t. 202. Escordio espinoso, y de olor.

Cast. Teucro espinoso.

Habita en los collados y campos de Portugal: en los campos incultos y collados cerca de Soto-luzon: en el monte de nuestra Señora de Monserrat y otras partes de España. ☉

Arroja la *raiz* descendente, algo tortuosa y sencilla: el tallo tendido, muy ramoso; con *ramas* opuestas en forma de aspa, y *ramitas* muy extendidas, rígidas, cuadrangulares, con pelo áspero y algo viscosas, adornadas de espinas opuestas, rígidas y alesnadas; las *primeras* que con el tiempo se extienden en ramas, con su remate

es-



espinoso, y *las mas tardias* que permanecen sencillas: las *hojas inferiores del tallo* oblongas, con peciolo, cortadas, alguna vez hendidas al través, vellosas y blandas: las *superiores* opuestas, colocadas baxo de las espinas, agudas ó casi oblongas, enterisimas, señaladas alguna vez por debaxo con una ú otra pequeña incision: las *flores* verticiladas en las espinas, con piececitos y horizontales: los *piececitos* derechos, apretados al tallo, la mitad mas cortos que el caliz y cada uno fixado lateralmente en ambas partes de la espina, y asi se hallan comunmente quatro flores en cada verticilo; con una *bractea* pequeña ú oblonga en cada una de ellas: el *periantio* persistente, con pelo áspero, de una pieza, giboso en su base por la parte inferior, y algo plano por la superior, con una pequeña joroba por donde está prendido el piececito y de dos labios; el *labio superior* entre casi redondo y aovado, puntiagudo, cóncavo por defuera por razon de sus márgenes elevadas y por dentro convexo; el *labio inferior* la mitad mas corto que el superior y hendido en quatro lacinias setáceas, *Loefl.*

El *caliz* es perfectamente semejante al de la *Albahaca*; pero la *corola* á la del *Teucro* y algo blanquecina: despide el *olor* algo pesado, y por lo mismo no merece esta especie llamarse olorosa. Es pues este género casi intermedio y distinto de las demas especies de *Teucro* por el *caliz* manifestamente dividido en dos labios. *Loefl. loco citato.*

855. Género SATUREIA. * *Tourn.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, tubuloso, estriado, derecho y persistente, con cinco dientes en su boca, casi iguales y derechos.

COR. de un *petalo*, boquiabierta: *tubo* cilindráceo, mas corto que el caliz: *garganta* sencilla: *labio superior* derecho, obtuso, agudamente escotado y de la longitud del *labio inferior*: *labio inferior* extendido, partido en tres lacinias, obtusas, iguales y la del medio un poco mayor.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, setáceos, apartados, casi del lar-

552. FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

largo del labio superior, de los cuales *los dos inferiores* son poco mas cortos: con las *anteras* arrimadas entre sí.

PIST. *Germen* hendido en quatro partes: *estilo* setáceo, del largo de la corola: con dos *estigmas* tambien setáceos.

PERIC. ninguno: el *caliz* cerrado fomenta las semillas en su fondo.

SEM. quatro, y casi redondas.

CARAC. GENER. DE TOURN. p. 197.

Se diferencia del Tomillo, por las flores que nacen esparcidas en las axilas de las hojas, y no recogidas en cabezuela: de la Calaminta por las flores puestas en piececitos que no son ramosos: y de la Thymbra por las flores que no están dispuestas en verticilo.

E S P E C I E S.

- Ju-
liana.
1. SATUREIA *verticillis fastigiatis, foliis linearilanceolatis.* X Satureia con verticilos levantados á modo de ramillete horizontal; y hojas entre lineares y lanceoladas.
- Satureia floribus verticillatis, foliis lanceolatis glabris.* Roy. lugdb. 324. X Satureia con flores en verticilo; hojas lanceoladas y lampifias.
- Satureia spicata.* C. B. P. 218. X Satureia espigada.
- Satureia foliis tenuibus, sive tenuifolia, Sancti Juliani quorundam.* Bauh. hist. 3. 273. X Satureia con hojas delgadas y de algunos autores llamada de San Julian.
- Thymbra Sancti Juliani, sive Satureia vera.* Lob. ic. 425. Tourn. p. 198. X Thymbra de San Julian, ó Satureia verdadera.
- Satureia perennis, verticillis spicatis & densius dispositis.* Moris. hist. 3. p. 412. sect. II. t. 17. f. 4. X Satureia perenne, con verticilos dispuestos en espiga y mas densamente.
- Cast. Satureia de San Julian.

Habita en Toscana, y en lugares ásperos del mar Thyrreno ó sea de Pisa y en Florencia. 4

2. SATUREIA *verticillis subtrotundis hispidis, foliis oblongis acutis.* Sabb. hort. 3, t. 71. Satureia de verticilos casi redondos, con pelo rígido; hojas oblongas y agudas.

Satureia Cretica. C. B. P. 218. Satureia de Creta,

Thymbra legitima. Clus. Thymbra legitima,

hist. 1. p. 358. *Thymum Creticum Ponaë, verticillatum.* Barr. rar. 279. Tomillo Cretico, de Pona, con flores en verticilo. t. 898.

Cast. Satureia thymbra.

Habita en Creta y Tripoli.

3. SATUREIA *pedunculis subtrifloris lateralibus, involuclis calyce brevioribus.* Mill. dict. n. 7. Satureia de pedunculos con tres ó quatro flores, laterales; é involucros parciales mas cortos que el caliz.

Satureia annua, Orientalis, tenuior, ad singulos nodos florifera. Moris. hist. 3. Satureia annua, Oriental, mas delgada, y que lleva flores en cada nudo. p. 411. sect. 11. t. 17. f. 2.

Clinopodium minus, exoticum, Thymi folio, majore, inodorum. Pluk. alm. 110. Clinopodio menor, exótico, sin olor, con hoja como la del Tomillo, pero mas grande. t. 84. f. 8.

Clinopodium Creticum. Alp. exot. 265. t. 264. Clinopodio de Creta.

Calamintha Cretica, angusto, oblongo folio. Tourn. Calaminta de Creta, con hoja angosta y oblonga. p. 194.

Cast. Satureia de Grecia.

Habita en el Archipielago, y en el circuito de Barcelona; de donde fue comunicada á D. Joseph Quer por el Doct. D. Joseph Salvador y Riera, peritissimo Naturalista y distinguido Botánico. 4

Su traza es como la de la *Satureia montana*, de la qual

554 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

qual se diferencia por las hojas que rematan menos en punta aguda, y principalmente por los corimbos de las flores que no están solos en ambas partes, sino de dos en dos: á esto se añade que las *bracteas* ó *involucros* en esta especie son muy pequeños; pero en la *Satureia montana* se hallan del largo del corimbo. Tiene las *hojas inferiores* aovadas como las del *Tomillo*, de color que tira á purpúreo por debaxo; y las *restantes* mas lineares. Posee ciertos átomos relucientes, en la haz superior de las hojas, los cuales provienen de algunos pelillos cortos esparcidos: las *corolas* de color que por defuera tira á purpúreo, por dentro entre blanquecino y purpúreo, con tres manchas tambien purpúreas en la base, de las quales la intermedia es mayor.

Creciendo la *planta*, en los años siguientes, los *corimbos* se hallan solitarios, pero en sus principios mellizos.

Montana.

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. SATUREIA <i>pedunculis lateralibus solitariis, floribus fasciculatis fastigiatis, foliis mucronatis lineari-lanceolatis.</i> Sabb. hort. 3. t. 64.</p> | <p>X Satureia con pedunculos laterales, solitarios; flores en hacecillo como en ramillete horizontal; hojas terminadas en punta rígida, entre lineares y lanceoladas.</p> |
| <p><i>Satureia racemis lateralibus, solitariis, foliis lineari-lanceolatis, punctatis, duris.</i> Scop. ed. 2. n. 738. t. 30. R.</p> | <p>X Satureia con racimos laterales, solitarios; hojas entre lineares y lanceoladas, punteadas y duras.</p> |
| <p><i>Satureia montana.</i> C. B. P. 218.</p> | <p>X Satureia montana.</p> |
| <p><i>Calamintha frutescens, Satureiæ folio, facie & odore.</i> Tourn. p. 194.</p> | <p>X Calaminta frutescente, con hoja, traza, y olor de Satureia.</p> |
| <p><i>Satureia durior.</i> Bauh. hist. 3. 272.</p> | <p>X Satureia mas dura.</p> |
| <p><i>Thymbra.</i> Dod. pempt. 288.</p> | <p>X Thymbra.</p> |

Cast. Satureia montana. vulgo: Hysopillo.

Habita en Toscana y Narbona: en la Alcarria y Serrania de

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 555

de Cuenca : en Aragon , Cataluña y otras partes de España. 2

PROPIED. Es calefaciente , desecativa , carminativa , estomática y emenagoga : se usa para el asma y demas enfermedades del pecho.

5. SATUREIA *pedunculis bifloris*. Mat. med. 167. Satureia con pedunculos de dos flores.

Sabb. hort. 3. t. 70.

Satureia hortensis , sive *Cunila sativa Plinii*. C. B. Satureia hortense , ó Cunila sativa de Plinio.

P. 218.

Satureia sativa. Bauh. Satureia sativa.

hist. 3. 272. Tourn. 197.

Satureia. Dod. pempt. 289. Satureia.

Cast. Satureia hortense. vulgo : Axedrea.

Habita en la Francia Narbonense , é Italia cerca de Herborn.

PROPIED. Es aromática , resolvente , expelente , estomática , emenagoga y afrodisiaca.

6. SATUREIA *floribus spicatis* , *foliis carinatis punctatis ciliatis*. Mat. med. Satureia con flores en espiga ; hojas aquilladas , punteadas y pestafiosas.

167. Gron. orient. 71.

Thymus capitatus , qui *Dioscoridis*. C. B. P. 219. Tomillo de cabezuela , que es el que trae Dioscorides.

Tourn. p. 196.

Thymum Creticum antiquorum. Bauh. hist. 3. part. Tomillo Cretico de los antiguos.

2. p. 262.

Thymum legitimum. Clu. Tomillo legitimo.

sii. hist. 1. p. 357.

Thymum Creticum , *incanum* , *capitatum*. Barr. ic. Tomillo de Creta , blanco , con flores en cabezuela.

Cast. Satureia de cabezuela.

Habita en Creta , Grecia y Palestina : en Sevilla y otras partes de Andalucía. 2

556 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

- Spi-
nosa. 7. SATUREIA *ramis spinosis, foliis hispidis.* Amœnit. acad. 4. p. 317. Satureia con ramas espinosas; y hojas erizadas.
- Satureia Cretica, frutescens, spinosa.* Tourn. cor. 13. Satureia de Creta, frutescente y espinosa.
- Satureia Cretica, spinosa.* Ponce. Ital. 21. Satureia Cretica, espinosa.

Cast. Satureia espinosa.

Habita en Creta. *h*

- Vi-
minea. 8. SATUREIA *pedunculis axillaribus trifloris, involucris linearibus, foliis lanceolato-ovatis integerrimis.* Amœn. acad. 5. p. 399. Satureia con pedunculos axilares, de tres flores; involucros lineares; hojas entre lanceoladas y aovadas, y enterisimas.
- Mentha viminea, foliis minoribus, obovatis, pedunculis trifloris, axillaribus.* Brown. jam. 258. Menta mimbrera, con hojas mas pequeñas, aovadas al revés; pedunculos de tres flores y axilares.

Cast. Satureia mimbrera.

Habita en la Jamaica.

Tiene la traza como la de la *Cunila*.

856. Género THYMBRA. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, casi cilindrico, aquillado por sus lados, con dos labios: el *superior* mas ancho, igual, medio hendido en tres partes, arrimadas entre sí: el *inferior* mas angosto y dividido en dos partes.

COR. boquiabierta: *tubo* casi cilindrico: *labio superior* plano, recto, obtuso y medio hendido en dos lacinias: el *inferior* hendido en tres, casi igual y plano.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, filiformes y acercados por pares, de los cuales los dos inferiores son mas cortos: con las *anteras* hendidas en dos lóbulos apartados, y recogidos baxo del labio superior de la corola.

PIST. *Germen* hendido en quatro partes: *estilo* filiforme, hen-

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 557

hendido en dos lacinias: con dos *estigmas* agudos.
 PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse recoge las semillas
 en su seno.

SEM. quatro.

E S P E C I E S.

Spicata.

1. THYMBRA *floribus* Thymbra con flores espi-
spicatis. gadas.
Thymbra spicata, verior, Thymbra espigada, de
Hispanica. Barr. ic. 1230. España, y la mas verdadera.
Thymum majus, longifo- Tomillo mayor, de hoja
lium, Stæchadis foliaceo ca- larga, peloso, con la cabe-
pite purpurascente, pilosum. zuela como la del Cantueso,
 Pluk. alm. 368. t. 116. f. 5. foliacea, y de color que tira
 á purpúreo.

Cast. Thymbra espigada.

Habita en Macedonia: en el monte Libano y en Anda-
 lucia. \hbar

Tiene las *flores* de color purpúreo y que salen de tres en
 tres de cada axila de las bracteas.

Verticillata.

2. THYMBRA *floribus* Thymbra con flores verti-
verticillatis. ciladas.
Hyssopus angustifolia, Hysopo montano, áspero,
montana, aspera. C. B. P. de hoja angosta.
 218.
Hyssopus montanus. Da- Hysopo montano.
 lech. hist. 394.

Cast. Thymbra verticilada.

Habita en la Europa austral. \hbar

Echa los *tallos* casi del largo de un pie: las *hojas* opuestas,
 entre lineares y lanceoladas, enteras y punteadas: las
florales poco mas anchas, mas agudas y pestañosas. Esta
 especie es enteramente verticilada, con *flores* sentadas;
 pero la precedente se halla con la *espiga* poco formada,
 oblonga y apifiada, con *bracteas* y *hojas* pestañosas.
 Acaso esta es variedad de la antecedente?

857. Género HYSSOPUS. * *Tourn. t. 95.*

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de una pieza, cilindráceo, oblongo, es-
triado, con cinco dientes agudos y persistente.
- COR.** de un *petalo*, boquiabierto: *tubo* cilindráceo, delga-
do, de la longitud del caliz: *garganta* inclinada:
labio superior recto, plano, corto, casi redondo y
escotado: el *inferior* hendido en tres lacinias; las *la-*
terales mas cortas, obtusas; la *intermedia* recortada,
de figura de corazon al revés, aguda y con lóbulos
apartados.
- ESTAMB.** *Filamentos* quatro, derechos, mas largos que la
corola, apartados, de los cuales los *dos superiores*
son mas cortos, y los *dos* mas largos mas acercados
al labio inferior: con las *anteras* sencillas.
- PIST.** *Germen* dividido en quatro partes: *estilo* filiforme,
debaxo del labio superior y tan largo como él: con el
estigma hendido en dos partes.
- PERIC.** ninguno: el *caliz* contiene en su seno las semillas.
- SEM.** quatro, y casi aovadas.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 200.

La *flor* es de un *petalo*, labiada; cuyo *labio superior*
se halla derecho, casi redondo y hendido en dos partes:
el *inferior* dividido en tres, y la del medio excavada á
manera de cuchara, con dos puntas y en algun modo alá-
da. Del caliz sale el pistilo acompañado de quatro em-
briones, que pasan á otras tantas semillas oblongas, y re-
cogidas en la capsula que fue antes caliz de la flor.

E S P E C I E S.

- Offici-
nalis. 1. HYSSOPUS *spicis se-* X
cundis, foliis lanceolatis. X
Mat. med. 168. Jacq. austr. X
t. 254. Sabb. hort. 3. t. 79. X
- Hysopo con espigas ladea-
das; y hojas lanceoladas.

Hys-

Hyssopus foliis linearibus, punctatis, verticillis in spicam continuatis. Hall. X Hysopo con hojas lineares, punteadas; y verticilos continuados en espiga.
 helv. n. 249. Riv. t. 68.

Hyssopus officinarum, cærulea seu spicata. C. B. P. X Hysopo de las oficinas, con la flor cerúlea, ó espigado.
 217. Tourn. p. 200.

Hyssopus vulgaris. Dod. X Hysopo vulgar.
 pempt. 287.

Hyssopus rubro, vel albo flore. C. B. P. 217. X Hysopo con la flor encarnada, ó blanca. α

Cast. Hysopo de las oficinas.

Habita en Austria y Siberia: en la Alcarria, Serrania de Cuenca, Aragon, Catalufia y otras partes de España. ¶

PROPIED. *Es balsámica, tónica, resolvente, expectorante y estomática: se usa en la tos, angina y asma humoral: en la gota, cálculo y optalmia; y en la sangre quaxada que resulta de las contusiones.*

Lophanthus.

2. **HYSSOPUS** *corollis sub resupinatis, staminibus inferioribus corolla brevioribus, foliis cordatis.* Jacq. X Hysopo con las corolas casi resupinadas; estambres inferiores mas cortos que la corola; y hojas de figura de corazon.
 hort. t. 182.

Cataria floribus inversis. X Cataria con flores inversas.
 Hall. goett. 344.

Cast. Hysopo lophanto.

Habita en la China Septentrional. ¶

Nepetoides.

3. **HYSSOPUS** *caule acuto quadrangulo.* Gov. illustr. X Hysopo con el tallo agudo y quadrangulo.
 35. Jacq. hort. t. 69.

Sideritis Canadensis, altissima, Scrophulariæ folio, flore flavescente & purpurascente. Tourn. p. 192. X Sideritide del Canadá, muy alta, con hoja como la de la Escrofularia; y flor de color que tira á amarillo roxo y purpúreo.
 Gov.

560 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Betonica Virginiana, *ela-*X *Betonica* de Virginia, mas
rior, *foliis Scrophulariæ*, X levantada, con hojas como
glabris, *flore ocroleuco*. X las de la Escrophularia, lam-
 Pluk. alm. t. 67. 150. f. 3. X piñas; y flor entre amarilla
 Moris. hist. 3. p. 365. sect. X y blanca.
 11. t. 4. f. 11. Herm. parad. X
 t. 106. X

Cast. Hysopo como Nepeta.

Habita en la Virginia y Canadá. ♂

858. Género NEPETA. * Cataria. *Tourn. t. 95.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, tubulado, cilindráceo, derecho, con cinco dientes agudos; los *superiores* mas largos, y los *inferiores* mas extendidos.

COR. de un *petalo*, boquiabierta: *tubo* cilindráceo, encorvado: *garganta* abierta, de figura de corazon, y terminada en dos lacinias redobladas, obtusas y muy cortas: el *labio superior* derecho, casi redondo y escotado: el *inferior* casi redondo, cóncavo, mayor, entero y recortadito.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, alesnados, puestos debaxo del labio superior, acercados, de los quales los dos son mas cortos: con las *anteras* echadas.

PIST. *Germen* dividido en quatro partes: *estilo* filiforme, del largo y direccion de los estambres: con el *estigma* hendido en dos partes, y agudo.

PERIC. ninguno: el *caliz recto* contiene las semillas en su seno.

SEM. quatro, y casi aovadas.

OBS. Si se cuentan las lacinias de la garganta con el labio inferior se hallará éste dividido en tres partes.

CARACT. GENER. DE TOURNEF.

CATARIA. p. 202.

La flor es de un petalo, labiada; cuyo labio superior se halla levantado, casi redondo y hendido en dos partes; el inferior dividido en tres, con la del medio excavada á ma-

manera de cuchara , y las demas que ciñen , como si fuesen alas , un grande orificio puesto entre los dos labios. Del caliz sale el pistilo acompañado de quatro embriones , que pasan á otras tantas semillas casi redondas , y recogidas en la capsula que antes fue caliz de la flor.

ESPECIES.

Caa
taria.

1. *NEPETA floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-serratis.* Mat. med. 168. Fl. dan. t. 580. Sabb. hort. 3. t. 80. Nepeta de flores espigadas ; verticilos con piececito corto ; hojas pecioladas , de figura de corazon , entre dentadas y aserradas.

Nepeta floribus interrupte spicatis pedunculatis. Hort. cliff. 310. Nepeta de flores interrumpidamente espigadas y con pedunculo.

Mentha Cataria, vulgaris & major. C. B. P. 228. Mentha Cataria , vulgar y mayor.

Cataria major, vulgaris. Tourn. p. 202. Cataria mayor , vulgar.

Cataria herba. Dod. pempt. 99. Cataria yerba.

Cast. *Nepeta Cataria.*

Habita en Europa : en la Real Casá de Campo : en los Pirineos de Cataluña : montes de Avila , Moncayo , de Segovia , Alcarria , Serrania de Cuenca y otras partes de España. ¶

PROPIED. *Es resolvente, expelente, cephalica, emenagoga y antelmintica ; y se usa con admirables efectos en el isterico y clorosis.*

Panno-
nica.

2. *NEPETA floribus paniculatis, foliis cordatis petiolatis obsolete crenatis.* Gmel. sib. 3. p. 239. Jacq. vind. t. 24. austr. t. 129. Nepeta de flores en panolja ; hojas de figura de corazon , pecioladas y con festones poco recortados.

Nepeta caule paniculato, pedunculis partialibus ramosis, multifloris. Roy. lugdb. 316. Nepeta con el tallo en panolja ; pedunculos parciales ramosos , y de muchas flores.

562 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Nepeta Pannonica, *major* & *elatiore*. Moris. hist. 3. p. 415. sect. 11. t. 6. f. 6. X Nepeta de Pannonia, mayor y mas levantada.

Mentha montana, *verticillata*. C. B. P. 227. X Menta montana, verticilada.

Menthastrum montanum. I. Clus. hist. 2. p. 32. X Mentastro montano, primo.

Cast. *Nepeta de Pannonia*.

Habita en Austria, Pannonia y Siberia. ¶

Vio- 3. NEPETA *verticillis* X Nepeta de verticilos con
lacea. *pedunculatis corymbosis, foliis petiolatis cordato-oblongis dentatis*. Scop. carn. ed. 2. n. 744. X pedunculo, corimbosos; hojas pecioladas, entre de figura de corazon y oblongas, y dentadas.

Nepeta montana, *purpurea*, *major*, *sparsa spica*. Barr. ic. 601. Bocc. mus. 2. p. 46. t. 36. X Nepeta montana, purpúrea, mayor, con la espiga esparcida.

Cataria Hispanica, *Betonice folio, angustiore, flores cæruleo*. Tourn. p. 202. X Cataria de España, con hoja como la de la Betonica, mas angosta, y flor cerúlea.

Cast. *Nepeta de color de violeta*.

Habita en la Siberia y Carniola: en el Piul de Ribas: en Asturias, Alcarria, Aragón y Cataluña. ¶

Ucra- 4. NEPETA *floribus paniculatis, foliis lanceolatis serratis sessilibus nudis*. X Nepeta con flores en pan-
nica. noja; hojas lanceoladas, aserradas, sin peciolo y desnudas.

Cast. *Nepeta de Ucrania*.

Habita en Ucrania.

Ne- 5. NEPETA *floribus racemosis, racemulis quinquefloris, foliis cordato-lanceolatis dentatis tomentosis*. X Nepeta de flores en raci-
petella mo, y racimitos de cinco flores; hojas entre de figura de corazon y lanceoladas, dentadas y tomentosas.

Cast. *Nepeta nepetela*.

Ha-

Habita en la Europa austral: en Andalucia, Aragon y otras partes de España. ¶

Es planta tres veces mas pequeña que la *Nepeta cataria*. Echa las *hojas* muy angostas, agudamente sinuosas y dentadas: las *flores* en racimos laxos; con los *racimitos* de cinco ó seis flores: los *cálices* desnudos: las *corolas* recientes encarnadas: las *anteras* cerúleas; y las *bracteas* muy angostas y extendidas.

Nuda.

6. *NEPETA florum racemis verticillatis nudis, foliis cordato-oblongis, sessilibus serratis.* Jacq. austr. t. 24. Nepeta con los racimos de las flores verticilados, desnudos; hojas entre de figura de corazon y oblongas, sin peciolo y aserradas.

Cataria foliis imis cordatis, obtusis, superioribus ovatis, verticillis sessilibus, densissimis, spicatis. Hall. helv. n. 248. Cataria con las hojas de mas abaxo de figura de corazon, obtusas y las superiores aovadas; verticilos sentados, muy densos y en espiga.

Mentha Cataria, Hispanica, angustioribus foliis. Bauh. hist. 3. p. 2. pag. 236. Menta Cataria, de España, con hojas mas angostas.

Cataria angustifolia, major. Tourn. p. 202. Cataria mayor, de hoja angosta.

Cataria folio longiore. Dod. pempt. 99. Cataria con hoja mas larga.

Cast. *Nepeta desnuda.*

Habita en Suiza: en la Mancha y Alcarria: en Texadilla de Segovia y otras partes de España. ¶

Arroja los tallos del largo de dos pies, lampiños, enxutos y apretados, con quatro surcos, y los mas antiguos de color entre negro y purpúreo: las *hojas* como las de la *Estaquis palustre*, sentadas, de figura de corazon, oblongas, aserradas, obtusas, venosas, desnudas y ásperas por ambas partes: los *racimos* con ramitas opuestas en forma de aspa: las *bracteas* lineares; y las *flores* separadas: la *corola* entre de color blanquecino y que tira á rubio; y la *garganta* con puntitos purpúreos.

564 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Hir-
suta. 7. *NEPETA floribus sessilibus verticillato--spicatis, verticillis tomento involutis.* Hort. cliff. 311. Nepeta con flores sentadas, entre verticiladas y en espiga; y los verticilos envueltos con tomento.
Horminum spicatum, Lavandulae flore & odore. Bocc. sic. 48. t. 25. f. 2. Hormino espigado, con flor y olor de Espliego.

Cast. Nepeta con pelo áspero.
Habita en Sicilia.

Ita-
lica. 8. *NEPETA floribus sessilibus verticillato-spicatis, bracteis lanceolatis longitudine calycis, foliis petiolatis.* Jacq. hort. t. 112. Nepeta de flores sin pedunculo, entre verticiladas y en espiga; bracteas lanceoladas, de la longitud del caliz; y hojas con peciolo.
Mentha Cataria, minor, alpina. C. B. P. 228. Prodr. 110. Tourn. p. 202. Menta Cataria, menor, alpina.

Cast. Nepeta de Italia.
Habita en Italia. ¶

Echa el tallo del largo de un pie: las *hojas* de figura de corazon, obtusas, recortadas y con peciolo: las *espigas terminales* con verticilos apartados, sentados y cercados de *bracteas* lanceoladas, verdes, mas blancas por sus lados, de la longitud de los cálices y puntiagudas: los *cálices* derechos é iguales; y las *corolas* blancas.

Tube-
rosa. 9. *NEPETA spicis sessilibus terminalibus, bracteis ovatis coloratis, foliis summis sessilibus.* Hort. cliff. 311. Gov. illustr. 36. Nepeta con espigas sentadas, terminales; bracteas ovadas, de color; y hojas de mas arriba sin peciolo.
Mentha tuberosa radice. C. B. P. 227. Menta con la raiz tuberosa.
Cataria Hispanica, supina, Betonicæ folio, tuberosa radice. Tourn. p. 202. Cataria de España, tendida, con hoja como la de la Betonica; y raiz tuberosa.
Menthastrum III. tuberosa radice. Clus. hist. 2. p. 33. Mentastro tercero, con la raiz tuberosa.

Nepeta tuberosa, spicata, *Nepeta de España, espi-*
Hispanica. Bocc. mus. 2. p. *gada; y con la raiz tubero-*
 44. t. 36. Barr. ic. 1131. *sa. α*
 Sabb. hort. 3. t. 81.

Cast. *Nepeta tuberosa.*

Habita en Portugal, Extremadura, montes de nuestra Señora de Mon-serrat, en el Piul de Rivas y otras partes de España. ¶

Arroja los tallos sencillos: las hojas entre de figura de corazon y oblongas, rugosas, algo obtusas, vellosas y con aserraduras gruesas: la espiga terminal larga, algo interrumpida, con muchas bracteas derechas, aovadas, agudas, nerviosas, de color encarnado, vellosas por su margen y que cubren los cálices; y las flores de color de violeta. La variedad α se halla tendida.

Scor-
dotis.

10. *NEPETA spicis sessilibus terminalibus, bracteis subcordatis villosis, foliis cordatis obtusis.* Amœnit. acad. 4. p. 317.

Scordium alterum, lanuginosius, verticillatum. C.B. P. 248.

Scordotis. Alp. exot. 284. t. 283. Clus. hist. 2. p. 312.

Nepeta de espigas sin pedunculo, terminales, con bracteas casi de figura de corazon, vellosas; hojas de figura de corazon y obtusas.

Otro Escordio verticilado y mas lanuginoso.

Escordotide.

Cast. *Nepeta Escordotide.*

Habita en Creta. ¶

Virgi-
nica.

11. *NEPETA capitulis terminalibus, staminibus flore longioribus, foliis lanceolatis.* Mill. dict. n. 9.

Clinopodium Amaraci folio, floribus albis. Pluk. alm. 110. t. 85. f. 2.

Nepeta con cabezuelas terminales; estambres mas largos que la flor; y hojas lanceoladas.

Clinopodio con hojas de Mejorana; y flores blancas.

566 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Clinopodium flore albo, ramosius, angustioribus foliis, glabris, Virginianum. Moris. hist. 3. p. 374. sect. 11. t. 8. figura ultima. X
 Clinopodio de Virginia, mas ramoso, con la flor blanca; hojas mas angostas y lampiñas.

Cast. Nepeta de Virginia.

Habita en la Virginia. 24

Tiene el labio inferior de la corola aserrado, y sin que sea cóncavo.

Mala- 12. NEPETA *spica verticillata, bracteis filiformibus, foliis lanceolatis inferne integerrimis.* X
 barica. Nepeta de espiga verticilada, con bracteas filiformes; hojas lanceoladas y enterisimas por debaxo.

Nepeta Malabarica, foliatiore, flore ex cœruleo al- bido. Moris. hist. 3. p. 415. X
 Nepeta de Malabár, con hoja mas ancha; y flor entre cerúlea y blanquecina.

Carim-tumba. Rheed. ma- lab..... X
 Carim-tumba.

Cast. Nepeta de Malabár.

Habita en Malabár.

Produce los tallos derechos, obtusangulos y tomentosos: las hojas entre aovadas y lanceoladas, tomentosas, aserradas, enterisimas ácia la base y con peciolo: muchos verticilos apartados, y casi en espiga interrumpida; con bracteas filiformes, algo mas gruesas por su ápice, vellosas, de dos en dos debaxo de cada flor y de la longitud de los cálices: el caliz velloso y con cinco dientes: las corolas de color violado pálido: el labio superior lanceolado, entero, cóncavo, revuelto por su margen, derecho, obtuso y mas corto que los filamentos: el labio inferior mas largo, mas ancho y partido en tres lacinias, con la intermedia mayor, recortadita y doblada por su margen. Koenig.

Indica, 13. NEPETA *corollarum labio superiore integerrimo brevissimo.* X
 Nepeta con el labio superior de las corolas enterisimo y muy corto.

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 567

Leucas foliis subrotundis, serratis, flore albo. Burm. Zeyl. 140. t. 63. ?

Leucas con hojas casi redondas, aserradas; y flor blanca.

Nepeta Indica, rotundiore folio. Moris. hist. 3. p. 415. sect. 11. t. 6. f. 7.

Nepeta de Indias, con hoja mas redonda.

Katu-Kurca. Rheed. mal. 10. p. 179. t. 90.

Katu-Kurca.

Cast. Nepeta de Indias.

Habita en las Indias.

Tiene el labio superior de la corola muy corto y entero: los estambres de la longitud del labio inferior: y las flores verticiladas. Es muy parecida á la especie precedente.

Amboini-
ca.

14. *NEPETA foliis cordatis obtusis crenatis, bracteis ovatis.* Suppl. p. 273.

Nepeta con hojas de figura de corazon, obtusas, recortadas; y bracteas aovadas.

Cast. Nepeta de Amboina.

Habita en Amboina. \bar{h}

Tiene el tallo sufruticoso: las ramas derechas, de quatro lados, vellosas y por debaxo de color negro que tira á purpúreo: las hojas opuestas, pecioladas, de figura de corazon, obtusas, con festones tambien obtusos, rayadas por encima, con algun tomento muy blando, verdes y por debaxo venosas: los peciolos ensanchados por su ápice y cortos: las flores casi en verticilo: dos bracteas menudas, aovadas, agudas y enterisimas: el labio superior de la corola blanco y corto; y el inferior de color de violeta.

Multi-
fida.

15. *NEPETA floribus spicatis, foliis pinnatifidis integerrimis.* Pall. it. 2. p. 653.

Nepeta con flores espigadas; hojas hendidas al través y enterisimas.

Nepeta foliis bipinnatis linearibus, floribus spicatis. Suppl. p. 273.

Nepeta con hojas dos veces pinnadas, lineares y flores en espiga.

La-

Lavandula foliis ovatis, sæpe lobatis. Gmel. sib. 3. p. 242. t. 55. X Lavandula ó sea Espliego, con hojas aovadas, y las mas veces hendidas en lóbulos.

Lavendula montana, folio Valerianellæ varie secto, cærulea. Amm. ruth. 69. X Lavendula montana, cærulea, con hoja como la de la Varianela variamente cortada.

Cast. Nepeta hendida en muchas partes.

Habita en toda la Siberia, fuera de Genisea. Gmel. ☉

Posee el tallo derecho y sin ramas: las *hojas inferiores* con peciolo; las *superiores* sentadas, sin ser recortadas; oblongas, hendidas en tres, quatro ó cinco lóbulos alternos y oblongos: las *flores* muy pequeñas; con las *anteras* divididas en dos partes. *Syst. plant.* 3. p. 34.

Arroja el tallo derecho, quadrangular, y con ramas opuestas en forma de aspa: las *hojas* dos veces pinnadas, lineares, desnudas y de figura de corazon, con lacinias obtusas: la *espiga* terminal, de seis lados y sentada: las *flores* blancas y pequeñas: el *labio superior* hendido en dos partes agudas y derecho: el *inferior* hendido en tres lacinias; las *laterales* escotadas, la *del medio* dividida en dos lóbulos y algo recortada. *Suppl.* p. 273.

Pecti-
nata.

16. NEPETA *floribus spicatis secundis, foliis cordatis nudis, caule frutescente, corollis minutis.* X Nepeta con flores en espiga, ladeadas; hojas de figura de corazon, desnudas; tallo frutescente; y corolas menudas.

Galeopsis procerior, foliis ovato-acuminatis, serratis, spicis majoribus compositis, spicillis geminatis, secundis. Brown. jam. 259. X Galeopsis mas alta, con hojas entre aovadas y puntiagudas, aserradas; espigas mayores compuestas; y espiguillas mellizas ladeadas.

Cast. Nepeta peynada.

Habita en la Jamaica. ♯

Produce el tallo de la altura de un hombre, de quatro lados, liso; con ramas opuestas en forma de aspa y algo oloroso: las *hojas* con peciolo, de figura de corazon, venosas, desnudas y aserradas: las *espigas terminales* ladeadas, interrumpidas y casi sin hojas: los ver-

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 569

ticilos pedunculados, levantados como en ramillete horizontal y ladeados; con muchas *bracteas* setáceas, del largo de la flor: el *caliz* dividido en cinco partes y tambien setáceo: la *corola* amarilla, apenas mayor que el caliz; con el *borde* hendido en cinco lacinias, las quatro iguales, agudas y extendidas, la quinta ó labio de color que tira á purpúreo y casi redondo: quatro *estambres* apartados y de la longitud de la corola: el *estilo* de color que tambien tira á purpúreo; y los *estigmas* sencillos. Florece en invierno.

La.
endu-
acea.

17. NEPETA *foliis ovatis inciso-serratis lineatis, spica compacta*. Suppl. p. 272. Nepeta con hojas aovadas, entre cortadas y aserradas, rayadas; y espiga compacta.

Cast. Nepeta como Espliego,

Habita en la Siberia. 4

Echa el *tallo* derecho; con *ramas* opuestas en forma de aspa, rollizo, de color que tira á purpúreo, del largo de un gemo, hasta el de un pie y con pelos blancos: las *hojas* opuestas, con peciolo, aovadas, rayadas, algo obtusas, con aserraduras profundas, y tambien obtusas, semejantes á las de la *Veronica officinal*, y las de mas abaxo enterisimas, con los peciolos casi de la longitud de ellas: la *espiga* terminal, algo obtusa, entre aovada y oblonga: las *bracteas* apretadas, aovadas, agudas y del largo del caliz: las *flores* del todo sentadas: el *caliz* de color pardo que tira á cerúleo y peloso: la *corola* de color de violeta y muy grande: el *labio superior* hendido en dos partes agudas; y el *inferior* apenas recortado: dos *estambres* de la longitud del labio superior, y los otros dos fuera de la garganta; con las *anteras* divididas en dos partes.

859. Género LAVANDULA. * *Tourn. t. 93.**Stœchas. Tourn. t. 95.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, aovado, con cinco dientes poco manifiestos, corto, persistente y apoyado con una bráctea.

COR. de un *petalo*, boquiabierta, resupinada: *tubo* cilíndrico, mas largo que el caliz: *borde* extendido: el *labio* que mira arriba mayor, hendido en dos partes y extendido: el *otro* que mira abaxo hendido en tres lacinias, todas algo redondas y casi iguales.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, cortos, dentro del tubo de la corola, é inclinados, de los cuales dos son mas cortos: con las *anteras* pequeñas.

PIST. *Germen* dividido en quatro partes: *estilo* filiforme, de la longitud del tubo: con el *estigma* hendido en dos lóbulos, obtusos y arrimados entre sí.

PERIC. ninguno: el *caliz* cerrado fomenta las semillas.

SEM. quatro, y aovadas al revés.

OBS. La *Lavandula* de *Tournefort* tiene las *flores* dispuestas en espiga sencilla.

La *Stœchas* del mismo *Tournefort* posee las *flores* en espiga dispuestas en varias series, y amontonadas con un penacho levantado y hermoso.

CARACTERES GENERICOS DE TOURNEFORT.

LAVANDULA. p. 198.

La *flor* es de un *petalo*, labiada; cuyo *labio* superior se halla levantado, casi redondo y hendido en dos partes; pero el inferior partido en tres. Del caliz sale el *pistilo* acompañado de quatro *embriones*, que pasan á otras tantas *semillas*, recogidas en una *capsula* que antes fue caliz de la flor. A estas notas deben añadirse las de las *flores* que nacen á manera de *verticilo*, en los remates de los tallos y ramas.

STOECNAS. p. 201.

La flor es de un petalo, labiada; cuyo labio superior se halla derecho y hendido en dos partes; pero el inferior partido en tres, y ambos cortados de manera, que á la primera vista, la flor parece partida en cinco lacinias. Del caliz sale el pistilo acompañado de quatro embriones, que pasan á otras tantas semillas, casi redondas, recogidas en una capsula que fue caliz de la flor. A estas notas se añaden las de las flores dispuestas por varias series en cabezuelas escamosas, en cuyo remate sobresalen algunas hojuelas vistosas, á las quales *Clusio* llama *Cintillas* membranas.

ESPECIES.

- Spica. 1. LAVANDULA *foliis lanceolatis integerrimis, spicis nudis*. Mat, med. 169. Lavandula con hojas lanceoladas, enterisimas; y espigas desnudas.
Sabb. hort. 3. t. 72.
Lavandula latifolia (vel *angustifolia*). C. B. P. 216. (ó de hoja angosta).
Tourn. p. 198. Dod. pempt. 273.

Cast. Lavandula espiga. vulgo: Espliego. Alhucema.
Habita en la Europa austral: en la Real Casa de Campo, en el Real Sitio del Pardo: en la Mancha, Extremadura, Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragon y otras muchas partes de España. \bar{h}

PROPIED. Es olorosa, nervina, resolvente, cefalica y uterina.

- Multi-fida. 2. LAVANDULA *foliis duplicato-pinnatifidis*. Burm. Lavandula con hojas dos veces hendidas al través.
ind. t. 38. f. 1.
Lavandula folio dissecto. Lavandula con hoja cortada.
C. B. P. 216. Tourn. p. 198.
Lavandula multifido folio. Bauh. hist. 3. p. 288. Lavandula con hoja hendida en muchas partes.
Clus, hist. 1. p. 345. X

La-

572 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Lavandula folio longiori tenuius & elegantius dissecto. Tourn. p. 198. Comm. rar. 27. t. 27. Lavandula con hoja mas larga, y cortada mas linda y delgadamente, α

Lavandula (Canariensis) foliis duplicato-pinnatifidis, hirsutis, spicis fasciculatis. Mill. dict. n. 4. R. Lavandula (de Canarias) de hojas dos veces hendidas al través, con pelo áspero; y espigas en bacecillo.

Lavandula Canariensis, maritima, spica multiplici, cærulea. Pluk. alm. 209. t. 303. f. 5. Lavandula de Canarias, maritima, con muchas espigas y de color cerúleo.

Cast. Lavandula hendida en muchas partes.

Habita en el Reyno de Valencia y de Andalucia. ♂

Dentata. 3. LAVANDULA *foliis pinnato-dentatis, spicis ramosis.* Roy. lugdb. 323. Lavandula con hojas entre pinnadas y dentadas; y espigas ramosas.

Stæchas folio serrato. C. B. P. 216. Cantueso con hoja aserrada.

Stæchas crispo folio. Clus. hist. 345. Cantueso con hoja rizada.

Lavandula foliis crenatis. Tourn. p. 198. Lavandula con hojas recortadas.

Cast. Lavandula dentada.

Habita en Oriente: en Cordova, Gibraltar y otras partes de Andalucia. ♀

Stæchas. 4. LAVANDULA *foliis lanceolato-linearibus integerrimis, spicis comosis.* Sauv. monsp. 143. Mat. med. 169. Lavandula de hojas entre lanceoladas y lineares, enterisimas; y espigas con penacho.

Stæchas purpurea. C. B. P. 216. Tourn. p. 201. Cantueso con la flor purpúrea.

Stæchas brevioribus ligulis. Clus. hist. 1. p. 344. Cantueso con cintillas mas cortas.

Stæchas Arabica vulgo dicta. Bauh. hist. 3. p. 273. Cantueso vulgarmente llamado de Arabia.

Stæchas cauliculis non foliaceis. C. B. P. 216. Tourn. Cantueso con tallitos sin hojas. α
p. 201.

Stæchas longioribus ligulis. Clus. hist. 1. p. 344. Cantueso con cintillas mas largas.

Cast. Lavandula Cantueso. Farm. *Stæchas Arabica.*

Habita en la Europa austral: en la Real Casa de Campo: Reales Sitios del Pardo y Aranjúez: en Aragon, Cataluña y otras muchas partes de España. \mathcal{L}

PROPIED. Tiene el olor mas fuerte que el espliego: es cerebral y nervina: se usa en la paralisis, vertigos é hypocondria.

Car. 5. LAVANDULA *foliis cordatis crenatis glaberrimis carnosis.* Suppl. p. 273. Lavandula con hojas de figura de corazon, recortadas, muy lampiñas y carnosas.

Cast. Lavándula carnosa.

Habita entre las peñas cerca de Sadrassam. Kœnig. \mathcal{H}
Es planta que en el tiempo que florece se halla sin hojas.

860. Género SIDERITIS. * Tourn. t. 90.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, tubuloso, oblongo, apenas medio hendido en cinco lacinias agudas y casi iguales.

COR. de un petalo, casi igual: tubo cilindráceo, oblongo: garganta oblonga, algo rolliza: labio superior derecho, hendido en dos partes y angosto: el inferior hendido en tres lacinias, con las laterales mas agudas, algo mas pequeñas que el labio superior, y la del medio casi redonda y recortada.

ESTAMB. Filamentos quatro, dentro del tubo de la corola, mas cortos que la garganta, de los cuales los dos son mas pequeños: con las anteras casi redondas, de dos en dos y mellizas.

PIST. Germen hendido en quatro partes: estilo filiforme, algo mas largo que los estambres: estigmas dos, de los

574 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

los cuales el *superior* es cilindrico, cóncavo, truncado: el *inferior* membranoso, mas corto y que envaya na al superior.

PERIC. ninguno: el *caliz* fomenta en su seno las semillas.
SEM. quatro.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 191.

La *flor* es de un petalo, labiada; cuyo labio superior se halla levantado; y el inferior partido en tres lacinias. Del caliz sale el pistilo acompañado de quatro embriones, que pasan á otras tantas semillas oblongas, y recogidas en una capsula que fue caliz de la flor. A estas notas se añaden las de las flores puestas en verticilo, en las axilas de las hojas y que se diferencian de las demas por estar cortadas á manera de cresta. (*son las bracteas*).

ESPECIES SIN BRACTEAS.

Canariensis I. SIDERITIS *fruticosa*, X Sideritide fruticosa, vello-
villosa, foliis cordato-oblon- X sa, de hojas entre de figura
gis acutis petiolatis, spicis X de corazon y oblongas, agu-
verticillatis ante florescen- X das, con peciolo; espigas en
tiam nutantibus, ramis di- X verticilo; inclinadas antes
varicatis. Mill. dict. n. 9. X de florecer; y ramas aparta-
das.
Stachis amplissimis Ver- X Estaquis con hojas muy an-
basci foliis, floribus albis, X chas como las del Verbascos;
parvis, non galeatis, spica X flores blancas, pequeñas, sin
Betonicae. Pluk. alm. 356. t. X capacete; y espiga como la
322. f. 4. Tourn. t. 186. X de la Betonica.

Cast. Sideritide de Canarias.

Habita en las Canarias. \bar{h}

Es *arbusto* que produce las *hojas* de figura de corazon, puntiagudas, recortadas y verdes en ambas partes: las *espigas* con pedunculo, largas, inclinadas: los *verticilos* apartados: muchisimas *flores*: los *cálices* con pelo áspero y terminados en punta rígida.

2. *SIDERITIS fruticosa*, tomentosa, foliis cordato-oblongis obtusis petiolatis, ramis divaricatis, spicis verticillatis. Sideritide fruticosa, tomentosa, de hojas entre de figura de corazon y oblongas, obtusas, con peciolo; ramas apartadas; y espigas en verticilos.

Stachis Canariensis, frutescens, *Verbasci folio*. Estaquis de Canarias, frutescente, con hoja como la del *Verbasci*.
Comm. hort. 2. p. 197. t. 99.

Cast. Sideritide de Creta.

Habita en Creta. $\frac{1}{2}$

Es arbusto que tiene las ramas desparramadas, con tomento muy espeso y de color de nieve; las hojas de figura de corazon, recortadas, obtusas, tomentosas por ambas partes, por encima verdes, y por debaxo con tomento muy espeso y de color de nieve: la espiga que sale de la division de las ramas, con pedunculo, pendula, tomentosa, y de color muy blanco como los cálices los cuales son obtusos; y ocho flores, poco mas ó menos, en cada verticilo.

3. *SIDERITIS suffruticosa*, tomentoso-lanata, foliis lanceolatis integerrimis, floribus verticillatis. Sabb. Sideritide sufruticosa, entre tomentosa y lanuda, con hojas lanceoladas, enterisimas; y flores en verticilo.

hort. 3. t. 40.

Sideritis Cretica, tomentosa, candidissima, flore luteo. Tourn. cor. 12. Sideritide de Creta, tomentosa, muy cándida, con la flor amarilla.

Stachis fruticosa, foliis lanceolato-linearibus integerrimis sessilibus. Hort. cliff. 310. Estaquis fruticosa, con hojas entre lanceoladas y lineares, enterisimas y sin peciolo. α

Stachis minor, Italica. Estaquis menor, de Italia.

C. B. P. 236. Tourn. p. 186.

Stachis Lychnoides incana, angustifolia, flore aureo. Barr. ic. 1187. Estaquis como *Lychnide*, blanquecina, con hoja angosta; y flor de color de oro.

576 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Pilosella Syriaca. C. B. X Pelosilla de Siria.
 P. 262. X
Stachis. Dod. pempt. 90. X Estaquis.

Cast. Sideritide de Siria.

Habita en Creta. h

Es *arbuscito* con traza como la de la *Salvia*; pero mas largo. Tiene las *hojas* como las de la *Salvia*, tomentosas, lanudas y blancas: las *inferiores* con peciolo: las *superiores* sentadas; y las *flores* de color que de blanco tira á amarillo-roxo.

Per-
foliata.

4. *SIDERITIS herbacea*, X Sideritide herbácea, con
hispido-pilosa, foliis supe- X pelo erizado; y hojas superio-
rioribus amplexicaulibus. X res amplexicaules.
 Mill. dict. n. 3.

Sideritis Orientalis, Phlo- X Sideritide Oriental, con
midis folio. Tourn. cor. 12 ? X hoja como la del Phlomis.

Stachys foliis oblongis, X Estaquis con hojas oblon-
acutis, amplexicaulibus, ser- X gas, agudas, amplexicaules,
ratis, floralibus cordatis, X aserradas; las florales de fi-
acutis, integerrimis. Roy. X gura de corazon, agudas y
 lugdb. 318. X enterisimas.

Cast. Sideritide perfoliada.

Habita en Oriente?

Posee el *tallo* derecho y herbáceo: las *hojas inferiores del tallo* con peciolo: las *superiores* sentadas, opuestas y amplexicaules: las *florales* de figura de corazon, enterisimas y puntiagudas: las *corolas* blancas y con algunas venas rubias.

Mon-
tana.

5. *SIDERITIS herbacea*, X Sideritide herbácea, sin
ebracteata, calycibus corolla X bracteas, con los cálices ma-
majoribus spinosis, labio X yores que la corola, espino-
superiore trifido. X sos; y el labio superior hen-
 dido en tres partes.

Cunila calycum labio spi- X Cunila con el labio de
noso, superiore trifido, in- X los cálices espinoso, el su-
feriore bipartito. Hort. Cliff. X perior hendido en tres par-
 tes, y el inferior partido en
 313. X dos.

Mar-

Marrubiastrum Sideritis folio, calyculis aculeatis, flore albo, limbo atropurpureo. Tourn. p. 190.

Marrubiastro de hoja como la de la Sideritide; calicilos con agujones; y flor amarilla-roxa, con su borde de color entre negro y purpúreo.

Sideritis montana, parvo varioque flore. C. B. P. 233.

Sideritide montana, con la flor pequeña y de varios colores.

Sideritis montana, parvo flore, nigro purpureo, medio croceo. Col. ecphr. 1. pag. 198. t. 196.

Sideritide montana, con la flor pequeña, entre negra y purpúrea, y en medio de color de azafran.

Cast. Sideritide montana.

Habita en Italia: entre los sembrados de la Alcarria, Serania de Cuenca y otras partes de España. ☉

Tiene las corolas de color amarillo-roxo; pero ferrugineo por su margen y menores que el caliz: los verticilos de seis flores y sin brácteas.

La planta que nace entre peñascos se halla derecha; pero tendida la que se cria en los prados.

Posee hojas en la base de los verticilos, en lugar de brácteas. Es de la altura de un pie, poco mas ó menos: tiene la traza como la de la *Sideritide Romana*, y las hojas con cinco nervios, poco mas ó menos, transversales. Gov. Hort. 277.

Romana.

6. *SIDERITIS herbacea decumbens, ebracteata, calycibus spinosis, labio superiore ovato.*

Sideritide herbácea, tendida, sin brácteas, con cálices espinosos, y el labio superior aovado.

Cunila calycum lacinia superiore latiori ovata trinervi. Hort. cliff. 313.

Cunila con la lacinia superior de los cálices mas ancha, aovada y de tres nervios.

Sideritis genus, verticillis spinosis. Bauh. hist. 3. P. 428.

Género de Sideritide, con verticilos espinosos.

578 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Sideritis verticillis spinosis, minor, procumbens. Sideritide menor, tendida, con verticilos espinosos.
 Moris. hist. 3. p. 388. sect. 11. t. 12. f. 5.

Cast. Sideritide Romana.

Habita entre los sembrados de la Europa austral: en el circuito de Barcelona, Valencia, Murcia y en Andalucía. ♂

Tiene el quinto lóbulo ó superior del caliz aovado, y al doble mas ancho que los restantes: las corolas blancas como las del *Marrubio*; con el labio superior solamente escotado: los verticilos de seis flores y sin brácteas: los tallos deprimidos y algo rígidos.

ESPECIES CON BRACTEAS DENTADAS.

Incana 7. *SIDERITIS suffruticosa, tomentosa, foliis lanceolato-linearibus integerrimis, floribus bracteisque dentatis.* Gov. illustr. 36. Sideritide sufruticosa, tomentosa, con hojas entre lanceoladas y lineares, enterisimas; flores y brácteas dentadas.

Sideritis Hispanica, erecta, folio angustiore. Tourn. Sideritide de España, levantada, con hoja mas angosta. p. 191.

Hyssopus montana, verticillata, major. Barr. ic. 239. Hisopo montano, mayor, verticilado. Bocc. mus. 2. p. 77. t. 67. f. 2.

Tragoriganum II. Clus. Tragorigano segundo. hist. 2. p. 240.

Cast. Sideritide blanquecina.

Habita en la Alcarria, Sierra de Miraflores y otras partes de España. ♀

Su traza es como la del *Espliego*; pero se halla con tomento blanquecino. Arroja el tronco sufruticoso, tendido comunmente por su base, del qual salen muchos tallos ó ramos ligeramente tomentosos, blancos, derechos, del largo de un pie, poco mas ó menos, y de quatro lados: las hojas menos abiertas, enterisimas, rayadas, tomentosas, blancas, lineares y lanceoladas y por encima des-

nudas: las superiores lineares y mas apartadas; y las de mas arriba ácia los verticilos alguna vez dentadas: las bracteas de figura de corazon, con dientes y algo espinosas: los verticilos de seis flores: los cálices blanquecinos y con cinco dientes: las corolas de color amarillo-roxo; con el labio superior derecho, linear, las mas veces hendido en dos lacinias, y el inferior hendido en tres, con la intermedia quatro veces mas ancha.

Hyso-
pifolia.

8. SIDERITIS foliis lanceolatis glabris integerrimis, bracteis cordatis dentato-spinosis, calycibus æqualibus.

Sideritide de hojas lanceoladas, lampiñas, enterisimas; bracteas de figura de corazon, con dientes espinosos; y cálices iguales.

Betonica foliis ellipticis, obiter crenatis, verticillis spicatis, bractearum dentibus aristatis. Hall. helv. n. 260.

Betonica de hojas elípticas, alguna vez recortadas; verticilos en espiga; y dientes de las bracteas con aristas.

Sideritis alpina, hyssopifolia. C. B. P. 233. Tourn. p. 191.

Sideritide alpina, con hoja como la del Hisopo.

Sideritis VII. Clus. hist. 2. P. 41.

Sideritide septima.

Cast. Sideritide con hoja de Hisopo.

Habita en Toscana y Thuri: en los Pirineos de Cataluña: en la Alcarria, Serrania de Cuenca, Aragon y otras partes de España. 2

Scor-
dioi-
des.

9. SIDERITIS foliis lanceolatis, subdentatis supra glabris, bracteis ovatis dentato-spinosis, calycibus æqualibus.

Sideritide de hojas lanceoladas, con algun diente, y por encima lampiñas; bracteas aovadas, con dientes espinosos y cálices iguales.

Betonica foliis ellipticis, acute dentatis, bracteis serratis, aristatis, verticillis spicatis. Hall. helv. n. 261.

Betonica de hojas elípticas, agudamente dentadas; bracteas aserradas, con aristas y verticilos en espiga.

Sideritis montana, *Scordioides*, *tomentosa*. Barr. ic. 143. Hall. helv. n. 261. Sideritide montana, tomentosa, parecida al Escordio.

Sideritis foliis hirsutis, *profunde crenatis*. C. B. P. 233. Tourn. p. 191. Sideritide de hojas con pelo áspero, y profundamente recortadas.

Sideritis Monspessulana. Bauh. hist. 3. p. 426. Sideritide de Mompeller.

Cast. Sideritide como Escordio.

Habita en Mompeller. Sauv. y en Suiza: en la Alcarria, Serranias de Miraflores y otras muchas partes de España. ¶

Se diferencia de la *Sideritide con pelo áspero* por los tallos mas derechos; por las hojas lampiñas comunmente por encima; por el labio superior de la corola amarillo; por las espigas aovadas y no interrumpidas; y por las brácteas aovadas con los dientes pestañosos.

Hirsuta. 10. *SIDERITIS foliis lanceolatis obtusis dentatis pilosis*, *bracteis dentato-spinosis*, *caulibus hirsutis decumbentibus*. Syst. veg. 443. Sideritide de hojas lanceoladas, obtusas, dentadas, pelosas; brácteas con dientes espinosos; tallos con pelo áspero y tendidos.

Sideritis foliis lanceolatis obtusis dentatis pilosis, *bracteis dentato-spinosis*, *caule hirto*, *spicis interrumpitis elongatis*. Sp. pl. 2. p. 803. Sabb. hort. 3. t. 58. Sideritide de hojas lanceoladas, obtusas, dentadas, pelosas; brácteas con dientes espinosos; tallo con pelo áspero; espigas interrumpidas y alargadas.

Sideritis hirsuta, *procumbens*. C. B. P. 233. Tourn. p. 191. Sideritide tendida, y con pelo áspero.

Sideritis III. Clus. hist. 2. p. 40. Sideritide tercera.

Cast. Sideritide con pelo áspero.

Habita en Italia y Narbona: en los circuitos de Madrid: Real Sitio de Aranjuez: en Valdemoro, Aragon, Cataluña, arenas del mar Mediterráneo y otras partes de España. ¶

Posee el tallo rigido y peloso; las hojas lanceoladas, algo ob-

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 581

obtusas , entre rugosas y plegadas , con tres ó quatro aserraduras un poco agudas : las *bracteas* de figura de corazon , con aserraduras espinosas : los *verticilos* muy apartadas , sin pedunculo , de seis flores ; con el *tallo* entre los *verticilos* mas peloso : las *corolas* de color amarillo-roxo , y su tubo encorvado ; el *labio superior* linear , medio hendido en dos lacinias , redoblado , derecho y blanco ; con el *labio inferior* muy pequeño : los *cálices* con pelo áspero y cinco espinas iguales.

La-
nata. II. SIDERITIS *foliis cor-* X Sideritide con hojas de fi-
datis obtusis villosis , caly- X gura de corazon , obtusas,
cibus muticis lanatis , spica X vellosas ; cálices sin arista,
longa , caule erecto. X lanudos ; espiga larga ; y ta-
X llo derecho.

Cast. Sideritide lanuda.

Habita en Egipto y Palestina. ☉

Es planta del largo de un gemo, poco mas ó menos, derecha y toda lanuda. Echa el *tallo* muy sencillo : las *hojas* de figura de corazon , casi sentadas, obtusas, y con festones poco manifiestos : la *espiga* mas larga que el mismo tallo , sin pedunculo , terminal , y compuesta de *verticilos* con seis flores , apartados y muy lanudos : las *corolas* de color entre negro y violado , y de la longitud del caliz : las *bracteas* aovadas, lanudas y con aserraduras poco manifiestas.

861. Genero MENTHA. * Tourn. t. 89.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , tubulado , derecho , con cinco dientes , igual y persistente.

COR. de un *petalo* , derecho , tubulado y poco mas largo que el caliz : *borde* casi igual , partido en quatro *lacinias* , con la superior mas ancha y escotada.

ESTAMB. *Filamentos* quatro , alesnados , derechos , apartados , de los cuales los dos mas próximos son mas largos : con las *anteras* casi redondas.

PIST. *Germen* hendido en quatro partes : *estilo* filiforme, de-

582 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

derecho, mas largo que la corola: con el *stigma* hendido en dos partes y extendido.

PERIC. ninguno: el *caliz* derecho fomenta las semillas en su seno.

SEM. quatro y pequeñas.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 188.

La *flor* es de un petalo, labiada; cuyo labio superior se halla arqueado; pero el inferior dividido en tres partes, y ambos cortados, de tal manera, que la flor á la primera vista parece dividida en quatro partes. Del caliz sale el pistilo, acompañado de quatro embriones, que pasan á otras tantas semillas, recogidas en una capsula, que antes fue caliz de la flor.

ESPECIES CON LAS FLORES ESPIGADAS.

Auricularia	I. MENTHA <i>spicis oblongis, foliis oblongis serratis pilosis sessilibus, staminibus corolla longioribus.</i> Mat. med. 169.	Menta con espigas oblongas; hojas tambien oblongas, aserradas, pelosas, sentadas; y estambres mas largos que la corola.
	<i>Mentha fœtida.</i> Burm. ind. 126.	Menta fétida.
	<i>Veronica hirsuta, latifolia, Zeylanica, aquatica.</i> Burm. Zeyl. 228.	Veronica aquatica, de Zeylan, con pelo áspero y hoja ancha.
	<i>Majorana fœtida.</i> Rumph. amb. 6. p. 41. t. 16.	Mejorana fétida.

Cast. Menta auricular.

Habita en lugares aguanosos de la India.

A la descripcion de la de Zeylan debe añadirse: el *caliz* hendido en cinco partes: la *corola* hendida en cinco lacinas; y los *filamentos* pelosos.

PROPIED. La yerba es amarga, olorosa y resolvente: se usa en la *cophosis* ó sea sordéra (de donde le vino el nombre de auricularia) y en los tumores.

Syl-
vestris

2. MENTHA *spicis oblongis, foliis oblongis tomentosis serratis sessilibus, staminibus corolla longioribus.* X Menta con espigas oblongas; hojas tambien oblongas, tomentosas, aserradas, sin peciolo; y estambres mas largos que la corola.
Mat. med. 170. Oed. dan. t. 484.

Mentha foliis elliptico-lanceolatis, serratis, subtus tomentosis, spicis cylindricis, staminibus flore duplo longioribus. Hall. helv. n. 227. X Menta con hojas entre elípticas y lanceoladas, aserradas, tomentosas por debaxo; espigas cilíndricas; y estambres al doble mas largos que la flor.

Mentha sylvestris, folio longiore. C. B. P. 227. Tournef. p. 189. X Menta silvestre, con la hoja mas larga.

Menthastrum spicatum, folio longiore, candicante. Bauh. hist. 3. p. 321. Riv. t. 51. X Mentastro espigado, con hoja mas larga, y de color que tira á cándido.

Cast. Menta silvestre.

Habita en Dinamarca, Alemania, Inglaterra, Francia y Siberia: en Cataluña, Aragon, las dos Castillas y otras partes de España. ¶

PROPIED. Es planta estomática, carminativa y emenagoga.

Vi-
ridis.

3. MENTHA *spicis oblongis, foliis lanceolatis nudis serratis sessilibus, staminibus corolla longioribus.* X Menta con espigas oblongas; hojas lanceoladas, desnudas, aserradas, sin peciolo; y estambres mas largos que la corola.

Mentha spicis solitariis, interruptis, foliis lanceolatis, serratis, sessilibus. Roy. lugdb. 325. X Menta con espigas solitarias, interrumpidas; hojas lanceoladas, aserradas y sin peciolo.

Mentha foliis elliptico-lanceolatis, glabris, spicis cylindricis. Hall. helv. n. 229. X Menta con hojas entre elípticas y lanceoladas, lampiñas; y espigas cilíndricas.

Men-

584 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Mentha spicata, folio longo, acuto, glabro, nigriori. Bauh. hist. 3. p. 220. Hall. X Menta espigada, con hoja larga, aguda, lampiña, y mas negra.

Mentha angustifolia, spicata. C. B. P. 227. Tournef. p. 189. X Menta espigada y con hoja angosta.

Mentha III. IV. Dod. pempt. 95. X Menta tercera y quarta.

Mentha aquatica, spicata, foliis oblongis, viridibus, serratis, acuminatis. Gron. virg. 167. X Menta aquatica, espigada, con hojas oblongas, verdes, aserradas y puntiagudas.

Cast. Menta verde.

Habita en Alemania, Inglaterra, Francia y Suiza: en la Alcarria, Sierra de Miraflores, y otras partes de España. ¶

Es muy parecida á la *Mentha silvestre*, pero mas baxa y lampiña.

Ro- 4. MENTHA *spicis oblongis*, foliis subrotundis rugosis crenatis sessilibus. X Menta con espigas oblongas, casi redondas, rugosas, recortadas y sin peciolo.

Mentha foliis ovatis, rugosis, *spicis cylindricis*. Hall. helv. n. 226. X Menta con hojas aovadas, rugosas; y espigas cilindricas.

Mentha sylvestris, rotundiore folio. C. B. P. 227. Tournef. p. 189. X Menta silvestre, con hoja mas redonda.

Menthastrum folio rugoso, rotundiore, spontaneum, flore spicato, odore gravi. Bauh. hist. 3. p. 2. pag. 219. X Mentastro espontáneo, de olor pesado, con hoja rugosa, mas redonda; y flor en espiga.

Cast. Menta de hoja redonda. Farm. Menthastrum.

Habita en terrenos aguanosos de Inglaterra: en los circuitos de Madrid, y es frecuente en las mas provincias de España. ¶

PROPIED. Es estomática, antelmintica, emenagoga y antihisterica,

ESPECIES CON LAS FLORES TERMINADAS
EN CABEZUELA.

5. MENTHA *spicis capitatis, foliis cordatis dentatis undulatis sessilibus, staminibus corollam aequantibus.* Mat. med. 170.

Menta con espigas en cabeza; hojas de figura de corazon, ondeadas, dentadas, sin peciolo; y estambres iguales á la corola.

Mentha foliis rugosis, brevissime petiolatis, verticillis spicatis. Hall. helv. n. 230.

Menta de hojas rugosas, con peciolo muy corto; y verticilos en espiga.

Mentha crispa, rotundifolia, spicata. Bauh. hist. 3. p. 217.

Menta con hojas rizadas redondas; y flores en espiga.

Mentha crispa, Danica, seu Germanica, speciosa. Moris, hist. 3. p. 367. sect. 11. t. 6. f. 5. Tourn. p. 189.

Menta muy hermosa, de Dinamarca, ó de Alemania, con hoja rizada.

Mentha crispa. Riv. monop. t. 50.

Menta rizada,

Cast. Menta rizada.

Habita en la Siberia, Suiza y Harcinia. ¶

PROPIED. Es olorosa, resolvente, carminativa, expelente, antifrodisiaca, emenagoga, estomática y retira la leche: se usa con admirables efectos en el sopór, cephalalgia, vómito y cólico: en la anorexia, lenteria, histérico, leucorrea, asma y tos convulsiva.

6. MENTHA *floribus capitatis, foliis ovatis serratis subsessilibus pubescentibus, staminibus corolla longioribus.*

Menta con flores en cabeza; hojas aovadas, aserradas, casi sin peciolo, vello-sas; y estambres mas largos que la corola.

Mentha aquatica, hirsuta, seu Sisymbrium hirsutum. Bauh. hist. 3. p. 224.

Menta aquatica, con pelo áspero, ó Sisymbrio con pelo áspero.

Men-

α *Mentha Sisymbrium hirsuta*, *glomerulis* & *foliis rotundioribus*. Rai. angl. 3. p. 233. t. 10. f. 1. X Menta llamada Sisymbrio con pelo áspero; con hojas y globulillos de las flores mas redondos. α

Cast. Menta con pelo áspero.

Habita en lugares aguanosos de Inglaterra, en Holanda *Osbeck* y en Alemania.

Se diferencia de la *Mentha aquatica*; por las hojas con mas pelo áspero y menos pecioladas: conviene con aquella, por los *estambres* mas largos que la corola, y por toda su traza. Tiene el *pistilo* mas largo que la corola hendida profundamente en quatro partes y casi regular; y los *cálices* pestañosos.

Haller admite á esta especie por variedad de la *Mentha aquatica*.

Aqua-
tica.

7. MENTHA *floribus capitatis*, *foliis ovatis serratis petiolatis*, *staminibus corolla longioribus*. Fl. dan. t. 673. Pollich. pal. n. 552. X Menta de flores en cabezuela; hojas aovadas, aserradas, con peciolo; y estambres mas largos que la corola.

Mentha foliis ovato-lanceolatis, *serratis*, *verticillatis paucissimis*, *terminali maximo*. Hall. helv. n. 225. X Menta con hojas entre aovadas y lanceoladas, aserradas; muy pocos verticilos, y el que termina muy grande.

Mentha rotundifolia, *palustris seu aquatica*, *major*. C. B. P. 227. Tourn. p. 189. X Menta palustre ó aquatica, mayor, con hoja redonda.

Sisymbrium. Dod. pempt. X Sisymbrio.

97. *Mentha aquatica*, *sive Sisymbrium*. Bauh. hist. 3. p. 2. p. 223. X Menta aquatica, ó Sisymbrio.

Sisymbrium sylvestre. Dalech. hist. 677. X Sisymbrio silvestre.

Cast. Menta aquatica.

Habita en las orillas de las aguas de Europa: en el Real Sitio del Escorial: en la Cartuxa del Paular, Alcarria, Aragon, Cataluña y otras partes de España. 24

Es

Es planta sin pelo áspero. Tiene los verticilos amontonados, terminales, y en cabezuela ó espiga obtusa; con los estambres mas largos que la corola.

Se halla variedad que tiene los estambres mas cortos que la corola. Pollich. l. c.

8. MENTHA spicis capitatis, foliis ovatis serratis petiolatis, staminibus corollabrevioribus. Mat. med. 170. Knigg. diss. t. 1. Menta de espigas en cabezuela; hojas aovadas, aserradas, con peciolo; y los estambres mas cortos que la corola.

Mentha spicis brevioribus & habitioribus, foliis Menthae fuscae, sapore feruido Piperis. Rai. angl. 3. P. 234. t. 10. f. 2. Menta con espigas mas cortas y mas corpulentas; hojas como las de la Menta de color obscuro, y de sabor ardiente como el de la Pimienta.

Cast. Menta piperita.

Habita en Inglaterra. ¶

PROPIED. Tiene las mismas qualidades que la Menta rizada; pero es mas acre y dexa en la lengua una sensacion de frescura. Su uso es tambien en las mismas enfermedades que el de aquella; pero mas eficaz.

ESPECIES CON FLORES EN VERTICILO.

9. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis acutiusculis serratis, staminibus corolla longioribus. Menta con flores en verticilo; hojas aovadas, algo agudas, aserradas; y estambres mas largos que la corola.

Mentha crispa, verticillata. C. B. P. 227. Tournef. P. 189. Menta crespa, con flores en verticilo.

Mentha prima. Dod. Pempt. 95. Menta primera.

Mentha crispa, verticillata, folio rotundiore. Bauh. hist. 3. p. 415. Menta con hoja rizada, mas redonda; y flores en verticilo.

Cast. Menta sativa. vulgo: Yerba buena.

Habita en la Europa austral. ¶

PROPIED. Disuelve la leche coagulada y la retira de los pe-

588 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

pechos de las recién paridas, aplicada en forma de cataplasma: detiene los vómitos, y es excelente estomáca y antelmintica.

Gen-tilis.

10. *MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis acutis serratis, staminibus corolla brevioribus.* Sabb. hort. 3. t. 50. Fl. dan. t. 736. Menta con flores en verticilo; hojas aovadas, agudas, aserradas; y estambres mas cortos que la corola.

Mentha hortensis, verticillata, Ocimi odore. C. B. P. 227. Tourn. p. 189. Menta hortense, verticilada, con olor de Albahaca.

Mentha verticillata, minor, acuta, non crispa, odore Ocimi. Bauh. hist. 3. p. 216. Menta verticilada, menor, aguda, que no es rizada; y con olor de Albahaca.

Mentha quarta. Fuchs. hist. 291. Dod. pempt. 95. Menta quarta.

Cast. Menta gentil. vulgo: Sandalos.

Habita en la Europa mas austral: en la Villa de Arenas, Sierra-morena y otras partes de España. ¶

Es muy semejante á la *Menta arvensis*; pero no tiene tanto pelo áspero. Echa los tallos rojos: los estambres que no son mas largos que el tubo de la corola: los verticilos laterales: los cálices salpicados de puntos resinosos: y la lacinia de mas abaxo de la corola aguda.

PROPIED. Son las mismas que las de la Menta rizada.

Ar-vensis.

11. *MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis acutis serratis, staminibus corollam æquantibus.* Flor. dan. t. 512. Menta con flores en verticilo; hojas aovadas, agudas, aserradas; y estambres iguales á la corola.

Mentha floribus verticillatis, foliis hirsutis, ovato-lanceolatis, verticillis tomentosus. Hall. helv. n. 223. Menta de flores en verticilo; hojas con pelo áspero, entre aovadas y lanceoladas; y verticilos tomentosos.

Mentha arvensis, verticillata, procumbens. Moris. hist. 3. p. 369. sect. 11. t. 7. f. 5. Menta arvensis, verticilada y tendida.

Calamintha arvensis, verticillata. C. B. P. 228. Calaminta arvense, verticilada.
Calamintha arvensis, verticillata, hirsuta. Bauh. Calaminta arvense, verticilada, y con pelo áspero.
 hist. 3. p. 2. pag. 217. Tourn. p. 189.

Cast. Menta arvense.

Habita en los sembrados de Europa, y es frecuente, despues de las siegas, en los circuitos de Madrid: en la Alcarria, Cataluña y otras partes de España. ¶

Es planta toda cubierta de pelo áspero. Echa los tallos difusos: los verticilos laterales: los estambres iguales al borde de la corola: la corola con la lacinia de mas abajo obtusa; y los cálices cubiertos de vello blanco. Varía con los estambres escondidos dentro del tubo de la corola.

12. MENTHA floribus verticillatis, foliis lanceolato-ovatis glabris acutis integerrimis. Amoen. Acad. 4. p. 318. Menta con flores en verticilo; hojas entre lanceoladas y aovadas, lampiñas, agudas y enterisimas.

Mentha aquatica, exigua. Rai. angl. 3. p. 232. Menta aquatica, pequeña.

Mentha hortensis IV. Fuchs. hist. 291. Menta hortense, quarta.

Calamintha aquatica, Belgarum & Matthioli. Lob. Calaminta aquatica de los de Flandes y de Mathiolo. ic. 505.

Cast. Menta pequeña.

Habita en Inglaterra. Miller. ¶

13. MENTHA floribus verticillatis, foliis lanceolatis serratis petiolatis pilosis, staminibus corollam æquantibus. Menta de flores en verticilo; hojas lanceoladas, aserradas, pelosas, con peciolo; y estambres iguales á la corola.

Cast. Menta del Canadá.

Habita en el Canadá. Kalm,

Se diferencia de la precedente, por el *tallo* mas alto, sin ramas y mas peloso; por las *hojas* la mitad mas angostas, mas agudas, mas profundamente aserradas, mas oscuras, y salpicadas de pelos vagos. Echa los *cáliz* con cinco dientes casi iguales y pelosos: la *corola* hendida en quatro lóbulos: el *superior* oblongo, mas largo, entero, y los restantes iguales: quatro *estambres* dentro del tubo de la corola: el *estilo* mas largo que ella, y hendido en dos partes por su ápice.

- Pule- 14. MENTHA *floribus* X Menta con flores en verti-
giun. *verticillatis, foliis ovatis* X cilo; hojas aovadas, obtu-
obtusis subcrenatis, cauli- X sas, algo recortadas; tallos
bus subteretibus repenti- X casi rollizos, rastreros; y es-
bus, staminibus corolla lon- X tambres mas largos que la
gioribus. Mat. med. 161. X corola.
Sabb. hort. 3. t. 49.
Pulegium latifolium. C. X Pulegio de hoja ancha.
B. P. 222.
Mentha aquatica, seu X Menta aquatica, ó Pulegio
Pulegium vulgare. Tourn. X vulgar.
p. 189.
Pulegium. Riv. monop. X Pulegio.
t. 33. f. 1. Fuchs. hist. 199. X

Cast. Menta pulegio. vulgo: Poleo.

Habita en lugares inundados de Alemania, Francia, Inglaterra y Suiza: en los contornos de Madrid, Real Casa de Campo, Soto-luzon: en Cataluña, Aragon y otras muchas partes de España. ¶

PROPIED. Toda la planta es emenagoga, y muy util en el asma, tos convulsiva y ronquera: en el histerico y en fermedades del estomago.

- Cer- 15. MENTHA *floribus* X Menta de flores en verti-
vina. *verticillatis, bracteis pal-* X cilo; bracteas palmeadas;
matis, foliis linearibus, X hojas lineares; y estambres
staminibus corolla longiori- X mas largos que la corola.
bus. Hort. cliff. 307. X

Mentha foliis lanceolatis, punctatis, sub verticillo palmatis. Hall. helv. n. 222. Menta de hojas lanceoladas, con puntitos; y las de abaxo del verticilo palmeadas.

Pulegium angustifolium. C. B. P. 222. Moris. hist. 3. Pulegio con hoja angosta.

p. 371. sect. 11. t. 7. f. 7. Riv. monop. t. 23. f. 2. Menta aquatica, con hoja como la de la Axedrea.

Mentha aquatica, Satuireie folio. Tourn. p. 190. Pulegio de Ciervo, con hoja angosta.

Pulegium Cervinum, angustifolium. Bauh. hist. 3. t. 2. p. 257.

Cast. Menta Cervina.

Habita en Mompeller: en las dehesas del Real Sitio del Escorial y de San Ildefonso: en Castilla la vieja, Alcarria, Cataluña y otras muchas partes de España. \mathcal{U}
PROPIED. Son las mismas que las de la Menta pulegio, aunque mas eficaces.

16. MENTHA *floribus capitatis axillaribus dichotomis, foliis ovatis crenatis, caule arborescente, staminibus corolla brevioribus.* Hort. cliff. 307. Menta de flores en cabezuela, axilares, ahorquilladas; hojas aovadas, recortadas; tallo arborescente; y estambres mas cortos que la corola.

Mentha Canariensis, frutescens, foliis subtus lanugine candidissima villosis, floribus glomeratis, è sinu foliorum, longioribus pediculis insidentibus. Pluk. alm. 248. t. 307. f. 2. Menta de Canarias, frutescente, de hojas por debaxo vellosas con pelusa muy cándida; flores conglobadas, y sentadas en piececitos mas largos que salen de la axila de las hojas.

Heliotropium Canariense, arborescens, Scorodoniae folio. Comm. hort. 2. p. 129. t. 65. Heliotropio de Canarias, arborescente, con hoja como la de la Escorodonia.

Cast. Menta de Canarias.

Habita en las Canarias. \mathcal{H}

Vease la *Melisa altissima globularia.* Plum. spec. 6. ic. 163.

592 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

163. f. 2. la qual ó es la misma que la *Menta de Canarias*, ó se la parece mucho.

Plu- 17. MENTHA caule fru- X Menta de tallo fruticoso;
mosa. ticoso, foliis ovatis petiola- X hojas aovadas, con peciolo,
tis serratis subtus albo-to- X aserradas, y con tomento
mentosus, paniculis dichoto- X blanco por debaxo; panojas
mis terminalibus. Suppl. p. X ahorquilladas y terminales.
273. X

Cast. Menta plumosa.

Habita en Tenerife, cerca del puerto de la Orotava.
Francisco Massones.

Dudó mucho *Linneo* si esta especie seria sola variedad, ó la misma que la *Menta de Canarias*; pues aunque parece muy diversa por las *panojas* plumosas, no dexan de asemejarse en el tallo y en las *hojas*; bien que las de esta se hallan por debaxo con el tomento mas blanco. Echa las *panojas* pelosas, terminales y axilares por todo el tallo, ahorquilladas, divididas en muchas series que con sus ramas conservan la figura redonda, y cubren las hojas de manera, que apenas se manifiestan en las sumidades: los *cálices* planos y estrellados, con los ródios alesnados, muy vellosos y sus pelillos extendidos: la *corola* pequeña; y el *receptáculo* velloso.

Peril- 18. MENTHA racemis se- X Menta con racimos latera-
loides. cundis lateralibus. Syst. veg. X les; y flores que miran á un
445. X lado.

Ocimum frutescens. Spec. X Albahaca frutescente.
plant. 2. p. 832. X

Ocimum foliis lanceolato- X Albahaca con hojas entre
ovatis, radice perenni. Hort. X lanceoladas y áovadas; y
Cliff. 315. X raiz perenne.

Cottam. Rheed. mal. 10. X Cottam.
p. 153. t. 77. X

Cast. Menta como perila.

Habita en la India. ☉

Tiene los *estambres* mas cortos que la *corola*, y es semejante á la *Perila* como *Albahaca*.

862. Género PERILLA.

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de una pieza , derecho , persistente , medio hendido en cinco lacinias iguales , con la de mas arriba cortísima.
- COR.** de un *petalo* , irregular , hendido en quatro lacinias , con la superior escotada , las laterales extendidas , y la infima mas larga y obtusa.
- ESTAMB.** *Filamentos* quatro , sencillos , apartados y mas cortos que la corola : con las *anteras* hendidas en dos partes.
- PIST.** *Gérmenes* quatro : *estilos* dos , filiformes , connexos , del largo de los estambres : con los *estigmas* sencillos.
- PERIC.** *Caliz* que no se muda.
- SEM.** quatro.

ESPECIE.

1. PERILLA.

Melissa maxima , *foliis ovato—oblongis* , *serratis* , *utrinque acutis* , *basibus mucronato-glandulosis* , *spicis secundis*. Ard. spec. 2. p. 28. t. 13.

Perila.
Melisa ó sea Torongil muy grande, de hojas entre aovadas y oblongas, aserradas, agudas por una y otra parte; sus bases con glandulas que rematan en punta; y espigas ladeadas.

Cast. Perila como Albahaca.

Habita en la India. ☉

Arroja el *tallo* sencillo , apretado , de quatro ángulos obtusos y con pelo áspero : las *hojas* aovadas , algo desnudas y aserradas ; con los *peciolos* del largo de ellas : los *racimos* terminales y laterales , derechos y con pelo rígido : las *flores* pequeñas , blancas , solitarias , ó de tres en tres : el *caliz* con pelo áspero : las *bracteas* mas largas que la flor y casi foliaceas.

Ocy-
m o i-
des.

863. Género GLECOMA. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, tubuloso, estriado, muy pequeño, persistente, hendido por su boca en cinco partes, puntiagudas y desiguales.

COR. de un *petalo*, boquiabierto: *tubo* delgado y comprimido: el *labio superior* derecho, obtuso y medio hendido en dos partes: el *inferior* extendido, mayor, obtuso, hendido en tres lacinias, con la intermedia mayor y escotada.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, inclinados debaxo del labio superior, de los cuales los dos son mas cortos: y cada par de las *anteras* arrimado entre sí en forma de cruz.

PIST. *Germen* hendido en quatro partes: *estilo* filiforme, inclinado baxo del labio superior: con el *estigma* hendido en dos lacinias agudas.

PERIC. ninguno: el *caliz* fomenta las semillas en su seno.

SEM. quatro, y aovadas.

E S P E C I E.

Hede-
racea. I. GLECOMA *foliis reniformibus crenatis*. Mat. Med. 171. Knorr. del. 2. t. Glecoma con hojas en forma de riñon y recortadas.

G. I.

Chamaeclema caule procumbente, radicato, foliis reniformibus, rotunde crenatis. Hall. helv. n. 245. Cameclema (ó sea pequeño sarmiento) de tallo postrado, arraygado; hojas en forma de riñon y con festones redondos.

Hedera terrestris, vulgaris. C. B. P. 306. Riv. t. 67. Dod. pempt. 394. Yedra terrestre, vulgar.

Calamintha humilior, folio rotundiore. Tourn. 194. Calaminta mas baxa, con hoja mas redonda.

Cast. Glecoma como Yedra. *vulgo*: Yedra terrestre.
Farm. Hedera terrestris.

Ha-

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 595

Habita en los vallados de la Europa Septentrional: en Aragon, Cataluña, Alcarria, las dos Castillas y otras partes de España. 24

Varia con la flor blanca y mas grande. *Vaill. par. t. 6. f. 4. Hall.*

Tiene las *hojas superiores* de figura de corazon, puntiagudas, con el peciolo largo; y los *verticilos* con seis flores sentadas. *Gov. hort. 282.*

PROPIED. *Es un poco amarga y acre, tónica y vulneraria: se usa en las ulceras internas, colica hypochondriaca, en la tos y cephalalgia.*

864. Género LAMIUM. * *Tourn. t. 85. Orvala.*

Gen. Pl. ed. VI. n. 715. Papia. Mich. 17.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, tubuloso, mas abierto por arriba, de cinco dientes con arista, casi iguales y persistente.

COR. de un *petalo*, boquiabierta: tubo cilindráceo, cortísimo: *borde* que se abre: *garganta* inflada, comprimida, gibosa, y señalada por ambas márgenes con un dientecito redoblado: el *labio superior* arqueado, casi redondo, obtuso y entero: el *inferior* mas corto, de figura de corazon al revés, escotado y redoblado.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, alesnados, y cubiertos con el labio superior, de los cuales los dos son mas largos: las *anteras* oblongas y con pelo áspero.

PIST. *Germen* hendido en quatro partes: *estilo* filiforme, de la longitud y direccion de los estambres: con el *estigma* hendido en dos lacinias agudas.

PERIC. ninguno: el *caliz* abierto lleva las semillas en su seno.

SEM. quatro, cortas, de tres caras, por una parte convexas, y truncadas en ambos extremos.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 183.

La flor es de un petalo, labiada; cuyo labio superior se halla excavado á manera de cuchara; el inferior hendi-

596 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBAES,

do en dos partes, en forma de corazon, y ambos acaban en fauces ribeteadas. Del caliz tubuloso y dividido en cinco partes sale el pistilo, acompañado de quatro embriones, que pasan á otras tantas semillas triangulares y recogidas en una capsula, que antes fue caliz de la flor.

ESPECIES.

Orvala 1. *LAMIUM foliis cordatis inæqualiter arguteque serratis, corollis fauce inflata, calyce colorato.* Lamio de hojas de figura de corazon, con aserraduras desiguales y agudas; corolas infladas por su garganta; y caliz de color.

Lamium (Pannonicum) foliis cordatis, petiolatis, corollæ galea serrata, tubo longiore. Scop. carn. ed. 2. n. 699. t. 27. R. Lamio (de Pannonia) con hojas de figura de corazon, pecioladas; capacete de la corola aserrado; y tubo mas largo.

Lamium maximum, sylvaticum, alterum. C. B. P. Otro Lamio silvatico, muy grande.

231.

Galeopsis maxima, Pannonica. Clus. hist. 2. p. 35. Galeopsis muy grande, de Pannonia.

α Orvala Garganica. Spec. plant. 3. p. 807. Orvala del monte de San Angelo. α

Papia Garganica, foliis Urticæ, alternis & eleganter incisís, flore purpureo. Mich. gen. 20. t. 17. Papia del monte de San Angelo, con hojas como las de la Ortiga, alternas y hermosamente cortadas; y flor de color purpúreo.

Cast. Lamio Orvala.

Habita en Pannonia, Italia é Istria. 26

La Orvala Garganica es mera variedad del Lamio Orvala, segun lo confirma el Doct. Basso, célebre profesor de Botánica en el Jardin de Bolonia.

Lævigatum. 2. *LAMIUM foliis cordatis rugosis, caule lævi, calycibus glabris longitudine tubi corollæ.* Pall. it. 3. F. 34. Sabb. hort. 3. t. 34. Lamio con hojas de figura de corazon, rugosas; tallo liso; cálices lampifios, y del largo del tubo de la corola.

La-

Lamium purpureum, fætidum, folio parvo, acuminato, flore majore. Pluk. phyt. t. 198. f. 1.

Lamio fétido, purpúreo, con hoja pequeña, puntiaguda; y flor mas grande.

Lamium subrotundo, rugoso folio, flore rubro. Bocc. mus. 2. t. 23.

Lamio con hoja casi redonda, rugosa; y flor encarnada.

Lamium purpureum, non fætens, folio oblongo. C. B. P. 231.

Lamio purpúreo, que no es fétido, con hoja oblonga.

Galeopsis flore purpurascente, majore, folio non maculato. Bauh. hist. 3. P. 321. Rai. hist. 559.

Galeopsis con la flor mas grande, de color que tira á purpúreo; y hojas sin mancha.

Cast. Lamio alisado.

Habita en Italia, Siberia y Suiza: en el circuito de Madrid y otros terrenos de España. Quer. 4

Tiene los tallos de color que tira á purpúreo: las hojas aserradas y apenas vellosas: los verticilos en una y otra parte casi de cinco flores: los dientes del caliz al doble mas largos que su vientre, y sin manchas oscuras en la base: los dientes laterales de la corola mas anchos, lanceolados y no setáceos y extendido ácia adelante: el labio inferior extendido, y sin que los lóbulos sean redoblados y paralelos. El caliz es semejante al del Lamio Orvala.

Garganicum.

3. LAMIUM foliis cordatis pubescentibus, corollis fauce inflata, tubo recto, dente utrinque gemino.

Lamio de hojas de figura de corazon, vellosas; corolas infladas en su garganta; tubo recto, y con un diente mellizo en ambas partes.

Lamium Garganicum, subincanum, flore purpurascente, labio superiore crenulato. Till. pis. 93. t. 34. f. 2.

Lamio del monte de San Angel, algo blanquecino; flor de color que tira á purpúreo; y el labio superior recortadito.

Lamium Cataria folio, flore purpureo. Act. paris. 1717. P. 351.

Lamio con hoja como la de la Cataria; y flor purpúrea.

Cast.

598 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Cast. Lamio del monte de San Angel.

Habita en el monte de San Angel. 24

Echa los tallos vellosos : las hojas algo obtusas, con algun lóbulo, aserradas, vellosas, pero no ásperas : los verticilos de muchas flores : el tubo de la corola recto, y no encorvado por su base : el labio superior con quatro dientes, abierto y no comprimido.

Macu-
latum. 4. LAMIUM foliis cordatis acuminatis, verticillis decemfloris. Leers. herb. n. 448. Lamio con hojas de figura de corazon, puntiagudas; y verticilos de diez flores.

Lamium alba linea notatum. C. B. P. 231. Tournef. p. 183. Lamio señalado con una linea blanca.

Lamium Plinii, Campoclarense & montanum. Col. ec. phr. 1. p. 190. t. 192. Lamio de Plinio, que nace en los montes Campoclarenses.

Lamium maculatum. C. B. P. 231. Lamio manchado.

Cast. Lamio manchado.

Habita en Italia, Alemania y Silesia : en Galicia, montes de Leon, Avila y Pirineos. 24

Es muy semejante al Lamio blanco ; pero diverso por las corolas purpúreas ; por las hojas con su linea longitudinal blanca ; por los peciolos que no se hallan ensanchados ; por tener los verticilos en ambas partes con cinco flores, y no con diez. La mancha de las hojas se desvanece en el verano.

Album 5. LAMIUM foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, verticillis vigintifloris. Oed. dan. t. 594. Knorr, del. 1. t. N. 8. Lamio de hojas de figura de corazon, puntiagudas, aserradas, con peciolo ; y verticilos de veinte flores.

Lamium album, non færens, folio oblongo. C. B. P. 231. Lamio que no es fétido, con la flor blanca y hoja oblonga.

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 599

Lamium vulgare, album, Arcangelica, flore albo. Tourn. p. 183. Lamio vulgar, ó Arcangelica, con la flor blanca.

Urtica iners, sive Lamium primum. Dod. pempt. 153. Ortiga que no punza, ó Lamio primero.

Galeopsis. Cam. epit. 865. Riv. t. 62. Galeopsis.

Cast. Lamio blanco.

Habita en lugares cultivados de Europa: en la Cartuja del Paular de Segovia, en Galicia, Cataluña y otras partes de España. ¶

Tiene los cálices con una mancha oscura, y varía con la flor de color de carne.

Posee los *piececitos* casi mas largos que los cálices y señalados por debaxo en su base con un punto cóncavo: los *verticilos* de muchas flores: los cálices de color que tira á purpúreo por debaxo en su base, y comprimidos: las *corolas* tres veces mayores que los cálices; con el *labio inferior* transversal, y el *superior* veloso y cóncavo: las *brácteas* alesnadas y colocadas entre las flores. Varía con flores de dos estambres. Gov. hort. 281.

PROPIED. Es emoliente, incisiva, diuretica, y util para las convulsiones histericas.

Purpureum. 6. LAMIUM *foliis cordatis obtusis petiolatis.* Oed. dan. t. 532. Knorr. del. 1. t. N. 9. Lamio de hojas de figura de corazon, obtusas y con peciolo.

Lamium foliis cordatis, obtusis, in summo ramo congestis. Hall. helv. n. 272. Lamio con hojas de figura de corazon, obtusas y amontonadas en la sumidad del ramo.

Galeopsis minor. Riv. monop. t. 62. Galeopsis menor.

Lamium purpureum, foetidum, folio subrotundo, sive Galeopsis Dioscoridis. C. B. P. 230. Tourn. p. 263. Lamio fétido, ó Galeopsis de Dioscorides, con la flor purpúrea; y hoja casi redonda.

Urtica iners, altera. Dod. pempt. 153. Otra Ortiga que no punza.

Cast.

600 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Cast. Lamio purpúreo.

Habita en lugares cultivados de Europa : en los circuitos de Madrid : en Aragon , Cataluña y otras partes de España.

- Am-
plexi-
caule. 7. LAMIUM foliis floralibus sessilibus amplexicaulis obtusis. Fl. dan. t. 752. Lamio con las hojas florales sentadas , amplexicaules y obtusas.
- Lamium foliis radicalibus petiolatis, lobatis, superioribus rotundis , amplexicaulis, incis. Hall. helv. n. 273. Lamio con las hojas radicales pecioladas , hendidas en lóbulos ; las superiores redondas , amplexicaules y coitadas.
- Lamium folio caulem am-
biente , minus. C. B. P. 231. Tourn. p. 184. Riv. t. 63. Lamio menor , con la hoja que abraza el tallo.
- α Lamium folio caulem am-
biente , majus. C. B. P. 231. Lamio mayor , con la hoja que rodea al tallo. α

Cast. Lamio que abraza el tallo.

Habita en lugares cultivados de Europa : en los circuitos de Madrid, en Cataluña y Aragon ; y es comun en otras partes de España. ☉

- Mult-
tidum. 8. LAMIUM foliis multi-
partitis. Hort. Cliff. 315. Lamio con hojas divididas en muchas partes.
- Lamium Orientale , foliis
elegantèr laciniatis. Tourn. cor. 11. Comm. rar. 26. t. 26. Lamio Oriental, con hojas hermosamente laciniadas.

Cast. Lamio de hojas hendidas en muchas partes.

Habita en Oriente.

865. Género GALEOPSIS. * Tetrahit. Dill. gen. 3. 4.

Galeobdolon. Dill. gen. 4.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , tubuloso , persistente , con cinco dientes agudos , y que rematan en aristas de la longitud del mismo tubo.

COR. de un *petalo* , boquiabierta : *tubo* corto : *borde* que se abre : *garganta* poco mas ancha que el tubo , de la longitud del caliz , y que arroja en ambas partes de la base del labio inferior un *dientecito* puntiagudo y cóncavo por debaxo ; el *labio superior* casi redondo , cóncavo , y aserrado por su ápice : el *inferior* hendido en tres lacinias ; las *laterales* casi redondas ; la *del medio* mayor , escotada y recortada.

ESTAMB. *Filamentos* quatro , alessnados , recogidos debaxo del labio superior , de los cuales los *dos* son mas cortos : con las *anteras* casi redondas y hendidas en dos partes.

PIST. *Germen* hendido en quatro partes : *estilo* filiforme , de la longitud y direccion de los estambres ; con el *estigma* hendido en dos lacinias agudas.

PERIC. ninguno : el *caliz* rígido y recto contiene las semillas en su fondo.

SEM. quatro , de tres caras y truncadas.

OBS. El *Galeopsis Ladano* tiene el labio superior de la corola algo recortado , con su ápice casi redoblado.

El *Galeopsis Galeobdon* posee el labio de la corola igual , y carece de dientes ,

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 185.

La *flor* es de un *petalo* , labiada , cuyo labio superior es excavado á manera de cuchara ; y el inferior dividido en tres partes , con la del medio mas ancha , aguda , ú obtusa. Del caliz sale el *pistilo* acompañado de quatro *embriones* , que pasan á otras tantas *semillas* , oblongas y recogidas en una capsula en forma de embudo , y hendida en cinco partes , que antes fue caliz de la flor.

E S P E C I E S.

- La da-
num. 1. GALEOPSIS *interno-*
diis caulinis æqualibus, ver-
ticillis omnibus remotis, ca-
lycibus inertibus. Scop. ed.
2. n. 227. Galeopsis con los entrenu-
dos del tallo iguales; todos
los verticilos apartados; y
cálices que no punzan.
- Galeopsis foliis linearibus,*
serratis, verticillis dissi-
tis. Hall. helv. n. 266. Galeopsis con hojas linea-
res, aserradas; y verticilos
apartados.
- Sideritis arvensis, an-*
gustifolia, rubra. C. B. P.
233. Sideritide arvense, con
hoja angosta y flor encar-
nada.
- Galeopsis patula, sege-*
tum, flore purpurascete.
Tourn. p. 185. Galeopsis extendida, que
nace en los sembrados, con
la flor de color que tira á
purpúreo.
- Ladanum segetum, flore*
rubro, quorundam. Bauh. hist.
3. P. 355. Ladano que nace entre
sembrados, con la flor en-
carnada llamada asi por al-
gunos autores.
- * *Ladanum segetum, folio*
latiore. Riv. monop. t. 24. Ladano que nace entre
sembrados, con la hoja mas
ancha. α

Cast. Galeopsis ladano.

Habita en lugares estériles y sembrados de Europa: en
Aragon, Cataluña, Alcarria, Serrania de Cuenca y
otras partes de España. ☉

Los nudos del tallo apenas se hallan hinchados: los dien-
tes del caliz casi no son espinosos ó no punzan; y el
capacete de la corola es recortado.

- Te-
trahit. 2. GALEOPSIS *interno-*
diis caulinis superne incras-
satis, verticillis summis
subcontiguis, calycibus pun-
gentibus. Scop. carn. ed. 2.
n. 728. Galeopsis con los entrenu-
dos del tallo encrasados por
arriba; verticilos mas altos
casi contiguos; y cálices que
punzan.

Galeopsis caule hirto, foliis ovato-lanceolatis, serratis. Hall. helv. n. 268. Galeopsis de tallo con pelo áspero; hojas aserradas, entre aovadas y lanceoladas.

Urtica aculeata, foliis serratis. C. B. P. 232. Ortiga con aguijones; y hojas aserradas.

Galeopsis procerior, calyculis aculeatis, flore purpurascente. Tourn. p. 185. Galeopsis mas alta, de cálices con aguijones; y flor de color que tira á purpúreo.

Galeopsis corolla flava, labio inferiore maculato. Fl. lapp. 192. Galeopsis con la corola de color amarillo-roxo; y el labio inferior manchado. α

Galeopsis caule hirto, foliis ovato-lanceolatis, serratis, flore calyce quadruplo majore. Hall. helv. n. 269. Galeopsis de tallo con pelo áspero; hojas entre aovadas y lanceoladas, aserradas; y flor quatro veces mayor que el caliz.

Lamium Cannabinum, aculeatum, flore specioso, luteo, labiis purpureis. Pluk. alm. 204. t. 41. f. 4. Lamio como Cáñamo, con aguijones; flor muy hermosa, amarilla, con sus labios de color purpúreo.

Cannabis spuria, flore majore. Riv. monop. 45. Cáñamo espurio, con la flor mas grande.

Cast. Galeopsis tetrahit.

Habita entre los sembrados y hortalizas de Europa: en Cataluña y otras partes de España.

Tiene los nudos del tallo entumecidos: los dientes del caliz espinosos ó que punzan; y el capacete de la corola recortado.

Galeobdolon.

3. GALEOPSIS *verticilliflora*, involucro tetraphyllo. Knorr. del. hort. 1. t. N. 9. n. 1. Galeopsis con verticilos de seis flores; é involucre de quatro hojuelas.

Leonurus foliis ovatis serratis acutis. Hort. cliff. 313. Leonuro con hojas aovadas, aserradas y agudas.

Cardiaca foliis petiolatis, cordatis, verticillis foliosis. Hall. helv. n. 274. Cardiaca con hojas pecioladas, de figura de corazon; y verticilos foliosos.

604 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Lamium (Galeobdolon) verticillis dimidiatis, subsexfloris, ore edentulo. Crantz. austr. 262. Lamio (*Galeobdolon*) con verticilos demediados, casi de seis flores, y su boca sin dientes.

Lamium flore luteo. Riv. monop. t. 20. Lamio con flor amarilla.

Lamium folio oblongo, flore luteo. C. B. P. 231. Lamio con hoja oblonga y flor amarilla.

Galeopsis sive Urtica iners, flore luteo. Bauh. hist. 3, 323. Tourn. p. 185. Galeopsis ú Ortiga que no punza, con la flor amarilla.

Urtica iners, tertia, seu Lamium flore luteo. Dod. pempt. 153. Ortiga tercera, que no punza, ó Lamio con la flor amarilla.

Cast. *Galeopsis galeobdolon.*

Habita en lugares sombríos de Europa: en Asturias, Alcarria, montes de Burgos y otras partes de España. Esta especie es de género obscuro, porque el labio de la corola es igual y carece de dientes. Tiene las hojas alguna vez con manchas blancas, y arroja vástagos largos desde su raiz.

866. Género BETONICA. * Tourn. t. 96.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, tubuloso, cilindrico, de cinco dientes con aristas, y persistente.

COR. de un *petalo*, boquiabierto: *tubo* encorvado, cilindrico: *labio superior* casi redondo, entero, plano y derecho: el *inferior* hendido en tres lacinias; la *del medio* mas ancha, casi redonda y escotada.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, alesnados, de la longitud de la garganta, de los cuales los dos son mas cortos é inclinados ácia el labio superior: con las *anteras* casi redondas.

PIST. *Germen* dividido en quatro partes: *estilo* de la figura, direccion y magnitud de los estambres: con el *estigma* hendido en dos partes.

PERIC. ninguno: el *caliz* en su seno fomenta las semillas.

SEM. quatro, y aovadas.

La flor es de un petalo , cuyo labio superior está levantado , y hendido en dos partes ; pero el inferior dividido en tres , con la del medio mas ancha y hendida tambien en otras dos. Del caliz sale el pistilo acompañado de quatro embriones , que pasan á otras tantas semillas oblongas , recogidas en la capsula que fue caliz de la flor. A estas notas se añaden las de las flores colocadas en verticilo y en espiga en las sumidades de los tallos.

ESPECIES.

Offi-
cinalis

1. *BETONICA spica interrupta, corollarum labii lacinia intermedia emarginata.* Mat. med. p. 172. Fl. dan. t. 726. X Betonica con la espiga interrumpida , y la lacinia intermedia del labio de las corolas escotada.

Betonica verticillorum calycibus bracteisque spinulosis, tubo longissimo. Crantz. austr. p. 255. X Betonica con los cálices y bracteas de los verticilos algo espinosos ; y el tubo de la flor muy largo.

Betonica purpurea. C. B. P. 235. Tourn. p. 203. X Betonica con la flor purpúrea.

Betonica vulgaris, purpurea. Bauh. hist. 3. p. 301. X Betonica vulgar, con la flor purpúrea.

Betonica. Dod. pempt. 40. X Betonica.

Betonica alba. C. B. P. 235. Tourn. 203. X Betonica con la flor blanca. X ca. *α*

Cast. *Betonica* oficial.

Habita en Europa : en los Reales Sitios de Aranjuez y San Ildefonso : en Miraflores , Bustarviejo , la Cartuja del Paular de Segovia , en Aragon , Cataluña y otras muchisimas partes de España. \mathcal{C}

PROPIED. *Es nervina, tónica y errina : se usa en la cephalalgia é histérico : pero la raiz es emetica.*

606 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Orientalis. 2. *BETONICA spica integra, corollarum labii lacinia intermedia integerrima.* Roy. lugdb. 316.
Betonica Orientalis, angustissimo & longissimo folio, spica florum crassiori. Tourn. cor. 13.

Betonica con la espiga entera; y la lacinia intermedia del labio de las corolas enterisima.
 Betonica Oriental, con hoja muy angosta y muy larga; y espiga de las flores mas crasa.

Cast. Betonica Oriental.
 Habita en Oriente. ¶

Alopecurus. 3. *BETONICA spica basi foliosa, corollis galea bifida.* Jacq. vind. 251. Austr. t. 78.

Betonica de espiga foliosa por su base; y corolas con el capacete hendido en dos partes.

Betonica spicæ calycibus bracteisque mollioribus, tubo brevi, galea bifida. Crantz. austr. p. 256.

Betonica con los cálices y bracteas de la espiga mas blandos; tubo corto; y capacete hendido en dos partes.

Sideritis alopecuros. Scop. carn. ed. 2. n. 711. t. 28.

Sideritide alopecuro.

Horminum minus, album, Betonice facie. C. B. P. 239. Prodr. 114. Burs. XIII. 119.

Hormino menor, con la flor blanca; y traza como la de la Betonica.

Betonice folio, capitulo Alopecuri. C. B. P. 235.

Planta con hoja como la de la Betonica; y cabezuela como la del Alopecuro.

Betonice folio, Alopecuros quorundam. Bauh. hist. 3. p. 303.

Planta con hoja como la de la Betonica, llamada por algunos autores Alopecuro.

Betonica alpina, latifolia, major, villosa, flore luteo. Tourn. p. 303.

Betonica alpina, mayor, con hoja ancha, vellosa; y flor amarilla.

Cast. Betonica alopecuro.

Habita en los montes de Saboya, Silesia, Austria superior, Italia y Provenza. ¶

Tiene las *hojas del tallo* en dos oposiciones: las *bracteas* enterisimas; y las *corolas* de color entre amarillo y blanco.

4. *BETONICA spica basi foliosa, corollis galea integra.* Betonica de espiga foliosa en su base; y corolas con el capacete entero.

Betonica (Monnieri) spica basi foliosa, corollis galea integra, foliis cordato-oblongis. Gov. illustr. 36. R. Betonica (de Monnier) de espiga foliosa por su base; corolas con el capacete entero; y hojas entre de figura de corazon y oblongas.

Betonica Alopecuros, minor, purpureo rubicundo flore, montis aurei. Monnier. obs. 146. Gov. Betonica Alopecuro, menor, del monte dorado, con la flor purpúrea y rubicunda.

Betonica alpina, incana, purpurea. Barr. ic. 340. bene. Gov. Betonica alpina, blanquecina, con flor de color purpúreo.

Betonica foliis hirsutis, floribus purpureis, amplissimis. Mentz. pug. Zanon. t. 40. p. 46. Betonica de hojas con pelo áspero; flores de color purpúreo y muy anchas.

Cast. *Betonica* con pelo áspero.

Habita en los montes Apeninos donde la descubrió nuevamente el *Doct. Baso*; y en los Pirineos. *Doct. Govan.* 2f

Es semejante á la *Betonica Alopecuro*; pero tiene mas pelo áspero, es mas robusta, y su espiga mas corta y mas gruesa. Posee el *capacete de la corola* entero y no hendido en dos partes y de color que tira á purpúreo: la *espiga* aovada: las *bracteas* oblongas, entre las flores, y las mas grandes aserradas; pero las mas pequeñas algo pestañosas solamente y no aovadas: uno ú otro par de *hojas* pecioladas en el tallo, á mas de las dos que se hallan sentadas debaxo de la espiga.

5. *BETONICA spica calycibus lanatis, dentibus filiformibus, foliis lanceolatis nudis.* Betonica de espiga y cálices lanudos, con dientes filiformes; hojas lanceoladas y desnudas.

Cast. *Betonica heraclea.*

Habita en Oriente.

Produce el tallo y hojas casi lampiños; la *espiga* mayor-
ci-

608 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

cita , entre lanuda y tomentosa : los *involucros* filiformes , del largo del caliz : los *dientes del caliz* filiformes , suaves y del largo del tubo : las *corolas* amarillas : con el *labio superior* apenas mas largo que el caliz : el *inferior* hendido en tres partes ; la *intermedia* redondeada y mayor : y los *estambres* casi tan largos como el labio superior.

867. Género STACHYS. * *Tourn. t. 86.*

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de una pieza , tubuloso , angulado , persistente , medio hendido en cinco dientecitos alesnados y algo desiguales.
- COR.** de un *petalo* , boquiabierta : *tubo* cortísimo : *garganta* oblonga y gibosa en su base : el *labio superior* derecho , casi aovado , arqueado , y las mas veces escotado : el *inferior* mayor , redoblado por sus lados , hendido en tres lacinias , con la *intermedia* muy grande , escotada y muy plegada.
- ESTAMB.** *Filamentos* quatro , de los cuales los dos son mas cortos , alesnados , y que despues de haber florecido se encorvan ácia los lados de la *garganta* : con las *anteras* sencillas.
- PIST.** *Germen* dividido en quatro partes : *estilo* filiforme , de la longitud y direccion de los estambres : con el *estigma* hendido en dos lacinias agudas.
- PERIC.** ninguno : el *caliz* que apenas se muda hace sus veces.
- SEM.** quatro , aovadas y angulares.

CARAC. GENER. DE TOURN. p. 186.

La *flor* es de un *petalo* , labiada ; cuyo *labio superior* es un tanto arqueado y derecho , y el *inferior* dividido en tres partes , con la del medio mas ancha. Del caliz sale el *pistilo* acompañado de quatro embriones que pasan á otras tantas semillas , casi redondas , recogidas en una capsula , que fue caliz de la flor. A estas notas se añaden las de las ho-

hojas vellosas y blanquecinas , las quales atribuye *Dioscorides* á la *Estaquis*.

E S P E C I E S.

- | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sil-
vatica. | 1. STACHYS <i>verticillis</i>
<i>sexfloris</i> , <i>foliis cordatis pe-
tiolatis</i> . Sabb. hort. 3. t. 38.
<i>Stachys sylvatica</i> . Riv.
monop. t. 26. | Estaquis con verticilos de
seis flores ; hojas de figura
de corazon y pecioladas.
Estaquis silvática. |
| | <i>Cardiaca foliis cordatis,
serratis</i> , <i>verticillis nudis,
spicatis</i> . Hall. hélv. n. 275. | Cardiaca con hojas de fi-
gura de corazon , aserradas ;
verticilos desnudos y en es-
piga. |
| | <i>Lamium maximum</i> , <i>syl-
vaticum</i> , <i>fœtidum</i> . C. B. P.
231. | Lamio muy grande , sil-
vático y fétido. |
| | <i>Galeopsis procerior</i> , <i>fœ-
tida</i> , <i>spicata</i> . Tourn. p. 185. | Galeopsis mas alta , fétida,
y en espiga. |
| | <i>Galeopsis legitima</i> . Clus.
hist. 2. p. 35. | Galeopsis legitima. |

Cast. Estaquis silvática.

Habita en bosques sombríos de Europa : en el Real Sitio de San Ildefonso , Bustar viejo , montes de Avila , Pirineos , Sierra nevada y otras partes de España. ☉

Tiene el tallo de la altura de dos pies , poco mas ó menos y veloso : las *hojas* del largo de quatro dedos , estriadas , con peciolo largo y aserradas : dos *bráctea*s lanceoladas y enterisimas : las *corolas* de color que tira á purpúreo : y el *labio inferior* manchado. *Gov. hort.* 252.

- | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pa-
lustris. | 2. STACHYS <i>verticillis</i>
<i>sub-sexfloris</i> , <i>foliis lineari-
lanceolatis semiamplexicau-
libus sessilibus</i> . Loesel. prus.
ic. 41. | Estaquis con verticilos ca-
si de seis flores ; hojas entre
lineares y lanceoladas , que
abrazan la mitad del tallo,
y sin peciolos. |
| | <i>Stachys foliis subhirsutis,
elliptico-lanceolatis, breviter
petiolatis</i> , <i>verticillis spica-
tis</i> . Hall. hélv. n. 257. | Estaquis de hojas con al-
gun pelo áspero , entre elip-
ticas y lanceoladas , con pe-
ciolo corto ; y verticilos en
espiga. |

610 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Stachys palustris, *fœtida*. C. B. P. 236. Riv. t. 26. Estaquis palustre, fétida.

Galeopsis alpina, *Betonicae folio*, *flore variegato*. Tourn. p. 185. Estaquis alpina, con hoja como la de la Betonica; y flor de varios colores.

Stachys aquatica. Tabern. ic. 577. bona. Estaquis aquatica.

Cast. Estaquis palustre.

Habita en las riveras y lugares cultivados algo húmedos de la Europa: en los montes de Avila, Pirineos de Cataluña, Aragon, Burgos, Leon y Sierra-nevada. \mathcal{L}
Los verticilos varían con seis hasta diez flores.

Al- 3. STACHYS *verticillis* Estaquis de verticilos con
pina. *multifloris*, *foliorum serratis apice cartilagineis*, muchas flores; aserraduras
scorollis labio plano. Sabb. de las hojas cartilagosas
hort. 3. t. 41. por su ápice; y corolas con
el labio plano.

Stachys alpina, *foliis lanceolato-ovatis basi emarginatis*, *verticillis tomentosis*. Hort. cliff. 310. Estaquis alpina, con hojas entre lanceoladas y aovadas, escotadas por su base; y verticilos tomentosos.

Stachys latifolia, *major*, Estaquis mayor, con hojas
foliis obscure virentibus, anchas, de color verde-oscuro; y flor con capacete de
flore galeato, *ferrugineo*. Pluk. alm. 356. t. 317. f. 4. color ferrugineo.

Pseudo-Stachys alpina. Falsa-Estaquis alpina.
C. B. P. 236. Prodr. 113.

Galeopsis alpina, *Betonicae folio*, *flore variegato*. C. B. P. 185. Tourn. p. 185. Estaquis alpina, con hoja como la de la Betonica; y flor de varios colores.

Salvia alpina. Tabern. ic. 322. Salvia alpina.

Cast. Estaquis alpina.

Habita en Alemania, Suiza y Carniola: en los montes de Burgos, Alcarria, Aragon y Cataluña. \mathcal{L}

Tiene las hojas de color verde que tira á amarillo-rojo, con aserraduras cartilagosas por su ápice y de color fusco; las florales de mas arriba aovadas, con su margen enterisima y plana: los verticilos con involu-

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 611.

lucros : las *corolas* de color purpúreo triste , con su *capete* horizontal, sin que el labio se halle redoblado por sus lados.

4. *STACHYS verticillis multifloris, foliorum serraturis imbricatis, caule lanato.* Flor. dan. t. 684. Jacq. austr. t. 319. Estaquis con verticilos de muchas flores ; aserraduras de las hojas que cogen unas partes de otras; y tallo lanudo.

Stachys tomentosa, foliis imis cordatis, superioribus elliptico-lanceolatis, verticillis densissimis. Hall. helv. n. 255. Estaquis tomentosa , con las hojas de abaxo de figura de corazon , las de mas arriba entre elípticas y lanceoladas ; y verticilos muy espesos.

Stachys major, Germanica. C. B. P. 236. Tourn. p. 186. Estaquis mayor , de Alemania.

Stachys. Fuchs. hist. 766. Riv. monop. t. 27. optima. Estaquis.

Stachys Dioscoridis. Lob. ic. 530. Estaquis de Dioscorides.

Cast. Estaquis de Alemania.

Habita en Alemania é Inglaterra : en los montes de Burgos , Asturias , Alcarria , de Guadalerse y otras partes de España. ¶

Echa el *tallo* cubierto de lana y blanco como toda la planta : las *hojas* con aserraduras que casi cogen unas partes de otras : las *florales* lanceoladas , redobladas ; y las *anteras* de color que de blanco tira á amarillo-roxo.

Varía con la *flor* blanca y las *hojas* mas angostas.

Sube á la altura de tres pies , y arroja los *verticilos* lanudos , con pedunculo : las *hojas de mas arriba* con el *peciolo* muy corto , ensanchado y que casi abraza el tallo : las *bráctees* alesnadas , ú aovadas y puestas en la base de cada caliz : los *dientecitos del caliz* desiguales , con los de arriba mas largos. *Gov. hort.* 283.

612 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Cretica. 5. STACHYS *verticillis* X Estaquis con verticilos de
triginta-floris, *calycibus* X treinta flores; cálices que no
pungentibus, *caule hirto.* X punzan; y tallo con pelo rí-
 Hort. ups. 170. X gido.

Stachys folio obscure vi- X Estaquis con hoja de color
rente, *flore purpurascente.* X verde-oscuro; y flor que ti-
 Walth. hort. 108. t. 19. X ra á purpúreo.

Sthachys Cretica. C. B.P. X Estaquis de Creta: Falsa-
 236. *Pseudo-Stachys Creti-* X Estaquis de Creta.
ca. ejusd. Prodr. 113. Tourn.
 p. 186. X

Cast. Estaquis de Creta.

Habita en Creta. ¶

Es semejante á la *Estaquis de Alemania*; pero de color amarillo-sucio, con pelo rígido y sin lana blanca. Tiene las *hojas florales* lanceoladas, entre aserradas y ondeadas, y no redobladas, ni arqueadas.

Sube á la misma altura que la antecedente; pero es menos lanuda. Posee las *hojas* recortadas: muchas *bracteas* alesnadas, á excepcion de dos opuestas de figura de corazon, y de la magnitud de los verticilos. *Gov. hort.* 283.

Gluti- 6. STACHYS *ramis ra-* X Estaquis con ramas muy
 nosa. *mosissimis*, *foliis lanceola-* X ramosas; hojas lanceoladas
tis glabris. Hort. cliff. 310. X y lampifias.

Sideritis glutinosa, *bitu-* X Sideritide glutinosa, que
men redolens. Moris. hist. 3. X huele mucho á betun.
 p. 389. X

Sideritis viscosa, *Creti-* X Sideritide viscosa, de Cre-
ca, *bitumen redolens.* Zanon. X ta, que huele mucho á be-
 hist. 136. X tun.

Cast. Estaquis glutinosa.

Habita en Creta.

Spi- 7. STACHYS *ramulis* X Estaquis con ramitos ter-
 nosa. *spina terminatis.* Hort. cliff. X minados en espina.
 310. X

Stachys spinosa, *Cretica.* X Estaquis espinosa, de Cre-
 C. B. P. 236. Moris. hist. 3. X ta.
 p. 283. sect. 11. t. 10. f. 9. X

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 613

Gaidarothymo. Clus. hist. X *Gaidarothymo* ó sea To-
2. p. 311. X millo de asno.

Cast. Estaquis espinosa.

Habita en la parte occidental de Creta.

Orien-
talis.

8. *STACHYS foliis to-* X Estaquis con hojas tomen-
mentosis ovato-lanceolatis, X tosas, entre aovadas y lan-
floralibus verticillo breviori- X ceoladas; y las florales mas
bus. Roy. lugdb. 318. X cortas que el verticilo.

Stachys Orientalis, *altis-* X Estaquis Oriental, alti-
sima, fætidissima. Tournef. X sima y muy fétida.
cor. 12. Boerh. lugdb. 1. p.
154. X

Cast. Estaquis oriental.

Habita en Oriente.

Pa-
lestina

9. *STACHYS floribus sub-* X Estaquis con flores casi en
spicatis, foliis lanceolatis X espiga; hojas lanceoladas,
sessilibus tomentosis rugo- X sin peciolo, tomentosas, ru-
sis integerrimis, calycibus X gosas, enterisimas; y cáli-
muticis. X ces sin espinas.

Stachys alba, angust- X Estaquis blanca, con hoja
Salviæ folio. Barr. ic. 279. X como la de la Salvia, angosta.

Sideritis molli, cinereo X Sideritide del monte Car-
oleæ folio, caulem ambiente, X melo, con hoja como la del
flore violaceo, ex monte Car- X Olivo, blanda, cenicienta,
melo. Bocc. mus. 2. p. 145. X que rodea el tallo; y flor de
t. 109. 112. X color de violeta.

Cast. Estaquis de Palestina.

Habita en Palestina. *Arduin.* \bar{h}

Arroja los tallos rollizos, con tomento blanco: las *hojas* tambien con tomento blanco, rugosas, y un poco agudas: el *caliz* casi de diez lados: las *corolas* con el *labio superior* cóncavo, entero, de color que tira á purpúreo: el *inferior* del mismo color, con la lacinia del medio mayor y cóncava; y su *garganta* manchada de blanco.
Syst. veg. 447.

STA-

614 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Mari-
tima.

10. *STACHYS foliis cordatis obtusis tomentosis crenatis, bracteis oblongis integerrimis.* Jacq. hort. t. 70.

Stachys verticillis sexfloris, foliis radicalibus ovalibus crenatis, summis ovalitis integerrimis, corollis calyce duplo longioribus. Gou. hort. monsp. 91.

Betonica maritima, flore ex luteo pallescente. Dill. elth. 50. t. 42. f. 50. Tourn. p. 203.

Sideritis heraclea, latifolia, Dioscoridis. Bocc. mus. 2. p. 164. t. 127. *Sub Betonica.*

Estaquis con hojas de figura de corazon, obtusas, tomentosas, recortadas; bractees oblongas y enterisimas.

Estaquis con verticilos de seis flores; hojas radicales ovales, recortadas; las de mas arriba aovadas, enterisimas; y corolas al doble mas largas que el caliz.

Betonica maritima, con la flor de color amarillo-pálido.

Sideritide heraclea de Dioscorides, con hoja ancha..... con el nombre de Betonica.

Cast. Estaquis maritima.

Habita en las orillas del mar de Venecia, Mompeller y Oriente: en las playas de la marina de Barcelona y otras partes de España.

Tiene las *hojas radicales* de figura de corazon, oblongas, obtusas, venosas, recortadas y tomentosas: el *tallo sufruticoso* del largo de un gema, derecho y veloso: la *espiga* compuesta de verticilos interrumpidos: las *bractees* de la longitud de las flores, ovales, oblongas y enterisimas: los *verticilos* de seis flores: los *cálices* lanudos, con cinco dientes agudos, casi sin arista; y las *corolas* amarillas.

Obs. La *Sideritide heraclea* Col. *ecphr.* 1. p. 128. t. 131. se parece mucho á esta especie; pero tiene las *flores* purpúreas.

Æthio-
pica.

11. *STACHYS verticillis bifloris.* Jacq. obs. 4. p. 2. t. 77.

Sideritis erecta, Teucris pratensis folio, Æthiopica. Pluk. alm. 245. t. 315. f. 3.

Estaquis con verticilos de dos flores.

Sideritide de Etiopia, levantada, con hoja como la del Teucris pratense.

Cast.

Cast. Estaquis de Etiopia.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Roy. 4

El tallo es del largo de un palmo, poco mas ó menos, derecho, ó difuso; y su traza como la del *Lamio purpúreo*, con algun pelo rígido. Produce las hojas de figura de corazón, profunda y obtusamente aserradas, rugosas, lustrosas, algo vellosas y mas cortas que los peciolos: las espigas terminales, interrumpidas, y compuestas de verticilos con flores opuestas, ó solitarias en ambas partes: el caliz algo hendido en cinco partes, casi iguales y con alguna arista: el tubo de la corola encorvado; el labio superior derecho, arqueado, corto y veloso; el inferior muy grande, muy extendido y hendido en tres lacinias, con la intermedia muy ancha, plana y recortada; y las laterales revueltas: los estambres apenas mas largos que el tubo; y las anteras divididas en dos partes. Roy.

Hirta.

12. *STACHYS verticillis* X Estaquis con verticilos de
sexfloris, caulibus prostra- X seis flores; tallos postrados;
tis, corollis labio superiore X corolas con el labio superior
bifido divaricatis reflexis. X hendido en dos partes, apar-
 tadas y redobladas.

Galeopsis caule piloso, X Galeopsis con el tallo pe-
calycibus labio corollae supe- X loso; y cálices mas largos
riore longioribus. Sp. plant. X que el labio superior de la
 I. p. 580. All. Niccens. 44. X corola.

Marrubium nigrum, ro- X Marrubio negro, con ho-
tundifolium. C. B. P. 230. X ja redonda.

Galeopsis annua, Hispa- X Galeopsis annua, de Es-
nica, rotundiore folio. To- X paña, con hoja mas redon-
 urn. p. 168. X da.

Ocymastrum Valentinum. X Ocymastro ó sea falsa-Al-
 Clus. hist. 2. p. 42. X bahaca de Valencia.

Cast. Estaquis con pelo rígido.

Habita en collados de Oriente é Italia: en los circuitos de Valencia y Barcelona. 4

Echa los tallos postrados, de quatro lados, fistulosos, frágiles y salpicados de pelos claros: las hojas pecioladas, de figura de corazón, con pelos en ambas partes y

616 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

y venosas; las inferiores obtusamente aserradas, obtusas y con el peciolo mas largo; las superiores agudas y agudamente aserradas: las flores en verticilo, tres en cada lado y sin involucre: el caliz con aristas: el tubo de la corola mas corto que el caliz y encorvado: el labio superior arqueado, medio hendido en dos lóbulos, apartados y obtusos; el inferior muy obtuso, plano, con tres lóbulos poco formados; y en cada lado de la base una lacinia aguda apenas manifesta, con puntos de color purpúreo en las márgenes de la base del labio superior, y en la base del labio inferior.

- Recta. 13. *STACHYS verticillis* X Estaquis con verticilos ca-
subspicatis, foliis cordato- si en espiga; hojas entre de
ellipticis crenatis, scabris, X figura de corazon y elipticas,
caulibus ascendentibus. X recortadas, ásperas; y tallos
 Gov. illustr. 36. Jacq. austr. ascendentes.
 t. 359.
- Betonica foliis hirsutis,* X Betonica de hojas con pe-
ovatis, rotunde crenatis, X lo áspero; aovadas, y con
bracteis ovato-lanceolatis, X festones redondos; bracteas
aristatis, integerrimis. Hall. entre aovadas y lanceoladas,
 helv. n. 262. con aristas y enterisimas.
- Sideritis flore luteolo.* X Sideritide con la flor algo
 Riv. monop. t. 70. amarilla.
- Sideritis vulgaris, hirsu-* X Sideritide vulgar, con pe-
 ta. Bauh. hist. 3. p. 425. lo áspero.
- Stachys vulgaris, hirsu-* X Estaquis vulgar, derecha,
 ta, erecta. C. B. P. 233. X y con pelo áspero.

Cast. Estaquis recta.

Habita en los caminos y lugares estériles de la Europa Austral: en la Alcarria, Extremadura, montes de Burgos, en Cataluña y otras partes de España. 24

Produce los tallos ascendentes, algo rígidos y salpicados de pelos claros: las hojas con peciolo corto, de figura de corazon, elipticas, ó las mas veces lanceoladas, profundamente recortadas, algo rugosas, y ásperas, con pelos claros en ambas partes: las espigas terminales, alargadas en verticilos apartados y de seis flores: los cálices algo espinosos; y las flores amarillas.

PRO-

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 617

PROPIED. Toda la yerba es corroborante, y bañándose con su cocimiento sirve maravillosamente en la perlesia.

El ilustre Doct. D. Juan Andréu, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Gerona, á impulsos de su innata caridad y compasion ácia los enfermos, me há comunicado esta especie, con la noticia de los admirables efectos que produce en la expresada enfermedad, (que en aquel pais llaman Feridura) bañándose ó fomentando por algunos dias con su cocimiento la parte ofendida. Y habiendolo puesto en práctica D. Gonzalo Poti, Cirujano de esta Corte, en una muger anciana, paralitica de piernas y muslos desde el año de 1772. hasta el dia de hoy; con unos veinte baños ó fomentos, se ha restablecido enteramente: en cuya atencion, el Doct. D. Salvador Soliva Médico, y D. Joaquin Rodriguez Cirujano, agregados por S. M. al Real Jardin Botánico de esta Corte, para observar las virtudes y propiedades de las plantas, con acuerdo de los Catedraticos, han empezado ya á experimentar las de esta especie, en la misma enfermedad, con feliz suceso.

Annua

14. STACHYS *verticillis* *sexfloris*, *foliis ovato-lanceolatis trinerviis*, *lævibus petiolatis*, *caule erecto*.
Jacq. austr. t. 360.

Stachys foliis lanceolatis sessilibus basi attenuatis.
Hort. cliff. 210.

Betonica foliis ovatis, crenatis, bracteis ovato-lanceolatis. Hall. helv. n. 263.

Sideritis arvensis, latifolia, glabra. C. B. P. 233.

Betonica arvensis, annua, flore ex albo flavescente.
Fourn. p. 203.

Alyssum majus. Tab. ic. 541.

Estaquis con verticilos de seis flores; hojas entre aovadas y lanceoladas, de tres nervios, lisas, pecioladas; y tallo derecho.

Estaquis con hojas lanceoladas, sin peciolo, y adelgazadas por su base.

Betonica con hojas aovadas, recortadas; y bracteas entre aovadas y lanceoladas.

Sideritide arvense, con hoja ancha y lampiña.

Betonica arvense, annua, con la flor que de color blanco tira á amarillo-roxo.

Aliso mayor.

Cast. Estaquis annua.

Ha-

618 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Habita en las márgenes de los campos de Alemania, Suiza y Francia: entre los sembrados de los circuitos de Madrid: en Aragon, Cataluña, Alcarria y otras partes de España. ☉

Produce las *hojas inferiores* aovadas, rugosas y muy obtusas: las *del medio* oblongas, con peciolo: las *de mas arriba* sentadas, lanceoladas y con tres nervios: las *corolas* de color amarillo-roxo: el *labio superior* con sus márgenes laterales de color ferrugineo, encorvado ácia atrás y escotado: los *cálices* que terminan en punta rígida y sin que sean espinosos.

Ar-
vensis

15. *STACHYS verticillis* X Estaquis con verticilos de
sexfloris, foliis obtusis nu- X seis flores; hojas obtusas, al-
diusculis, corollis longitu- X go desnudas; corolas de la
dine calycis, caule debili. X longitud del caliz; y tallo
Oed. dan. t. 887. Sabb. hort. X debil.
rom. 3. t. 51.

Trixago foliis hirsutis, X Trixágo de hojas con pelo
ovato-cordatis, rotunde den- X áspero, entre aovadas y de
tatis. Hall. helv. n. 231. K. X figura de corazon y con diente
redondos.

Sideritis Alsines Trixa- X Sideritide con hoja como
ginis folio. C. B. P. 233. X la de la Alsine Trixágo.
Prodr. III.

Marrubiastrum vulgare. X Marrubiastro vulgar.
Tourn. p. 190.

Stachys arvensis, mini- X Estaquis arvense, muy pe-
ma. Riv. t. 27. Petiv. t. 33. X queña.

Lamium paludosum, Bel- X Lamio de Flandes, que
gicum. Herm. lugdb. 351. X se cria en lugares pantano-
t. 353. B. X sos.

Cast. Estaquis arvense.

Habita entre los sembrados de Europa: en los circuitos de Madrid y demas partes que la antecedente.

Echa el *tallo* de quatro lados, obtusos; con *ramas* opuestas en forma de aspa y con pelo áspero, igualmente que los peciolos y caliz: las *hojas* de figura de corazon, obtusas, con menos pelo áspero, y sus aserraduras tambien obtusas: los *cálices* sentados, medio hendidos en

cin-

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 619

cinco partes iguales y que terminan en punta rígida: la *corola* blanquecina, casi menor que el caliz, con su capete enterisimo: el *labio* hendido en tres lacinias: la *intermedia* mas ancha, de color que tira á purpúreo, con puntitos y sin que sea escotada.

868. Género **BALLOTA**. * Ballote. *Tourn. t. 85.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, tubuloso, en forma de salvilla, de cinco lados, oblongo, con diez estrias, derecho, persistente é igual, agudo, abierto por su boca, plegado y con cinco dientes.

Involucro de hojuelas lineares puestas debaxo de los verticilos.

COR. de un *petalo*, boquiabierta: *tubo* cilindráceo, del largo del caliz: *labio superior* derecho, aovado, entero, ó recortado y cóncavo: *labio inferior* hendido en tres lacinias obtusas; con la *intermedia* mayor y escotada.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, de los cuales los *dos* son mas cortos, alesnados, inclinados ácia el labio superior y mas cortos que él: con las *anteras* oblongas y laterales.

PIST. *Germen* hendido en quatro partes: *estilo* filiforme, de la direccion y figura de los estambres: con el *estigma* delgado y hendido en dos lacinias.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse fomenta las semillas en su seno.

SEM. quatro, y aovadas.

OBS. El *involucro* es como el del *Clinopodio*: el *caliz* como el del *Marrubio*: la *corola* como la de la *Estaquis*; y es parecido este género al del *Marrubio*.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 184.

La *flor* es de un *petalo*, labiada; cuyo labio superior se halla excavado á manera de cuchara; pero el inferior dividido en tres partes, con la del medio mas ancha y de figura de corazon. Del caliz sale el pistilo, acompañado de
qua-

620 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

cuatro embriones, que pasan á otras tantas semillas oblongas, recogidas en una capsula tubulada, de cinco lados, dividida en cinco partes, y que fue caliz de la flor.

E S P E C I E S.

- Nigra. 1. **BALLOTA** *foliis cordatis indivisis serratis, calycibus acuminatis*. Sabb. hort. 3. t. 35. Balota con hojas de figura de corazon, indivisas, aserradas; y cálices puntiagudos.
- Ballote*. Fuhs. hist. 154. Balote.
- Matth. 825. Tourn, 185.
- Marrubium nigrum, fistulosum, Ballote Dioscoridis*. Marrubio negro, fétido, llamado Balote de Dioscorides.
- C. B. P. 230.
- Marrubiastrum*. Riv. monop. t. 66. Marrubiastro, ó falso-Marrubio.
- Marrubium nigrum, sive Ballote*. Bauh. hist. 3. p. 318. Marrubio negro, ó Balote.

Cast. Balota negra.

Habita en terrenos pedregosos de la Europa: en los circuitos de Madrid y es comun en las mas provincias de España. 26

Varia con la flor blanca; de suerte que la *Balota blanca* es solamente variedad de esta.

PROPIED. *Se tiene por muy util en los afectos histericos.*

- La-nata. 2. **BALLOTA** *foliis palmatis dentatis, caule lanato*. Pall. it. 2. p. 688. Balota de hojas palmeadas con dientes; y tallo lanudo.
- Phlomis foliis multifidis*. Phlomis con hojas hendidas en muchas partes.
- Gmel. Sib. 3. p. 241. n. 72. t. 54.

Cast. Balota lanuda.

Habita en la Siberia ácia la China.

Tiene los tallos cubiertos de lana blanca: los *verticilos* con mucho pelo áspero: las *hojas* como las de la *Grossellera*, hendidas en tres ó cinco lóbulos obtusos, con tres dientes, lampiñas por encima y con pelo áspero por de-

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 621

debaxo : los cálices con cinco dientecitos , setáceos : las corolas con mucho pelo áspero , de color entre amarillo y blanco y por defuera blancas.

Snave-
oleus.

3. *BALLOTA foliis cordatis , spicis foliosis , calycibus truncatis , aristis linearibus.*

Mesosphærum hirsutum , foliis cordatis , serrato-sinuatis , floribus verticillari-ter spicatis. Brown. jam. 257. t. 18. f. 3.

Melissa spicata , Lavandulam spirans , major. Plum. sp. 6. ic. 136. f. 1?

Marrubiastrum maximum , flore cœruleo , Nardi odore. Sloan. jam. 64. hist. I. p. 171. t. 102. f. 2.

Balota de hojas de figura de corazon ; espigas foliosas ; cálices truncados y con aristas lineares.

Mesosphero ó sea planta de olor de Nardo , con pelo áspero ; hojas de figura de corazon , entre aserradas y sinuosas ; y flores espigadas con verticilos.

Melisa espigada , mayor , que despide olor de Espliego.

Marrubiastro muy grande , con la flor cerúlea , y olor de Nardo.

Cast. Balota de olor suave.

Habita en la America Meridional.

Dis-
ticha.

4. *BALLOTA verticillis dimidiatis bipartitis semispicatis.*

Monarda floribus verticillatis , foliis subcordatis , calycibus pilosis , involucri longioribus. Fl. Zeyl. 24?

Stachys Indica , procerior , Betonicæ folio. Rai. hist. 1872.

Balota con verticilos de- mediados , divididos en dos partes y medio espigados.

Monarda con flores verticiladas ; hojas casi de figura de corazon ; cálices pelosos y mas largos que el involucri.

Estaquis mas alta , de Indias , con hoja como la de la Betonica.

Cast. Balota distica.

Habita en la India.

Su estatura es como la de la *Nepeta*. Arroja el tallo de quatro ángulos y vellosos : las hojas con peciolo , casi de figura de corazon , aserradas y tomentosas : los verticilos de uno en uno en ambos lados , divididos en dos par-

622 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

partes, ó compuesto de espigas de dos en dos, unilaterales, ascendentes y al modo que las espigas de las plantas asperifolias: las *flores* alternas, sentadas, ascendentes y colocadas en el rachis ó lomo sencillo ondeado: una *bractea* debaxo de cada flor, alesnada y mas corta que el caliz: el *caliz* hendido en cinco partes casi iguales, sin arista, de cinco lados y otros cinco desfigurados: quatro *estambres*: quatro *semillas* casi redondas y lustrosas.

869. Género MARRUBIUM. * *Tourn. t. 91.*

Pseudo-dictamnus. *Tourn. t. 89.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, en forma de salvilla, rígido, con diez estrias, igual, abierto por su boca, y comunmente con diez dientecitos alternadamente mas pequeños.

COR. de un *petalo*, boquiabierta: *tubo* cilindrico: *borde* que se abre: su *garganta* larga y tubulosa: *labio superior* derecho, linear, hendido en dos partes y agudo: el *inferior* redoblado, mas ancho, medio hendido en tres lacinias; con la del *medio* mas ancha, escotada; y las *laterales* agudas.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, mas cortos que la corola, recogidos debaxo del labio superior, de los cuales *dos* son mas largos: con las *anteras* sencillas.

PIST. *Germen* hendido en quatro partes: *estilo* filiforme, del largo y direccion de los estambres: con el *estigma* hendido en dos lacinias.

PERIC. ninguno: el *caliz* coartado por el cuello y abierto por su boca encierra las semillas.

SEM. quatro, y algo oblongas.

OBS. Se hallan algunas especies con el *caliz* de cinco dientes.

CARACTERES GENERICOS DE TOURN.
MARRUBIUM. p. 192.

La flor es de un petalo , labiada ; cuyo labio superior se halla levantado y con dos hastitas ; y el inferior dividido en tres partes. Del caliz sale el pistilo acompañado de quatro embriones , que pasan á otras tantas semillas , oblongas y recogidas en una capsula , que antes fue caliz de la flor.

PSEUDO-DICTAMNUS. p. 188.

La flor es de un petalo , labiada ; con el labio superior arqueado , comunmente hendido en dos partes ; y el inferior dividido en tres. Del caliz en forma de embudo sale el pistilo , acompañado de quatro embriones , que pasan á otras tantas semillas , oblongas , recogidas en una capsula en forma de embudo , que fue caliz de la flor.

ESPECIES QUE TIENEN LOS CALICES
CON CINCO DIENTES.

Alysoni.

1. MARRUBIUM *foliis* X Marrubio de hojas en forma de cuña , con pliegues, *cuneiformibus quinque-dentatis plicatis , verticillis* y cinco dientes ; y verticilos *involutro destitutis.* Roy. sin involucreo.

lugdb. 314.

Marrubium album , foliis X Marrubio blanco , con hojas profundamente cortadas ; *profunde incisís , flore cæruleo.* Moris. hist. 3. p. 377. y flor cerúlea.

sect. II. t. 10. f. 12.

Alysson verticillatum , foliis X Alyso verticilado , con hojas profundamente cortadas. *profunde incisís.* C. B.

P. 232.

Alysson Galeni. Clus. hist. Alyso de Galeno.

2. p. 35. Dod. pempt. 88.

Marrubium Hispanicum , supinum , calyce stellato & Marrubio de España , tendido ; de caliz estrellado y *aculeato.* Tourn. p. 192. con agujones.

Cast. Marrubio Alyso.

Ha

624 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Habita en los circuitos de Madrid : en la Mancha , Valencia , Orihuela , Andalucia , Aragon , Cataluña y otras partes de España. ¶

Tiene tres *flores* en ambas partes , de color purpúreo y pequeñas : los *cálices* agudos , y con los dientes extendidos.

Pe-
regri-
num.

2. MARRUBIUM *foliis ovato-lanceolatis serratis, calycum denticulis setaceis.* Marrubio con hojas entre aovadas y lanceoladas , aserradas ; y dientecitos de los cálices setáceos.

Jacq. austr. t. 160,

Marrubium album, latifolium, peregrinum. C. B. P. Marrubio peregrino, blanco , de hoja ancha.

230. Tourn. p. 192. Moris.

hist. 3. p. 577. sect. 11. t. 9. f. 8.

Marrubium alterum, Pannonicum. Clus. hist. 2. p. 34. Otro Marrubio de Pannonia.

* *Marrubium album, angustifolium, peregrinum.* Marrubio peregrino, blanca , de hoja angosta. *

C. B. P. 230.

Marrubium Creticum. Da- Marrubio de Creta.
lech. hist. 962.

Cast. Marrubio peregrino.

Habita en lugares secos de Sicilia , Creta : en Aragon y otras partes de España ; pero la variedad * en el monte Libano. ¶

Can-
didis-
simum

3. MARRUBIUM *foliis subovatis lanatis superne emarginato-crenatis, denticulis calycinis subulatis.* Marrubio con hojas casi aovadas , lanudas , entre escotadas y recortadas por arriba ; y dientecitos del caliz alesnados.

Marrubium folio rotundo, candidissimo. Boerh. lugdb. Marrubio con hoja redonda y muy candida.

p. 156. Dill. elth. 218. t. 174.

f. 214.

Marrubium album, candidissimum & villosum. To- Marrubio blanco , muy cándido y veloso.

urn. cor. 12.

Cast.

Cast. Marrubio muy cándido.

Habita en Creta.

Supinum. 4. MARRUBIUM *denticulatus calycinis setaceis rectis villosis*. Sauv. monsp. 151. Marrubio con los dientes del caliz setáceos, rectos y vellosos.

Marrubium album, sericeo parvo & rotundo folio. Barr. ic. 685. Bocc. mus. 2. P. 78. t. 69. Marrubio blanco, de hoja pequeña y redonda, con vello como seda.

Marrubium album, Hispanicum, majus. Barr. ic. 686. Marrubio mayor, de España, con hoja blanca.

Marrubium Hispanicum, supinum, foliis sericeis, argenteis. Tourn. p. 192. Marrubio de España, echado, de hojas con vello como seda, de color de plata.

Cast. Marrubio echado.

Habita en Narbona y Carniola: en los cerros del Real Sitio de Aranjuez, laderas del Piul de Rivas, Alcarria, Serrania de Cuenca y otras partes de España. 24

ESPECIES QUE TIENEN LOS CALICES CON DIEZ DIENTES.

Vulgare. 5. MARRUBIUM *denticulatus calycinis setaceis uncinatis*. Mat. med. 173. Sabb. hort. 3. t. 59. Marrubio con los dientes del caliz setáceos y ganchosos.

Marrubium album, vulgare. C. B. P. 230. Riv. monop. t. 67. Marrubio blanco, vulgar.

Marrubium sive Prasiolum album. Tabern. ic. 539. Marrubio ó Prasio blanco.

Marrubium vulgare. Clus. hist. 2. p. 34. Marrubio vulgar.

* *Marrubium album, villosum*. C. B. P. 230. Prodr. 110. Tourn. p. 192. Marrubio blanco, velloso.

Cast. Marrubio vulgar.

Habita en tierras pedregosas de Europa: en los circuitos de

626 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

de Madrid; y es comun en las mas provincias de España. ¶

PROPIED. La yerba es algo amarga é ingrata: expelente emenagoga, pectoral y antelmintica: se usa en el asma humoral, en el pthialismo procedido del mercurio: en la obstruccion de las entrañas y en el histérico.

Afri-
canum.

6. MARRUBIUM foliis X Marrubio con hojas de fi-
cordatis subrotundis emar- gura de corazon, casi redon-
ginato-crenatis. Hort. cliff. das, entre escotadas y re-
311. cortadas.

Marrubium album, re- Marrubio blanco, menor,
tundifolium, minus, cris- de Etiopia, con hojas cres-
patis foliis, Æthiopicum. pas y redondas.

Pluk. alm. 242. t. 306. f. 2. Falso-dictamno de Africa,
Pseudo-dictamnus Afri- con hojas casi redondas y
canus, foliis subrotundis, blanquecinas por debaxo.
subtus incanis. Comm. hort. 2. p. 179. t. 90.

Cast. Marrubio de Africa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ¶

Tiene el capacete de la corola escotado y peloso.

Cris-
pum.

7. MARRUBIUM foliis X Marrubio de hojas de fi-
cordatis subrotundis crena- gura de corazon, algo redon-
to-subdentatis, calycibus das, entre recortadas y casi
decem dentatis muticis. con dientes; cálices con diez
dientes y sin arista.

Marrubium Dictamni Spu- Marrubio con hojas y tra-
rii foliis & facie. Herm. za como las del Dictamno
parad. 200. t. 200. espurio.

Pseudo-dictamnium ni- Falso-dictamno negro,
grum, rotundo, crispo folio. con hoja redonda y rizada.

Bocc. mus. 2. p. 152. t. 129. Falso-dictamno de Espa-
Pseudo-dictamnus Hispa- ña, con hojas rizadas y ru-
nicus, foliis crispis & ru- gosas.
gosis. Tourn. p. 188.

Cast. Marrubio rizado.

Habita en Italia: en el término de la Puebla de Montalban: en el barranco que llaman las cuevas, cerca del
rio

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 627

rio Tajo : en el cerro que cae al Mediodia de la fuente de Valderetamar , cerca de Aranjuez entre Yepes y el mencionado rio. ¶

Arroja el tallo sufruticoso , derecho y con pelo áspero : las hojas pecioladas y muy rugosas , recortadas , algo tomentosas y por debaxo pelosas : el caliz en forma de embudo , con diez dientes : la corola de color que tira á purpúreo y sin pelos ; con el labio superior casi redondo , obtuso y entero ; el inferior hendido en tres lacinias ; con la intermedia hendida en otras dos ; y las laterales extendidas : y las anteras que no salen mas allá de la garganta.

La del Sinónimo de Herman parad. t. 200. tiene el labio superior lanceolado , con pelo , y los estambres del largo del mismo labio.

Hispanicum.

8. MARRUBIUM *calycum limbis patentibus, dentibus acutis.* Hort. cliff. Marrubio con los bordes de los cálices extendidos , y los dientecitos agudos.

312.

Marrubium album, rotundifolium, Hispanicum. Marrubio blanco , de España , con hoja redonda.

Herm. parad. 201. t. 201.

Marrubium subrotundifolio. Barr. ic. 797. Bocc. mus. 2. p. 167. t. 122. Marrubio con hoja casi redonda.

Pseudo-dictamnus Hispanicus, amplissimo folio, candicante & villosa. Tourn. Falso-dictamnino de España , con hoja muy ancha , que tira á color candido y vellosa.

Cast. Marrubio de España.

Habita en varios lugares áridos y salobres de Andalucía. ¶

Posee las hojas casi redondas , planas y recortadas : el labio superior de la corola hendido en tres ó quatro partes ; y los dientes del caliz alternadamente menores.

Pseu-
do-dic-
t a m-
nus.

9. MARRUBIUM *caly-* X Marrubio con los bordes
cum limbis planis villosis, X de los cálices planos, vello-
foliis cordatis concavis, cau- X sos; hojas de figura de cora-
le fruticoso. Sabb. hort. 3. X zon, cóncavas; y tallo fru-
 t. 47. X ticoso.

Pseudo-dictamnus verti- X Falso-dictamno sin olor,
cillatus, inodorus. C. B. P. X y con flores en verticilo.
 222. Tourn. t. 188.

Pseudo-dictamnus. Dod. X Falso-dictamno.
 pempt. 281. X

Cast. Marrubio falso-dictamno.

Habita en Creta: en los montes de Sierra-morena, térmi-
 no del lugar que llaman el Hoyo, en otras partes de An-
 dalucia en terrenos incultos y pedregosos. *h*

Es *planta* toda cubierta de tomento denso y compacto.

Ac-
tabulo-
sum.

10. MARRUBIUM *caly-* X Marrubio con los bordes
cum limbis tubo longioribus X de los cálices mas largos que
membranaceis, angulis ma- X el tubo, membranosos, y
joribus rotundatis. Mill. dict. X los ángulos mayores redon-
 n. 11. X deados.

Pseudo-dictamnus aceta- X Falso-dictamno con los
bulis Molluccæ. C. B. P. 222. X cálices cóncavos y en forma
 Tourn. p. 188. X de cono inverso como los de
 la Moluca.

Dictamnus-falsus verti- X Dictamno falso de Anda-
cillatus, pericarpio conoide, X lucia, con flores en vertici-
Baticus. Barr. ic. 129. X lo; y pericarpio que se acer-
 X ca á la figura cónica.

Cast. Marrubio con cálices cóncavos y de figura cónica
 inversa.

Habita en Creta y Andalucia. *h*

Tiene las *hojas* de figura de corazon, profundamente aser-
 radas, delgadas y vellosas: el *borde del caliz* membra-
 noso, desnudo, sin vello, y que despues de haber flo-
 recido crece y se hace dos veces mas largo que el tubo,
 con veinte ángulos en su margen, y los mas pequeños
 agudos; pero los mas anchos muy obtusos y redondeados.

870. Género LEONURUS. * Cardiaca. Tourn. t. 87.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, tubulado, cilindrico, de cinco lados, con cinco dientes y persistente.

COR. de un *petalo*, boquiabierta: *tubo* angosto: *borde* que se abre: *garganta* larga: *labio superior* mas largo, medio cilindrico, cóncavo, giboso, entre redondeado y obtuso por su remate, entero y veloso: *labio inferior* redoblado y partido en tres lacinias, lanceoladas y casi iguales.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, cubiertos con el labio superior; de los cuales los dos son mas cortos: *anteras* oblongas, comprimidas, hendidas por medio en dos partes, echadas y salpicadas de puntitos elevados, globosos, relucientes, sólidos y muy pequeños.

PIST. *Gérmenes* quatro: *estilo* filiforme, de la longitud y direccion de los estambres: con el *estigma* hendido en dos partes agudas.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse contiene las semillas.

SEM. quatro, oblongas, por una parte convexâs y por la otra anguladas.

CARACT. GENER. DE TOURNEF.

CARDIACA. p. 186.

La flor es de un petalo, labiada; cuyo labio superior, acanalado, es mucho mas largo que el inferior dividido en tres partes. Del caliz sale el pistilo, acompañado de quatro embriones, que pasan á otras tantas semillas, anguladas y que ocupan toda la capsula, que fue caliz de la flor.

ESPECIES.

Car- I. LEONURUS *foliis cau-* X Leonuro con las hojas del
diaca. *linis lanceolatis trilobis.* Fl. X tallo lanceoladas, y dividi-
dan. 727. Mat. med. 173. X das en tres lóbulos.

Car.

630 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Cardiaca foliis petiolatis, X Cardiaca de hojas con pe-
cordatis, verticillis foliosis. ciolo , de figura de corazon;
 Hall. helv. n. 274. y verticilos foliosos.

Marrubium Cardiaca dic- Marrubio llamado Cardia-
tum. C. B. P. 230. ca.

Cardiaca. Bauh. hist. 3. Cardiaca.

p. 320. Dod. pempt. 94. Lob.

ic. 516. Fuchs. hist. 3. t. 395.

Tourn. t. 186.

α Cardiaca crispa. Rai. hist. Cardiaca rizada. *α*

572. Sabb. hort. 3. t. 43.

Cast. Leonuro cardiaca.

Habita en lugares pedregosos de Europa : en Cataluña y
 otras partes de España. *℥*

La variedad *α* es distinta especie segun Murray quien la
 determina del modo siguiente :

Leonurus (crispus) foliis X Leonuro (rizado) con to-
omnibus acute serratis, mar- das las hojas agudamente
gine irregulariter reflexis, aserradas, redobladas por su
rugosissimis, caulinis quin- margen irregularmente, muy
que lobis. Nov. Comm. Goett. rugosas ; y las del tallo di-
 t. 8. p. 44. t. 4. R. vididas en cinco lóbulos.

Marrubias-
 trum.

2. LEONURUS *foliis X* Leonuro con unas hojas
ovatis lanceolatisque serra- aovadas y otras lanceoladas,
tis, calycibus sessilibus spi- aserradas ; cálices sentados y
nosis. Scop. carn. ed. 2. n. espinosos.

704.

Marrubiastrum foliis Car- Marrubiastro con hojas
diacæ. Bocc. mus. 2. p. 120. como las de la Cardiaca.
 t. 98.

Sideritis foliis ovatis lan- Sideritide con hojas aova-
ceolatis inciso-serratis. Hort. das , lanceoladas , entre cor-
 cliff. 213. tadas y aserradas.

Cast. Leonuro marrubiastro.

Habita en Bohemia , Ucrania , Alemania y tambien en
 Java.

Tiene el *caliz* hendido en cinco partes , con aristas , y és-
 tas tambien debaxo de los verticilos : las *corolas* apenas
 mas

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 631

mas largas que el caliz, pequeñas y parecidas á las de la *Nepeta*; con el *capacete* entero y la *lacinia intermedia* del *labio inferior* sin ser recortada.

Tarta-
ricus.

3. LEONURUS *foliis tri-* Leonuro con hojas dividi-
partitis laciniatis, calyci- das en tres partes, lacinia-
bus villosis. Gmel. it. 1. p. das; y cálices vellosos.

111.

Sideritis foliis tripar- Sideritide con hojas divi-
vito-multifidis. Hort. cliff. didas en tres partes y hendi-
das en otras muchas.

313.

Cardiaca foliis tenuius & Cardiaca con hojas corta-
profundius incisís, glabra das mas delgada y profun-
seu villosa. Amm. ruth. 49. damente, lampiñas ó vello-
50. Mill. ic. 30. sas.

Cast. Leonuro de Tartaria.

Habita en la Tartaria. ♂

Posee las *corolas* encarnadas; con el *labio superior* dere-
cho, arqueado y que cubre los estambres; el *inferior*
hendido en tres lacinias, con las *laterales* acercadas al
labio superior, y la del medio de figura de corazon al
revés.

Sibi-
ricus.

4. LEONURUS *foliis tri-* Leonuro con hojas dividi-
partitis multifidis lineari- das en tres partes, hendidas
bus obtusiusculis. Hort. ups. en otras muchas, lineares y
algo obtusas.

170.

Ballote inodora, foliis Balote sin olor, y con ho-
Coronopi. Amm. ruth. 48. jas como las del Coronopo
t. 8. ó sea Estrella-mar.

Cast. Leonuro de Siberia.

Habita en la Siberia y en la China. ♂

Es variedad de la precedente por las *corolas* mas grandes.

Gmel. Sib. 3. p. 239.

632 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

871. Género PHLOMIS. * *Tourn. t. 82.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, tubuloso, oblongo, de cinco ángulos, con dientes y persistente.

Involucro puesto debaxo del verticilo.

COR. de un *petalo*, boquiabierta: *tubo* oblongo: *labio superior* aovado, arqueado, echado, comprimido, velloso y muy poco hendido en dos partes: *labio inferior* hendido en tres lacinias; con la *del medio* mayor, de dos lóbulos y obtusa: las *laterales* pequeñas y agudas.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, recogidos debaxo del labio superior; de los cuales dos son mas largos: con las *anteras* oblongas.

PIST. *Germen* dividido en quatro partes: *estilo* de la longitud y direccion de los estambres: con el *estigma* hendido en dos lacinias agudas, y la inferior mas larga.

PERIC. ninguno: el *caliz* contiene las semillas en su fondo.

SEM. quatro, oblongas, y de tres caras.

CARACT. GENER. DE TOURN. P. 177.

La *flor* es de un *petalo*, labiada; cuyo *labio superior*, que es en forma de *capacete*, se halla todo echado sobre el inferior el qual está dividido en tres partes y algo hinchado. Del *caliz* sale el *pistilo*, acompañado de quatro *embriones*, que pasan á otras tantas *semillas*, oblongas, y recogidas en una *capsula* ó *tubo* de cinco lados, que fue *caliz* de la *flor*.

ESPECIES.

I. PHLOMIS *foliis sub-rotundis tomentosis crenatis, involucris lanceolatis, caule fruticoso.* Sabb. hort. 3. t. 15. X Phlomis con hojas casi redondas, tomentosas, recordadas; involucros lanceolados; y tallo fruticoso.

Ver-

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 633

Verbascum latifolia Salvia
foliis. C. B. P. 240.

Verbascum con hojas como
las de la Salvia, y anchas.

Verbascum quartum, si
ve sylvestre. Matth. 1146.

Verbascum quarto, ó silves-
tre.

Verbascum sylvestre, al-
terum. Dod. pempt. 146.

Otro Verbascum silvestre.

Phlomis fruticosa, Sal-
viae folio, latiore & rotundio-
re. Tourn. p. 177.

Phlomis fruticosa, con ho-
ja como la de la Salvia, mas
ancha y mas redonda.

Phlomis Cretica, frutico-
sa, folio subrotundo, flore
luteo. Tourn. cor. 10.

Phlomis de Creta, fruti-
cosa, con hoja casi redonda
y flor amarilla. α

Phlomis (latifolia) foliis
oblongo-ovatis petiolatis to-
mentosis, floribus capitatis,
caule fruticoso. Mill. dict.
n. 3.

Phlomis (de hoja ancha)
de hojas entre oblongas y ao-
vadas, con peciolo, tomen-
tosas; flores en cabezuela; y
tallo fruticoso.

*Phlomis latifolia, capita-
ta, lutea, grandiflora.* Dill.
elth. 316. t. 237. f. 306.

Phlomis con hojas anchas;
flores grandes, amarillas, y
puestas en cabezuela.

Cast. Phlomis fruticosa.

Habita en Sicilia: en Extremadura, Sierra-morena y otras
partes de Andalucia. h

Pur-
purea.

2. PHLOMIS involucris
linearibus obtusis calyce
brevioribus, foliis cordatis
oblongis tomentosis, caule
suffruticoso. Mill. ic. 202.

Phlomis con involucros
lineares, obtusos, mas cor-
tos que el caliz; hojas de fi-
gura de corazon, oblongas,
tomentosas; y tallo sufruti-
coso.

Verbascum subrotundo
Salviae folio. C. B. P. 240.

Verbascum con hoja como
la de la Salvia, y casi re-
donda.

*Phlomis fruticosa, Lusi-
tanica, flore purpurascens,*
foliis acutioribus. Tournef.
p. 178.

Phlomis fruticosa, de Por-
tugal, con la flor de color
que tira á purpúreo; y hojas
mas agudas.

Sal-

634 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Salvia fraticosa, *Cistifolio*, *haud incano*, *floribus purpureis*. Pluk. alm. 329. t. 57. f. 6. X *Salvia fruticosa*, con hoja como la de la Xara, que no es blanquecina; y flores purpúreas.

Cast. *Phlomis purpúrea*.

Habita en Italia y Portugal: en Sierra-morena y otras partes de Andalucía. \hbar

Produce el tallo casi sufruticoso, tomentoso y comunmente débil: las hojas de figura de corazon ú oblongas, tomentosas y blanquecinas en ambas partes: los peciolos inferiores mas largos que la hoja: los verticilos con seis flores: los involucros la mitad mas cortos que el caliz, lineares, obtusos y tomentosos; y la corola con el labio inferior purpúreo por encima.

Nis-solii.

3. PHLOMIS *foliis radicalibus cordato-sagittatis utrinque tomentosis villosis*. Mill. dict. t. 204. X *Phlomis* con hojas radicales entre de figura de corazon y de saeta, tomentosas y vellosas en ambas partes.

Phlomis Orientalis, foliis auriculatis, incanis, flore luteo. Nissol. X *Phlomis Oriental*, de hojas blanquecinas, con orejillas y flor amarilla.

Cast. *Phlomis* de Nissolio.

Habita en Oriente.

Tiene las hojas radicales aovadas: los cálices con pelo áspero, y carece de involucros.

I.ych-nites.

4. PHLOMIS *foliis lanceolatis tomentosis, floralibus ovatis, involucris setaceis lanatis*. Mill. dict. n. 6. ic. 203. X *Phlomis* con hojas lanceoladas, tomentosas; las florales aovadas; involucros setáceos y lanudos.

Phlomis foliis ligulatis, utrinque tomentosis, radii involucri setaceis, villosis. Sauv. monsp. 143. X *Phlomis* con hojas á manera de cintillas ó lenguetas, tomentosas en ambas partes; rádios del involucro setáceos y vellosos.

Verbascum angustis Salviae foliis. C. B. P. 240. X *Verbascum* con hojas como las de la *Salvia*, y angostas.

Phlo-

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 635

Phlomis Lychnitis. Clus. X
hist. 2. p. 22. Phlomis Lichnitide.

Cast. Phlomis Lichnitide. *vulgo* : Candilera.
Habita en la Europa austral : en el circuito de Madrid, Castilla la vieja , Alcarria , Extremadura , la Mancha, Aragon , Cataluña y otras muchas partes de España.
Tiene las *corolas* apenas mayores que el caliz : los *involucros* lineares , con pelos largos y como cerdas.

Laciniata. 5. PHLOMIS *foliis alternatim pinnatis, foliolis laciniatis, calycibus lanatis.* X
Mill. dict. n. 14. Phlomis de hojas alternativamente pinnadas, con hojuelas laciniadas; y cálices lanudos.
Phlomis Orientalis, foliis laciniatis. X
Tourn. cor. 10. Phlomis Oriental, con hojas laciniadas.

Cast. Phlomis laciniada.
Habita en Oriente.

Samia. 6. PHLOMIS *foliis ovatis subtus tomentosis, involucri subulatis strictis tripartitis.* X
Mill. dict. n. 8. Phlomis con hojas aovadas, tomentosas por debaxo; involucros alesnados, apretados y rígidos; y divididos en tres partes.
Phlomis Samia, herbaeceae, folio Lunariæ. X
Tourn. cor. 10. Phlomis de Samo, herbácea, con hoja como la de la Lunaria.

Cast. Phlomis de Samo.
Habita en la Isla de Samo.

Herba venti. 7. PHLOMIS *involucris setaceis hispidis, foliis ovato-oblongis scabris, caule herbaceo.* X
Sabb. hort. 3. t. 17. Phlomis con involucros setáceos y erizados; hojas entre aovadas y oblongas, ásperas; y tallo herbáceo.
Marrubium nigrum, longifolium. X
C. B. P. 230. Marrubio negro, con hoja larga.
Herba venti. X
Lob. ic. 332. Yerba de viento.

636 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Phlomis Narbonensis, *Phlomis de Narbona*, con
Hormini folio, *flore purpu-* hoja como la del Hormino,
rascente. Tourn. p. 178. y flor de color que tira á pur-
 púreo.

Cast. *Phlomis* yerba de viento. *vulgo*: Aguavientos.

Habita en Persia, Tartaria y Narbona: y en los mismos
 lugares de España que la *Phlomis Lychniide*. ¶

Tube-
 rosa.

8. PHLOMIS *involucris* *Phlomis* con involucros
hispidis subulatis, *foliis* erizados, alesnados; hojas de
cordatis scabris, *caule her-* figura de corazon, ásperas;
baceo. Pall. it. 1. p. 319. y tallo herbáceo.

Phlomis involucris seta- *Phlomis* con los rádios del
ceis, *foliis ex cordato-lan-* involucro setáceos; y hojas
ceolatis. Gmel. Sib. 3. p. 241. entre de figura de corazon y
 n. 73. lanceoladas.

Phlomis foliis cordifor- *Phlomis* con hojas en for-
mibus, *galea lacera*. Act. ma de corazon, y capacete
 goett. 211. t. 12. lacerado.

Galeopsis maxima, *foliis* *Galeopsis* muy grande,
Hormini. Buxb. cent. 1. p. 4. con hojas como las del Hor-
 t. 6. mino.

Cast. *Phlomis* tuberosa.

Habita en los campos de Siberia. ¶

Tiene los *involucros* alesnados: los *dientes del caliz* ex-
 tendidos y erizados: el *capacete de la corola* con dien-
 tes; y la raíz tuberosa.

Zey-
 lanica.

9. PHLOMIS *foliis lan-* *Phlomis* de hojas lanceo-
ceolatis subserratis, *capitu-* ladas, algo aserradas; cabe-
lis terminalibus, *calycibus* zuelas terminales; y cálices
octo dentatis. con ocho dientes.

Cardiaca seu Leonurus *Cardiaca* ó Leonuro de
Hyssopi hirsutis foliis, *Ma-* Madraspatan de hojas como
deraspatana, *floribus di-* las del Hisopo, con pelo ás-
lute rubris, *unico tantum* pero; flores de color roxo
verticillo in ramulorum cy- claro; y un verticilo sola-
mis. Pluk. alm. 81. t. 118. mente en las cimas de las
 f. 4. ramitas.

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 637

Herba admirationis. Rum-
ph. amb. 6. p. 39. t. 16. f. 1. (No supo Rumphio porque
la llaman asi).

Cast. Phlomis de Zeylan.

Habita en la India. ☉

Produce el tallo de la estatura de la *Phlomis Leonuro*, del largo de dos pies, derecho, herbáceo y de quatro lados obtusos: las *hojas* mas largas que los entrenudos, lanceoladas, algo tomentosas, rayadas, con peciolo y algunas aserraduras apartadas: los *verticilos* casi terminales, con su involucre alesnado: el *caliz* obliquamente truncado, con siete dientes desfigurados y el superior mas largo: la *corola* blanca: el *labio superior* con pelo áspero, cortísimo, arqueado, cerrado y entero: el *inferior* grande, extendido, hendido en tres lacinias; con la *intermedia* ancha y casi plegada: las *anteras* negras, comprimidas y truncadas: un *estigma* puesto sobre el estilo debaxo de su ápice; y el *otro* de mas abaxo alesnado y agudo. *Syst. veg. p. 450.*

Indica. 10. PHLOMIS *involucris* Phlomis con involucros li-
linearibus, calycibus unila- neares; cálices de un labio
biatis obliquis, foliis ovatis obliquos; hojas aovadas y pe-
vilosis. losas.

Cast. Phlomis de Indias.

Habita en la India.

Echa las *hojas* aovadas, verdes, aserradas, adelgazadas por su base, con peciolo, y cubiertas de pelos blandos: dos ó tres *verticilos* ácia el remate, crasos, y ceñidos con involucros derechos, lineares, aquillados y vellosos: los *cálices* tubulosos, oblongos, de diez lados, alargados por la margen exterior de la boca en un labio de tres dientes y dos muy menudos por detras, donde la margen es cortísima: la *corola* semejante á la del *Leonuro Cardia-*
ca, con el capacete de muchos pelos blancos y mas largo; y el *labio inferior* hendido en tres lacinias, con la *del medio* al doble mas larga. Es muy parecida á la especie precedente.

638 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Nepetifolia. 11. PHLOMIS *foliis cordatis acutis serratis subtomentosis, calycibus septemdentatis aristatis, supremamajore, caule herbaceo.* Syst. veg. 451. X Phlomis de hojas de figura de corazon, agudas, aserradas, algo tomentosas; cállices de siete dientes, con aristas, la de mas arriba mayor; y tallo herbáceo.

Phlomis foliis cordatis acutis serratis subtomentosis, calycibus sex seu octodentatis, dente supremo infimoque majori, caule herbaceo. Suppl. p. 274. X Phlomis de hojas de figura de corazon, agudas, aserradas, algo tomentosas; cállices de seis ú ocho dientes, con el de mas arriba y de mas abaxo mayores; y tallo herbáceo.

Cardiaca Americana, annua, Nepetæfolio, floribus brevibus, phæniceis, villosis. Herm. lugdb. 115. t. 117. X Cardiaca de America, annua, con hoja como la de la Nepeta; flores cortas, de color de datil, y vellosas.

Cast. Phlomis con hoja de Nepeta.

Habita en Surinam. ☉

Arroja el tallo sencillo, derecho y de quatro ángulos obtusos: las *hojas* de figura de corazon, con aserraduras algo obtusas y profundas, casi tomentosas y verdes: los *peciolos* del largo de las hojas: algunos *verticilos* ácia los remates, globosos y de muchas flores: el *caliz* algo peloso, cilindrico, espinoso por su borde y agudísimo, con el diente superior al doble mas grande, á mas de quatro ó seis dientes pequeños: la *corola* vellosa, con traza y color como el de la *Phlomis Leonuro*; pero tres veces menor; con el *labio superior* algo rollizo, largo y escotado: y el *inferior* corto, liso y hendido en tres partes: el *involucro* alesnado y redoblado: los *estambres* arrimados por pares: dos *estigmas* filiformes, y el superior la mitad mas corto. Syst. pl.

Produce el tallo de quatro lados, derecho, de la altura de seis pies y liso, con quatro sulcos angostados entre las hojas: las *hojas* opuestas, pecioladas, de figura de corazon, con aserraduras gruesas, venosas, algo vellosas, ó lampiñas, y como las del *Lamio blanco*: los *verticilos* globosos, y dos ó tres en el remate: las *bracteas* de los *verticilos* foliaceas, de dos en dos, mas largas y que cuel-

cuelgan: el tubo del caliz vellosos: el borde con seis, ú ocho dientes que apenas punzan; el de mas arriba y mas abaxo mayores, y los restantes iguales entre sí y agudos: la corola como la del *Phlomis Leonuro*, cubierta de vello como seda y de color amarillo-roxo: el labio inferior desnudo, hendido en tres partes, obtuso, pequeño y que se marchita pronto. *Suppl. p. 274.*

12. *PHLOMIS foliis lanceolatis serratis, calycibus decagonis decem dentatis muticis, caule fruticoso.*
Berg. cap. 151. Knorr. del. hort. 2. t. L. Sabb. hort. 3. t. 44.

Phlomis de hojas lanceoladas, aserradas; cálices de diez lados, con diez dientes sin arista; y tallo fruticoso.

Leonurus Capitis Bonæ spei. Bryn. cent. 171. t. 36. Seb. mus. 1. p. 22. t. 14. f. 1.

Leonuro del Cabo de Buena-esperanza.

Stachys Africana, frutescens, angustifolia, flor longisimo, phœniceo, Leonurus dicta. Moris. hist. 3. p. 383. sect. 11. t. 19. f. 17.

Estaquis de Africa, llamada Leonuro, frutescente, con hoja angosta; flor larguísima, y de color de dátil.

Cast. *Phlomis Leonuro.*

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. $\frac{h}{2}$

Es planta muy hermosa quando florece. Tiene el caliz sin aristas: el involucreo mas largo que el caliz, de muchas hojuelas, alesnadas y redobladas: la corola cubierta toda como de seda, de color amarillo-roxo; con el labio superior largo, tomentoso, pestafioso y enterisimo; el inferior corto, membranoso, desnudo, hendido en tres laciniás, con las laterales redobladas y áridas, y la intermedia escotada: los filamentos de color de nieve: las anteras de dos lóbulos, de color amarillo-roxo, salpicadas solamente por su base de harina globulosa; y el estigma superior mas corto. Varia con los involucreos mas cortos que el caliz.

Leo- 13. PHLOMIS *foliis ova-* X Phlomis de hojas aovadas,
 nitis. *tis obtusis subtomentosis* X obtusas, recortadas, algo
crenatis, calycibus septem- X tomentosas; cálices de siete
dentatis aristatis, caule fru- X dientes con aristas; y tallo
uticoso. X fruticoso.

Leonurus minor, Capitis X Leonuro menor, del Ca-
Bonæ-spei. Boerh. lugdb. 1. X bo de Buena-esperanza.
 p. 180. Mill. dict. t. 162.

Stachys Africana, fru- X Estaquis de Africa, frutes-
tescens, Melissa foliis, flo- X cente, con hojas como las
ribus brevioribus, phæni- X del Torongil; flores mas
ceis. Moris. hist. 3. p. 383. X cortas y de color de datil.

Cast. Phlomis Leonitide.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. †

Es muy semejante al *Phlomis Leonuro*; pero tiene las ho-
 jas aovadas, mas tomentosas y no lanceoladas. Conviene con el *Phlomis de hoja de Nepeta* por los cálices con aristas; por las hojas pequeñas, obtusas, consistentes; y por el cuello del caliz con pelo áspero; pero se diferencia mucho de ella por el tallo fruticoso: en otra manera las corolas de estas tres especies son muy semejantes.

872. Género MOLUCCELLA. * Molucca.

Tourn. t. 88.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, muy grande, cónico inverso, encorvado, persistente, y que gradualmente remata en un borde muy ancho, á manera de campana, con dientes espinosos, de los cuales el *superior* se halla mas apartado.

COR. de un *petalo*, boquiabierta, menor que el caliz: *tubo* y *garganta* cortos; el *labio superior* derecho, cóncavo y entero; el *inferior* hendido en tres lacinias: con la *del medio* mas extendida y escotada.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, recogidos debaxo del labio superior, de los cuales los *dos* son mas cortos: con las *anteras* sencillas.

PIST.

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 641

PIST. *Germen* dividido en quatro partes: *estilo* de la magnitud y direccion de los estambres: con el *estigma* hendido en dos lacinias.

PERIC. ninguno: el *fruto* cónico inverso truncado se halla en el fondo del caliz abierto.

SEM. quatro, en una parte convexâs, en la otra anguladas, y por arriba mas anchas y truncadas.

OBS. La *Molucela espinosa* tiene el *caliz* con siete espinas largas.

La *Moluc. lisa* tiene cinco espinas pequeñas.

La *Moluc. frutescente* posee dos espinas extendidas.

Y en unas especies el *caliz*, es mas largo que la corola, y en otras mas corto. R.

CARACT. GÉNÉR. DE TOURNER.

MOLUCCA. p. 187.

La *flor* es de un petalo, labiada; cuyo labio superior se halla excavado á manera de cuchara; y el inferior dividido en tres partes. Del caliz sale el pistilo, acompañado de quatro embriones, que pasan á otras tantas semillas, anguladas y recogidas en una capsula en forma de campana, que antes fue caliz de la flor.

ESPECIES.

- Lavis.* I. MOLUCCELLA *calyx* X Molucela de cálices en
cibus campanulatis subquin- X forma de campana, y casi
que—dentatis, denticulis X con cinco dientecitos igua-
æqualibus. Sabb. hort. 3. t. X les.
 45. *Molucca lavis.* Dod. X Moluca lisa.
 pempt. 92. Tourn. p. 187. X
Melissa Moluccana, odo- X Torongil de Molucas olo-
rata. C. B. P. 229. X roso.
Molucca. Bauh. hist. 3. X Moluca.
 234. X
Cast. Molucela lisa.
 Habita en Siria. ☉
 Tiene el *caliz* mas largo que la corola.

642 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

2. MOLUCCELLA *calycibus ringentibus octo-dentatis*. Sabb. hort. 3. t. 46. Molucela de cálices boquiabiertos, y con ocho dientes.
- Molucca spinosa*. Dod. Moluca espinosa.
- pempt. 92. Tourn. p. 187.
- Melissa Moluccana*, *fœtida*. C. B. P. 229. part. 2. Torongil fétido, de Molucas.
- Molucca asperior*, *fœtida*. Bauh. hist. 3. part. 2. p. 235. Moluca mas áspera, y fétida.

Cast. Molucela espinosa.

Habita en las Molucas. ☉

Echa los verticilos de seis flores y sentados: el involucre de quatro espinas que salen de tres en tres de un mismo pie, lineares, extendidas y que punzan: el labio superior de la corola mas grande y con puntas espinosas; el inferior redondeado, entero y con siete espinas: y la corola mas larga que el caliz.

- Frutescens. 3. MOLUCCELLA *calycibus infundibuliformibus quinquefidis, corollis calyce longioribus*. Allion. nicæens. Molucela con los cálices en forma de embudo, hendidos en cinco partes; y corolas mas largas que el caliz.
- 51.

Moluccella Persica. Burm. Molucela de Persia.

ind. 128. t. 38. f. 2.

Scordium spinosum, *floris labio superiore, seu galea lanuginosa, seu villosa*. Rai. Suppl. p. 311. Escordio espinoso, con el labio superior ó capacete de la flor lanuginoso, ó velloso.

Cast. Molucela frutescente.

Habita en la Persia, de donde se trasladó á Italia. ♀

Es arbustito que produce las ramitas ahorquilladas: las hojas aovadas, del largo de una pulgada, pecioladas, vellosas con pelos claros y señaladas en ambos lados con dos ó tres aserraduras profundas: las espinas axilares, solitarias en una y otra parte, de tres en rama, como en el *Berberis*; pero solamente en los verticilos de las flores: los calices en forma de embudo, pequeños, de diez lados, regulares, con el borde hendido en cinco

par-

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 643

partes y con diez espinas terminales: la *corola* como la de la *Cardiaca* con el capacete lanudo.

Una muestra de Persia que el célebre *Burman* envió á *Linneo* tenia las *hojas* mas vellosas, y las *aserraduras* mas agudas: los *cálices* con las lacinias aovadas al revés, membranosas, mas agudas, y casi con tres dientes; sin embargo de ser la misma especie.

873. Género CLINOPODIUM. * *Tourn. t. 92.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Involucro* de muchas cerdas, de la longitud del *periantio* y colocado debaxo del verticilo.

Periantio de una pieza, cilindráceo, ligeramente encorvado, y de dos labios; el *superior* mas ancho, hendido en tres partes, agudo y redoblado; el *inferior* dividido en dos lacinias, delgado y doblado ácia dentro.

COR. de un *petalo*, boquiabierta: *tubo* corto, gradualmente ensanchado en una garganta: el *labio superior* derecho, cóncavo, obtuso y escotado: el *inferior* obtuso y hendido en tres lacinias; con la *del medio* mas ancha y escotada.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, recogidos debaxo del labio superior, de los cuales los *dos* son mas cortos: con las *anteras* casi redondas.

PIST. *Germen* dividido en quatro partes: *estilo* filiforme, de la longitud y direccion de los estambres: con el *estigma* sencillo, agudo y comprimido.

PERIC. ninguno: el *caliz* encogido por su cuello, y giboso en el vientre contiene las semillas.

SEM. quatro, y aovadas.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 194.

La *flor* es de un *petalo*, labiada; cuyo labio superior se halla levantado, casi redondo y hendido en dos partes; pero el inferior partido en tres. Del caliz sale el pistilo, acompañado de quatro embriones, que pasan á otras tantas semillas, oblongas, y recogidas en una capsula, que fue

644 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

fue caliz de la flor. A estas notas se añade la de las flores dispuestas en verticilo.

ESPECIES.

- Vul-
gare. 1. **CLINOPODIUM** *capitulis subrotundis hispidis, bracteis setaceis.* Sabb. hort. 3. t. 65. *flore albo.* t. 66.
Clinopodio con cabezuelas casi redondas, erizadas; y bracteas setáceas..... y de flor blanca.
- Clinopodium foliis ovatis, lanceolatis, obiter dentatis, stipulis setaceis.* Hall. helv. n. 239.
Clinopodio de hojas aovadas, lanceoladas, alguna vez con dientes; y estipulas setáceas.
- Clinopodium Origano simile.* C. B. P. 224. Tourn. p. 195.
Clinopodio semejante al Oregano.
- Clinopodium.* Cam. epit. 563. Riv. monop. t. 43.
Clinopodio.
- α *Clinopodium foliis ovatis, rugosis, verticillis omnibus distantibus.* Mill. ic. 63. t. 95.
Clinopodio con hojas aovadas, rugosas; y todos los verticilos apartados. α

Cast. Clinopodio vulgar.

Habita en las peñas de Europa, Canadá y Egipto: en los circuitos de Madrid, Alcarria, ambas Castillas, Cataluña y otras partes de España. ℥

De las semillas de la especie del Canadá salen las corolas al doble mas pequeñas.

- Inca-
num. 2. **CLINOPODIUM** *foliis subtus tomentosis, verticillis explanatis, bracteis lanceolatis.*
Clinopodio con hojas tomentosas por debaxo; verticilos aplanados; y bracteas lanceoladas.
- Clinopodium Menthe folio, incanum & odoratum.* Mill. eth. 87. t. 74. f. 85.
Clinopodio con hoja como la de la Menta, blanquecino y oloroso.

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 645

Clinopodium majus, *Virginianum*, *non ramosum*, *verticillis majoribus*, *floribus brevioribus*, *carneis*. Moris. hist. 3. p. 374. sect. 11. t. 8. f. 4.

Clinopodio mayor, de Virginia, que no es ramoso, con verticilos mayores; flores mas cortas, y de color de carne.

Clinopodium Serpentaria dictum, *latiori folio*, *capitulis grandioribus*. Pluk. Mant. 51. t. 344. f. 7. Rai. Suppl. p. 298.

Clinopodio llamado Serpentaria, con hoja mas ancha; y cabezuelas mas grandes.

Cast. Clinopodio blanquecino. *Habita en la America Boreal.* ¶

Ru- 3. CLINOPODIUM *foliis rugosis*, *capitulis axillari-*
gosum. *bus pedunculatis explanatis radiatis.*

Clinopodio con hojas rugosas; cabezuelas axilares, con pedunculo, aplanadas y radiadas.

Clinopodium rugosum, *capitulis Scabiosæ*. Dill. elth. 88. t. 75. f. 86.

Clinopodio rugoso, con las cabezuelas como las de la Escabiosa.

Scabiosæ affinis Chrysanthemi facie, *Lamii foliis*, *Americana*. Pluk. alm. 335. t. 222. f. 7.

Planta de America, parecida á la Escabiosa, con traza de Chrysanthemo; y hojas como las del Lamio.

Sideritis spicata, *Scrophulariæ folio*, *flore albo*, *spicis brevibus*, *habitiorebus*, *rotundis*, *pediculis insidentibus*. Sloan. jam. 65. hist. 1. p. 174. t. 109. f. 2.

Sideritide espigada, con hoja como la de la Escrofularia; flor blanca; espigas cortas, mas gruesas, redondas, y sentadas en piecitos.

Mentha Americana, *inodora*, *foliis subincanis*. Rai. Suppl. p. 284.

Menta Americana, sin olor, y con hojas blanquecinas.

Cast. Clinopodio rugoso. *Habita en la Carolina, Jamaica y Francia Equinoccial.* ¶

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Involucro* espigado, compuesto de bracteas apiñadas, aovadas, y de color.
- Periantio* desigual y vario.
- COR.** de un *petalo*, boquiabierto: *tubo* cilindrico y comprimido: *labio superior* derecho, plano, obtuso y escotado: *labio inferior* hendido en tres lacinias casi iguales.
- ESTAMB.** *Filamentos* quatro, filiformes, del largo de la corola, de los cuales los dos son mas largos: con las *anteras* sencillas.
- PIST.** *Germen* hendido en quatro partes: *estilo* filiforme, é inclinado ácia el labio superior de la corola: con el *estigma* ligeramente hendido en dos partes.
- PERIC.** ninguno: el *caliz* cerrado fomenta las semillas en su seno.
- SEM.** quatro, y aovadas.
- OBS.** El *involucro del caliz* constituye el carácter esencial de este género.
- El *periantio* en algunas especies es casi igual y con cinco dientes: en otras está hendido en dos labios; el *superior* grande, entero: y el *inferior* cortísimo: y en otras especies se halla de dos hojuelas.
- El *Oregano de Tournefort* posee las *flores* solitarias, que provienen de las escamitas propias.
- La *Mejorana de Tournefort* tiene las *flores* que salen de una cabezuela apiñada y de quatro lados.
- El *Dictamno de Rayo* y de *Boerhave* posee las *flores* que salen de una cabezuela laxâ y apiñada.

CARAC. GENER. DE TOURN. p. 198.

La *flor* es de un *petalo*, labiada; cuyo labio superior se halla levantado, casi redondo, y hendido en dos partes, y el inferior en tres. Del caliz sale el pistilo acompañado de quatro embriones, que pasan á otras tantas semillas, casi redondas y recogidas en una capsula, que fue

caliz de la flor. A estas notas se añade la de las flores colocadas en espigas, escamosas, y como si estuviesen en hacecillo.

ESPECIES.

Ægyptiacum

1. *ORIGANUM foliis carnis tomentosis, spicis nudis.* Hasselq. it. 479.

Majorana rotundifolia, scutellata, exotica. Tourn. p. 199.

Origanum cognata Zatarhendi. C. B. P. 223. Moris. hist. 3. p. 360. sect. 11. t. 3. f. ult.

Zatarhendi. Alp. Ægypt. 94. t. 95.

Cast. Origanum de Egipto.
Habita en Egipto. ¶

Dictamnus

2. *ORIGANUM foliis inferioribus tomentosis, spicis nutantibus.* Mat. med. 173. Sabb. hort. 3. t. 76.

Dictamnus Creticus. C.B. P. 222.

Dictamum verum. Dod. pempt. 281.

Origanum Creticum, latifolium, tomentosum, seu Dictamnus Creticus. Tourn. p. 199.

Dictamnus. Lob. ic. 502. ¶ Dictamo.

Cast. Origanum Cretico. Farm. Dictamnus Creticus.
Habita en el monte Ida de Creta. ¶

PROPIED. Toda la planta es olorosa, resolvente, expelente, nervina, uterina y emenagoga.

648 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

- Sipy-
ticum. 3. *ORIGANUM foliis omnibus glabris, spicis nutantibus.* Hort. cliff. 304. X Oregano con todas las hojas lampiñas; y espigas inclinadas.
- Origanum montis Sipyli.* Herm. lugdb. 462. t. 463. X Oregano del monte Sipylo.
- Dictamnus Sipylius, Majoranae foliis.* Moris. hist. 3. p. 457. sect. 11. t. 4. f. 2. X Dictamo del monte Sipylo, con hojas como las de la Mejorana.

Cast. Oregano Sipylo.

Habita en el monte Sipylo de Frigia.

- Cre-
ticum. 4. *ORIGANUM spicis aggregatis longis prismaticis rectis, bracteis membranaceis, calyce duplo longioribus.* Mat. med. 174. Hall. helv. n. 234. X Oregano con espigas agregadas, largas, en forma de prisma, rectas; bracteas membranáceas, y al doble mas largas que el caliz.

Origanum foliis ovatis, acutis, glabris, venis scabris, spicis tetragonis. Gron. orient. 75. X Oregano de hojas aovadas, agudas, lampiñas, con venas ásperas; y espigas de quatro lados.

Origanum foliis ovatis obtusis scabris integerrimis, spicis confertis compactis glabris. Amoen. acad. 1. p. 160. X Oregano con hojas aovadas, obtusas, ásperas, enterisimas; espigas amontonadas, compactas y lampiñas.

Origanum Creticum. C.B. P. 223. X Oregano de Creta. α

Origanum folio subrotundo. C. B. P. 223. Tourn. p. 199. X Oregano con hoja casi redonda.

Origanum Monspeliense, pulchrum. Cam. epit. 468. Bauh. hist. 3. part. 2. p. 238. X Oregano hermoso, de Montpellier.

Cast. Oregano de Creta.

Habita en la Europa austral: en Palestina y Basilea. 24
PROPIED. Es oloroso, estimulante y odontalgico.

5. *ORIGANUM foliis ovatis acutis serratis, spicis congestis umbellatim fastigiatis.* Hort. cliff. 304.

Oregano con hojas aovadas, agudas, aserradas; espigas amontonadas como en umbela y ramillete horizontal.

Origanum Smyrneum.

Oregano de Smirna.

Rai. hist. 405.

Majorana Cretica, Origanum foliis, villosa, Satureia odor, corymbis majoribus, albis. Tourn. cor. 13.

Mejorana de Creta, con hojas como las del Oregano, villosa, de olor de Axedrea; corimbos mayores y blancos.

Cast. Oregano de Smirna.

Habita en Creta y Smirna en un monte en que se halla una fortaleza.

Heracleoticum.

6. *ORIGANUM spicis longis pedunculatis aggregatis, bracteis longitudine calycum.*

Oregano de espigas largas, con pedunculo, agregadas; y bracteas de la longitud de los cálices.

Origanum heracleoticum, Cunila Gallinacea Plinii. C. B. P. 223. Tourn. p. 199.

Oregano heracleotico, Cunila de Gallinas, llamada asi por Plinio.

Origanum heracleoticum Matthioli, aliis forte Creticum. Bauh. hist. 3. part. 2. p. 237.

Oregano heracleotico de Mathiolo, acaso Oregano Cretico de otros autores.

Cast. Oregano heracleotico.

Habita en la Europa austral y en la Grecia. 24

Su traza es como la del Oregano silvestre; pero tiene las espigas del largo de un dedo y floxamente apiñadas. Se diferencia del Oregano de Creta por las bracteas que apenas son mas largas que los cálices; y por las espigas con pedunculo.

Vulgare.

7. *ORIGANUM spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis.* Fl. dan. t. 638. Sabb. hort. 3. t. 75. Mat. med. p. 174.

Oregano con espigas casi redondas, en panoja, conglomeradas; bracteas mas largas que el caliz y aovadas.

Ori-

650 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Origanum foliis ovatis, spicis laxis erectis confertis paniculatis. Hort. cliff. 305. X Oregano con hojas aovadas, espigas laxas, derechas amontonadas y en panoja.

Origanum foliis ovatis, umbellis coloratis, staminibus exertis. Hall. helv. n. 233. X Oregano con hojas aovadas; umbelas de color; y estambres que salen fuera.

Origanum sylvestre. C. B. P. 223. Tourn. p. 198. X Oregano silvestre.

Dod. pempt. 285. *Origanum sylvestre, seu vulgare.* Fuchs. hist. 522. X Oregano silvestre, ó vulgar.
Riv. monop. t. 60.

Cast. Oregano vulgar.
Habita entre peñas de Europa y Canadá: en el Real Sitio del Escorial, Aragon, Cataluña y otras muchas partes de España. ¶

Varía con las flores blancas.
PROPIED. *Es algo acre, amarga y olorosa: corroborante, abstergente, resolvente y estimulante: es muy util en la tós, asma, tisis, flogosis y edemas.*

Onites. 8. ORIGANUM *spicis oblongis aggregatis hirsutis, foliis cordatis tomentosis.* X Oregano de espigas oblongas, agregadas, con pelo áspero; hojas de figura de corazon y tomentosas.

Origanum lignosum, Syracusanum, perenne, umbellam amplissima, brevi lato nervoso folio. Bocc. mus. 2. X Oregano de Zaragoza de Sicilia, leñoso, perenne, con la umbela muy ancha; hoja corta, ancha y nerviosa.
P. 45. t. 38. Tourn. p. 199.

Origanum onites. C. B. P. 223. X Oregano de asno.

Genuina Græcorum Hysosopus. Lob. ic. 494. X Hisopo genuino de los Griegos.

Cast. Oregano de asno.
Habita en Zaragoza de Sicilia. ¶

Su habito es como el de la Mejorana, pero leñoso. Echa los tallos con pelos largos y extendidos: las hojas pequeñas, de figura de corazon, casi sentadas, agudas, con



CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 651

con alguna aserradura y tomentosas por ambas partes: las espigas amontonadas como en la *Mejorana*; pero oblongas, vellosas, y de tres en tres en cada pedunculo; con la *intermedia* sentada; y las flores blancas.

9. *ORIGANUM spicis longis ternatis pedunculatis villosis, foliis ovatis villosis.* Oregano de espigas largas, de tres en tres que salen de un mismo pedunculo, vellosas; hojas aovadas y tambien vellosas.

Majorana Syriaca, vel Cretica. C. B. P. 224.

Marum Syriacum. Lob. ic. 499.

Mejorana de Siria, ó de Creta.

Maro de Siria.

Cast. Oregano de Siria.

Habita.

Su traza es como la de la *Mejorana*. Tiene las hojas entre casi redondas y aovadas, agudas y salpicadas de pelos claros: los racimos que salen de las axilas: el corimbo terminal, compuesto de ramas mas largas y opuestas en forma de aspa; con tres espigas en todas partes, terminales, largas, derechas, de quatro lados y vellosas.

10. *ORIGANUM spicis hirsutis, foliis ovatis tomentosis sessilibus.* Oregano de espigas con pelo áspero; hojas aovadas, tomentosas y sin peciolo.

Majorana Cretica, Origanifolio, villosa, Satureia odore, flore purpurascente. Mejorana de Creta, con hoja como la del Oregano, vellosa, olor de Axedrea; y flor de color que tira á purpúreo.

Marum Creticum. Alp. exot. 289. t. 288,

Maro de Creta.

Cast. Oregano Maro.

Habita en Creta. 24

Su traza es como la de la *Mejorana*; pero más rígida. Posee las hojas sin peciolos manifiestos, muy crasas, tomentosas, aovadas y blanquecinas: el tallo de color que tira á purpúreo y salpicado de pelillos claros: las

ca-

652 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

cabezuelas con mucho pelo áspero, triternadas, las últimas sentadas y que terminan el tallo y ramas.

Majorana.

II. *ORIGANUM foliis ovalibus obtusis, spicis subrotundis compactis pubescentibus*. Hort. cliff. 304. Mat. med. 174.

Mejorana vulgaris. C. B.

P. 224. Tourn. p. 199.

Amaracus vulgator. Lob. ic. 498.

Majorana tenuifolia. C.

B. P. 224. Sabb. hort. 3. t. 78.

Oregano con hojas ovales, obtusas; espigas casi redondas, compactas y vellosas.

Mejorana vulgar.

Almoradux ó sea Mejorana mas vulgar.

Mejorana con hoja delgada.

Cast. Oregano Mejorana ó Almoradux.

Habita en Palestina y Portugal. \mathcal{L}

PROPIED. Es planta olorosa y algo amarga: tónica, resolvente, nervina, cefálica y estomática.

875. Género THYMUS. * Tourn. t. 93.

Acinos. Dill. gen. 4.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, tubulado, persistente: su garganta cerrada con pelillos, y medio hendido en dos labios; el superior mas ancho, plano, derecho y con tres dientes; y el inferior con dos cerdas de igual longitud.

COR. de un petalo, boquiabierta: tubo del largo del caliz: garganta pepueña; el labio superior mas corto, plano, derecho, escotado y obtuso; el inferior mas largo, extendido, mas ancho, obtuso y hendido en tres lacinias, con la del medio mas ancha.

ESTAMB. Filamentos quatro, encorvados, de los cuales dos son mas largos: con las anteras pequeñas.

PIST. Germen dividido en quatro partes: estilo filiforme: con el estigma hendido en dos lacinias agudas.

PE-

PERIC. ninguno : el caliz angostado por el cuello fomenta las semillas en su seno.

SEM. quatro , pequeñas y casi redondas.

OBS. El Tomillo de Tournefort tiene los estambres muy cortos.

El Sérpol del mismo Autor se diferencia del Tomillo por los tallos leñosos , menos duros y mas baxos.

El Acinos de Rivino y de Dillenio posee el labio inferior de la corola con la lacinia del medio escotada.

La Mastichina de Boerhave produce los dientes del caliz extendidos en cerdas larguissimas y vellosas.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 196.

La flor es de un petalo ; cuyo labio superior se halla levantado y hendido en dos partes , y el inferior partido en tres. Del caliz sale el pistilo acompañado de quatro embriones , que pasan á otras tantas semillas , recogidas en una capsula , que fue caliz de la flor. A estas notas se añaden las de los tallos duros , leñosos , y de las flores recogidas en cabezuela.

E S P E C I E S .

- I. THYMUS floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. Mat. med. 175. Tomillo con flores en cabezuela ; tallos rastreros; hojas planas , obtusas y pestafiosas por su base.
- Thymus repens , foliis planis , floribus verticillato-spicatis. Hort. cliff. 306. Tomillo rastrero , con hojas planas ; flores entre en verticilo y espigadas.
- a Serpillum vulgare , majus (vel minus). C. B. P. 220. Sérpol vulgar , mayor (ó menor). x
- Tourn. p. 197. Sabb. hort. 3. t. 69.
- Serpillum vulgare. Dod. Sérpol vulgar.
- pempt. 277. Bauh. hist. 3. part. 2. p. 269.
- b Serpillum vulgare , minus , capitulis lanuginosis. Sérpol vulgar , menor , con cabezuelas lanuginosas. β
- C. B. P. 220. Tourn. p. 197.

654 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

- Serpillum angustifolium*, X Sérpol de hoja angosta,
 x *hirsutum* (vel *glabrum*). C. X con pelo áspero (ó *lampi-*
 B. P. 220. Tourn. p. 197. X ño). x
 d *Serpillum foliis Citri odo-* Sérpol de hojas con olor
 re. C. B. P. 220. Tourn. p. X como el del Cidro. d
 197. X

Cast. Tomillo Sérpol.

Habita en Europa : en los contornos de Madrid : en Cata-
 luña , Aragon , y otras muchisimas partes de España. 2/

Tiene los *dientes del caliz* pestañosos ; y los *estambres* de
 la longitud de la corola.

Varía con los *estambres* mas cortos ó mas largos que la co-
 rola , y en ser esta mas ó menos grande.

PROPIED. *Es olorosa y estiptica , resolvente , estimulante*
y tónica : se usa en la cefalalgia y afectos uterinos.

- Vul- 2. THYMUS *erectus*, fo- X Tomillo derecho , con ho-
 garis. *liis revolutis ovatis , flori-* X jas revueltas , y aovadas ;
bus verticillato—spicatis . X flores entre en verticilo y es-
 Mat. med. 175. X pigadas.

Thymus vulgaris, *folio* X Tomillo vulgar , con hoja
tenuiore. C. B. P. 219. To- X mas delgada.
 urn. p. 196.

α *Thymus vulgaris*, *folio* X Tomillo vulgar , con hoja
latiore. C. B. P. 219. Tourn. X mas ancha. α
 p. 196. Sabb. hort. 3. t. 68.

Thymum durius . Dod. X Tomillo mas duro.
 pempt. 276.

β *Thymus supinus*, *candi-* X Tomillo echado , oloroso,
cans, odoratus. Tourn. p. 196. X y de color que tira á cándi-
 do. β

x *Thymus capitulis minori-* X Tomillo de Marsella , con
bus, Massiliensis. Tournef. X las cabezuelas mas peque-
 p. 196. X ñas. x

Cast. Tomillo vulgar.

Habita en la Siberia : abunda en la Francia Narbonense :
 en Cataluña , Aragon , Castilla la vieja y otras partes
 de España. 2/

PROPIED. *Es planta olorosa , resolvente , estimulante , ex-*
pe-

pelente , nervina , corroborante , tónica , estomática y emenagoga.

Zygis.

3. THYMUS *floribus verticillato-spicatis, caule suffruticoso erecto, foliis linearibus basi ciliatis.* Tomillo con flores entre en verticilo y espigadas ; tallo sufruticoso, derecho ; hojas lineares y por su base pestañosas.

Thymo vulgatori rigidiore simile. B. hist. 2. p. Tomillo semejante al mas vulgar y mas rígido.

371.

Thymum angusto longioreque folio. Barr. ic. 777. Tomillo con hoja angosta y mas larga.

Serpillum sylvestre, folio Zygis Dioscoridis. Clus. hist. 1. p. 358. Sérpol silvestre , con hoja como la del Zygis de Dioscorides.

Thymbra Hispanica, Corisidii folio. Tourn. p. 197. Thimbra de España , con hoja como la del Coris.

Cast. Tomillo Zygis. vulgo : Tomillo salsero.

Habita en las cercanias de Madrid y en varias partes de Castilla la vieja. ¶

Su traza es como la del Tomillo vulgar. Produce el tallo sufruticoso , derecho y baxo , con muchas ramas , encorvadas antes de florecer : las hojas lineares , revueltas longitudinalmente , vellosas por encima y roxas por debaxo : los peciolo pestañosos : los cálices de dos labios ; y la corola blanca igualmente que los estambres.

PROPIED. Tiene las mismas que las del Tomillo vulgar.

Aci- nos.

4. THYMUS *floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis subramosis, foliis acutis serratis.* Fl. Suec. p. 478. Tomillo con flores en verticilo ; pedunculos de una flor ; tallos derechos , algo ramosos ; hojas agudas y aserradas.

Clinopodium foliis ovatis, dentatis, flore folio breviorre. Hall. helv. 237. Clinopodio de hojas aovadas , con dientes ; y flor mas corta que la hoja.

Clinopodium arvense, Oxy-mi facie. C. B. P. 225. Tourn. p. 195. Clinopodio arvense , con traza como la de la Albahaca.

Oxy-

656 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Ocimum sylvestre, *Acinos*. Dod. pempt. 280. X Albahaca silvestre, llamada Acinos.
Acinos. Riv. monop. t.43. X Acinos.

Cast. Tomillo Acinos.

Habita en lugares secos, pedregosos y gredosos de Europa: en los circuitos de Madrid: en Castilla la vieja, Mancha, Aragon, Cataluña y otras muchas partes de España. ☉

Alpinus. 5. *THYMUS verticillis sexfloris, foliis obtusiusculis concavis subserratis*. X Tomillo con verticilos de seis flores; hojas algo obtusas, cóncavas y un poco aserradas.
 Jacq. austr. t. 97.

Clinopodium foliis ovatis, acutis, serratis, flore folio majori. Hall. helv. n. 238. X Clinopodio con hojas aovadas, agudas, aserradas; y flor mas grande que la hoja.

Clinopodium montanum. X Clinopodio montano.

C. B. P. 225. Tourn. p. 195.

Bocc. mus. 2. p. 50. t. 45.

Clinopodium Austriacum. X Clinopodio de Austria.

Clus. hist. 3. p. 353.

Acini pulchra species. X Especie hermosa de Acinos.

Bauh. hist. 3. p. 620.

Cast. Tomillo alpino.

Habita en los alpes de Suiza, de Austria y en Mompeller: en los Reales Sitios de Aranjuez y de San Ildefonso: en la Cartuja del Paular de Segovia: montes de Burgos, Alcarria y otras partes de España. ☉

Es muy parecida á la especie antecedente; pero mayor, con las flores tres veces mas grandes, pedunculadas, y de tres en tres ó de quatro en quatro á cada lado.

pipe- 6. *THYMUS pedunculis multifloris lateralibus, foliis ovatis obtusis glabris nervosis integerrimis*. X Tomillo de pedunculos con muchas flores, laterales; hojas aovadas, obtusas, lampiñas, nerviosas y enterisimas.
 Syst. veg. p. 453.

Marum Hispanicum, nigrum. Bocc. mus. 2. p. 166. X Maro negro, de España.

t. 117. Barr. ic. 354. t. 694. X

Cast.

Cast. Tomillo piperela.

Habita en España.

Es semejante á la *Melisa Nepeta*; pero lampiña y con hojas menudas.

Ce-
phalo-
tus. 7. THYMUS capitulis imbricatis magnis, bracteis ovatis, foliis lanceolatis.

Thymus Lusitanicus, cephalotos, squamis capitulorum amplioribus, Tourn.

P. 196.

Tragoriganum Dictamni capite, Hispanicum. Barr. ic. 787. Bocc. mus. 2. p. 50. t. 43.

α *Thymus Lusitanicus*, cephalotos, capitulo majori (vel minori). Tourn. p. 196.

Tomillo con cabezuelas apañadas, grandes; bracteas aovadas; y hojas lanceoladas.

Tomillo de Portugal, con flores en cabezuelas, y escamas de ellas mas anchas.

Tragorigano de España, con cabezuela como la del Dictamo.

Tomillo de Portugal, con flores en cabezuela mas grande (ó mas pequeña). α

Cast. Tomillo de cabezuela.

Habita en Portugal: en el Reyno de Valencia, Andalucia y otras partes de España. 24

Villo-
sus. 8. THYMUS capitulis imbricatis magnis, bracteis dentatis, foliis setaceis pilosis.

β *Thymus Lusitanicus*, folio capillaceo, villosa, capite magno, purpurascete, oblongo (vel rotundo). Tourn. p. 196.

Tomillo de cabezuelas apañadas, grandes; bracteas con dientes; hojas setáceas y pelosas.

Tomillo de Portugal, con hoja capilar, vellosa; cabezuela grande, de color que tira á purpureo, y oblonga (ó redonda). β

Cast. Tomillo vellosa.

Habita en Portugal. 24

Misti-
china. 9. THYMUS floribus verticillatis, calycibus lanuginosis, dentibus calycinis setaceis villosis. Hort. cliff. 306.

Tomillo de flores en verticilo; cálices lanuginosos, con sus dientes setáceos y vellosos.

658 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBAES,

Sampsucus seu Marum X Mejorana ó Maro que hue-
Mastichen redolens. C. B. X le mucho á Almastiga.
 P. 224.

Thymbra Hispanica, Ma- X Thymbra de España, con
loranae folio. Tourn. p. 197. X hoja como la de la Mejorana.

Marum vulgare, seu Cli- X Maro vulgar, ó Clinopo-
nodium. Dod. pempt. 197. X dio.

Cast. Tomillo mastichino.

Habita en la Real Casa de Campo, en el Real Sitio del Pardo: en las Sierras de Villarroya y montes de Rodena en Aragon: en la Mancha y otras partes de España en terrenos pedregosos. ¶

Tiene muchos *verticilos* apartados: la *corola* blanca, del largo del caliz: el *estilo* mas largo que la corola; y los *estambres* en el fondo de ella.

Tragoriganum.

10. THYMUS *floribus* X Tomillo con flores en ver-
verticillatis, caule suffruticoso erecto, foliis hispidis acuminatis. X ticilo; tallo sufruticoso, derecho; hojas erizadas y puntiagudas.

Tragoriganum Creticum. X Tragorigano de Creta.
 C. B. P. 223. Rai. hist. 1. X
 p. 523.

Tragoriganum magnum. X Tragorigano grande.
 Alp. exot. 79. t. 78.

Tragoriganum II. altera X Tragorigano segundo, otra
species. Clus. hist. 1. p. 355. X especie.

Cast. Tomillo tragorigano ó sea Oregano de macho cabrío.

Habita en Creta. ¶

Es *planta* de olor suave. Echa los *tallos* con pelo áspero y del largo de un pie: las *hojas* agudas en ambas partes y algo rígida.

Virginicus.

11. THYMUS *capitulis* X Tomillo con cabezuelas
terminalibus, caule erecto, X terminales; tallo derecho; y
foliis lanceolatis. Syst. veg. X hojas lanceoladas.

P. 453.

Satureia Virginiana. Sp. X Satureia de Virginia.
 pl. 2. p. 793. Herm. par. 218. X
 t. 218.

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 659

Pulegium erectum, *Virginianum*, *angustifolium*, *floribus in cymis dispositis*. Poleo de Virginia, levantado, con hoja angosta; y flores dispuestas en cimas.
Moris. hist. 3. p. 371. sect.

11. t. 7. f. 8.

Clinopodium Pulegii angusto rigidoque folio, *Virginianum*, *flosculis in cymis dispositis*. Pluk. alm. Clinopodio de Virginia, con hoja como la del Poleo, angosta y rígida; y florecitas dispuestas en cimas.

110. t. 54. f. 2.

Serpentaria Virginiana. Serpentaria de Virginia.
Bocc. mus. 2. p. 161. t. 115.

Cast. Tomillo de Virginia.
Habita en la Virginia. 24

876. Género MELISSA. * *Tourn. t. 91.*

Calamintha. Tourn. t. 92.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, casi á manera de campana, árido y membranoso, algo extendido, angulado, es-triado, persistente y hendido en dos labios: el *superior* con tres dientes, plano ó entre redoblado y extendido: el *inferior* mas corto, algo agudo y dividido en dos partes.

COR. de un *petalo*, boquiabierta: *tubo* cilindráceo: *garganta* abierta: *labio superior* mas corto, derecho, arqueado, casi redondo y hendido en dos partes: el *inferior* hendido en tres lacinias, con la del medio mayor y de figura de corazon.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, alesnados, de los cuales dos son de la longitud de la corola, y los otros dos la mitad mas cortos: con las *anteras* pequeñas y arrimadas entre sí por pares,

PIST. *Germen* hendido en quatro partes: *estilo* filiforme, del largo de la corola, inclinado junto con los estambres debaxo del labio superior de la corola: con el *estigma* delgado, hendido en dos partes y redoblado.

660 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

PERIC. ninguno: el *caliz* mas crecido y sin mudarse forma las semillas en su seno.

SEM. quatro y aovadas.

CARACTERES GENERICOS DE TOURNEFORT.

MELISSA. p. 193.

La *flor* es de un petalo, labiada; cuyo labio superior se halla levantado, casi redondo y hendido en dos partes; pero el inferior partido en tres. Del caliz sale el pistilo acompañado de quatro embriones, que pasan á otras tantas semillas, casi redondas, recogidas en una capsula, que fue caliz de la flor. A estas notas se añaden las de las flores que nacen en las axilas de las hojas, y no enteramente en verticilo.

CALAMINTHA. p. 193.

La *flor* es de un petalo, labiada; cuyo labio superior se halla levantado, casi redondo y hendido en dos partes; pero el inferior en tres. Del caliz sale el pistilo acompañado de quatro embriones, que pasan á otras tantas semillas, casi redondas, recogidas en una capsula, que fue caliz de la flor. A estas notas se añaden las de las flores que nacen en las axilas de las hojas, y sentadas en piecitos ramosos.

ESPECIES.

- | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Offi-
nalis. | 1. MELISSA <i>racemis</i> X | Melisa de racimos axila- |
| | <i>axillaribus verticillatis, pe-</i> res, verticilados, y con pie- | |
| | <i>dicellis simplicibus.</i> Sabb. X cecitos sencillos. | |
| | hort. 3. t. 61. Mat. med. 175. | |
| | <i>Melissa foliis cordatis,</i> | Melisa con hojas de figu- |
| | <i>serratis, petiolis foliis bre-</i> ra de corazon, aserradas; | |
| | <i>vioribus.</i> Hall. helv. n. 242. X y peciolos mas cortos que | |
| | | ellas. |
| | <i>Melissa hortensis.</i> C. B. X | Melisa hortense. |
| | P. 229. Tourn. p. 193. Riv. X | |
| | monop. t. 45. | |
| | <i>Melissa vulgaris, odore</i> X | Melisa vulgar, con olor |
| | <i>Citri.</i> Bauh. hist. 3. p. 232. X de Cidro. | |
| | <i>Melissa.</i> Dod. pempt. 91. X | Melisa. |

Cast.

Cast. Melisa oficial.

Habita en los montes de Ginebra, de Saboya é Italia: en la Sierra de Miraflores: montes de Avila, de Aragon y Cataluña. ¶

PROPIED. Echa el olor como el de la corteza de Cidro: es resolvente, estimulante, expelente, cordial, tónica, emenagoga, y diuretica: se usa en la melancolia, hypochondria, histerico y palpitations.

Grandiflora.

2. MELISSA *pedunculis axillaribus dichotomis longitudine florum.* Melisa con los pedunculos axilares, ahorquillados, y de la longitud de las flores.

Thymus racemis lateralis, sparsis, corollis calyce triplo longioribus. Scop. Tomillo con racimos laterales, esparcidos ó sea sin orden; y corolas tres veces mas largas que el caliz.

Calamintha magno flore. C. B. P. 229. Riv. monop. Calaminta con la flor grande.

43. Tourn. p. 194.

Calamintha montana, praes-tantior. Lob. ic. § 12. Calaminta montana, mas excelente.

Cast. Melisa de flor grande.

Habita en los montes de Toscana: en los de nuestra Sierra de Monserrat, Moncayo, faldas de los montes Pirineos de Cataluña, y otras partes de España. ¶

Calaminta.

3. MELISSA *pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum.* Mat. med. Melisa con los pedunculos axilares, ahorquillados, y del largo de las hojas.

Melissa foliis subhirsutis, ovato-lanceolatis, acutis serratis, petiolis florigeris ramosis, folia superantibus. Hall. helv. n. 241. Melisa de hojas con algun pelo áspero, entre aovadas y lanceoladas, agudamente aserradas; piececitos que llevan las flores ramosos, y mas altos que las hojas.

Thymus racemis lateralis, secundis, foliis ovatis, serratis. Scop. carn. ed. I. Tomillo con racimos laterales, ladeados; hojas aovadas y aserradas.

P. 457. n. 4.

Ca.

662 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Calamintha vulgaris, vel *officinarum Germaniæ*. C. las oficinas de Alemania.
B. P. 228. Tourn. p. 194.

Calamintha flore magno, vulgaris. Bauh. hist. 3. part. la flor grande.
2. p. 228.

Calamintha montana. Dod. Calaminta montana.
pempt. 98. Riv. monop. t. 46.

Cast. Melisa calaminta.

Habita en lugares peñascosos de Italia, Francia, Suiza y Austria: en los circuitos de Madrid, Aragon, Cataluña; y es frecuente en las mas provincias de España. \mathcal{P}
PROPIED. Tiene el olor como el de la precedente, aunque mas débil: es resolvente, expelente, expectorante, estomática; y se usa en el asma.

Ne- 4. MELISSA *pedunculis* Melisa de pedunculos axi-
peta. *axillaribus dichotomis folio* lares, ahorquillados, mas
longioribus, caule adscen- largos que la hoja; y tallo
dente hirsuto. ascendente, con pelo áspero.

Melissa foliis hirsutis, Melisa de hojas con pelo
ovato-lanceolatis, serratis, áspero, entre aovadas y lan-
petiolis florigeris ramosis, ceoladas, aserradas; piececi-
folia superantibus. Hall. helv. tos que llevan las flores ra-
n. 240. mosos, y mas altos que las
hojas.

Calamintha Pulegii odore, Calaminta ó Nepeta con
sive Nepeta. C. B. P. 228. olor de Poleo.
Tourn. p. 194.

Calamintha flore minore, Calaminta con la flor mas
odore Pulegii. Bauh. hist. 3. pequeña, y olor de Poleo.
p. 229.

Pulegium sylvestre, sive Poleo silvestre, ú otra
Calamintha altera. Dod. Calaminta.
pempt. 98.

α *Calamintha montana, præ-* Calaminta montana, muy
alta, Pulegii odore. Bocc. alta, con olor como el del
mus. 2. p. 45. t. 40. & 38. Poleo. α
Riv. monop. t. 47. Tourn.
p. 194.

Cast.

Cast. Melisa Nepeta.

Habita en tierras pedregosas de Italia, Francia, Inglaterra y Suiza: en Extremadura, Cataluña, Valencia, Aragon y otras partes de España.

Tiene los tallos algo duros y con pelo áspero como toda la planta: las hojas casi de figura de corazón, y lampiñas por encima: las brácteas alesnadas: la corola algo cerúlea con su paladar ribeteado, blanco y cerúleo.

Creta.

5. MELISSA *racemis terminalibus, pedunculis solitariis brevissimis.*

Calamintha incana, Ocy-mi foliis. C. B. P. 228. Tourn. p. 194.

Calamintha Pulegii odore, minor. Barr. ic. 1166

Calamintha folio & flore parvo, incana. Bauh. hist. 3. part. 2. p. 230.

Melisa con racimos terminales; pedunculos solitarios y cortísimos.

Calaminta blanquecina, con hojas como las de la Albahaca.

Calaminta menor, con olor de Poleo.

Calaminta blanquecina, con hoja y flor pequeñas.

Cast. Melisa de Creta.

Habita en Mompeller: en el Reyno de Valencia y en el campo de Tarragona término llamado *Alta fulla*.

Es semejante á la *Melisa Nepeta*. Arroja el tallo baxo, recto, y de color entre negro y purpúreo: las hojas ovadas, con pocas aserraduras y obtusas: muchos verticilos formados de pedunculos de una flor, sin hojuelas y que terminan las ramas á manera de racimo; con brácteas lanceoladas: los cálices de color obscuro: y las corolas entre blancas y purpúreas.

Fruticosa.

6. MELISSA *ramis attenuatis virgatis, foliis subtus tomentosis, caule fruticoso.*

Melissa caule fruticoso, racemis verticillatis. Roy. lugdb. 321.

Melisa con ramas adelgazadas, en varitas; hojas tomentosas por debaxo; y tallo fruticoso.

Melisa con el tallo fruticoso; y racimos verticilados.

664 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Calamintha Hispanica, \times Calaminta de España, frutrescens, *Mari folio*. To- \times tescente, con hoja como la urn. p. 194. \times del Maro.

Cast. Melisa fruticosa.

Habita en el circuito de Barcelona, camino de Orta: en Ricla, Montalbán y Segura de Aragon. ♂

Tiene los tallos blanquecinos, y del largo de un pie; las hojas que de aovadas tiran á la figura de rombo y tomentosas: las flores pequeñas y de color purpúreo claro.

Synops. pl. Arag. p. 78.

877. Género DRACOCEPHALUM. * *Tourn. t. 83.*

Hire. Aët. Gal. 1712. t. 11. Moldavica,

Tourn. t. 85.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, tubulado, persistente y muy corto.

COR. de un petalo, boquiabierto: tubo de la longitud del caliz: garganta muy grande, oblonga, inflada, abierta y algo comprimida por su dorso: el labio superior recto, arqueado, plegado y obtuso: el inferior hendido en tres lacinias; con las laterales derechas, y como si fuesen lacinias de la garganta; la intermedia que cuelga, pequeña, y que ácia adelante sobrepuja por su base, casi redonda y escotada.

ESTAMB. Filamentos quatro, alesnados, recogidos debaxo del labio superior de la corola, de los quales dos son poco mas cortos: con las anteras casi de figura de corazon.

PIST. Germen dividido en quatro partes: estilo filiforme, y de la direccion de los estambres: con el estigma hendido en dos partes agudas, delgadas y redobladas.

PERIC. ninguno: el caliz fomenta en su fondo las semillas.

SEM. quatro, entre aovadas y oblongas, y de tres caras.

OBS. El *Dracocephalo* de *Tournef.* tiene el caliz tubuloso, encorvado, con cinco dientes, é igual.

La

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 665

La *Moldavica* del mismo *Tournef.* posee el caliz ventricoso, coartado por el cuello, y con dos labios; el superior mas ancho, hendido en tres partes; el inferior mas pequeño, mas agudo y partido en dos lacinias.

CARACTERES GENERICOS DE *TOURN.*
DRACOCEPHALON. p. 181.

La flor es de un petalo, labiada; cuyo labio superior es en forma de capacete; y el inferior dividido en tres partes, que rematan en una garganta como si fuesen una especie de cabeza de dragon. Del caliz sale el pistilo acompañado de quatro embriones, que pasan á otras tantas semillas, recogidas en una capsula, que fue caliz de la flor.

MOLDAVICA. p. 184.

La flor es de un petalo, labiada; cuyo labio superior es algo arqueado, hendido en dos partes, y doblado ácia arriba; el inferior igualmente hendido en dos partes y los dos rematan en una garganta ribeteada. Del caliz tubuloso, y cortado en dos labios desiguales sale el pistilo acompañado de quatro embriones, que pasan á otras tantas semillas, recogidas en una capsula, que fue caliz de la flor.

ESPECIES CON LAS FLORES EN ESPIGA.

- | | | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Vir-
ginia-
num. | I. DRACOCEPHALUM X | Dracocefalo con flores en espiga; hojas lanceoladas y aserradas. |
| | <i>floribus spicatis, foliis lanceolatis serratis.</i> Sabb. hort. | |
| | 3. t. 26. | |
| | <i>Dracocephalum.</i> Breyn. ic. | Dracocefalo. |
| | 33. t. 27. Hire act. 1712. p. | |
| | 276. t. II. | |
| | <i>Dracocephalus angustifolius, folio glabro, serrato.</i> | Dracocefalo de hoja angosta, lampiña y aserrada. |
| | Moris. hist. 3. p. 407. sect. | |
| | II. t. 4. f. 1. | |

Pseu-

666 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Pseudo-Digitalis, Persi- X Falsa-Dedalera, con hojas
æ foliis. Bocc. sic. 12. t. 6. X como las del Persico.
 f. 3.

Digitalis Americana, X Dedalera Americana, con
purpurea, foliis serratis. X la flor purpúrea; y hojas
 Dodart. mem. 272. X aserradas.

Lysimachia galericulata, X Lysimachia del Canadá,
spicata, purpurea, Cana- X de flores con capacete, en
densis. Barr. ic. 1152. X espiga, y de color purpúreo.

Dracocephalon America- X Dracocefalo de America.
num. Tourn. p. 181. X

Cast. Dracocefalo de Virginia.

Habita en la America Septentrional. ♀

Canariense. 2. DRACOCEPHALUM X Dracocefalo con flores en
floribus spicatis, foliis com- X espiga; y hojas compuestas.
positis. Hort. cliff. 308. Mat.
 med. 176.

Dracocephalo affinis, X Planta de America, pare-
Americana, trifoliata, Te- X cida al Dracocefalo, con ho-
rebinthinæ odore. Volk. no- X jas de tres en rama, y olor
 rib. 145. t. 145. X de Trementina.

Camphorosma. Moris. hist. X Canforosma.
 3. p. 366. sect. 11. t. 11. fig.
 ultima.

Melissa forte Canariana, X Melisa acaso de Canarias,
triphyllos, odorem Campho- X con tres hojuelas; y que des-
ræ spirans penetrantissi- X pide el olor muy penetrante
mum. Pluk. alm. 401. t. 315. X de Alcanfor.
 f. 5. Sabb. hort. 3. t. 27.

Cedronella Canariensis, X Cedronela de Canarias,
viscosa, foliis plerumque X viscosa, con hojas que las
ex eodem pedicello ternis. X mas veces salen de tres en
 Comm. hort. 2. p. 81. t. 41. X tres de un mismo piececito.

Moldavica Americana, X Moldavica de America,
trifolia, odore gravi. Tourn. X con hojas de tres en rama, y
 p. 184. X olor pesado.

Cast. Dracocefalo de Canarias. Farm. *Melissa Canariensis.*

Habita en las Canarias y America. ♀

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 667

PROPIED. Despide el olor de Trementina, acercandose al de Alcanfor: es nervina y resolvente: se usa en la cachexia y cefalalgia.

3. DRACOCEPHALUM
floribus spicatis, foliis cordatis pinnato-sinuatis.

Dracocefalo con flores en espiga; hojas de figura de corazon, entre pinnadas y sinuosas.

Dracocephalum floribus ex verticillato-spicatis, foliis cordatis, sinuato-pinnatifidis. Gmel. sib. 3. p. 235. n. 58. t. 52.

Dracocefalo con flores entre verticiladas y en espiga; hojas de figura de corazon, entre sinuosas y hendidas al través.

Dracocephalum foliis pinnato-sinuatis obtusis, floribus spicatis (spicæ?) villosis coloratis. Hort. ups. 165.

Dracocefalo con hojas entre pinnadas y sinuosas, obtusas; y las florales espigadas, (las de la espiga?) vellosas, y de color.

Cast. Dracocefalo pinnado.

Habita en Jerkatsch. Steller. Gmel. \bar{n}

Produce los tallos fruticosos y tendidos: las hojas de figura de corazon, obtusas, hendidas al través, con sus lóbulos ó lacinias apartadas, y peciolo largo: la espiga como la del *Melampyro arvense*; con bracteas lanceoladas, entre dentadas y setáceas, y comunmente de color roxo: las corolas pequeñas; con los estilos al doble mas largos que las flores.

4. DRACOCEPHALUM
floribus subspicatis, foliis caulinis ovato-oblongis incis, bracteis lineari-lanceolatis, denticulato-spinosis. Gmel. sib. 3. p. 237.

Dracocefalo con flores casi en espiga; hojas del tallo entre aovadas y oblongas, cortadas; bracteas entre lineares y lanceoladas, y con dientecitos espinosos.

Dracocephalum floribus oppositis, bracteis lanceolatis integerrimis, foliis lanceolatis mucronatis dentatis. Amoen. acad. 4. p. 318.

Dracocefalo de flores opuestas; bracteas lanceoladas, enterisimas; hojas tambien lanceoladas que rematan en punta rígida y dentadas.

Cast. Dracocefalo peregrino.

Ha-

668 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,
Habita en la Siberia. 26

- Aus-
 tria-
 eum. 5. DRACOCEPHALUM X Dracocefalo con flores en
floribus spicatis, foliis brac- X espiga; hojas y bracteas li-
teisque linearibus partitis X neares, partidas y espinosas.
spinosis.
Hyssopus Austriacus, X Hisopo de Austria, con la
magno flore, folio Chamæpi- X flor grande; y hoja como la
thyos. Herm. lugdb. 330. X del Camepitys.
Ruyschiana hirsuta, foliis X Ruyschiana con pelo áspe-
laciniatis. Amm. ruth. 50. X ro; y hojas laciniadas.
Chamæpithys cærulea, X Camepitys de Austria;
Austriaca. C. B. P. 250. X con la flor cerúlea.
Chamæpithys Austriaca. X Camepitys de Austria.
Clus. hist. 2. p. 185. X

Cast. Dracocefalo de Austria,
Habita en Austria. 26

- Ruys-
 chia-
 na. 6. DRACOCEPHALUM X Dracocefalo con flores en
floribus spicatis, foliis brac- X espiga; hojas y bracteas lan-
teisque lanceolatis indivisis X ceoladas, indivisas y sin aris-
muticis. Flor. dan. t. 121. X ta ó espina.
Dracocephalus foliis ellip- X Dracocefalo con hojas
ticis, fasciculatis, verticil- X elípticas, en hacecillo; ver-
lis spicatis, bracteis ovato- X ticilos espigados; y bracteas
lanceolatis. Hall. helv. n. X entre aovadas y lanceoladas.
 254.
Ruyschiana flore cæruleo, X Ruyschiana con la flor
magno. Boerh. lugdb. 1. p. X grande, y de color cerúleo.
 172. Zanon. nou. t. 146.
Pseudo-Chamæpithys Aus- X Falso-Camepitys de Aus-
triaca. Riv. monop. t. 146. X tria.
Prunella Hyssopi folio, X Prunela con hoja como la
viridi, amplo flore cæruleo. X del Hisopo, verde; flor an-
 Moris. hist. 3. p. 364. sect. X cha y de color cerúleo.
 11. t. 5. f. 9. X

Cast. Dracocefalo Ruyschiano.
Habita en la Siberia, Suecia, Suiza y Dinamarca. 26

ESPECIES CON FLORES EN VERTICILO.

7. DRACOCEPHALUM *Dracocephalo con flores en verticilo ; hojas aovadas, entre cortadas y hendidas en festones ; bracteas lanceoladas y enterisimas.*
floribus verticillatis, foliis ovatis inciso-crenatis, bracteis lanceolatis integerrimis.
 Syst. pl. tom. 3. p. 88. Laxman. act. petrop. v. XV. p. 555. t. 29. f. 2.

Dracocephalum foliis crenatis, radicalibus cordatis, caulinis orbiculatis sessilibus, bracteas acuminatodentatis. Suppl. p. 274. Dracocefalo con hojas recortadas, las radicales de figura de corazon, las del tallo redondas, sin peciolo; y bracteas puntiagudas y dentadas.

Dracocephalum (altaiese) foliis crenatis, radicalibus cordatis, caulinis orbiculatis sessilibus, bracteas laciniatis oblongis. Laxman. nov. act. petrop. vol. XV. p. 556. t. 29. f. 3. Syst. pl. tom. 3. p. 89. Dracocefalo con hojas recortadas, las radicales de figura de corazon, las del tallo redondas, sin peciolo; bracteas laciniadas y oblongas. "

Cast. Dracocefalo de flor grande.

Habita en los alpes de Siberia. 4

Tiene las *hojas* aovadas, ú ovals, profunda y obtusamente aserradas y desnudas; las del *tallo* con tres nervios; y las *florales* enterisimas: las *bracteas* lanceoladas, enterisimas, pequeñas y salpicadas de pelos: la *corola* muy grande y de color cerúleo. Syst. plant. tom. 3. p. 88.

Produce los *tallos* del largo de medio pie, con cuatro lados, muy sencillos y algo vellosos: las *hojas radicales* como las de la *Betonica*, pecioladas, de figura de corazon, obtusas, obtusamente aserradas, rugosas y con vello: las *hojas del tallo ó superiores*, casi en forma de cuña, redondeadas, muy obtusas y con festones como dientes: las *bracteas* de dos en dos en cada lado, muy obtusas, de la longitud del caliz, entre puntiagudas y dentadas; á mas

670 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

mas de otras *dos bracteas* menudas y lanceoladas, de las flores laterales: los *verticilos* con flores de tres en tres, en cada lado: los *cálices* con pedunculo corto, tubulosos, hendidos en cinco dientes, y los tres superiores menos divididos: la *corola* grande y de color cerúleo: la *garganta* muy inflada, con una estria elevada en cada lado de su dorso: el *labio superior* hendido en dos lacinias y obtuso: el *inferior* hendido en tres, con la del medio mas grande, de color entre negro y cerúleo, redoblada, y con pelos en su ápice: quatro *estambres* recogidos debaxo del labio superior, con las *anteras* oblongas; y dos *estigmas* agudos. Las *bracteas* y *hojas florales* de la variedad α son de color que tira á purpúreo. *Suppl.* p. 274.

Sibi-
ricum.

3. DRACOCEPHALUM X Dracocefalo con flores la-
floribus subverticillatis, pe- deadas, casi en verticilo;
dunculis bifidis secundis, X pedunculos hendidos en dos
foliis cordato-oblongis acu- partes; hojas entre de figura
minatis nudis. X de corazon y oblongas, pun-
tiagudas y desnudas.

Dracocephalum verticil- X Dracocefalo con verticilos
lis pedunculo communi ele- elevados por un pedunculo
vatis, secundis. Gmel. Sib. X comun y ladeados.

3. p. 234. n. 51.
Nepeta corymbis geminis, X Nepeta de corimbos me-
pedunculatis axillaribus, fo- llizos, con pedunculo, axi-
liis cordato-oblongis acumi- lares; hojas entre de figura
natis serratis. Hort. ups. X de corazon y oblongas, pun-
164. X tiagudas y aserradas.

Cataria montana, foliis X Cataria montana, con ho-
Veronicæ pratensis. Buxb. X jas como las de la Veronica
cent. 3. p. 27. t. 50. f. 1. X pratense.

Cast. Dracocefalo de Siberia.

Habita en la Siberia. 26

Tiene la *garganta* de la *corola* ancha y casi inflada: el *labio superior* comprimido y hendido en dos partes: el *inferior* con dientecitos y veloso por delante; y los *dos estambres superiores* con pelo áspero por su base.

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 671

9. DRACOCEPHALUM Dracocefalo de flores en
verticilo ; bracteas lanceola-
das , y con aserraduras capi-
láceas.
*floribus verticillatis , brac-
teis lanceolatis , serraturis
capillaceis.* Mat. med. 177.

*Dracocephalum floribus
verticillatis , foliis ex ova-
to-lanceolatis , bracteis lon-
ge ciliatis.* Gmel. Sib. 3. Dracocefalo de flores en
verticilo ; hojas que de aova-
das tiran á lanceoladas ; y
bracteas con pestañas largas.
P. 230.

*Melissa peregrina , folio
oblongo.* C. B. P. 229. Melisa peregrina , con ho-
ja oblonga.

*Moldavica Betonica folio,
flore cœruleo.* Tourn. p. 184. Moldavica con hoja como
la de la Betonica ; y flor ce-
rúlea.

*Melissa Tursica , multis
dicta.* Bauh. hist. 3. part. 2. Melisa de Turquía , lla-
mada así por muchos autores.
P. 234. Tabern. ic. 255.

Melissa Moldavica. Cam. Melisa de Moldavia.
epit. 576.

Cast. Dracocefalo de Moldavia.

Habita en Moldavia y Siberia. ☉

PROPIED. Es olorosa , nervina y resolvente.

10. DRACOCEPHALUM Dracocefalo de flores en
verticilo ; bracteas oblongas,
con aserraduras espinosas ; y
hojas algo tomentosas.
*floribus verticillatis , brac-
teis oblongis , serraturis spi-
nosis , foliis subtomentosis.*
Mill. dict. n. 5. & ic. t. 129.

*Moldavica Orientalis ,
Betonica folio , flore magno
violaceo.* Tourn. cor. 11. Moldavica Oriental , con
hoja como la de la Betonica ;
flor grande y de color de
violeta.
Comm. rar. 28. t. 28.

*Sideritis annua , flore lu-
teo , utriculis & foliis lon-
gioribus.* Moris. hist. 3. p. Sideritide annua , con la
flor amarilla ; cálices y hojas
mas largos.
389. sect. 11. t. 8. f. 18. X

Cast. Dracocefalo que encanece.

Habita en Oriente. ☉

672 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

pel- 11. DRACOCEPHALUM X Dracocefalo con flores en
tatum. *floribus verticillatis, brac-* X verticilo; bracteas redondas,
teis orbiculatis serrato-ci- X entre aserradas y pestañosas.
liatis. Mill. dict. n. 8.

Moldavica Orientalis, Sa- X Moldavica Oriental, con
licis folio, parvo flore, cæru- X hoja como la del Sauce; flor
leo. Tourn. cor. 11. X pequeña y de color cerúleo.

Cast. Dracocefalo abroquelado.

Habita en Oriente. ☉

Nu- 12. DRACOCEPHALUM X Dracocefalo con flores en
tans. *floribus verticillatis, brac-* X verticilo; bracteas oblongas,
teis oblongis ovatis integer X ovadas, enterisimas; coro-
rimis, corollis majusculis X las mayorcitas é inclinadas.
nutantibus. Hort. ups. 167.
n. 2.

Dracocephalum floribus X Dracocefalo con flores en
verticillatis, bracteis lan- X verticilo; bracteas lanceola-
ceolatis, integerrimis, foliis X das, enterisimas; hojas oblon-
oblongis, superioribus inte- X gas, las superiores enteras;
gris, floribus nutantibus. X y flores inclinadas.

Gmel. Sib. 3. p. 231. t. 49. X

Cast. Dracocefalo inclinado.

Habita en la Siberia.

Thy- 13. DRACOCEPHALUM X Dracocefalo con flores en
millo- *floribus verticillatis, brac-* X verticilo; bracteas oblon-
rum. *teis oblongis integerrimis,* X gas, enterisimas; y corolas
corollis vix calyce majori- X apenas mayores que el caliz.
bus. Hort. ups. 167.

Dracocephalum floribus X Dracocefalo con flores en
verticillatis, bracteis lan- X verticilo; bracteas lanceola-
ceolatis, integerrimis, foliis X das, enterisimas; hojas ao-
ovatis, superioribus inte- X vadas, las superiores ente-
gris, floribus vix è calyce X ras; y corolas que apenas so-
eminentibus. Gmel. Sib. 3. X bresalen del caliz.

p. 233. t. 50. X

Cast. Dracocefalo con flor de Tomillo.

Habita en la Siberia. ☉

878. Género HORMINUM. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, en forma de campana, recto, angulado, con cinco líneas, desigual, y medio hendido en dos labios: el *superior* mas ancho, aovado y extendido, y con tres dientes puntiagudos: el *inferior* lanceolado, recto, partido en dos segmentos, puntiagudos y echados uno encima de otro en forma de cruz.

COR. de un *petalo*, boquiabierta: *tubo* de la longitud del caliz: el *labio superior* derecho, cóncavo, hendido en dos partes y mas corto: y el *inferior* hendido en tres segmentos casi redondos.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, alesnados, ascendentes, doblados ácia dentro, sin que sean mas largos que la corola, de los cuales los dos opuestos son poco mas cortos: con las *anteras* sencillas.

PIST. *Germen* hendido en quatro partes: *estilo* filiforme, de la direccion y longitud de los estambres: con el *estigma* hendido en dos lacinias agudas.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse hace sus veces.

SEM. quatro, casi redondas, y de tres caras obtusas.

ESPECIE.

Py-
renai-
cum.

- | | | |
|-----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| I. HORMINUM <i>foliis</i> | X | Hormino con hojas aovadas, obtusas; y tallo desnudo. |
| <i>ovatis obtusis, caule nudo.</i> | X | |
| Hall. helv. 243. | X | |
| <i>Melissa pyrenaica.</i> Jacq. | X | Melisa de Pirineos. |
| hort. t. 186. | X | |
| <i>Gallitrichum folio rotundo, flore magno, violaceo.</i> | X | Galitrico con hoja redonda; flor grande y de color de violeta. |
| Bauh. hist. 3. p. 313. Moris. | X | |
| hist. 3. p. 395. Rai. hist. 546. | X | |
| <i>Melissa pyrenaica, caule brevi, Plantaginis folio.</i> | X | Melisa pirenaica, con el tallo corto; y hoja como la del Llantén. |
| Tourn. p. 193. Magn. hort. | X | |
| 133. t. 133. | X | |
| TOM. IV. | | Vv Cast. |

674 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Cast. Hormino de Pirineos.

Habita en las cumbres de los montes del Tiról y Pirineos: en los de Asturias, Burgos y otras partes de España. 2

Tiene las *bracteas* aovadas, puntiagudas y enterisimas.

La *Melisa pyrenaica de Scopoli ann. 2. p. 55.* posee el *caliz* con diez estrias alternadamente mas gruesas; con el *labio superior* de tres dientes, y el *inferior* hendido en dos segmentos, echados uno encima de otro, en forma de cruz: la *corola* grande, de color entre roxo y ce-rúleo; con el *labio superior* hendido en dos partes, y el *inferior* en tres segmentos casi redondos. *Syst. veg. p. 455.*

879 Género MELITTIS. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, en forma de campana, rolli-zo, recto y hendido en dos labios: el *superior* mas largo, escotado y agudo: el *inferior* mas corto, agu-do y hendido en dos lacinias abiertas.

COR. de un *petalo*, boquiabierta: *tubo* mucho mas angos-to que el *caliz*: *garganta* apenas mas gruesa que el tubo: el *labio superior* derecho, casi redondo y en-tero: el *inferior* extendido, obtuso y hendido en tres lacinias; con la *intermedia* mayor, plana y entera.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, alesnados, y recogidos de-baxo del *labio superior*, de los quales los *intermedios* son mas cortos que los exteriores: con las *anteras* ar-rimadas entre sí por pares en forma de cruz, hendidas en dos partes y obtusas.

PIST. *Germen* obtuso, hendido en quatro partes, y vello-so: *estilo* filiforme, de la longitud y direccion de los estambres: con el *estigma* hendido en dos lacinias agudas.

PERIC. ninguno: el *caliz* sin mudarse contiene las semillas en su fondo.

SEM. quatro.

OBS. El *labio inferior del caliz* se manifiesta algunas veces recortado.

ESPECIE.

Melisso-
phyllun.

- | | |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| 1. MELITTIS. Hort. cliff. | Melitis. |
| 309. Sauv. monsp. 150. Jacq. | |
| austr. t. 26. | |
| <i>Melissophyllum</i> . Hall. helv. | Meliso filo ó sea planta con |
| n. 244. Riv. monop. t. 21. | hoja como la del Torongil. |
| <i>Lamium montanum</i> , <i>Me-</i> | Lamio montano, con hoja |
| <i>lissæfolio</i> . C. B. P. 231. | como la del Torongil. |
| <i>Melissa humilis</i> , <i>latifolia</i> , | Torongil baxo, con hoja an- |
| <i>maximo flore</i> , <i>purpurascen-</i> | cha; flor muy grande, y de |
| <i>te</i> . Tourn. p. 193. | color que tira á purpúreo. |
| <i>Melissa Fuchsii</i> . Lob. ic. | Melisa de Fuchsio. |
| 515. Cam. epit. 99. 30. | |

Cast. Melitis con hoja de Torongil.

Habita entre matorrales y montes subalpinos de Alemania, Suiza, Austria, Inglaterra y Mompeller: en los del Real Sitio de San Ildefonso, laderas del rio frente de Balsain: en los de la Cartuja del Paular de Segovia: en los de Avila y Pirineos: de Burgos, Leon, Asturias, Sierra-nevada y otros. ¶

Varía con las flores enteramente blancas.

PROPIED. *Et vulneraria y utilisima para la supresion de orina*. Vease á Tournefort en su historia de plantas del circuito de París p. 438. y 439. y la Flora de Don Joseph Quer tom. 5. p. 420.

880. Género OCYUM. * Tourn. t. 96.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, cortísimo, persistente y de dos labios: el superior plano, redondo, mas ancho y ascendente: el inferior agudo y hendido en quatro lacinias que se arriman entre sí.

COR. de un petalo, boquiabierto y resupinada: tubo cortísimo abierto; uno de los dos labios que mira ácia arriba, mas ancho, medio hendido en quatro lacinias, obtusas é iguales: el otro que mira ácia abaxo, mas angosto, entero, aserrado y mas largo.

676 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

ESTAMB. *Filamentos* quatro, declinados, de los cuales los dos son poco mas largos, y los otros dos echan por su base un dientecito redoblado; con las *anteras* de figura de media luna.

PIST. *Germen* dividido en quatro partes: *estilo* filiforme, de la longitud y direccion de los estambres: con los *estigmas* hendidos en dos lacinias.

PERIC. ninguno: el *caliz* cerrado fomenta las semillas.

SEM. quatro, y aovadas.

OBS. El *labio superior del petalo* mira ácia abaxo; y el *inferior* ácia arriba, que es lo que constituye la corola *resupinada*.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 203.

La *flor* es de un petalo, labiada; cuyo labio superior se halla levantado, casi redondo, recortado y mas ancho que el inferior, el qual se manifiesta rizado ó ligeramente cortado. Del caliz sale el pistilo acompañado de quatro embriones, que pasan á otras tantas semillas, oblongas y recogidas en una capsula, que fue caliz de la flor. Esta capsula se divide en dos labios, de los cuales el superior está levantado y hendido en dos partes y el inferior cortado en muchas lacinias.

ESPECIES.

ymi
flor^{um} 1. OCYMUM *floribus paniculato-fasciculatis, caule ramosissimo.* Murray. in nov. comm. Goett. tom. 8. p. 47. t. 5.

Cast. Albahaca con flor en panoja aovada.

Habita en la India, y permanece mucho tiempo verde.

Arroja el *tallo* derecho, leñoso, del largo de pie y medio, todo subdividido en ramas opuestas en forma de aspa, ó en panoja con ramitas rollizas y acanaladas en ambas partes: las *hojas* pecioladas, entre elípticas y lanceoladas, verdes en ambas superficies, desnudas, ligeramente aserradas, enterisimas por su base, algo ásperas en su quilla y puntiagudas: las *panojas de las ramas terminales*, con ramitas en verticilo, opuestas en forma de

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 677

de aspa , densas ó amontonadas , apenas mas largas que las hojas y de color que tira á purpúreo : las *bracteas* lanceoladas , y del mismo color : las *corolas* tambien del mismo color , pero por defuera pálidas ; y el *labio inferior* blanco : los *pistilos* del mismo color purpúreo : y el *olor* como el de la *Ruda*.

2. OCYMUM *staminibus edentulis alternis basi barbatis.*

Ocymum caryophyllatum, Monachorum, sive Acinos Columnæ. Bauh. hist. p. 260. Tourn. p. 203.

Albahaca con los estambres sin dientes , y alternadamente barbados en su base.

Albahaca de Monges , con olor de clavos de especia , ó Acinos de Columna.

Cast. Albahaca de Monges.

Habita ☉

Produce el tallo derecho , del largo de un pie , algo rollizo , un poco peloso , con las *ramas* casi sobre-axilares : las *hojas* pecioladas , aovadas , algo obtusas , desnudas , aserradas y algo pestañosas : los *racimos* compuestos de verticilos con seis flores : el *labio superior del caliz* de figura de corazon y con tres estrias : las *bracteas* tambien de figura de corazon y que se caen facilmente : las *corolas* mas pequeñas , blanquecinas ; con el *labio inferior* de color que tira á purpúreo : los *filamentos* tambien purpúreos , de la longitud de la corola y sin dientes en la base.

3. OCYMUM *caule suffruticoso, foliis lanceolato-ovatis, racemis teretibus.*

Ocymum Zeylanicum, perenne, odoratissimum, latifolium. Burm. Zeyl. 174. t. 80. f. 1.

Albahaca con el tallo sufruticoso ; hojas entre lanceoladas y aovadas ; y racimos rollizos.

Albahaca de Zeylan , perenne , muy olorosa ; y con hoja ancha.

Cast. Albahaca muy agradable.

Habita en la Asia. ♀

Tiene el tallo apretado y rígido , y su base perenne : las *hojas* con tomento blanco en su lomo : las *espigas* de qua-

Monachorum.

Gratissimum

678 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

cuatro lados antes de florecer; con algunas *bracteas* alesnadas y que sobresalen; y *otras* de figura de corazon y agudas: las *flores* pequeñas; y las *corolas* blancas; con las *anteras* amarillas.

- Al- 4. OCYMUM *foliis ova-* X Albahaca con hojas aova-
bum. *tis obtusis, verticillis race-* X das, obtusas; verticilos de
morum approximatis, nubi- X los racimos acercados; los
libus tetragonis, corollis X que están para florecer de
crenatis. X cuatro lados; y corolas re-
X cortadas.

Cast. Albahaca blanca.

Habita en la India y Java. ○

Echa el tallo del largo de un pie, entre blanco y verde, y leñoso por su base: pocos *racimos*: las *hojas* mas anchas, y mas crasas que las de las demas especies de este género, aovadas, cóncavas, y obtusamente aserradas: las *bracteas del racimo* lanceoladas, de figura de corazon, ú aovadas, agudas, mas largas que la flor antes de florecer y que forman una espiga de cuatro lados: los *verticilos* acercados: las *corolas* grandes, blancas y recortadas; el *labio superior* hendido en cuatro partes; y las *lacinias laterales* mas apartadas; con los *estambres* blancos.

- Basi- 5. OCYMUM *foliis ova-* X Albahaca con hojas aova-
licum, *tis glabris, calycibus cilia-* X das, lampiñas; y cálices pes-
tis. Hort. cliff. 315. Mat. X tafiosos.

med. p. 177.

Ocymum caryophyllatum, X Albahaca mayor, con olor
majus. C. B. P. 226. Tourn. X de clavo de especia.

p. 204.

Ocymum tertium, maxi- X Albahaca tercera, muy
mum. Dod. pempt. 279. X grande.

Ocymum. Cam. epit. 308. X Albahaca.

Sabb. hort. 3. t. 84.

α *Ocymum caryophyllatum,* X Albahaca muy grande,
maximum. C. B. P. 225. To- X con olor de clavo de espe-
urn. p. 204. X cia. α

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 679

- § *Ocimum latifolium*, *maculatum*, seu *crispum*. C. B. P. 226. Tourn. p. 203. Albahaca con hoja ancha, manchada, ó rizada. β
- × *Ocimum viride*, *foliis bullatis*. C. B. P. 225. Tourn. p. 203. Albahaca verde, de hojas con ampollas. x

Cast. Albahaca real.

Habita en la India y Persia. ☉

Mini-
mum.

6. OCYMIUM *foliis ovatis integerrimis*. Hort. ups. 169. Albahaca con hojas aovadas y enterisimas.

Ocimum foliis ovatis incanis. Hort. cliff. 315. Albahaca con hojas aovadas y blanquecinas.

Ocimum minimum. C. B. P. 226. Bauh. hist. 3. part. 2. Albahaca muy pequeña.

p. 247. Moris. hist. 3. p. 407. sect. 11. t. 10. f. 17. Tourn. p. 204. Sabb. hort. 3. t. 85.

Ocimum caryophyllatum, *minus*. Tabern. ic. 344. Albahaca menor, con olor de clavo de especia.

Cast. Albahaca muy pequeña.

Habita en Zeylan. ☉

Sanc-
tum.

7. OCYMIUM *foliis oblongiusculis obtusis serratis undulatis*, *caule hirtio*, *bracteis cordatis*. Albahaca con hojas algo oblongas, obtusas, aserradas, ondeadas; tallo con pelo áspero; y bracteas de figura de corazon.

Cast. Albahaca santa.

Habita en la India. ☉

Tiene el tallo del largo de pie y medio, derecho, con ramas opuestas en forma de aspa, algo rollizo, casi acanalado en ambas partes, de color entre negro y purpúreo, con puntitas rígidas y tuberculos con pelo blanco; las hojas aovadas ó algo oblongas, un poco obtusas, aserradas y desnudas; pero pelosas por debaxo en la margen y nervios, con venas de color purpúreo: los peciolos con pelo áspero, y de color entre negro y purpú-

680 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

purpúreo: los *racimos* terminales, solitarios, derechos y de color tambien entre negro y purpúreo: con *bráctea*s pecioladas, de figura de corazon, cóncavas, redobladas, de la longitud del caliz y que se caen facilmente: el *caliz* con pelo áspero sobre la base gibosa: la *corola* de color purpúreo alegre y apenas mayor que el caliz: los *filamentos* blanquecinos; con las *anteras* de color que tira á amarillo-roxo. Es *planta* casi sin olor.

Ame-
rica-
num.

8. OCYMUM *foliis sub-lanceolatis acuminatis subserratis, racemis teretibus, caule subherbaceo.* Amoen. acad. 4. p. 276.

Albahaca con hojas casi lanceoladas, puntiagudas, algo aserradas; racimos rollizos; y tallo casi herbáceo.

Cast. Albahaca de America.

Habita en America. ☉

Te-
nuillo-
sum.

9. OCYMUM *foliis ovato-oblongis serratis, bracteis cordatis reflexis concavis, spicis filiformibus.*

Albahaca con hojas entre aovadas y oblongas, aserradas; bráctea de figura de corazon, redobladas, cóncavas; y espigas filiformes.

Ocymum Maderaspatanum; frutescens, gratissimi odoris, flore parvo, caulibus villosis. Pluk. alm. 268. t. 208. f. 4.

Albahaca de Madraspatan, frutescente, con olor muy grato; flor pequeña; y tallos vellosos.

Basilicum agreste. Rumph. amb. 5. t. 92. f. 2.

Albahaca agreste.

Mentha Zeylanica, spicata, pusilla, angustissimo folio, dentato. Burm. Zeyl. 158. t. 70. f. 2.

Menta de Zeylan, espigada, pequeñita, de hoja muy angosta y con dientes.

Cast. Albahaca de flor delgada.

Habita en Malabár. ☉ ♀

Echa el tallo del largo de uno ó dos pies, algo rollizo, de color que tira á purpúreo, con *ramas* opuestas en forma de aspa, mas cortas y salpicado de pelos extendidos: las *hojas* entre aovadas y oblongas, obtusamente aserradas, blandas y con peciolo largo: las *espigas* termi-

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 681

minales, de tres en tres, largas, angostas, pedunculadas; con *bracteas* opuestas, lampiñas, de figura de corazón, cóncavas y apretadamente redobladas: tres *flores* casi sentadas y que salen de cada *bractea*: los *cállices* lampiños, hendidos en cinco partes; con el *labio superior* plano, mayor, en forma de riñon y agudo: la *corola* pequeña, de color que tira á purpúreo; con el *labio superior* hendido en quatro partes; y el *inferior* sencillo: quatro *estambres* de los quales *dos* tienen en su base un apéndice ó diente: el *estilo* mas largo que la flor y hendido en dos partes: las *flores* tan pequeñas que apenas se manifiestan, y que empiezan á florecer desde el remate de la espiga.

Po-
lysta-
chion.

10. OCYMUM *corollis* X Albahaca con las corolas
quadrifidis, racemis aphyllis X hendidas en quatro partes;
apice nutantibus. Murr. X racimos sin hojas, é inclina-
comm. goett. nov. tom. 3. p. X dos por su remate.
71. t. 3.

Cast. Albahaca de muchas espigas.

Habita en la India. 24

Arroja el tallo derecho, del largo de dos pies, con ramas opuestas en forma de aspa, muy abundantes, derechas, y de quatro ángulos agudos y ásperos: las *hojas* tambien opuestas, con peciolo, aovadas, obtusas, rayadas, agudas y con aserraduras gruesas: los *peciolos* de la longitud de las hojas, con quatro lados y por debaxo algo ásperos: los *racimos* axilares, ladeados, largos, sin hojas, derechos, é inclinados por su remate, especialmente en la noche; con *flores* en verticilo y de cinco en cinco: el *caliz* hendido en cinco lacinias; con la *superior* de figura de corazón, y las *restantes* algo almenadas: las *corolas* casi al doble mas largas que el caliz, menudas, blanquecinas, hendidas en quatro partes, y semejantes á las de la *Menta*; con el *borde* de color que tira á purpúreo, y la *lacinia superior* algo escotada: los *estambres* declinados, y sin que sean mas largos que la corola.

OCY-

682 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Ment-
t hoi-
des.

11. OCYMUM *foliis lineari-lanceolatis, serratis.* Albahaca con hojas entre lineares y lanceoladas, y aserradas.

Mentha Zeylanica, angustissimo folio, dentato. Menta de Zeylan, de hoja muy angosta y con dientes.

Cast. Albahaca como Menta.

Habita en Zeylan.

Scutel-
larior-
des.

12. OCYMUM *corollis arqueadas, y piecitos ramosos.*

Ocimum foliis lanceolato-ovatis serratis, racemis verticillatis. Sp. pl. 2. p. 834. Albahaca con hojas entre lanceoladas y aovadas, aserradas; y racimos en verticilo.

Majorana rubra. Rumph. Mejorana roxa.

Cast. Albahaca como Escutelararia.

Habita en la India.

Produce el tallo vellosa: las *hojas* aovadas, con aserraduras obtusas, y peciolos (quando tiernos) muy tomentosos: el *racimo* derecho y largo; con *bracteas* de figura de corazon, sentadas, puntiagudas y lisas: los *piecitos* mellizos, ramosos y de muchas flores: el *caliz* menudo; con el *labio superior* de figura de corazon; el *inferior* hendido en quatro lacinias, agudas, delgadas, y las *dos intermedias* mas largas: el *tubo de la corola* derecho: el *borde* redoblado; con su *garganta* ensanchada: el *labio superior* derecho y muy corto; el *inferior* largo, arqueado, y que envuelve los estambres y pistilo. Se diferencia de las demas especies en la *flor*, de manera que casi es de distinto género.

Pros-
tratum

13. OCYMUM *caulibus prostratis, foliis ellipticis lineatis.* Albahaca con los tallos postrados; hojas elipticas y rayadas.

Cast. Albahaca postrada.

Habita en la India Oriental. ☉

Echa el *tallo* del largo de un xeme, derecho, con ocho sulcos y los pelos inclinados: las *ramas* muy apartadas; pero las que están cerca de la raiz mas largas y postradas: las *hojas* opuestas, con peciolo, elípticas, rayadas, algo pelosas, agudamente aserradas y del largo de una pulgada: las *espigas* terminales, solitarias, oblongas y compuestas de verticilos: la *lacinia superior del caliz* mas ancha y mas obtusa; las *dos de mas abaxo* menores y mas agudas: la *corola* muy pequeña y de color que tira á cerúleo: el *labio superior* hendido en quatro partes, igual y veloso junto á sus senos; el *inferior* mas largo y cóncavo: los *estambres* mellizos, declinados, algo señalados con un diente y de la longitud de la corola: y dos *estigmas* casi derechos.

Punctatum.

14. OCYIMUM caule tereti, foliis ovatis rugosis, floribus spicatis. Suppl. p. 275.
 Albahaca con el tallo ro-
 llizo; hojas aovadas, rugo-
 sas; y flores en espiga.

Cast. Albahaca punteada.

Habita en la Abysinia. ☉

Su traza es como la de la *Perila*, aunque menor: sus flores se hallan resupinadas y como las de la *Albahaca*. Tiene el *tallo* herbáceo, enteramente rollizo, del largo de un pie, con las *ramas* de abaxo apartadas, algo erizado, y con puntitos oblongos, de color rubio: las *hojas* opuestas, con peciolo, aovadas, aserradas, rugosas, rayadas y pelosas: ninguna *estipula*: las *espigas* terminales y pedunculadas: las *bracteas* aovadas: las flores cabizbaxas: la *corola* de color que tira á cerúleo, resupinada, y de la magnitud de la del *Tomillo*; con el *labio superior* hendido en quatro partes, blanquecino; y el *inferior* comprimido.

Verticillatum.

15. OCYIMUM racemo elongato nudo, floribus verticillato-quaternis pedunculatis, foliis obtusis. Suppl. p. 276.
 Albahaca con el racimo
 alargado, desnudo; flores
 verticiladas, de quatro en
 quatro, con pedunculo; y
 hojas obtusas.

Cast. Albahaca verticilada.

Ha-

684 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Habita en la India. Doct. Montin.

Lleva el *tallo* del largo de un pie, todo liso, mas corto que el racimo y ascendente, con cinco, ó seis pares de hojas opuestas, pecioladas, aovadas, obtusas, lisas, y con dos aserraduras en ambas partes: los *peciolos* de la longitud de las hojas: el *racimo* derecho, mas largo que la yerba, desnudo y filiforme: las *flores* en verticilo como las de la *Hottonia* y de quatro en quatro: los *piececitos* capilares y casi del largo de las flores: las *bracteas* en los *piececitos* de dos en dos, aovadas, menudas y lisas: el *caliz* en forma de campana, agudo, casi igual y de cinco dientes, sin que se halle alguno mas ancho, ni echado encima de otro: la *corola* resupinada, encorvada, con el labio mas ancho y redoblado: dos *estambres* de la longitud de la corola; y otros *dos* mas cortos.

Ca-
pitel-
latum.

16. OCYMUM herba-
ceum, foliis ovatis, floribus
aggregatis, petiolis late-
ralibus. Suppl. p. 276.

Kosaria. Forsk. Arab. 164.
n. 34. t. 20. Sed flores mino-
res nostris.

Albahaca herbácea, con
hojas aovadas; flores agre-
gadas; y peciolos laterales.
Kosaria; pero con las flo-
res mas pequeñas que las que
vió Linneo.

Cast. Albahaca de cabezuela.

Habita en la China.

Tiene el *tallo* de quatro lados obtusos, con dos surcos, poco ramoso, y del largo de un pie: las *hojas* opuestas, con peciolo, aovadas, obtusamente aserradas, rugosas como las del *Lamio*, con lomo, lisas y sin que sean lustrosas: el *peciolo* que gradualmente va rematando en hoja: los *pedunculos* axilares, solitarios; con las *flores* agregadas en cabezuela de la magnitud de una avellana: el *caliz comun* con cinco hasta diez hojuelas, del largo de la flor: los *periantios propios* tubulosos, hendidos en cinco partes, rara vez en quatro, é iguales: las *corolas* blancas, y tan pequeñas que apenas se discernen: el *tubo* delgado y del largo del caliz: el *borde* hendido en quatro lacinias, y la superior algo cóncava y hendida en dos partes; y ultimamente todo el *borde* hendido en cinco lacinias y redoblado.

Gé-

881. Género TRICHOSTEMA. † Gronov.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, con dos labios: el *superior* al doble mayor, hendido en tres partes iguales y agudas: el *inferior* partido en dos, y agudo.

COR. de un *petalo*, boquiabierto: *tubo* cortísimo: el *labio superior* comprimido y arqueado: el *inferior* partido en tres lacinias, con la *intermedia* muy pequeña y oblonga.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, capilares, larguissimos y encorvados, de los cuales los *dos* son poco mas cortos: con las *anteras* sencillas.

PIST. *Germen* hendido en quatro partes: *estilo* capilar, de la longitud y figura de los filamentos: con el *estigma* hendido en dos partes.

PERIC. ninguno; pero hace sus veces el *caliz* mas crecido, redoblado, de manera que el labio superior parece inferior, ventricoso y cerrado.

SEM. quatro, y casi redondas.

OBS. *Filamentos* larguissimos, ó cortísimos. *Wern.*

ESPECIES.

Dichotoma.

1. TRICHOSTEMA *staminibus longissimis exsertis.* Trichostema con los estambres larguissimos, y que salen fuera.
Scutellaria cœrulea, Majoranæ folio, Americana. Escutelaria de America, con hoja como la de la Mejorana, y flor cerúlea.
Rai. Suppl. p. 311.

Cast. Trichostema ahorquillada.
Habita en la Virginia y Pensilvania. ☉

Braquiata

2. TRICHOSTEMA *staminibus brevibus inclusis.* Trichostema con los estambres cortos y encerrados.
Teucrium Virginianum, Origani folio. Dill. elth. Teucro de Virginia, con hoja como la del Oregano.
380. t. 285. f. 369.

Cast.

686 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Cast. Trichostema con ramas en forma de aspa.

Habita en la America Septentrional.

882. Género SCUTELLARIA. * Cassida.

Tourn. t. 84.

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de una pieza, muy corto, tubulado, casi entero en su boca, y cerrado con su tapadera despues de haber florecido.
- COR.** de un *petalo*, boquiabierta: *tubo* cortísimo y doblado ácia atrás: *garganta* larga y comprimida: *labio superior* cóncavo y hendido en tres lacinias, con la *del medio* cóncava, escotada; y las *laterales* planas, algo agudas y puestas debaxo de la intermedia: el *labio inferior* mas ancho y escotado.
- ESTAMB.** *Filamentos* quatro, recogidos debaxo del labio superior, de los cuales los *dos* son mas largos: con las *anteras* pequeñas.
- PIST.** *Germen* dividido en quatro partes: *estilo* filiforme, de la longitud y direccion de los estambres: con el *estigma* sencillo, encorvado y puntiagudo.
- PERIC.** ninguno; pero hace sus veces el *caliz* cerrado con una tapadera en forma de capacete, de tres caras, y que se abre por la margen inferior.
- SEM.** quatro, y casi redondas.
- OBS.** Se distingue mucho de los demas generos solo por el *fruto*; pues el *caliz* representa un capacete con su cresta y tapadera.

CARACT. GENER. DE TOURNEF.

CASSIDA. p. 181.

La *flor* es de un *petalo*, labiada; cuyo *labio superior* representa un morrion con dos orejillas; y el inferior se halla hendido en dos partes. Del *caliz*, cuya parte superior forma una cresta, sale el *pistilo*, acompañado de quatro embriones, que pasan á otras tantas semillas, oblongas, recogidas en una capsula, que fue *caliz* de la flor. Esta capsula representa una cabeza guarnecida de un mor-

morrion ó capacete, cuya parte superior está en forma de cresta, y la inferior como aquella del morrion con que se cubre la barba ó mexilla de abaxo.

E S P E C I E S.

Orien-
talis.

1. SCUTELLARIA *foliis incisissubtus tomentosis, spicis rotundato-tetragonis.* Escutelaria con hojas cortadas, tomentosas por debajo; y espigas entre redondeadas y de quatro lados.

Hort. ups. 173.

Scutellaria foliis pinnatifidis. Roy. lugdb. 310. Escutelaria con hojas hendidas al traves.

Cassida Orientalis, folio Chamadryos, flore luteo. Casida Oriental, con hoja como la del Camedrys; y flor amarilla.

Tourn. cor. 11. it. 3. p. 306.

t. 306. Comm. rar. 30. t. 30.

Mart. cent. 18. t. 18.

α *Scutellaria Orientalis, incana, foliis laciniatis, flore luteo.* Tourn. cor. 11. Escutelaria Oriental, blanquecina, con hojas laciniadas; y flor amarilla. α

Cast. Escutelaria Oriental.

Habita en la America cerca de Teflin, y en Dinamarca. 24

Tiene las corolas purpúreas, con el labio blanco.

Albida

2. SCUTELLARIA *foliis subcordatis serratis rugosis opacis, spicis secundis, bracteis ovatis.* Sabb. hort. rom. 3. t. 29. Escutelaria con hojas casi de figura de corazon, aserradas, rugosas, opacas; espigas ladeadas; y bracteadas.

Cast. Escutelaria blanquecina.

Habita en Oriente. 24

Es muy parecida á la *Escutelaria Oriental*; pero tiene las corolas mayores, y enteramente blancas.

Alpina 3. *SCUTELLARIA foliis cordatis inciso-serratis crenatis, spicis imbricatis rotundato-tetragonis.* Escutelaria con hojas de figura de corazon, entre cortadas y aserradas, afestonadas; espigas apifiadas, entre redondeadas y de quatro lados.

Cassida procumbens, foliis ovatis, crenatis, spicis raris, foliosis. Hall. helv. n. 281. Casida tendida, con hojas aovadas, recortadas; espigas claras y foliosas.

Teucrium alpinum, indorum, magno flore. C. B. P. 247. prodr. 116. Burs. XV. 35. Teucro alpino, sin olor; y con la flor grande.

Cast. Escutelaria alpina.

Habita en los alpes de Suiza: en la Palomita y otras partes de Aragon. \bar{h}

Es muy semejante á la *Escutelaria lupulina*; pero tiene las corolas violadas; con el labio blanquecino, y no de color amarillo-roxo: las bractéas aovadas, agudas, mas cortas que el tubo de la corola y desiguales: y las hojas menos oblongas.

Lupulina. 4. *SCUTELLARIA foliis cordatis inciso-serratis acutis glabris, spicis imbricatis rotundato-tetragonis.* Escutelaria con hojas de figura de corazon, entre cortadas y aserradas, agudas, lampiñas; espigas apifiadas, entre redondeadas y de quatro lados.

Cassida alpina, supina, magno flore, albido. Tourn. p. 182. Casida alpina, tendida, con la flor grande, y blanquecina.

Cast. Escutelaria lupulina.

Habita en la Siberia y Tartaria. \mathcal{N}

Late-tiflora. 5. *SCUTELLARIA foliis lævibus carina scabris, racemis lateralibus foliosis.* Escutelaria con hojas lisas, ásperas en su quilla; racimos laterales y foliosos.

Scutellaria foliis cordato-lanceolatis, serratis, pedunculis multifloris. Roy. lugdb. Escutelaria con hojas entre de figura de corazon y lanceoladas, aserradas; y pedunculos de muchas flores.

311.

Scutellaria palustris, repens, Virginiana, major, flore minore. Moris. hist. 3. Escutelaria de Virginia, mayor, palustre y rastrera, con la flor mas pequeña.

P. 416.

Cast. Escutelaria con flores laterales.

Habita en el Canadá y Virginia. 26

Echa los racimos laterales; con hojas mas pequeñas, lanceoladas y aserradas: y los piececitos señalados con una cerda en ambas partes, como en la *Escutelaria de sombrerillo y peregrina*.

Galericulata.

6. SCUTELLARIA *foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus.* Fl. dan. Escutelaria con hojas entre de figura de corazon y lanceoladas, recortadas; y flores axilares.

t. 637. Sabb. hort, 3, t. 30. *Cassida foliis oblongo cordatis, crenatis, verticillis nudis, bifloris.* Hall. helv. Casida con hojas de figura de corazon oblonga, recortadas; verticilos desnudos y de dos flores.

n. 280. *Lysimachia cœrulea, galericulata, seu Gratiola cœrulea.* C. B. P. 246. Lysimaquia de sombrerillo, con la flor cerúlea, ó Graciola cerúlea.

Cassida palustris, vulgarior, flore cœruleo. Tourn. Casida palustre, mas vulgar, con la flor cerúlea.

p. 182.

Lysimachia galericulata. Dalech. hist. 1060. Lob. ic. Lysimaquia de sombrerillo.

344. *Tertianaria aliis Lysimachia galericulata.* Bauh. hist. Tercianaria llamada por otros Lysimaquia de sombrerillo.

Cast. Escutelaria de sombrerillo. *vulgo*; Tercianaria, porque se cree que cura las tercianas.

Habita en Europa: en el circunto de Madrid á las orillas del rio Manzanares: en los montes de Avila, de Burgos, Asturias y Pirineos de Cataluña. 26

690 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Hasti-
folia.

7. SCUTELLARIA *foliis integerrimis, inferioribus hastatis, superioribus sagittatis.* It. gotl. 212. Crantz. austr. p. 276. Escutelaria con hojas enterisimas; las inferiores de figura de alabarda; y las superiores en forma de saeta.

Scutellaria folio non serrato. Riv. monop. t. 77. Escutelaria con hojas sin aserraduras.

Cast. Escutelaria con hoja de alabarda.

Habita en Austria y Alemania, y rara vez se halla en Suecia.

Es muy parecida á la antecedente, y acaso variedad de ella.

Minor.

8. SCUTELLARIA *foliis cordato-ovatis subintegerrimis, floribus axillaribus.* Huds. angl. 232. Escutelaria con hojas entre de figura de corazon y aovadas, casi enterisimas; y flores axilares.

Cassida palustris, minima, flore purpurascente. Tourn. p. 182. Rai. angl. 3. p. 244. Casida palustre, muy pequeña, con la flor que tira á color purpúreo.

Cast. Escutelaria menor.

Habita en lugares pantanosos de Inglaterra. ¶

Se asemeja mucho á las dos precedentes.

Inte-
grifo-
lia.

9. SCUTELLARIA *foliis sessilibus ovatis, inferioribus obsolete serratis, superioribus integerrimis.* Escutelaria de hojas sin peciolo, aovadas; las inferiores con aserraduras poco manifestas, y las superiores enterisimas.

Scutellaria cœrulea, Virginiana, Lamii aut potius Teucris folio, minor. Pluk. alm. 338. t. 313. f. 4. Escutelaria de Virginia, menor, con la flor cerúlea, y hoja como la del Lamio, ó mas bien como la del Teucris.

Cast. Escutelaria de hoja entera.

Habita en la Virginia y Canadá.

Hava-
nensis

10. SCUTELLARIA *foliis cordato-ovatis crenatis, floribus solitariis axillaribus, corollæ labio utroque trifido.* Escutelaria con hojas entrecoradas, de figura de corazon y ayudadas, recortadas; flores solitarias, axilares; y ambos labios de la corola hendidos en tres partes.
Syst. veg. p. 457. Jacq. obs. 2. t. 29.

Cast. Escutelaria de la Havana.

Habita

Es planta tendida, herbácea y tiernecita; tiene los pedunculos axilares, de una flor; y el capacete de la corola hendido en tres partes.

Hys-
sopi-
folia.

11. SCUTELLARIA *foliis lanceolatis.* Escutelaria con hojas lanceoladas.
Gron. virg. 91.

Cassida marina, Hysso-pifolia. Pet. act. angl. Casida marina (*maritima*) con hoja como la del Hisopo.

Cast. Escutelaria con hoja de Hisopo.

Habita en la Virginia.

Posee el tallo derecho: las hojas lanceoladas, sin peciolo, enterisimas y ásperas; y el labio superior de la corola peloso en su quilla,

Pere-
grina.

12. SCUTELLARIA *foliis subcordatis serratis, spicis elongatis secundis.* Escutelaria con hojas casi de figura de corazon, aserradas; y espigas alargadas, con flores que miran á un lado.
Hort. cliff. 317.

Scutellaria foliis cordatis, obtusis, obtuse serratis, spica foliosa in summo caule. Escutelaria de hojas de figura de corazon, obtusas, con aserraduras tambien obtusas; y espiga foliosa en el remate del tallo.
Gmel. Sib. 3. p. 228. R.

Cassida. Colum. ecphr. 1. p. 187. t. 189. Tourn. p. 181.

Lamium peregrinum, seu Scutellaria. C. B. P. 231. Casida. Lamio peregrino, ó Escutelaria.

Cast. Escutelaria peregrina.

Habita en los bosques sombríos de Florencia, Esclavonia y

692 FLORES HERMAF., DE IV. ESTAMBRES,

y Siberia : en Asturias , Rioja , Alcarria y otras partes de España.

Se halla otra muy semejante á esta, que tiene los cálices lamudos y pelos de color gris : el *capacete de la corola* peloso por su ápice : y las *bracteas* aovadas y cortas.

Varia con las *flores* blancas , y con las *hojas* algo pelosas siendo mas crecidas.

Indica. 13. SCUTELLARIA fo- X Escutelaria de hojas casi
liis subovatis obtusis crena- X aovadas , obtusas , recorta-
tis petiolatis , racemis nu- X das , con peciolo ; y racimos
diusculis. Osb. it. 244. X algo desnudos.

Serratula amara. Rumph. X Serratula amarga.
amb. 5. p. 459. t. 170. f. 1. 2. X

Scutellaria Sinica , Beto- X Escutelaria de la China,
nica folio , *floribus albis*. X con hoja como la de la Beto-
Pluk. amalth. 190. t. 441. f. 1. X nica ; y flores blancas.

Cast. Escutelaria de las Indias.

Habita en la China.

Es planta pequeña que produce las *hojas* algo redondas, casi aovadas , con peciolo y aserraduras poco manifiestas : el *racimo* terminal : con *bracteas* lineares y cortísimas : los *cálices* tambien muy cortos y sin tubo : las *corolas* angostas y algo largas.

Altísi-
sima.

14. SCUTELLARIA fo- X Escutelaria con hojas en-
liis cordato-oblongis acumi- X tre de figura de corazon y
natis serratis , spicis sub- X oblongas , puntiagudas , aser-
nudis. X radas ; y espigas casi desnu-
das.

Scutellaria Orientalis , al- X Escutelaria Oriental, muy
tissima , *Urticæ folio*. Tourn. X alta , con hoja como la de la
cor. II. X Ortiga.

Cast. Escutelaria altísima.

Habita en Oriente.

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 693

15. SCUTELLARIA villosa, foliis cordatis obtusis, obtuseque serratis, spicis imbricatis, bracteis setaceis. Roy. lugdb. 311.

Cassida Cretica, fruticosa, folio Cataria, flore albo. Tourn. cor. 11.

Escutellaria vellosa, con hojas de figura de corazon, obtusas, y obtusamente aserradas; espigas apifiadas; y bracteas setáceas.

Casida de Creta, fruticosa, con hoja como la de la Cataria; y flor blanca.

Cast. Escutellaria Cretica.

Habita en Creta.

Es planta toda cubierta de pelo áspero. Tiene los cálices como los de la Escutellaria: las corolas casi como las del Teucro, menudas y con pelo áspero por defuera: el labio superior se manifiesta muy pequeño y escotado; por cuyo motivo ¿acaso será verdadera especie de Escutellaria ó de Teucro?

883. Género PRUNELLA. * Brunella. Tourn. t. 84.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, con dos labios, mas corto que la garganta de la corola y persistente: el labio superior plano, mas ancho, truncado y hendido ligeramente en tres dientes: el inferior derecho, mas angosto, agudo y medio hendido en dos partes.

COR. de un petalo, boquiabierta: tubo corto, cilindríceo: garganta oblonga: el labio superior cóncavo, entero é inclinado: el inferior redoblado, obtuso y hendido en tres lacinias, con la del medio mas ancha, escotada y aserrada.

ESTAMB. Filamentos quatro, alesnados, y ahorquillados por su ápice, de los quales dos son poco mas largos: con las anteras sencillas, insertas en los filamentos debaxo de sus ápices, y como en uno de los dos ramos.

PIST. Germen dividido en quatro partes: estilo filiforme, inclinado con los estambres ácia el labio superior: y el estigma hendido en dos lacinias.

FRUC. ninguno: el caliz cerrado fomenta las semillas.

SEM. quatro, y casi aovadas.

OBS.

694 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

OBS. El carácter esencial de este género consiste en los filamentos bifurcados en su ápice.

CARACTER GENERICO DE TOURNEFORT.

BRUNELLA. p. 182.

La flor es de un petalo, labiada; cuyo labio superior se halla con capacete; y el inferior dividido en tres lacinas, con la del medio excavada á manera de cuchara. Del caliz sale el pistilo, acompañado de quatro embriones, que pasan á otras tantas semillas casi redondas, recogidas en una capsula, que fue caliz de la flor. A estas notas se añade la de las flores dispuestas en espiga densa.

ESPECIES.

- | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vulgaris. | 1. PRUNELLA foliis omnibus ovato-oblongis serratis petiolatis. Mat. med. 177. Sabb. hort. 3. t. 32. | Prunela con todas las hojas entre aovadas y oblongas, aserradas y con peciolo. |
| | Prunella bracteis cordatis. Roy. lugdb. 314. | Prunela con las bracteas de figura de corazon. |
| | Brunella major, folio non dissecto. C. B. P. 260. Tourn. p. 182. | Brunela mayor, con la hoja entera. |
| | Brunella. Dod. pempt. 136. Riv. monop. t. 29. | Brunela. |
| α | Prunella vulgaris, grandiflora. Jacq. austr. 377. | Prunela vulgar, con la flor grande. α |
| β | Prunella (grandiflora) foliis sub-integris, ex subrotundo-ovatis, calycibus superne profundius tridentatis. Pollich. pal. n. 578. | Prunela (de flor grande) con hojas casi enteras, entre algo redondas y aovadas; y cálices por arriba hendidos mas profundamente en tres dientes. β |
| | Brunella flore majore. Riv. monop. t. 29. | Brunela con la flor mas grande. |
| | Brunella caerulea, magno flore. C. B. P. 261. Tourn. p. 182. | Brunela con la flor grande y de color cerúleo. |

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 695

Brunella prima, non vulgaris. Clus. hist. 2. p. 42. ~~X~~ Brunela primera, que no es vulgar.

Cast. Prunela vulgar.

Habita en Europa entre pastos: en los circuitos de Madrid, Real Casa de Campo, arroyo de Cantarranas y de San Bernardino: en Aragon, Cataluña y otras muchas partes de España. \mathcal{C}

La variedad α en lugares abrigados se halla tendida y muy baxa; pero en los bosques sombríos, derecha y del largo de un pie. La variedad β *grandiflora* nace comunemente en las rendijas de las peñas.

PROPIED. La yerba es algo olorosa y un poco astringente: y se usa en la angina.

Laciniata.

2. PRUNELLA *foliis ovato-oblongis petiolatis, super premis quatuor lanceolatis dentatis.* Jacq. austr. t. 378. Sabb. hort. 3. t. 31. ~~X~~ Prunela de hojas entre aovadas y oblongas, pecioladas; y las quatro de mas arriba lanceoladas y con dientes.

Brunella foliis imis ovatis, oblongis, caulinis dentatis & semipinnatis. Hall. helv. n. 279. ~~X~~ Brunela con las hojas de abaxo aovadas, oblongas; las del tallo con dientes y medio pinnadas.

Brunella folio laciniato. C. B. P. 261. Riv. t. 30. ~~X~~ Brunela con hoja laciniada.

Brunella II. non vulgaris. Clus. hist. 2. p. 43. ~~X~~ Brunela segunda, que no es vulgar.

α *Brunella minor, alba, laciniata.* C. B. P. 261. Tourn. p. 183. ~~X~~ Brunela menor, con la flor blanca; y hoja laciniada. α

Brunella flore magno, albo, folio laciniato. Bauh. hist. 3. p. 429. ~~X~~ Brunela con la flor grande, blanca; y hoja laciniada.

β *Brunella Verbenulæ folio, flore cæruleo.* Vaill. paris. 22. t. 5. f. 1. ~~X~~ Brunela con hoja como la de la pequeña Verbena; y flor cerúlea. β

Cast. Prunela laciniada.

Habita en Europa entre pastos: en los prados y castañar del Real Sitio del Escorial; en los del Paular de Segovia,

696 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

via, Aragon, Cataluña, Alcarria y otras muchas partes de España. ¶

Es variedad constante, producida de la especie antecedente.

Hyssopifolia.

3. PRUNELLA *foliis lanceolatis integerrimis sessilibus, caule erecto.* Syst. veg. 458. Prunela de hojas lanceoladas, enterisimas, con peciolo; y tallo derecho.

Prunella foliis lanceolato-linearibus ciliatis subsessilibus. Sp. pl. 2. p. 837. Sauv. monsp. 141. Prunela con hojas entre lanceoladas y lineares, pestañosas y casi sentadas.

Prunella Hyssopifolia. C. B. P. 261. Tourn. p. 183. Prunela con hoja como la del Hisopo.

Brunella II. flore purpureo. Clus. hist. 2. p. 43. Brunela segunda, con la flor purpúrea.

Brupella angustifolia, integra, hirsutior. Moris. hist. 3. p. 364. sect. 11. t. 5. f. 7. ro. Brunela de hoja angosta, entera y con mas pelo aspero.

Cast. Prunela con hoja de Hisopo.

Habita en Mompeller: y en los mismos lugares de España que las antecedentes. ¶

Se diferencia de la *Prunela vulgar* por el tallo derecho, y no ascendente; por las hojas lanceoladas, sin peciolo, enterisimas y ásperas; por las corolas quatro veces mayores, y con la quilla del labio superior pelosa.

884. Género CLEONIA. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, tubuloso, angulado y con dos labios: el superior algo plano, ancho y con tres dientes: el inferior dividido en dos partes y corto.

COR. de un petalo, y boquiabierta: el labio superior recto, hendido en dos partes y aquillado: el inferior hendido en tres lacinias: la intermedia con dos lóbulos; y las laterales extendidas.

ESTAMB. Filamentos quatro, ahorquillados en su ápice: y los dos inferiores mas largos: con las anteras sentadas

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 697

das en el ápice exterior de los filamentos , y cruzadas por pares.

PIST. *Germen* dividido en quatro partes : *estilo* filiforme, y de la longitud de los estambres : con quatro *estigmas* setáceos é iguales.

PERIC. ninguno : el *caliz* cerrado con pelillos hace sus veces.

SEM. quatro , algo rollizas y lampifias.

OBS. *Por los quatro estigmas se diferencia este género de todos los demas del mismo orden.*

ESPECIE.

1. CLEONIA.

Prunella bracteis pinnato-dentatis ciliatis. Loefl. it. 148. Mill. ic. 47. t. 70.

Prunella odorata, Lusitanica, flore violaceo. Barr. ic. 561.

Clinopodium Lusitanicum, spicatum & verticillatum. Tourn. p. 195.

Bugula odorata, Lusitanica. Corn. canad. 46. Morris. hist. 3. p. 391. sect. 11. t. 5. f. 4.

Cleonia.

Prunela con bracteas entre pinnadas y dentadas , y pestañosas.

Prunela de Portugal, olorosa , con flor de color de violeta.

Clinopodio de Portugal, con flores en espiga y en verticilo.

Bugula olorosa , de Portugal.

Cast. Cleonia de Portugal.

Habita en Portugal : en el circuito de Madrid , barranco de Cantarranas y de San Bernardino : en la Real Casa de Campo , Real Sitio de Aranjuez : en la Alcarria, Serrania de Cuenca , Mancha , Extremadura y otras partes de España. ☉

Arroja el tallo levantado , con ramas opuestas en forma de aspa , y por abaxo peloso: el labio superior de la corola derecho , con sus lacinias redobladas por su ápice; el labio inferior de figura de corazon al revés , entre plegado y extendido , con su base gibosa : todos los filamentos espinosos ó bifurcados; y con las anteras crestadas en su dorso.

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de una pieza, entre de figura de campana y cónico inverso, derecho y con dos labios: el *superior* mas ancho, medio hendido en tres lacinias agudas: el *inferior* poco mas pequeño y dividido en dos partes.
- COR.** de un *petalo*, boquiabierta: el *labio superior* derecho, aovado, algo escotado y cóncavo: el *inferior* mas ancho, redoblado y hendido en tres lacinias; con la *del medio* mayor.
- ESTAMB.** *Filamentos* quatro, alesnados, apretados al labio superior y mas cortos que él, de los cuales *dos* son mas cortos que los restantes: con las *anteras* oblongas y laterales.
- PIST.** *Germen* hendido en quatro partes: *estilo* filiforme, de la longitud y direccion de los estambres: con el *estigma* agudo y hendido en dos lacinias, de las cuales la una es mas corta.
- PERIC.** *Bayas* quatro, puestas en el fondo del caliz, casi redondas y de una celdilla.
- SEM.** solitarias, y casi redondas.
- OBS.** *Las mismas semillas cubiertas de una epidermide carnosa reducida á baya, manifiestan que son de la naturaleza de baya. De aqui es, que siendo planta que lleva quatro semillas desnudas, aunque cubiertas de aquella epidermide, se distingue por esta nota de los demas géneros de este orden.*

E S P E C I E S.

- Majus. I. PRASIUM *foliis ova-* X Prasio con hojas entre o-
to-oblongis serratis. Hort. X vadas y oblongas, y aserra-
 cliff. 309. Sabb. hort. 3. t. 37. X das.
Lamium arboreum, pe- X Lamio de Creta, arboreo
renne, Creticum. Zan. hist. X y perenne.
 112. t. 46. Rai. hist. 561. X

CON II. MAS CORTOS Y IV. SEM. DESNUD. 699

Melissa fruticosa, *Cretica*, *Teucrii* X Melisa de Creta, fruticosa, siempre verde, con traza como la del Teucro; y flor blanca.
ca, *sempervirens*, *Teucrii* X
facie, *flore albo*. *Moris. hist.* X
 3. p. 408. sect. 11. t. 21. f. 3. X
Teucrium fruticans, *am* X Teucro de Italia, fruticoso, con la flor ancha y blanca.
plo, *albo flore*, *Italicum*. X
 Barr. ic. 895.

Cast. Prasio mayor.
 Habita en Sicilia y Roma; y en el campo de Tánger. \hbar

Minus. 2. PRASIIUM *foliis ovatis crena utrinque duplici*. X Prasio de hojas aovadas y con dos festones en ambas partes.
 Hort. cliff. 309.

Lamium fruticans, *Teucrii folio*, *lucido*, *calyce ex flore magno candido*, *tantilla purpura varie notato*. *Cup.* X Lamio fruticoso, de hoja como la del Teucro, reluciente; caliz con flor grande y cándida, señalada variamente con un tantico de color de púrpura.
 Cath. 106.

Cast. Prasio menor.
 Habita en Sicilia. \hbar
 Se debe indagar si esta especie es bastante distinguida de la antecedente.

886. Género PHRYMA. *Leptostachya*. *Michel.* 11.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, cilindrico, giboso encima de su base, estriado y de dos labios: el *superior* angosto y mas largo, con tres dientes alesnados y arrimados entre sí: el *inferior* obtuso y hendido en dos partes.
 COR. de un *petalo*, boquiabierta: *tubo* de la longitud del caliz: el *labio superior* mas corto, casi aovado, escotado y recto: el *inferior* mayor, mas extendido, hendido en tres lacinias, con la *intermedia* mas larga.
 ESTAMB. *Filamentos* quatro, de dos en dos en ambas partes, y los superiores mas cortos: con las *anteras* casi redondas, arrimadas entre sí, y puestas en la garganta de la corola.
 PIST.

700 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

PIST. *Germen* oblongo: *estilo* filiforme, del largo de los estambres: con el *estigma* obtuso.

PERIC. ninguno: el *caliz* asurcado y cerrado hace sus veces.

SEM. una sola, oblonga, algo rolliza y por una parte asurcada.

ESPECIES.

Lep-
to sta-
chya.

1. PHRYMA *foliis ovatis serratis petiolatis, calyce monophyllo quinquefido.* Sup. pl. p. 277. Phryma de hojas aovadas, aserradas, con peciolo; caliz de una pieza y hendido en cinco partes.

Phryma leptostachya. Syst. pl. tom. 3. p. 103. Phryma con espiga delgada.

Phryma. Amœn. acad. 3. p. 19. Phryma.

Leptostachya. Michel. gen. 11. Planta de espiga delgada.

Amaranthi Siculi Bocconis spica floribus parvis, purpureis, propendentibus, herba Floridana. Pluk. amalt. 59. t. 380. f. 5. Yerba de la Florida, con espiga como la del Amarantho de Sicilia de Boccon, con flores pequeñas, purpúreas é inclinadas.

Verbena racemo simplicissimo, floribus sessilibus, calycibus fructus reflexis, racemoque appressis. Gron. virg. 92. Roy. lugdb. 536. Xmo. Verbena de racimo muy sencillo, con flores sentadas; cálices del fruto redoblados, y apretados al racimo.

Cast. Phryma con espiga delgada.

Habita en la America Septentrional. ¶

Produce el tallo del largo de un pie, de quatro lados obtusos, algo liso, y con ramas opuestas en forma de aspa: las hojas opuestas, aovadas, agudas, algo ásperas, con peciolo y aserraduras gruesas: las espigas terminales y solitarias: las flores opuestas y apartadas, horizontales y cabizbaxas despues de haber florecido: las bractœas de tres en tres, alesnadas: la inferior del largo del caliz; y las laterales derechas y cortas: el caliz cilindrico, estriado, giboso sobre su base, duro y de dos labios; el superior angosto, de color que tira á pur-

purpúreo, con tres dientes; y el *inferior* hendido en dos partes: la *corola* blanquecina, de figura como la de la *Dodartia*; pero pequeña y con el *labio superior* de color que tira á purpúreo por defuera.

2. PHRYMA *calycibus* ~~X~~ Phryma con los cálices,
tandem longitudinaliter de- ~~X~~ que por último se abren lon-
biscentibus. Suppl. p. 277. ~~X~~ gitudinalmente.

Cast. Phryma que se abre.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. D. Thunberg.

Arroja los tallos sufruticosos por su base, con pocas ramas, opuestas y derechas: las hojas tambien opuestas, casi pecioladas, en forma de cuña, por arriba redondeadas, con nueve dientes y algo crasas: los racimos terminales, solitarios, muy sencillos, derechos y con el piecicito muy corto: las bracteas menudas, alesnadas y solitarias; el caliz de una pieza, rollizo, de cinco surcos, truncado, con cinco dientes, y que quando madura se abre longitudinalmente por el lado de afuera: la corola como la de la *Verbena*; el tubo del largo del caliz; y el borde pequeño, casi igual y hendido en cinco lacinias redondas: quatro estambres, con los dos mas largos que los otros dos: el germen oblongo: el estilo filiforme; con el estigma algo obtuso: semilla una que llena y rompe el caliz, algo comprimida, un poco rolliza, entre comprimida y en forma de cuña por su base y de dos celdillas, con otra semilla pequeña, linear y solitaria.

Para evitar la multiplicacion de géneros acompañó Linneo esta especie con el de *Phryma* aunque su traza es diferente.

ORDEN II.

ANGIOSPERMIA. DE LAS MISMAS FLORES CON LAS SEMILLAS
CUBIERTAS CON ALGUN PERICARPIO.

887. Género BARTSIA. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, tubuloso, persistente, obtuso por su boca, con dos lóbulos escotados y de color en sus ápices.

COR. de un *petalo*, boquiabierto: el *labio superior* derecho, delgado, entero, y mas largo: el *inferior* redoblado, obtuso, muy pequeño y hendido en tres partes.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, setáceos, del largo del labio superior, de los cuales *dos* son poco mas cortos: con las *anteras* oblongas, acercadas, y recogidas debaxo del remate del labio superior.

PIST. *Germen* aovado: *estilo* filiforme, mas largo que los estambres: con el *estigma* obtuso é inclinado.

PERIC. *Capsula* aovada, comprimida, puntiaguda, de dos celdillas y de dos ventallas, con el *disepimento* opuesto.

SEM. numerosas, anguladas y pequeñas.

ESPECIES.

Cocci- 1. BARTSIA *foliis alter-* Bartsia de hojas alternas,
nea. *nis linearibus utrinque bi-* lineares, y con dos dientes
dentatis. en ambas partes.

Bartsia foliis alternis. Bartsia con hojas alternas.

Hort. cliff. 235. Amoen. acad.

i. p. 160.

Pedicularis seu Cristæ galli affinis, Virginiana, Ajugæ multifido folio apicibus coccineo, floribus pal- lidis in spicam congestis. Pedicular ó sea planta de Virginia, parecida á la Cres- ta de gallo, con hoja como la de la Aiuga, hendida en muchas partes, y de color coccineo por sus ápices; flo- res pálidas y amontonadas en espiga.
 Pluk. alm. 283. t. 102. f. 5.
 Rai. Suppl. p. 400.

Horminum tenui Coronopi folio, Virginianum. Mo- Hormino de Virginia, con hoja como la del Coronopo, pero delgada.
 ris. hist. 3. p. 395. sect. 11.
 t. 13. f. 28.

Cast. *Bartsia coccinea.*

Habita en la Virginia y Noveboraco. ¶

Tiene los cálices de color coccineo por su margen: las bracteas hendidas en tres partes; y la capsula que se abre elasticamente. La fructificacion de esta especie no se halla todavia bien exâminada.

Palli-
da. 2. *BARTSIA foliis alter- nis lanceolatis integerrimis, floralibus ovatis dentatis.* *Bartsia* de hojas alternas, lanceoladas y enterisimas, las florales aovadas y con dientes.

Bartsia foliis lanceolatis, indivisis, floralibus incisis. *Bartsia* con hojas lanceo- ladas, indivisas, y las flora- les cortadas.
 Gmel. Sib. 3. p. 201. n. 11.
 t. 42.

Bartsia foliis alternis bi- dentatis. *Bartsia* de hojas alternas y con dos dientes.
 Amœn. acad. 2.
 p. 356.

Cast. *Bartsia pálida.*

Habita en la Siberia. D. Gmel. Demidoff.

Vis-
cosa. 3. *BARTSIA foliis supe- rioribus alternis serratis, floribus distantibus latera- libus.* *Bartsia* con las hojas su- periores alternas, aserra- das; flores apartadas y la- terales.
 Huds. angl. 233. Ger.
 prov. 283.

704 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Euphrasia major, lutea, latifolia, palustris. Rai. hist. 772. angl. 3. p. 285. X Eufrasia palustre, mayor, con hoja ancha; y flor amarilla.

Euphrasia lutea, palustris. Pluk. alm. 142. t. 27. f. 5. X Eufrasia palustre, con flor amarilla.

Alectorolophos Italica, luteo-pallida. Barr. ic. 209. t. 665. X Alectorolofos ó sea cresta de gallo, de Italia, con la flor amarilla-pálida.

Cast. *Bartsia viscosa.*

Habita en lugares pantanosos cerca de riachuelos, de Inglaterra, Francia é Italia.

Alpina 4. *BARTSIA foliis oppositis cordatis obtuse serratis.* Roy. lugdb. 298. X *Bartsia* con hojas opuestas, de figura de corazon, y obtusamente aserradas.

Stehelinia foliis cordatis, amplexicaulibus, serratis, floralibus coloratis. Hall. helv. n. 312. X *Stehelinia* con hojas de figura de corazon, que abrazan el tallo, aserradas; y las florales de color.

Pedicularis genus montanum. Oed. dan. t. 42. X Género de *Pedicular* montano.

Clinopodium alpinum, hirsutum. C. B. P. 225. Pluk. alm. 110. t. 163. f. 5. X *Clinopodio* alpino, con pelo áspero.

Pedicularis alpina, Teucrii folio, atrorubente coma. Tourn. p. 172. X *Pedicular* alpina, con hoja como la del *Teucro*; y penacho de color entre negro y purpúreo.

Cast. *Bartsia alpina.*

Habita en los alpes de Lapponia, Suiza y de Saboya. 26

Gym-nandra 5. *BARTSIA diandra, foliis radicalibus binis petiolatis, caule subdiphylo unispicato, spica linearibus obtusa, verticillis bracteatis coarctatis.* Suppl. p. 278. X *Bartsia* de dos estambres; hojas radicales de dos en dos, pecioladas; tallo con dos ó tres hojuelas, y una espiga linear, obtusa; verticilos coarctados y con bracteas.

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 705

Gymnandra borealis. Pall. X
it. vol. 3. p. 710. t. A. f. 1. X
Gymnandra ó sea planta
boreal, con estambres descu-
biertos.

Lagotis glauca. Gärtner. X
act. petrop. vol. 14. p. 533. X
t. 18. X
Lagotis de color garzo.

*Veronica foliis inferiori-
bus ovatis, crenatis, supe-
rioribus rotundis, mucro-
natis, caule spica termi-
nato*. Gmel. Sib. vol. 3. p. X
219. n. 13. X
Veronica con las hojas in-
feriores aovadas, recortadas;
las superiores redondas, que
rematan en punta rigida; y
tallo terminado en espiga.

Gerberia. Stell. manuscr. X
Gerberia.

Cast. *Bartsia* de dos estambres.

Habita en terrenos del Septentrion cerca de Obo: en los
alpes mas altos de Dauria: en las peñas muy frias de
Kamtschatca por el lado del Septentrion donde no se
cria ninguna otra planta. ¶

Echa la *raiz* casi horizontal, un poco crasa, y de sabor
dulce y desabrido: las *hojas radicales* de dos en dos,
aserradas y muy lampiñas: el *tallo* del largo de un pal-
mo, rollizo, derecho, lampiño, muy sencillo; con dos
hojas en medio, alternas, aovadas y sin peciolo: la *es-
piga* que consta de verticilos coartados; con *bracteas*
aovadas y de color que tira á cerúleo: el *caliz* de color,
comprimido, con tres dientes, ó lacinias laterales y es-
cotadas: la *corola* de color cerúleo claro; con el *labio*
inferior hendido en dos ó tres partes: la *capsula* com-
primida y de quatro dientes por su ápice.

Varía por razon del clima y del suelo en la magnitud y
figura de las hojas: en hallarse tambien unidas por su
base y dos veces aserradas.

888. Género RINANTHUS. * Pedicularis species.

Tourn. t. 77. Elephas. Tourn. t. 482.

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de una pieza , casi redondo , inflado , comprimido , hendido en quatro partes y persistente.
- COR.** de un *petalo* , y boquiabierta : *tubo* casi cilindrico y del largo del caliz : *borde* que se abre y comprimido por su base : el *labio superior* con capacete , comprimido , escotado y mas angosto : el *inferior* extendido , plano , obtuso , y medio hendido en tres lacinias ; con la *del medio* mas ancha.
- ESTAMB.** *Filamentos* quatro , del largo del labio superior , baxo del qual están recogidos , y de ellos los *dos* son mas cortos : con las *anteras* echadas , con pelo áspero y por una parte hendidas en dos lacinias.
- PIST.** *Germen* aovado y comprimido : *estilo* filiforme , de la direccion de los estambres y mas largo que ellos : con el *stigma* obtuso y doblado.
- PERIC.** *Capsula* obtusa , derecha , comprimida , de dos celdillas y dos ventallas , con el *diseipimento* opuesto á ellas , y que se abre por sus márgenes.
- SEM.** muchas , y comprimidas.
- OBS.** *El Elefante* de Tournefort *tiene la margen de la capsula obtusa : el caliz desigual y con dos labios.*
La Cresta de gallo de Rivino *posee la margen de la capsula con apendices : las semillas cubiertas de una membrana floxa : el caliz igual y hendido en quatro partes.*

CARACTERES GENERICOS DE TOURN.

PEDICULARIS. p. 171.

La *flor* es de un petalo , anomala , personada y dividida en dos labios ; de los cuales el superior tiene capacete ; y el inferior se halla dividido en tres partes. Del caliz sale el pistilo , que pasa á fruto , que se abre en dos partes y divide en dos celdillas , y lleno de simientes oblongas , ó comprimidas y escotadas.

ELEPHAS COROL. p. 48.

La flor es de un petalo , anomala , personada , dividida en dos labios ; de los quales el superior se asemeja á una trompa de Elefante ; y el inferior se divide en muchas partes. Del caliz sale el pistilo , que pasa á fruto , dividido en dos celdillas y lleno de simientes oblongas.

E S P E C I E S .

Orientalis.

1. RHINANTHUS corollis labio superiore subulato incurvo. Rhinanto de corolas con el labio superior alesnado y encorvado.

Elephas Orientalis , flore magno , proboscide incurva. Elefante Oriental , de flor grande , con la trompa encorvada.
Tourn. cor. 48. it. 2. p. 299. t. 299. X

Cast. Rhinanto Oriental.

Habita en Oriente.

Produce el caliz hendido en quatro lacinias , con la primera (debaxo del pico de la corola) aovada ; las laterales redobladas por una y otra parte ; y la quarta recta y obtusa.

Elephas.

2. RHINANTHUS corollae labio superiore subulato recto. Roy. lugdb. 298. Rhinanto con el labio superior de la corola alesnado y recto.

Elephas Italica , flore magno , proboscide subrecta. Elefante de Italia , con la flor grande , y la trompa casi recta.
Tourn. cor. 48.

Elephas campoclarensium. Elefante de los campoclarenses.
Col. ecphr. 1. p. 186. t. 188.

Euphrasia lutea , floribus Elephantis caput cum proboscide referentibus. Moris. Eufrasia amarilla , de flores que se asemejan á la cabeza del Elefante con su trompa.
hist. 3. p. 432. sect. 11. t. 24. f. 14.

Elephas Orientalis , flore parvo , proboscide surrecta. Elefante Oriental , de flor pequeña , y con la trompa levantada. α

Tourn. cor. 48. it. 3. p. 54.

Y y 2

Cast.

708 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Cast. Rhinanto Elefante.

Habita en lugares sombríos de Italia y Siberia. ☉

Su traza es como la de la precedente ; pero la flor diversa por el caliz hendido en tres lacinias , las dos redobladas ; y la tercera mayor , derecha , plegada y aguda.

Crista galli.	3. RHINANTHUS <i>corolarum labio superiore compresso brevior.</i> Fl. lapp. 248.	Rhinanto con el labio superior de las corolas comprimido y mas corto.
	<i>Crista galli.</i> Riv. monop. t. 92.	Cresta de gallo.
	<i>Crista galli , fœmina.</i> Bauh. hist. 3. p. 436. Dod. pempt. 556.	Cresta de gallo , femenina.
	<i>Pedicularis pratensis , lutea , seu crista galli.</i> C. B. P. 163. Tourn. p. 172.	Pedicular pratense , de flor amarilla , ó cresta de gallo.
	<i>Crista galli , angustifolia , montana.</i> C. B. P. 163. prodr. 86.	Cresta de gallo , montana , con hoja angosta.
α	<i>Pedicularis angustifolia , montana.</i> Tourn. p. 172.	Pedicular montana , de hoja angosta. α
β	<i>Crista galli , mas.</i> Bauh. hist. 3. p. 436.	Cresta de gallo , masculina. β
	<i>Pedicularis pratensis , lutea , erectior , calyce floris hirsuto.</i> Tourn. p. 172.	Pedicular pratense , mas levantada , de flor amarilla , y caliz con pelo áspero.

Cast. Rhinanto cresta de gallo.

Habita en los prados de Europa : en los del Real Sitio del Escorial : de Bustarviejo , Cartuja del Paular de Segovia : en los de Cataluña , Aragon y otras muchas partes de España. ☉

Es de la altura de un pie y medio. Tiene las hojas muy lampiñas y aserradas : los cálices comprimidos , muy lampiños y en redecilla : las brácteas aovadas , aserradas y grandes. Gov. hort. 296.

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 709

Tri-
xago.

4. RHINANTHUS *caly-*
cibus hirsuto—tomentosis,
foliis oppositis, obtuse serr-
ratis, caule simplicissimo.

Rhinanto de cálices entre
con pelo áspero y tomento-
sos; hojas opuestas, obtusa-
mente aserradas; y tallo muy
sencillo.

Trixago Apula, unicaul-
lis. Col. ecphr. 1. p. 199.
t. 197. Moris. hist. 3. p. 427.
sect. 11. t. 24. f. 8.

Trixágo de Pulla, con un
tallo.

Crista galli spicata, flo-
re luteo, magno, Messanen-
sis.

Cresta de gallo de Mesi-
na, espigada, con la flor
amarilla y grande.

Chamædrys unicaulis, spi-
cata. C. B. P. 248.

Camedrys de un tallo, y
espigada.

Antirrhinum folio dissec-
to. C. B. P. 211.

Antirrhino con hoja cor-
tada.

Pedicularis maritima,
folio oblongo, serrato. To-
urn. p. 172.

Pedicular maritima, con
hoja oblonga y aserrada.

Trixago Chamædryos fo-
liis. Barr. ic. 774.

Trixágo con hojas como
las del Camedrys.

Cast. Rinantho Trixágo.

Habita en lugares marítimos, húmedos, y entre juncos,
de Palestina, Italia y Mompeller: en los arenales del
mar de Barcelona y otros del Mediterraneo. ☉
Sube á la altura de palmo y medio.

Ca-
pensis.

5. RHINANTHUS *caly-*
cibus tomentosis, bracteis
ovatis, foliis lanceolatis
dentatis. Syst. veg. p. 459.

Rhinanto con cálices to-
mentosos; bracteas aovadas;
hojas lanceoladas y con dien-
tes.

Buchnera (Africana) fo-
liis lanceolatis subdentatis,
calycibus tomentosis fruc-
tu longioribus. Amœn. acad.
6. afr. 18.

Buchnera (*Africana*) de
hojas lanceoladas, con algun
diente; cálices tomentosos y
mas largos que el fruto.

Pedicularis Æthyopica,
Rutæ caninæ aspero & fra-
gili folio. Pluk. alm. 283.
t. 310. f. 3.

Pedicular de Etiopia, con
hoja como la de la Ruda per-
runa, pero áspera y fragil.

Cast.

710 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Cast. Rhinanto del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en Etiopia.

Es planta con traza como la del *Trixágo*, y secándose se vuelve toda negra. Echa las *hojas* lanceoladas, con tres ó quatro dientes en ambas partes: la *espiga* oblonga; las *bracteas* tomentosas, aovadas y algo agudas: los *cálices* tambien tomentosos, hendidos en quatro partes y obtusos.

- Indica, 6. RHINANTHUS *foliis* Rhinanto con hojas casi
sublanceolatis pilosis inte- lanceoladas, pelosas y ente-
gerrimis. Fl. Zeyl. 238. risimas.
 Burm. ind. 131. t. 39. f. 1.
Hyssopus Zeylanicus, te- Hisopo de Zeylan, tierne-
nellus, pratensis. Burm. cito, pratense.
 Zeyl. 122.
 * *Veronicæ affinis Indica,* Planta de Indias, pareci-
tenuifolia, floribus è caly- da á la Veronica, con hojas
cibus barbatis, summo fere delgadas; flores que salen
caulium umbellatis. Pluk. de los cálices barbados, y
 alm. 384. t. 114. f. 2. Burm. puestas en umbela las mas
 veces en el remate de los ta-
 llos. α

Cast. Rhinanto de Indias.

Habita en Zeylan.

- Virgi- 7. RHINANTHUS *corol-* Rhinanto con las corolas
 nica. *lis fauce patentibus, foliis* abiertas por su garganta; y
sinuato-dentatis. Gron. virg. hojas entre sinuosas y den-
 192. † tadas.

Cast. Rhinanto de Virginia.

Habita en la Virginia.

Tiene las *anteras* con pelo rígido: y se parece á la *Gerardia* de color amarillo-roxo.

889. Género EUPHRASIA. * *Tourn. t. 78.*

Odontitis. Dill. gen. 6.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, cilindrico, hendido en quatro partes, desigual y persistente.

COR. de un *petalo*, boquiabierta: *tubo* de la longitud del caliz: el *labio superior* cóncavo y escotado: el *inferior* extendido, partido en tres lacinias, iguales y obtusas.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, filiformes, inclinados debaxo del labio superior: con las *anteras* de dos lóbulos; de las cuales las *inferiores* se hallan puntiagudas y como espinosas en el lóbulo inferior.

PIST. *Germen* aovado: *estilo* filiforme, de la figura y direccion de los estambres: con el *estigma* obtuso y entero.

PERIC. *Capsula* entre aovada y oblonga, comprimida y de dos celdillas.

SEM. numerosas, muy pequeñas y casi redondas.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 174.

La *flor* es de un *petalo*, anomala, personada y dividida en dos labios; de los cuales el superior está levantado y cortado en muchas partes; y el inferior en tres, cada una de las cuales se halla tambien hendida en otras dos. Del caliz sale el *pistilo*, que pasa á fruto, ó *capsula* oblonga, dividida en dos celdillas y llena de simientes pequeñas.

ESPECIES.

- | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Lati-
folia. | 1. EUPHRASIA <i>foliis</i> | X | Eufrasia con hojas entre dentadas y palmeadas; y flores casi en cabezuela. |
| | <i>dentato-palmatis</i> , <i>floribus</i>
<i>subcapitatis.</i> Sabb. hort. 3. | | |
| t. 7. | <i>Euphrasia purpurea</i> , <i>minor.</i> C. B. Prodr. III. Magn. | X | Eufrasia menor, con la flor purpúrea. |
| | monsp. 95. t. 94. | X | |

712 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Pedicularis purpurea, X Pedicular de primavera,
annua, minima, verna. Tourn. p. 172. X annua, muy pequeña; y con
 la flor purpúrea.

Euphrasia pratensis, Italica, latifolia. C. B. P. 234. X Eufrasia de Italia, praten-
 se, con hoja ancha.

Moris. hist. 3. p. 430. sect. X
 II. t. 24. f. 8. Rai. hist. 773. X

Euphrasia tertia, latifolia, pratensis. Col. ecphr. X Eufrasia tercera, praten-
 se, de hoja ancha.

200. t. 202. f. 2. X
Euphrasia. Barr. ic. 276. X Eufrasia,
 n. 1. & 3. X

Cast. Eufrasia de hoja ancha.

Habita en Pulla y Mompeller: en el circuito de Madrid, Real Sitio del Pardo: en Aragon, y abunda en Cataluña y otras partes de España. ☉

Tiene las *bracteas* palmeadas y con algun pelo áspero.

Offici- 2. EUPHRASIA *foliis ovatis lineatis argute den-* X Eufrasia de hojas aovadas,
 nalis. *tatis.* Mat. med. 178. Sabb. X rayadas, y con dientes agu-
 hort. 3. t. 9. dos.

Euphrasia caule ramoso, foliis ovatis acute dentatis. X Eufrasia de tallo ramoso;
 Hort. cliff. 325. X hojas aovadas y con dientes
 agudos.

Euphrasia officinarum. X Eufrasia de las oficinas.
 C. B. P. 233. Tourn. p. 174.

Euphrasia. Cam. epit. X Eufrasia.
 767. Taber. ic. 362. Riv. t.

90. Bauh. hist. 3. p. 432. X
 Dod. pempt. 54. X

Cast. Eufrasia officinal.

Habita entre pastos áridos de Europa: en los prados de la Cartuja del Paular de Segovia: en los de Valencia y Bustarviejo: en Avila, Cataluña, Aragon y otras muchas partes de España. ☉

Varía con la flor blanca, ó de color amarillo-roxo. R.

PROPIED. *Es algo amarga y astringente: se usa en la ophtalmia; pero con efectos poco observados.*

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 713

Tri-
cuspi-
data.

3. EUPHRASIA foliis linearibus tricuspидatis.

Eufrasia de hojas lineares y con tres puntas.

Euphrasia angustis tricuspидatis foliis, floribus ex albo purpureis. Pluk.

Eufrasia de hojas angostas y con tres puntas; y flores de color entre blanco y purpúreo.

alm. 142. t. 177. f. 1. Zan. hist. 110. t. 76.

Cast. Eufrasia de tres puntas.

Habita en Italia. ☉

Tiene las hojas lineares, con un diente en ambas partes; y la corola semejante á la de la Eufrasia oficial.

Odon-
tites.

4. EUPHRASIA foliis linearibus omnibus serratis.

Eufrasia con hojas lineares y todas aserradas.

Fl. dan. t. 625.

Odontites bracteis serratis, hirsutis. Hall. helv. n. 304.

Odontite de bracteas aserradas, y con pelo áspero.

Euphrasia pratensis, rubra. C. B. P. 234.

Eufrasia pratense, con la flor encarnada.

Pedicularis serotina, purpurascens flore. Tourn. p. 172.

Pedicular tardia, con la flor de color que tira á purpúreo.

Euphrasia altera. Dod. pempt. 55. Riv. t. 89.

Otra Eufrasia.

Euphrasia sylvestris, major, purpurea, latifolia. Col. ecphr. I. p. 201. t. 202. f. 1.

Eufrasia silvestre, mayor, con hoja ancha, y flor purpúrea. ^a

Cast. Eufrasia odontite.

Habita entre sembrados y pastos estériles de Europa: en los prados y dehesas de la Cartuja del Paular de Segovia: en Aragon, Cataluña y otras partes de España. ☉
Sube á la altura de mas de un pie. Echa el tallo con muchas ramas en forma de aspa. Varía con hojas aovadas: flores ladeadas, purpúreas y blancas.

714 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

- Lutea.** 5. *EUPHRASIA foliis linearibus serratis, superioribus integerrimis.* Jacq. Eufrasia con hojas lineares, aserradas; y las superiores enterisimas. austr. t. 398.
- Odontites bracteis glabris integerrimis.* Hall. helv. Odontite con bracteas lampiñas y enterisimas. n. 305.
- Odontites flore luteo.* Riv. Odontite con la flor amarilla. t. 91.
- Euphrasia pratensis, lutea.* C. B. P. 234. Moris. Eufrasia pratense, con la flor amarilla. hist. 3. p. 432. sect. II. t. 24. f. 16.
- Pedicularis serotina, lutea.* Tourn. p. 172. Pedicular tardia, con la flor amarilla.
- Euphrasia sylvestris, lutea, montana, angustifolia, major, altera.* Col. ecphr. 1. Otra Eufrasia silvestre, montana, mayor, con hoja angosta, y flor amarilla. p. 204. t. 203.

Cast. Eufrasia amarilla.

Habita en lugares montuosos y áridos de la Europa austral: en la Alcarria, Serrania de Cuenca, Aragon y Cataluña entre el Brezo vulgar. ☉
 Sube á la altura de pie y medio; con el tallo rollizo y de color que tira á roxo.

- Lini-folia.** 6. *EUPHRASIA foliis linearibus omnibus integerrimis, calycibus glabris.* Eufrasia con hojas lineares, todas enterisimas; y cálices lampiños. Ger. prov. 285.
- Euphrasia foliis Lini angustioribus.* C. B. P. 234. Eufrasia con hojas como las del Lino y mas angostas.
- Pedicularis foliis Lini angustioribus.* Tourn. p. 172. Pedicular con hojas como las del Lino y mas angostas.
- Euphrasia Linifolia.* Col. ecphr. 2. p. 68. t. 69. Eufrasia con hoja como la del Lino.

Cast. Eufrasia con hoja de Lino. *vulgo:* Algarabia.

Habita en el Casal, prados ó cercas de Manzanares y en otras partes de España. ☉

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 715

7. EUPHRASIA *foliis linearibus, calycibus glutinoso-hispidis.* Ger. prov. 285. Eufrasia con hojas lineares; y cálices entre glutinosos y erizados.

Gou. illustr. 37. *Odontites foliis viscidis, rariter serratis.* Hall. helv. n. 306. Odontite de hojas viscosas, y con aserraduras claras.

Pedicularis annua, lutea, tenuifolia, viscosa, pomum redolens. Garid. aix. 351. t. 78. Pedicular annua, viscosa, con hoja delgada; flor amarilla y que huele mucho á manzana.

Cast. Eufrasia viscosa. *Habita en lugares pedregosos y estériles de Provenza.* Se diferencia de la *Eufrasia amarilla* por las hojas entre lineares y lanceoladas, y no estrechamente lineares; por los cálices vellosos, viscosos y no lampiños; y por las corolas cerradas y no mas cortas que los estambres. Debe distinguirse de la *Eufrasia con hoja de Lino*.

89or Género MELAMPYRUM. * Tourn. t. 78.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, tubuloso, hendido en quatro lacinias, delgadas y persistentes.

COR. de un *petalo*, boquiabierta: *tubo* oblongo, encorvado ácia atrás: *borde* comprimido: el *labio superior* con capacet, comprimido, escotado, con ribetes pequeños, laterales, redoblados: el *inferior* plano, derecho, del largo del superior, medio hendido en tres lacinias iguales, obtuso, y señalado con dos eminencias en medio.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, alesnados, encorvados, recogidos debaxo del labio superior, de los quales los dos son mas cortos: con las *anteras* oblongas.

PIST. *Germen* puntiagudo: *estilo* sencillo, de la longitud y direccion de los estambres: con el *estigma* obtuso.

PERIC. *Capsula* oblonga, obliqua, puntiaguda, comprimida; con su *margin superior* convexa; y la *inferior* recta, de dos celdillas y dos ventallas; con el *diseipimen-*

716 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

mento contrario á ellas, y que se abre por la sutura superior.

SEM. mellizas, aovadas, gibosas y acompañadas de un cuerpecito por su base.

CARAC. GENER. DE TOURN. p. 173.

La flor es de un petalo, anomala, personada ó sea de figura de mascarilla, dividida en dos labios; de los cuales el superior se halla con capacete; y el inferior entero. Del caliz sale el pistilo, que pasa á fruto ó capsula casi redonda, que se abre en dos partes, y divide en dos celdillas con su disepimento intermedio, y llena de simientes que se parecen á un grano de trigo.

ESPECIES.

Cris-
tatum. 1. MELAMPYRUM *spicis quadrangularibus, bracteis cordatis compactis denticulatis imbricatis.* Scop. Melampyro de espigas quadrangulares; bracteas de figura de corazon, compactas, con dientecitos y apiñadas. Carn. ed. 2. n. 757. Riv. t. 80.

Melampyrum foliis integerrimis, floribus spicatis, bracteis duplicatis, cristatis. Hall. helv. n. 311. Melampyro con hojas enterisimas; flores en espiga; bracteas duplicadas y en forma de cresta.

Melampyrum luteum, angustifolium. C. B. P. 234. Melampyro con hoja angosta, y flor amarilla.

Melampyrum luteum, Linariae folio. Bauh. prod. 112. Melampyro con hoja como la de la Linaria; y flor amarilla.

Melampyrum angustifolium, cristatum. Pluk. alm. 249. t. 99. f. 2. Melampyro de hoja angosta y crestado.

Cast. Melampyro crestado.

Habita en los prados ásperos de la Europa boreal: en las dehesas y bosques de Robles de la Cartuja del Paular de Segovia y otras partes de España. ☉

Varía con las flores blancas.

Ar-
vense.

2. MELAMPYRUM *spicis conicis laxis, bracteis dentato-setaceis coloratis.*

Melampyro con espigas cónicas, laxás; bracteas entre dentadas y setáceas, y de color.

Riv. t. 79. Sabb. hort. 3. t. 8.

Melampyro con hojas enterisimas; y bracteas medio pinnadas.

Melampyrum foliis integerrimis, bracteis semipinnatis. Hall. helv. n. 310.

Melampyro con penacho de color que tira á purpúreo.

Melampyrum purpurascente coma. C. B. P. 234. Tourn. p. 173.

Melampyro de muchos autores, ó Trigo de Vacas.

Melampyrum multis, sive Triticum Vaccinum. Bauh. hist. 3. p. 439. Dod. pempt. 541.

Melampyro lanuginoso, de Andalucia.

Melampyrum lanuginosum, Baeticum. C. B. P. 234.

Cast. Melampyro arvense.

Habita entre los sembrados de Europa: en la Sierra de Miraflores: faldas de los Pirineos: montes de Burgos, Leon, Asturias y otras partes de España. ☉

Nemo-
rosum.

3. MELAMPYRUM *floribus secundis lateralibus, bracteis dentatis cordato-lanceolatis, summis coloratis sterilibus, calycibus lanatis.* Oed. dan. t. 305.

Melampyro de flores la- deadas, laterales; bracteas con dientes, entre de figura de corazon y lanceoladas; las de mas arriba de color, estériles ó sea sin flor; y cálices lanudos.

Melampyrum foliis ovato-lanceolatis, floralibus hamatis, acute dentatis, patulis, calycibus hirsutis. Hall. helv. n. 309.

Melampyro de hojas entre aovadas y lanceoladas; las florales ganchosas, agudamente dentadas, extendidas; y cálices con pelo áspero.

Melampyrum bracteis unifloris, coloratis, cordatis, calycibus hirsutis. Scop. carn. ed. 2. n. 756.

Melampyro de bracteas con una flor, de figura de corazon, de color; y cálices con pelo áspero.

Melampyrum sylvaticum. Riv. t. 81. Hall.

Melampyro silvatico.

718 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

- Melampyrum coma cærulea*. C. B. P. 234. Melampyro con penacho cerúleo.
- Parietaria sylvestris* I. Clus. hist. 2. p. 44. Parietaria silvestre, primera.

Cast. Melampyro de bosques.

Habita en bosques sombríos de la Europa boreal. ☉

- Pra- 4. MELAMPYRUM flo- Melampyro con flores la-
tense. ribus secundis lateralibus, deadas, laterales; en pare-
conjugationibus remotis, co- jas apartadas; y las corolas
rollis clausis. Scop. carn. cerradas.
ed. 2. n. 758.

Melampyrum foliis imis integerrimis, mediis dentatis, floralibus hastatis. Hall. helv. n. 308. Melampyro con las hojas de abaxo enterisimas; las del medio dentadas; y las florales de hechura de alabarda.

Melampyrum foliis lanceolatis, florum paribus remotis. Fl. lapp. 240. Melampyro con hojas lanceoladas; y los pares de las flores apartados.

Melampyrum luteum, latifolium. C. B. P. 234. Tourn. p. 173. Melampyro con hoja ancha; y flor amarilla.

Cast. Melampyro pratense.

Habita en prados secos de la Europa boreal: en los montes de Avila, Pirineos, Castilla la vieja, Sierra-nevada, Pinar de la Cartuja del Paular de Segovia, en Aragon y Cataluña. ☉

Varía con las *hojas* enterisimas ó laciniadas.

- Sylva- 5. MELAMPYRUM flo- Melampyro con flores la-
ticum. ribus secundis lateralibus, deadas, laterales, parejas
conjugationibus remotis, co- apartadas; y corolas que se
rollis hiantibus. Flor. dan. abren.
t. 145.

Melampyrum foliis integerrimis, floribus hiantibus. Hall. helv. n. 307. Melampyro con hojas enterisimas; y flores que se abren.

Melampyrum latifolium, floribus parvis luteis. Flor. lapp. 240. Melampyro con hoja ancha; flores pequeñas y amarillas.

Cast.

Cast. Melampyro silvatico.

Habita en las selvas de la Europa boreal: en Moncayo, Monseñ y otros montes de España. ☉

Se diferencia de la precedente por las corolas la mitad mas cortas, y que se abren: por ser del todo de color amarillo-roxo, y no blancas en el tubo.

891. Género LATHRÆA. * Clandestina.

Tourn. t. 424.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, en forma de campana, recto y profundamente hendido en quatro partes.

COR. de un petalo, boquiabierta: tubo mas largo que el caliz: borde ventricoso: el labio superior cóncavo, con capacete, ancho, angosto y ganchoso por su ápice: el inferior mas pequeño, redoblado, obtuso y hendido en tres lacinias.

Nectario: una glandula escotada, deprimida en ambas partes, cortísima, é inserta en el receptáculo de la flor á uno de los ángulos del germen.

ESTAMB. Filamentos quatro, alesnados, del largo de la corola y recogidos debaxo del labio superior: con las anteras obtusas, deprimidas y arrimadas entre sí.

PIST. Germen globoso y comprimido: estilo filiforme, de la longitud y direccion de los estambres: con el estigma truncado é inclinado.

PERIC. Capsula casi redonda, obtusa, con puntita, de una celdilla, de dos ventallas que se abren elásticamente, y vestida con el caliz muy grande y abierto.

SEM. pocas, y casi globosas.

OBS. Se parece á la *Orobanca* por tener la glandula nectarifera.

CARACT. GENER. DE TOURN.

CLANDESTINA. p. 652.

La flor es de un petalo, personada, ó sea en mascarilla, tubulosa por debaxo, y dividida en dos labios por arriba; de los cuales el superior se halla arqueado; y el ni-

inferior dividido en tres partes. Del caliz tubuloso y recortado sale el pistilo, que pasa á fruto oblongo, de una celdilla, que se abre en dos partes, y arroja elásticamente las simientes casi redondas.

E S P E C I E S.

Clandestina.

I. *LATHRÆA caule ramoso subterrestri, floribus erectis solitariis.* Latrea con el tallo ramoso, casi todo puesto debaxo de la tierra; flores derechas y solitarias.

Lathræa foliis cordatis, floribus fasciculatis. Guett. stamp. 454. Dalib. paris. 191. Latrea con hojas de figura de corazon; y flores en haces.

Clandestina flore subcæruleo. Tourn. p. 652. Clandestina con la flor algo cerúlea.

Orobanche montana. Rudb. elys. 2. p. 233. f. 14. Orobanca montana.

Orobanche flore majore, ex cæruleo purpurascente. C. B. P. 87. prodr. 31. Burs. III. 155. Rudb. elys. 2. p. 229. f. 2. Orobanca con la flor mas grande, y de color que de azul tira á purpúreo.

Orobanche seu Dentaria aphyllis, purpurea, cespite denso. Moris. hist. 3. p. 503. sect. 12. t. 16. f. 15. Orobanca ó Dentaria sin hojas, con flor purpúrea y cespèd denso.

Planta Clandestina, seu Madrona. Dalech. hist. 960. Planta Clandestina ó Madrona.

Cast. Latrea Clandestina.

Habita en lugares sombríos y húmedos de Francia, Pireneos é Italia: en el parque del Excmo. Sr. Duque del Infantado: montes de Burgos, que llaman *Pancarvo*, cerca de las fuentes de Ontoria: en Zervera del Condado de Pernia, en un bosque llamado la *Dehesa*, en cuyo pais es bastante conocida con el nombre de *Madrona* ó *Terba de la Matriz*: en Liebana, montes de Leon, Asturias, Galicia y otras partes en las orillas de los riachuelos. ¶

Posee el tallo corimboso, debaxo de la tierra; de manera que las frutificaciones solamente sobresalen en cada ramo.

LA-

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 721

Phae-
lypæa.

2. LATHRÆA corollis
campanulato-patentibus.

Latrea con las corolas de
figura de campana y abier-
tas.

Phelypæa Lusitanica, flo-
re luteo. Tourn. cor. 47.

Phelypea de Portugal,
con la flor amarilla.

Orobanche elegantissima,
verna, flore luteo. Grisl. lu-
sit. Moris. hist. 3. p. 502.

Orobancha muy hermosa,
de primavera, con flor ama-
rilla.

* *Phelypæa Orientalis*, flo-
re coccineo. Tourn. cor. 47.

Phelypea Oriental, con la
flor coccinea. α

Cast. Latrea Phelypea.

Habita en lugares sombríos de Portugal. Z

Anbla-
tum.

3. LATHRÆA corolla-
rum labiis indivisis.

Latrea con los labios de
las corolas indivisos.

Anblatum Orientale, flo-
re purpurascente. Tourn.
cor. 48.

Anblato Oriental, con la
flor que tira á color purpú-
reo.

Cast. Latrea Anblato ó sea sin hojas.
Habita en Oriente. Z

Squa-
maria.

4. LATHRÆA caule sim-
plicissimo, corollis pendu-
lis, labio inferiore trifido.
Flor. dan. t. 136.

Latrea con el tallo muy
sencillo; corolas pendulas,
y el labio inferior hendido
en tres partes.

Squamaria. Riv. t. 89.

Escamosa ó sea planta con
muchas escamas.

Dentaria. Matthiol. 964.

Dentaria.

*Orobanche radice denta-
ta*, major. C. B. P. 88.

Orobancha mayor, con la
raiz dentada.

*Orobanche radice squa-
mata, foliis rotundis, flore
pendente & suave rubente*.
Rubb. elys. 2. p. 234. f. 17.

Orobancha con la raiz es-
camosa; hojas redondas; flor
pendula, y de color rubio
delicado.

*Orobanche radice dentata,
altius radicata, foliis & flo-
ribus albo-purpureis*. Mentz.
pug. t. 3. f. 3. Moris. hist. 3.
p. 503. sect. 12. t. 16. f. 14.

Orobancha con la raiz
dentada, arraigada mas pro-
fundamente; hojas y flores
de color entre blanco y pur-
púreo.

TOM. IV.

Zz

Cast.

722 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Cast. Latrea de escamas.

Habita en lugares muy sombríos de la Europa mas fria. 24

392. Género SCHWALBEA. † Gron. virg. 71.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, entre tubulado y ventricoso, estriado, obliquo y hendido en quatro lacinias: la de mas arriba muy corta: las laterales mas largas; y la infima mas larga, mas ancha y escotada.

COR. de un petalo, boquiabierta: tubo de la longitud del caliz: el borde derecho: el labio superior tambien derecho, cóncavo y enterisimo: el inferior de la misma longitud, obtuso y hendido en tres lacinias pequeñas é iguales.

ESTAMB. Filamentos quatro, filiformes, del largo de la corola, de los cuales dos son poco mas cortos: con las anteras echadas.

PIST. Germen casi redondo: estilo de la longitud, figura y direccion de los estambres: con el estigma gruesecito y encorvado ácia atrás.

PERIC. Capsula de dos celdillas?

SEM. una sola, casi redonda y pequeña.

ESPECIE.

Americana.

I. SCHWALBEA. Gron. Schwalbea. virg. 92.

Euphrasia major, Mariana, floribus spicatis, amplis, tubis longioribus, summis oris profunde incis. Pluk. mant. 73. t. 348. f. 2? Eufrasia mayor, de la Is- la Mariana, con flores en es- piga, anchas, tubos mas lar- gos, y las orillas de mas ar- riba profundamente cortadas.

Cast. Schwalbea Americana.

Habita en la America Septentrional.

Echa el tallo muy sencillo, de quatro lados y veloso: las hojas lanceoladas y velosas: las flores alternas y sentadas: el caliz tambien veloso; las corolas inclinadas, y de color entre negro y rojo.

De-

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 723

Debe exâminarse con mas exâctitud la fructificacion de esta especie ; porque no bastó á *Linneo* la muestra que le envió *Gronovio*.

893. Género TOZZIA- † *Mich.* 16.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, tubulado, muy corto, con cinco dientes y persistente.

COR. de un *petalo*, boquiabierto: *tubo* cilindráceo, mas largo que el caliz: *borde* abierto: el *labio superior* hendido en dos partes: el *inferior* hendido en tres lacinias casi iguales y redondas.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, recogidos debaxo del labio superior: con las *anteras* casi redondas.

PIST. *Germen* aovado: *estilo* filiforme, de la longitud y direccion de los estambres: con el *estigma* en cabezuela.

PERIC. *Capsula* globosa, de una celdilla y una ventalla.
SEM. una sola, y aovada.

E S P E C I E.

- | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Al-
Pina. | 1. TOZZIA. Jacq. austr. t. 165. | Tozzia. |
| | <i>Tozzia alpina, lutea, Alsines folio, radice squamata.</i> Mich. gen. 20. t. 16. | Tozzia alpina, con la flor amarilla; hoja como la de la Alsine; y raiz escamosa. |
| | <i>Euphrasia lutea, Alsine folia, radice squamata.</i> C. B. P. 234. prodr. III. | Eufrasia con la flor amarilla; hoja como la de la Alsine; y raiz escamosa. |
| | <i>Dentaria Buguloides, radice globosa, squamulis myontoideis, alpina.</i> Mens. pug. t. 9. f. 3. 4. | Dentaria alpina, como Bugula, con la raiz globosa; y escamitas como musculos. |
| | <i>Orobanche Buglossoides, radice rotunda, squamulis myontoideis, alpina.</i> Moris. hist. 3. sect. 12. t. 16. fig. antepenult. | Orobanca alpina, como Buglosa, con raiz redonda; y escamitas como musculos. |

724 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Anonyma Fratr. Grego- ~~rii~~ *Anonyma de Fr. Grego-*
rii, radice Dentariæ. Col. ~~rio~~, con la raiz como la de
 ecphr. 2. p. 49. t. 50. ~~la Dentaria.~~

Cast. *Tozzia alpina.*

Habita en lugares ásperos y húmedos de los alpes de Sui-
 za, Austria é Italia : y en los Pirineos de España. 24

894. Género PEDICULARIS. * *Tourn. t. 77.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, casi redondo, ventricoso,
 hendido en cinco laciniás iguales y persistente.

COR. de un *petalo*, boquiabierto: *tubo* oblongo y giboso:
labio superior en forma de capacete, derecho, com-
 primido, escotado y mas angosto: el *inferior* exten-
 dido, plano, obtuso y medio hendido en tres laci-
 niás; con la *del medio* mas angosta.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, del largo del labio superior,
 debaxo del qual se hallan recogidos, y de ellos los
dos son mas cortos: con las *anteras* echadas, casi re-
 dondas y comprimidas.

PIST. *Germen* algo redondo: *estilo* filiforme, de la direc-
 cion de los estambres, pero mas largo: con el *estig-*
ma obtuso y doblado.

PERIC. *Capsula* casi redonda, obliqua, terminada en pun-
 ta rígida, que se abre por su ápice, de dos celdillas
 y con el *diseipimento* opuesto á las ventallas.

SEM. muchas, casi redondas, comprimidas y truncadas:
receptáculos oblongos y con piececito.

OBS. *La capsula en las mas especies se halla obliqua*
por su ápice.

El *Cetro Carolino de Rudb.* tiene la capsula regular, y
 la boca de la corola cerrada.

Y se hallan especies con el *caliz* hendido en dos partes.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 171.

La *flor* es de un petalo, anomala, en forma de mascarilla y dividida en dos labios; de los cuales el superior se halla con capacete; y el inferior dividido en tres partes.

Del

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 725

Del caliz sale el pistilo, que pasa á fruto, que se abre en dos partes y divide en dos celdillas, lleno de simientes oblongas, ó comprimidas y ribeteadas.

ESPECIES CON EL TALLO RAMOSO.

Pa-
lustris.

1. PEDICULARIS caule ramoso, calycibus cristatis calloso-punctatis, corollis labio obliquis. Fl. dan. t. 225. Riv. t. 92.

Pedicular con el tallo ramoso; cálices crestados, con puntos callosos; y corolas obliquas en su labio.

Pedicularis caule ramoso, foliis pinnatis, pinnis pinnatis, dentatis, calyce bifido. Hall. helv. n. 320.

Pedicular con el tallo ramoso; hojas dos veces pinnadas, dentadas; y caliz hendido en dos partes.

Pedicularis caule ramoso, erecto, calycibus bifidis, quadrifidisque, laciniis fimbriatis. Crantz. austr. p. 324.

Pedicular de tallo ramoso, derecho; cálices hendidos en dos y (á veces) en quatro lacinias cortadas en flecos.

Pedicularis Danica, maxima. Lob. illustr. 147.

Pedicular muy grande, de Dinamarca.

Cast. Pedicular palustre.

Habita en lugares pantanosos de la Europa Septentrional. ○

Tiene las corolas purpúreas.

Syl-
vatica.

2. PEDICULARIS caule ramoso, calycibus oblongis angulatis lævibus, corollis labio cordato. Fl. dan. t. 225.

Pedicular de tallo ramoso; cálices oblongos, angulados, lisos; y corolas con el labio de figura de corazon.

Pedicularis caule ramoso, procumbente, foliis pinnatis, pinnis dentatis. Hall. helv. n. 321.

Pedicular de tallo ramoso, tendido; hojas pinnadas; y hojuelas con dientes.

Pedicularis pratensis, purpurea. C. B. P. 163. Tourn. p. 173.

Pedicular pratense, con la flor purpúrea.

Pedicularis minor. Riv. t. 92.

Pedicular menor.

Fis-

726 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Fistularia. Dod. pempt. \times *Fistularia*.
556. \times

Cast. Pedicular silvática.

Habita en las selvas pantanosas de Europa : en los prados y dehesas lagunosas del Real Sitio del Escorial , de la Cartuja del Paular de Segovia y otras muchas partes de España. ○

Tiene las *hojas* alternas , dos veces hendidas al través : las *flores* axilares , solitarias ; y los *pedunculos* muy cortos.

Ros-
trata.

3. *PEDICULARIS caule declinato subramoso , corollis galea rostrato-acuminatis , calycibus cristatis subhirsutis.* Jacq. austr. t. 205. \times Pedicular de tallo declinado y algo ramoso ; corolas con pico puntiagudo en el capicete ; cálices crestados y con algun pelo áspero.

Pedicularis alpina , Filicis folio , minor. C. B. P. 163. Tourn. p. 173. \times Pedicular alpina , menor, con hoja como la del Helecho.

Alectorolophus alpina , III. minor. Clus. hist. 2. p. 210. \times Alectorolopho alpino , ter-
cero , menor.

Cast. Pedicular con pico.

Habita en los alpes de Suiza y Austria : en los prados de la Cartuja del Paular de Segovia y otras partes de España.

Poee el tallo sencillo , alguna vez ramoso y comunemente tendido.

ESPECIES CON EL TALLO MUY SENCILLO.

4. *PEDICULARIS caule simplici , floribus ternovorticillatis , corollis clausis , calycibus cristatis , capsulis regularibus.* Oed. dan. t. 26. \times Pedicular con el tallo sencillo ; flores de tres en tres y en verticilo ; corolas cerradas ; cálices crestados ; y capsulas regulares ó que no son obliquas.

Pedicularis capsulis subrotundis , regularibus. Gmel. Sib. 3. p. 206. n. 17. \times Pedicular con las capsulas casi redondas y regulares.

Scep-

Sceptrum Carolinum. X Cetro Carolino.
 Rudb. it. 1. t. 1. Fl. lapp. X
 243. t. 4. f. 4. Hort. cliff. 233. X

Cast. Pedicular Cetro Carolino.

Habita en las selvas de tierra esponjosa y regadia de Suecia, Prusia y Rusia. ¶
 Echa el tallo del largo de tres pies y muy hermoso: las corolas cerradas, amarillas y de color sanguineo en su boca.

Verticillata.

5. *PEDICULARIS caule simplici, foliis quaternis.* X
 Jacq. austr. t. 206.

Pedicularis foliis pinnatis, quaternis, floribus spicatis. Hall. helv. ed. 2. n. 318. t. 9. f. 1.

Pedicularis alpina, floribus purpureis, spicatis, foliis pinnatis, verticillatis. Hall. helv. ed. 1. n. 623. t. 17. f. 1.

Alectorolophus alpina, II. floribus purpureis. Clus. hist. 2. p. 210.

Filipendula montana alpina. C. B. P. 163.
Pedicularis alpina, altera, Asphodeli radice. Tourn. p. 173.

Cast. Pedicular verticilada.

Habita en la Siberia, Suiza y Austria. ¶

Tiene las corolas obtusas, de color purpúreo y que varía en blanco. Gmel.

Echa las flores en espiga y terminales: las bracteas pequeñas: la raíz con raicillas como cordeles y agregadas.

Pedicular con el tallo sencillo; y hojas de quatro en quatro.

Pedicular con hojas pinnadas, de quatro en quatro; y flores en espiga.

Pedicular alpina, con flores purpúreas, en espiga; hojas pinnadas y en verticilo.

Alectorolopho (ó sea planta que lleva flores como crestas de gallo) alpino, segundo, con flores purpúreas.

Otra Filipendula montana.

Otra Pedicular alpina, con raíz como la del Asfodelo.

728 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Resu-
pinata.

6. PEDICULARIS caule *simplici, foliis lanceolatis serratis crenulatis, floribus resupinatis.* Gmel. Sib. 3. p. 204. t. 44.

Pedicular de tallo sencillo; hojas lanceoladas, con aserraduras, recortaditas; y flores resupinadas.

X

Cast. Pedicular resupinada.

Habita en la Siberia. D. Gmel. D. Demidoff.

Arroja el tallo del largo de un pie, liso y muy sencillos: las hojas lanceoladas, alternas, indivisas, profundamente aserradas, con las aserraduras recortaditas: las flores que salen de las axilas superiores, solitarias y sentadas: el caliz liso, obtuso y hendido en dos partes: la corola de color purpúreo muy subido y resupinada; con el capacete ganchoso y comprimido: el vexilo ancho y redondo.

Varia con las flores de color de carne, ó de leche. R.

Recu-
tita.

7. PEDICULARIS caule *simplici, foliis pinnatifidis serratis, spica foliosa, calycibus coloratis, corollis obtusis.* Syst. veg. 461. Jacq. austr. t. 258.

Pedicular con el tallo sencillo; hojas hendidas al través, aserradas; espiga foliosa; cálices de color; y corolas obtusas.

Pedicularis caule simplici, foliis pinnatis, floribus spicatis, staminibus eminentibus. Hall. helv. n. 316. t. 8. f. 1.

Pedicular con el tallo sencillo; hojas pinnadas; flores en espiga; y estambres que sobresalen.

X

Cast. Pedicular de capacete sin pico.

Habita en los alpes mas altos de Suiza y Austria.

Tiene el tallo sencillo: las hojas hendidas al través y aserradas: la espiga algo foliosa: los cálices de color: la corola purpúrea; con el capacete obtuso y sin pico.

Tris-
tis.

8. PEDICULARIS caule *simplici, corollarum galeis margine villosis.*

Pedicular con el tallo sencillo; y los capacetes de las corolas vellosos por su margen.

X

Pedicularis caule simpli-
ci, foliis semi-pinnatis, pin-
nulis obtusis, acute serratis. Pedicular de tallo sencil-
 llo; hojas medio pinnadas,
 con las hojuelas ó lacinias
 obtusas y agudamente aser-
 radas.
 Gmel. Sib. 3. p. 212. n. 23.

Cast. Pedicular triste.

Habita en la Siberia.

Posee el tallo muy sencillo y del largo de un gema: las
 hojas alternas, hendidas al través y aserraditas: las flo-
 res amontonadas en espiga ó en cabezuela: las corolas
 obtusas y de color amarillo-roxo; con el capacete un
 poco encorvado y veloso por su margen.
 Es planta con mucho pelo áspero. Tiene el pico de la co-
 rola bastante obtuso, y las flores de color amarillo-blan-
 co, amontonadas en espiga apretada. Gmel. loc. cit.

Flam-
 inca.

9. *PEDICULARIS caule*
simplici, foliis pinnatis re-
tro-imbricatis. Gmel. Sib. 3.
 p. 212. Oed. t. 30? Pedicular con el tallo sen-
 cillo; hojas pinnadas y api-
 fiadas por detras.

Pedicularis caule simpli-
ci, foliis semipinnatis obtu-
sis, laciniis imbricatis cre-
natis. Fl. lapp. 244. t. 11.
 f. 2. Pedicular de tallo sencil-
 llo; hojas medio pinnadas,
 obtusas, con sus lacinias
 apiñadas y recortadas.

Pedicularis caule simpli-
ci, foliis pinnatis, pinnis
dentatis, denticulis retro-
versis. Hall. helv. n. 315.
 t. 8. f. 2. Pedicular de tallo sencil-
 llo; hojas pinnadas; hojue-
 las dentadas; y los diente-
 citos vueltos atrás.

Pedicularis alpina, folio
Ceterach. C. B. P. 163. To-
 urn. p. 173. Pedicular alpina, con ho-
 ja como la de la Doradilla.

Cast. Pedicular de color de llama.

Habita en los alpes de Lapponia y Suiza. 24

Tiene las corolas entre de color negro y purpúreo, seña-
 ladamente en su ápice.

730 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Hir-
suta.

10. PEDICULARIS caule *simplici, foliis dentato-pinnatis linearibus, calycibus hirsutis.* Pall. it. 3. p. 34.

Pedicular de tallo sencillo; hojas entre dentadas y pinnadas, lineares; y cálices con pelo áspero.

Pedicularis caule simplici, calycibus villosis, foliis linearibus dentatis crenatis. Fl. lapp. 245. t. 4. f. 3. Oed. dan. t. 30?

Cast. Pedicular con pelo áspero.

Habita en los alpes de Lapponia. ¶

Posee las corolas encarnadas.

Incar-
nata.

11. PEDICULARIS caule *simplici, foliis pinnatis serratis, calycibus rotundatis glabris, corollis galeata uncinata acuta.* Pall. it. 2. p. 404. Jacq. austr. t. 140.

Pedicular de tallo sencillo; hojas pinnadas, aserradas; cálices redondeados, lampiños; y corolas con el capacete ganchoso y agudo.

Pedicularis foliis pinnatis, pinnis dentatis, floribus rostratis, spicatis, calycibus tomentosis. Hall. helv. n. 319. secund. Jacq.

Cast. Pedicular encarnada.

Habita en la Siberia Austria, y Suiza.

Produce las *hojas* radicales, pinnadas, del largo de un pie; con las *hojuelas* hendidas al través y aserradas; las del tallo hendidas al través casi hasta la base y aserradas: el *tallo* liso, del largo de mas de un pie y con hojas alternas: la *espiga* desnuda: los *cálices* medio globosos, y con cinco dientes lampiños: la *corola* encarnada; con el *capacete* arqueado, muy ganchoso y agudo.

Iap-
ponica

12. PEDICULARIS caule *simplici, foliis pinnatifidis serratis, calycibus bifidis obtusis.* Oed. dan. t. 2. Pall. it. 3. p. 34.

Pedicular con el tallo sencillo; hojas hendidas al través, aserradas; cálices hendidos en dos partes y obtusos.

Pe-

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 731

Pedicularis caule simplicifolia, foliis lanceolatis semipinnatis serratis acutis. Fl. lapp. 242. t. 4. f. 1. Pedicular con el tallo sencillo; hojas lanceoladas, medio pinnadas, aserradas y agudas.

Cast. Pedicular de Lapponia.

Habita en los alpes de Lapponia donde es muy frecuente. ¶

Tiene las corolas de color amarillo-roxo.

Co-
nosa.

13. *PEDICULARIS caule simplici, spica foliosa, corollis galea acuta emarginata, calycibus quinquedentatis.* Gov. illustr. 37. Pall. Pedicular de tallo sencillo; espiga foliosa; corolas con el capacete agudo, escotado; y cálices de cinco dientes.
it. 1. p. 148.

Pedicularis foliis bipinnatis, calyce non cristato, floribus ochroleucis in spicam nudam congestis. Allion. pedem. 50. t. 12. f. 1. Pedicular con hojas dos veces pinnadas; caliz que no es crestado; flores de color entre amarillo y blanco, y amontonadas en espiga desnuda.

α *Pedicularis alpina, foliis alternis, pinnis semipinnatis, floribus rostratis, ochroleucis.* Cet. Allion. pedem. 50. t. 12. f. 2. ex sententia Govani. R. Pedicular alpina, con hojas alternas; hojuelas medio pinnadas; flores con pico, y de color entre amarillo y blanco. α

Cast. Pedicular de penacho.

Habita en los alpes de Italia y Pirineos. ¶

Posee el caliz con cinco dientes, tubuloso, enterisimo y algo peloso: la corola amarilla, y el labio superior agudo; pero escotado, con dos dientes agudos é inclinados.

Fo-
liosa.

14. *PEDICULARIS caule simplici, spica foliosa, corollis galea obtusissima integra, calycibus quinquedentatis.* Jacq. vind. 250. austr. 2. t. 139. Gov. illustr. 37. Pedicular de tallo sencillo; espiga foliosa; corolas con el capacete muy obtuso, entero; y cálices de cinco dientes.

Pe-

732 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Pedicularis spica foliosa. X Pedicular con la espiga
Hall. helv. n. 31. t. 9. f. 2. X foliosa.

Pedicularis alpina, Filicis folio, major. C. B. P. 163. X Pedicular alpina, mayor,
Tourn. p. 173. X con hoja como la de Helecho.

Pedicularis major, alpina. Dalech. hist. 1138. X Pedicular alpina, mayor.

Alectorolophus alpina, X Alectorolofa alpino, pri-
prima. Clus. hist. 2. p. 210. X mero.

Cast. Pedicular foliosa.

Habita en los alpes de Suiza y Austria. ¶

Tiene el tallo casi del largo de un pie : las hojas dos veces hendidas al través : los cálices pelosos en sus ángulos y boca : la corola de color entre amarillo y blanco, con el capacete sin pico, muy obtuso y encorvado.

Canadensis.

15. PEDICULARIS caule simplici, spica subsoliosa, corollis galea setaceobidentata, calycibus deorsum truncatis. X Pedicular de tallo sencillo ; espiga algo foliosa ; corolas con el capacete con dos dientes setáceos ; y cálices truncados ácia abaxo.

Cast. Pedicular del Canadá.

Habita en la America Septentrional. Kalm. ¶

Produce el tallo derecho, del largo de un gemo, sencillo y veloso por arriba : las hojas alternas, hendidas al través, recortadas, obtusas y lisas : la espiga terminal, sin pedunculo, aovada y con hojas poco mas largas que el caliz : los cálices velosos y truncados obliquamente ácia abaxo : las corolas blancas : el capacete algo arqueado, con algun pico, casi truncado por su ápice, y con un diente apenas manifiesto, en la margen de mas arriba, y otro en ambas partes de mas abaxo, setáceo y mucho mas largo que en la *Pedicular silvática* ó *tuberosa* : el labio inferior hendido en tres partes y obtuso.

Tuberosa

16. PEDICULARIS caule simplici, calycibus cristatis, corollis galea rostro-adunca. Gmel. Sib. 3. p. 208. X Pedicular de tallo sencillo ; cálices crestados ; y corolas con el capacete con pico ganchoso.

Pe-

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 733

Pedicularis caule simpli- Pedicular de tallo senci-
ci, floribus spicatis, ros- llo; flores espigadas, con pi-
tratis, calycibus glabris. co; y calices lampiños.

Hall. helv. n. 323. t. 10.

Filipendula montana, flo- Filipendula montana, con
re Pedicularie. C. B. P. 163. la flor como la de la Pedi-
 cular.

Pedicularis alpina, As-
phodeli radice, flore purpu-
rascente. Tourn. p. 173.

Pedicular alpina, con la
 raíz como la del Asfodelo; y
 flor de color que tira á pur-
 púreo.

Alectorolophus montana,
flore luteo. Barr. ic. 466.

Alectorolopho montano,
 con la flor amarilla.

Bocc. mus. 315. t. 8.

Pedicularis bulbosa. Bauh.
 hist. 3. p. 438.

Pedicular bulbosa.

Cast. Pedicular tuberosa.

Habita en los alpes de Suiza, Italia y Siberia: en los
 montes y Pirineos de Cataluña. 24
 Tiene las *bojas* como las de *Milenrama*, con pelusa en las
 hojas y cálices; y las *corolas* amarillas.

895. Género GERARDIA. † Plum. 12.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, con cinco dientes, derecho,
 agudo y persistente.

COR. de un *petalo*, boquiabierta: *tubo* rollizo y mas largo
 que el caliz: *labio superior* derecho, obtuso, plano,
 mas ancho y escotado: el *inferior* redoblado, parti-
 do en tres lacinias: las *laterales* escotadas; y la *del*
medio mas corta y dividida en dos partes.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, apenas del largo del tubo, de
 los cuales *dos* son poco mas cortos: con las *anteras*
 pequeñas.

PIST. *Germen* aovado y pequeño: *estilo* sencillo y corto:
 con el *estigma* obtuso.

PERIC. *Capsula* aovada, de dos celdillas, de dos ventallas
 y que se abre por su base.

SEM. aovadas y solitarias.

ESPECIES.

Tu- 1. GERARDIA *foliis sub-* X Gerardia con hojas casi
 qerosa *ovatis tomentosis repandis* X aovadas, tomentosas, ondea-
longitudine caulis. † X das por su margen y de la
 longitud del tallo.

Gerardia humilis, Bugu- X Gerardia baxa, con hojas
la foliis, Asphodeli radice. X como las de la Bugula; y
 Plum. gen. 31. ic. 75. f. 2. X raiz como la del Asfodelo.

Cast. Gerardia tuberosa.

Habita en la America mas caliente.

La fructificacion de esta especie deberá exâminarse.

Del- 2. GERARDIA *foliis li-* X Gerardia con hojas linea-
 phini- *nearibus pinnatifidis, caule* X res, hendidas al través; y
 folia. *subramoso.* Amoen. acad. 4. X tallo algo ramoso.
 p. 318.

Cast. Gerardia con hoja de Delfinio.

Habita en la India Oriental. ☉

Pur- 3. GERARDIA *foliis li-* X Gerardia con hojas linea-
 purea. *nearibus.* X res.

Digitalis foliis lineari- X Dedalera con hojas linea-
bus, floribus remotis. Gron. X res, y flores apartadas.
 virg. 193.

Digitalis rubra, minor, X Dedalera menor, con las
labiis florum patulis, foliis X flores encarnadas y sus labios
parvis, angustis. Gron. virg. X abiertos; hojas pequeñas y
 1. p. 72. X angostas.

Digitalis Virginiana, ru- X Dedalera de Virginia, con
bra, foliis & facie Antir- X la flor encarnada; hojas y
rhini vulgaris. Pluk. mant. X traza como las del Antirrhino
 65. t. 388. f. 1. X vulgar.

Cast. Gerardia purpúrea.

Habita en la Virginia y Canadá. ☉

Arroja los tallos del largo de un pie, filiformes, lisos, muy sencillos, ó con ramas opuestas en forma de aspa: las hojas lineares, enterisimas, opuestas y las mas veces alternas: las flores opuestas, con pedunculos fili-

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 735

liformes, de una flor, ó sentadas: los *cálices* lisos, pequeños, en forma de campana y con cinco dientes: las *corolas* á manera de rueda, ó de campana, ó tubulosas y de color purpúreo muy subido.

Vease á *Plukenet phyt. t. 12. f. 2.*

Flava.

4. GERARDIA *foliis lanceolatis pinnato-dentatis, caule simplicissimo.*

Digitalis lutea, elatior, Jaceæ nigra foliis. Pluk. mant. 64. t. 368.

Digitalis procerior, Florida, Jaceæ nigra dissectis foliis, floribus albis amplioribus. Pluk. amalth. 71. t. 389. f. 1.

Cast. Gerardia de color amarillo-roxo.

Habita en la Virginia y Canadá.

Tiene el tallo del largo de un pie, ó mas: las *hojas* opuestas, lanceoladas, con peciolo corto, semejantes á las del *Licopo de Europa*, hendidas al través por su base con sus senos abiertos ó extendidos: la *espiga* terminal, laxâ, compuesta de flores opuestas, grandes y de color amarillo-roxo: las *anteras* que terminan en dos espigas inclinadas ácia abaxo; y sin que tenga quinto estambre.

Pedicularia

5. GERARDIA *foliis oblongis duplicato-serratis, caule paniculato, calycibus crenatis.*

Pedicularis foliis lanceolatis, pinnatifidis, serratis, floribus pedunculatis. Gron. virg. 68.

Gerardia con hojas oblongas, dos veces aserradas; tallo en panoja; y cálices recortados.

Pedicular de hojas lanceoladas, hendidas al través, aserradas; y flores con pedunculo.

736 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Digitalis Verbesinae fo-^X Dedalera de America, de
liis, è regione binis, Ameri-^X hojas como las de la Verbe-
cana, capsularum apicibus^X sina, opuestas de dos en dos;
longissimis filamentis dona-^X y adornada en los ápices de
ta. Pluk. mant. 64. las capsulas con filamentos
muy largos.

Digitalis Mariana, Fili-^X Dedalera de la Isla Ma-
pendula folio. Rai. Suppl. riana, con hoja como la de
P. 397. la Filipendula.

Cast. Gerardia como Pedicular.

Habita en la Virginia y Canadá.

Posee las corolas oblongas, y vellosas por defuera: los
dientes del caliz recortados; y las hojas opuestas. Es se-
mejante á la *Pedicular triste*; y quando se deseca se vuel-
ve negra del mismo modo que aquella.

6. GERARDIA *foliis ova-^X* Gerardia de hojas aovadas,
Glu- *tis serratis, bracteis linea-^X* aserradas; bracteas lineares
tinosa. *ribus hispidis.* Osb. it. t. 9. X y con pelo rígido.

Cast. Gerardia glutinosa.

Habita en la China.

Produce el tallo algo rollizo y derecho, con las ramas mas
cortas: las hojas opuestas, con peciolo, aovadas, agu-
das, mas anchas de una pulgada, profundamente aser-
radas y algo vellosas: los racimos terminales, solitarios,
compuestos de flores opuestas con piececito muy corto:
los cálices agudos, partidos en cinco lacinias y la su-
perior mas ancha: una ú otra bractea filiforme, pues-
ta debaxo del caliz y de su misma longitud, erizada co-
mo el mismo caliz y con pelos glutinosos.

7. GERARDIA *scabra,^X* Gerardia áspera, con ho-
Ni- *foliis lanceolatis inferne ser-^X* jas lanceoladas, por debaxo
grina. *ratis, caule tetragono.* Sup- aserradas; y tallo de quatro
pl. p. 278. lados.

Nigrina viscosa. Syst. Nigrina viscosa.
veg. ed. 13. p. 167.

Melasma scabrum. Berg. Melasma (ó sea planta
cap. p. 162. t. 3. f. 4. X negra) áspera.

Cast.

Cast. Gerardia negruzca.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

El género *Nigrina* no debe separarse del de la *Gerardia*.

8. GERARDIA *lævis, fo-* Gerardia lisa, con hojas
liis linearibus integris acu- lineares, enteras, agudas; y
tis, tubo calyce longiore. el tubo mas largo que el ca-
 Suppl. p. 279. liz.

Cast. Gerardia tubulosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunberg.

9. GERARDIA *hispida* Gerardia erizada, áspera,
scabra, foliis oblongis pin- con hojas oblongas y hendi-
natifidis. Suppl. p. 279. das al través.

Cast. Gerardia áspera.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunberg.

896. Género CHELONE. * *Dill. gen. 11.*

Anonymos. Gron. virg. 71. 72.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, muy corto, persistente, y partido en cinco lacinias derechas y aovadas.

COR. de un *petalo*, en forma de mascarilla: *tubo* cilindráceo, cortísimo: *garganta* inflada, oblonga, convexa por encima y plana por debaxo: *borde* cerrado y pequeño: *labio superior* obtuso y escotado; el *inferior* casi igual al superior y ligeramente hendido en tres partes.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, recogidos baxo el dorso de la corola, de los cuales los *dos laterales* son poco mas largos; con las *anteras* echadas: un *rudimento* de otro *filamento* á manera de una puntita, puesto dentro del par superior de los estambres.

PIST. *Germen* aovado: *estilo* filiforme, de la longitud y direccion de los estambres: con el *estigma* obtuso.

PERIC. *Capsula* aovada, de dos celdillas y mas larga que el caliz.

738 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

SEM. muchas , casi redondas y ceñidas con un ribete membranoso.

OBS. La Chelone de cinco estambres se diferencia por tenerlos ascendentes y del largo de la corola ; por poseer el rudimento de otro estambre sin antera, craso, recto , de la longitud de la corola , y barbado por encima longitudinalmente.

ESPECIES.

- Glabra 1. CHELONE foliis petiolatis lanceolatis serratis, summis oppositis. Gron. virg. 70. Chelone de hojas con peciolo , lanceoladas , aserradas , y las de mas arriba opuestas.
- Chelone Acadiensis*, flore albo. Tourn. act. 1706. Chelone de Acadia , con la flor blanca.
- Chelone foliis lanceolatis, acuminatis, sessilibus, obsolete serratis, radice reptratrice.* Mill. dict. n. 1. Chelone de hojas lanceoladas , puntiagudas , sentadas , con aserraduras poco manifestas ; y raiz rastrera.

Cast. Chelone lampiña.

Habita en la Virginia y Canadá. 2

- Obliqua. 2. CHELONE foliis petiolatis lanceolatis serratis oppositis. Mill. ic. 62. t. 93. Chelone de hojas con peciolo , lanceoladas , aserradas y opuestas.
- Chelone (purpurea) foliis lanceolatis, obliquis, petiolatis, oppositis, marginibus acute serratis.* Mill. dict. n. 2. Chelone (purpúrea) de hojas lanceoladas , obliquas , con peciolo , opuestas , y por sus márgenes agudamente aserradas.
- Digitalis Mariana, serratis, densioribus, rigidis & angustis foliis, semine Fagopyri triquetro.* Pluk. mant. 64. t. 348. f. 3. Dedalera de la Isla Mariana , con hojas aserradas , mas densas , rígidas y angostas ; y semilla de tres caras como la del Fagopyro ó sea Alforfon ó Trigo negro.

Cast. Chelone obliqua.

Habita en la Virginia y Canadá. 2

Miller distingue esta especie de la precedente por la raiz me-

menos rastrera ; por las *hojas* mas anchas y mas profundamente aserradas ; y por las *flores* purpúreas.

Hir-
suta. 3. CHELONE caule fo- X Chelone de tallo y hojas
liisque hirsutis. Mill. dict. X con pelo áspero.

n. 3.
Anonymos flore pallide X Planta Anonima , de flor
cæruleo, Digitalis instar, in X como la de la Dedalera , de
summis caulibus disposito, X color pálido-cerúleo , dis-
foliis villosis , acuminatis. X puesta en los tallos mas al-
Gron. virg. 71. X tos ó en el remate de ellos ;
X con hojas vellosas y punta-
X gudas.

Cast. Chelone con pelo áspero.

Habita en la Virginia.

En esta especie se halla un quinto estambre largo , con su antera muy vellosa. D. *Jussieu*. Acaso es variedad de la siguiente ?

Pents-
temon. 4. CHELONE foliis am- X Chelone con hojas que
plexicaulibus , panicula di- X abrazan al tallo ; y panoja
chotoma. X ahorquillada.

Chelone foliis inferioribus X Chelone con las hojas in-
ovatis , acuminatis , inte- X feriores aovadas , puntiagu-
gerrimis , superioribus am- X das , enterisimas ; las supe-
plexicaulibus , lanceolatis, X riores amplexicaules , lanceo-
dentatis , corollis patentibus, X ladas , dentadas ; corolas
bilabiatis. Ard. sp. 14. X abiertas y de dos labios.

t. 5.
Dracocephalus latifolius, X Dracocefalo lampiño , con
glaber , Lysimachiae luteæ X hojas anchas y seme antes á
foliis. Moris. hist. 3. p. 417. X las de la *Lysimachia* de flor
sect. 11. t. 21. f. 2. X amarilla.

Digitalis perfoliata, gla- X Dedalera perfoliada , lam-
bra , flore violaceo , minore. X piña , con la flor mas peque-
Moris. hist. 2. p. 479. sect. 5. X ña , y de color de violeta.
t. 8. f. 6.

Pentstemon. Mich. gen. X Planta con la flor de cin-
14. X co estambres.

740 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

^α *Dracocephalus hirsutus*, ^X Dracocefalo con pelo áspero, de hojas como las de *Lysimachia foliis, latioribus, hirsutis*. Moris. hist. 3. ^X la *Lysimachia*, mas anchas y p. 407. sect. 11. t. 21. f. 3. ^X con pelo áspero. α

Cast. Chelone de cinco estambres.

Habita en la Virginia. ¶

Echa el *tallo* rollizo y vellosos: el *caliz* partido en cinco laciniás, entre derechas y extendidas y casi iguales: la *corola* á manera de mascarilla, entre blanquecina y purpúrea: el *tubo* de la longitud del caliz: la *garganta* oblonga y ventricosa: la *abertura de la boca* blanca: el *labio superior* mas corto, dividido en dos laciniás obtusas y redoblado: el *inferior* hendido en tres partes, recto, obtuso y redoblado por sus lados: quatro *filamentos* con dos mas cortos que los otros dos, declinados y mas cortos que la abertura de la boca: otro *filamento* colocado mas arriba, castrado ó sea sin antera, barbado, mas ancho ácia su ápice, y echado sobre el labio inferior; y el *estigma* obtuso.

Ruel- 5. CHELONE *foliis radicalibus petiolatis ovatis serratis, caulinis oppositis amplexicaulibus, pedunculis elongatis, calycibus ciliatis*. ^X Chelone de hojas radicales con peciolo, aovadas y aserradas; las del tallo opuestas, amplexicaules; pedunculos alargados; y cálices pestañosos. ^X

Cast. Chelone como Ruelia.

Habita en la tierra del fuego. *Back.* ¶

Tiene las *hojas radicales* de dos en dos, alternas, con peciolo largo, cenicientas por debaxo y algo nerviosas: el *tallo* echado, apenas mas largo que la hoja: las *hojas* apartadas y opuestas: los *pedunculos* axilares, opuestos, alargados y de una flor: las *laciniás del caliz* obtusas y pestañosas: la *corola* encorvada y de color purpúreo. A persuasión del *Doct. Forster* puso *Linneo* esta especie en este género.

897. Género GESNERIA. † Gesnera.

Plum. 9. Jacq. amer. 179.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , encima del germen , hendi-
do en cinco partes , agudo y persistente.

COR. de un *petalo* , encorvada ácia dentro y ácia atrás :
tubo gruesecito , con el cuello coartado y la gargan-
ta en forma de embudo : *borde* obtuso y hendido en
cinco lacinias , con las superiores cóncavas , y las tres
inferiores planas y extendidas.

ESTAMB. *Filamentos* quatro , y mas cortos que la corola:
con las *anteras* sencillas.

PIST. *Germen* debaxo del caliz y deprimido : *estilo* senci-
llo , de la longitud y direccion de los estambres : con
el *estigma* en cabezuela.

PERIC. *Capsula* casi redonda , coronada con el caliz abier-
to , y de dos celdillas.

SEM. muchisimas y muy pequeñas. *Receptáculos* pegados
á una y otra parte del disepimento.

E S P E C I E S.

Humi-
lis.

1. GESNERIA *foliis lan-* Gesneria con hojas lan-
ceolatis serratis sessilibus, ceoladas , aserradas , sin pe-
pedunculis ramosis multi- ciolo ; pedunculos ramosos y
floris. de muchas flores.

Gesnera humilis, flore fla- Gesnera baxa , con la flor
vescente. Plum. gen. 27. ic. de color que tira á amarillo-
133. f. 2. roxo.

Digitalis folio oblongo, Dedalera con hoja oblon-
serrato , ad foliorum alas ga , aserrada ; y que florece
florida. Sloan. jam. 60. hist. en las axilas de las hojas.
1. p. 162. t. 104. f. 2. Rai.
Suppl. p. 396.

Cast. Gesneria baxa.

Habita en la America austral. \bar{h}

742 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Acau-
lis.

2. GESNERIA *foliis lanceolato-ovatis serratis subpetiolatis terminali-confer-tis, pedunculis trifloris folio brevioribus*. Amœn. acad. 5. p. 400.

Gesneria rupestris, indivisa, foliis oblongis, rugosis, summo caule dispositis, floribus singularibus ad alas. Brown. jam. 262.

Rapunculo affinis anomala vasculifera, folio oblongo, serrato, flore coccineo, tubuloso. Sloan. jam. 59. hist. I. p. 159. t. 102. f. 1.

Gesneria de hojas entre lanceoladas y aovadas, aserradas, con algun peciolo, terminales y amontonadas; pedunculos de tres flores y mas cortos que la hoja.

Gesneria rupestre, indivisa, con hojas oblongas, rugosas, dispuestas en lo mas alto de tallo; y flores de una en una en las axilas.

Planta anomala, que lleva capsulas, parecida al Rapunculo, con hoja oblonga, aserrada; flor tubulosa y de color coccineo.

Cast. Gesneria sin tallo.

Habita en la Jamaica.

To-
mento-
sa.

3. GESNERIA *foliis ovato-lanceolatis crenatis hirsutis, pedunculis laterali-bus longissimis corymbiferis*. Hort. cliff. 318. Jacq. amer. 179. t. 175. f. 64.

Gesnera amplo digitalis folio tomentoso. Plum. gen. 27. ic. 34.

Gesneria erecta, foliis lanceolatis, rugosis, hirsutis, pedunculis longissimis, ramosis, ex alis superiori-bus. Brown. jam. 261.

Gesneria de hojas entre aovadas y lanceoladas, recortadas, con pelo áspero; pedunculos laterales larguissimos y que llevan corimbos.

Gesnera con hoja como la de la Dedalera, ancha y tomentosa.

Gesneria levantada, de hojas lanceoladas, rugosas, con pelo áspero; pedunculos larguissimos, ramosos, y que salen de las axilas superiores.

Cast. Gesneria tomentosa.

Habita en las riberas de la America meridional.

898. Género ANTIRRHINUM. * *Tourn. t. 75.*

Linaria. Tourn. t. 76. Asarina. Tourn.

t. 76. Elatine. Dill. gen. 6.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* partido en cinco *lacini*as oblongas y persistentes : con las *dos inferiores* mas abiertas.

COR. de un *petalo* , en forma de mascarilla : *tubo* oblongo y giboso : *borde* de dos labios : el *superior* hendido en dos partes y redoblado por sus lados : el *inferior* hendido en tres *lacini*as y obtuso , con una convexidad que sobresale entre los dos labios , y cierra la *garganta* y *paladar* cóncavos.

*Ne*ctario que sobresale y se alarga por debaxo de la base de la corola.

ESTAMB. *Filamentos* quatro , encerrados debaxo del labio superior , casi del largo de la corola y *dos* mas cortos : con las *an*teras arriadas entre sí.

PIST. *Germen* algo redondo : *estilo* sencillo , de la longitud y direccion de los estambres : con el *estig*ma obtuso.

PERIC. *Capsula* casi redonda , obtusa , de dos celdillas , de varias figuras y que se abre de diferentes modos en diversas especies.

SEM. muchas. *Receptáculos* en forma de riñon , solitarios , y prendidos al disepimento.

OBS. *El Ne*ctario y *Pericarpio* ocurren muy diversos en este género.

La *Linaria* de *Tourn.* posee el *ne*ctario largo y alesnado : y la *capsula* que se abre con igualdad.

El *Antirrhino* del mismo *Tourn.* tiene el *ne*ctario obtuso , y que apenas sobresale : la *capsula* desigual en su base , y que se abre obliquamente por su ápice.

La *Elatine* de *Dillenio* contiene el *ne*ctario alesnado : y la *capsula* que abriendose dexa una laminita en ambas partes.

El *Antirrhino* con *hoja* de *Margarita* y el de *Canadá* se hallan con la boca abierta y destituidos de convexidad en el labio inferior.

CARACTERES GENERICOS DE TOURNEFORT.

ANTIRRHINUM. p. 167.

La *flor* es de un petalo , anomala , tubulosa , en forma de mascarilla , dividida en dos labios , de los cuales el superior se halla hendido en dos lacinias y el inferior en tres. Del caliz sale el pistilo, que pasa á fruto ó capsula, semejante al casco de un cerdo (formando la parte anterior de la cabeza sobre la frente y las orbitas como una boca) con su disepimento intermedio , dividida en dos celdillas y llena de simientes pequeñas , fixadas al receptáculo.

LINARIA. p. 168.

La *flor* es de un petalo , anomala , en forma de mascarilla , terminada por detras en una cola y dividida por delante en dos labios ; de los cuales el superior se halla hendido en dos ó muchas partes y el inferior en tres. Del caliz sale el pistilo , que pasa á fruto ó capsula casi redonda, dividida en dos celdillas , mediante su disepimento y llena de simientes , unas veces comprimidas y ribeteadas, otras anguladas y casi redondas fixadas al receptáculo.

AZARINA. p. 171.

La *flor* es de un petalo , anomala , tubulosa , en forma de mascarilla , y semejante á la flor del *Antirrhino*. Del caliz sale el pistilo , que pasa á fruto ó capsula casi redonda , dividida en dos celdillas , mediante su disepimento y llenas de simientes , fixadas al receptáculo. Las celdillas suelen abrirse de varios modos, igualmente que el fruto de la *Linaria* ; por lo que la *Azarina* puede reputarse por un género de planta con la flor como del *Antirrhino* ; y con el fruto como de la *Linaria*.

ESPECIES CON HOJAS ANGULADAS.

Cym-
balaria

1. ANTIRRHINUM fo-
liis cordatis quinquelobis
alternis, caulibus procum-
bentibus. Hort. cliff. 32.

*Antirrhinum caule repen-
te, foliis reniformibus quin-
quelobis.* Hall. helv. n. 339.

Cymbalaria. C. B. P. 306.
Cam. epit. 860. Dalech. hist.
1322. Riv. t. 86.

*Linaria hederaceo folio,
glabro, seu Cymbalaria vul-
garis.* Tourn. p. 169.

Antirrhino de hojas de fi-
gura de corazon, con cinco
lóbulos, alternas; y tallos
postrados.

Antirrhino de tallo rastre-
ro; hojas en forma de riñon
y con cinco lóbulos.
Cymbalaria.

Linaria con hoja como la
de la Yedra, lampiña, ó
Cymbalaria vulgar.

Cast. Antirrhino Cymbalaria.

Habita en las peñas y murallas antiguas de Alemania,
Suiza y Francia: en Cataluña, Valencia, Serrania de
Miraflores y otras partes de España. ☉

Tiene las semillas rugosas: los peciolo y pedunculos lar-
guisimos.

Pilo-
sum.

2. ANTIRRHINUM fo-
liis reniformibus pilosissi-
mis alternis, caulibus pro-
cumbentibus. Jacq. obs. 2.

p. 29. t. 48. †
*Linaria Hederæ folio, vil-
loso, seu Cymbalaria alpi-
na.* Tourn. p. 169.

Antirrhino con hojas en
forma de riñon, muy pelo-
sas, alternas; y tallos tendi-
dos.

Linaria con hoja como la
de la Yedra, vellosa, ó Cym-
balaria alpina.

Cast. Antirrhino peloso.

Habita en los Alpes.

Su estatura es como la de la *Cymbalaria* de la qual tie-
ne origen; pero se halla toda pelosa, con las hojas entre
en forma de riñon y casi redondas, divididas por su
margen en nueve ó diez lóbulos obtusos y recortaditos.

Jacq.

746 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Ela-
tine. 3. ANTIRRHINUM fo-
liis hastatis alternis, cauli-
bus procumbentibus. Oed. y
Fl. dan. t. 426. Antirrhino con hojas de
figura de alabarda, alternas;
y tallos tendidos.

Antirrhinum caule pro-
cumbente, foliis hastatis,
imis conjugatis, superiori-
bus alternis. Hall. helv. n.
340. Antirrhino con el tallo
tendido; hojas de hechura
de alabarda, las de abaxo
opuestas de dos en dos; y
las superiores alternas.

Elatine folio acuminato,
in basi auriculato, flore lu-
teo. C. B. P. 253. Elatine de hoja puntiagu-
da, con orejillas en su base,
y flor amarilla.

Linaria segetum, Num-
mulariæ folio, aurito & vil-
loso, flore luteo. Tourn. p.
169. Linaria que nace entre
sembrados, de hoja como la
de la Numularia, con oreji-
llas y vellosa; y flor amarilla.

Elatine altera. Cam. ep.
754. Dod. pempt. 42. Otra Elatine.

α Elatine folio acuminato,
flore cæruleo. C. B. P. 253. Elatine con la hoja pun-
tiaguda, y flor cerúlea. α

Cast. Antirrhino Elatine.

Habita entre los sembrados de Alemania, Inglaterra y
Francia: en el circuito de Madrid, y es muy comun en
Cataluña. ☉

Spu-
rium. 4. ANTIRRHINUM fo-
liis ovatis alternis, cauli-
bus procumbentibus. Roy.
lugdb. 295. Antirrhino con hojas ao-
vadas, alternas; y tallos ten-
didos.

Antirrhinum caule pro-
cumbente, foliis villosis, ova-
tis, imis conjugatis, supe-
rioribus alternis. Hall. helv.
n. 341. Antirrhino con el tallo
tendido; hojas vellosas, ao-
vadas, las de abaxo opues-
tas de dos en dos, y las su-
periores alternas.

Elatine. Riv. t. 86. Elatine.

Elatine folio subrotundo.
C. B. P. 252. Elatine con hoja casi re-
donda.

Linaria segetum, Num-
mulariæ folio villoso. Tourn.
p. 169. Linaria de sembrados, con
hoja como la de la Numula-
ria y vellosa.

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 747

Veronica fœmina, Fuchsii, X *Veronica femenina de Fu-*
sive Elatine. Dod. pempt. X *chsio, ó Elatine.*
 42.

Cast. Antirrhino espurio.

Habita entre los sembrados de Alemania, Inglaterra,
 Francia é Italia: en los circuitos de Madrid, de Barce-
 lona, de Gerona y otras partes de España. ○

En esta especie vieron una variedad como la de la *Lin-*
aria peloria. Ramspeck. com. goett. 1. p. 351. t. 15. f. 4.
 y *Stebelino act. helv. 2. p. 25. t. 4.*

Cirr-
 osum

5. ANTIRRHINUM fo. X Antirrhino con hojas de
liis hastatis alternis, cauli- X hechura de alabarda, alter-
bus patulis, petiolis passim X nas; tallos extendidos; y pe-
cirrhescensibus. Jacq. hort. X ciolos que por todas partes
 t. 82. X hacen veces de zarcillos.

Linaria supina villosa, X Linaria echada, vellosa,
folio sagittato, flore vix X con hoja de figura de saeta;
conspicuo. Pis. t. 38. f. 2. X y flor apenas perceptible.

Cast. Antirrhino de zarcillos.

Habita en Egipto. ○

Produce los tallos filiformes, difusos, muy ramosos, pos-
 trados, alargados en varitas, de color que tira á purpú-
 reo, alguna vez vellosos y algo apretados: las hojas al-
 ternas, con peciolo, de figura de saeta, algo lustrosas
 y de color verde alegre: las *radicales* mayores, de figu-
 ra de alabarda, con dientes: los *peciolos* que por todas
 partes y á manera de zarcillos abrazan las ramas cerca-
 tos y apretados, mas largos que las hojas, de color que
 tira á purpúreo y que sobresalen, derechos, baxo del tallo
 y de una flor: la *corola* de color pálido-cerúleo, con el
 paladar blanquecino, señalado con puntitos cerúleos; y
 el *nectario* recto: la *capsula* globosa: el *caliz* menor
 que ella y mas angosto.

Es producida del *Antirrhino Elatine*, diferenciandose
 poco de ella, y señaladamente por las *corolas* seis veces
 menores, y no amarillas, sino de color violado en el labio
 superior; por las *hojas* quatro veces menores y que care-
 cen de pelos blancos.

AN-

748 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Ægyptiacum 6. ANTIRRHINUM fo-
liis hastatis alternis, caule erecto ramosissimo, pedunculis rigescentibus. Syst. veg. p. 464.

Antirrhino con hojas de hechura de alabarda, alternas; tallo derecho, y pedunculos que se vuelven yertos.

Linaria Memphitica, pumila, hastato folio tricuspidi, flore luteo. Lipp.

Linaria de Menfi, enana, de hoja de hechura de alabarda, con tres puntas, y flor amarilla. (*Menfi es ciudad de Egipto*).

Cast. Antirrhino de Egipto.

Habita en Egipto.

Es muy semejante al *Antirrhino Elatine*. Posee los tallos derechos, en varitas y apenas vellosos: las *hojas* de figura de corazon, con dos ángulos en ambas partes inferiores, y uno solo en las superiores: la *corola* semejante á la de la *Elatine amarilla*; pero sin mancha negra, aunque el paladar punteado con manchitas de color que tira á purpúreo: el *labio superior* escotado y pálido: el *espolon* de color que tira á cerúleo, encorvado ácia atrás, y del largo de la flor; y los *pedunculos*, despues que han perdido la flor, yertos y como si fuesen espinas,

ESPECIES CON HOJAS OPUESTAS.

Tri-
phyl-
lum. 7. ANTIRRHINUM fo-
liis ternis ovatis. Hort. cliff. 324.

Antirrhino con hojas de tres en tres y aovadas.

Linaria triphylla, minor, lutea. C. B. P. 212. Tourn. p. 169.

Linaria menor, con hojas de tres en tres; y flor amarilla.

Linaria Hispanica. Clus. hist. 1. p. 320.

Linaria de España.

Linaria Sicula, latifolia, triphylla. Bocc. Sic. 44. t. 22.

Linaria de Sicilia, con hojas anchas y de tres en tres.

α *Linaria triphylla, cœrulea.* C. B. P. 312. Tourn. p. 169.

Linaria con hojas de tres en tres, y flor cerúlea. α

Cast. Antirrhino de tres hojas.

Habita en Sicilia: en el circuito de Madrid, Valencia, Ara-

Aragon, Cataluña y otras partes de España. ☉
 Es de la altura de medio pie. Tiene las *hojas* sentadas, enterisimas, y alguna vez opuestas, ó las inferiores de tres en tres, y las superiores opuestas, alternas: y las *flores* en espiga. *Gov. hort.* 300.

8. ANTIRRHINUM fo-
liis quaternis lanceolatis,
caule erecto ramoso, floribus
pedunculatis. Hort. cliff. 324.
Linaria Americana, ma-
xima, purpureo flore. Herm.
lugdb. 376. t. 377. *Rai. hist.*
 1884.
Linaria flore purpureo,
Americana. Riv. monop. t.
 81.

Antirrhino con hojas de quatro en quatro, lanceoladas; tallo derecho, ramoso; y flores pedunculadas.
 Linaria muy grande, de America, con la flor purpúrea.
 Linaria de America, con la flor purpúrea.

Cast. Antirrhino de tres páxaros. Se llama así por la mucha semejanza que tienen las flores á un paxarito, y hallarse de tres en tres.

Habita en America y Portugal: es frecuente en Galicia: en los montes de Leon y Burgos: en la baxada del puerto de Sierras-albas: en la provincia de Liebana entre las zarzas y espinos que sirven de cercas.

Es *planta* que sube á la altura de un hombre; y tiene el *labio superior de la corola* arqueado.

Purpureum.
 9. ANTIRRHINUM fo-
liis quaternis linearibus,
caule florifero erecto spica-
to. Hort. ups. 174.
Antirrhinum foliis linea-
ribus sparsis, nectariis su-
bulatis recurvis, floribus
laxe spicatis. Hort. cliff.
 498.
Linaria flore purpureo,
minore. Riv. monop. t. 82.
Linaria purpurea, mag-
na. Bauh. hist. 3. p. 460.

Antirrhino con hojas de quatro en quatro, lineares; tallo que lleva las flores derecho y espigado.
 Antirrhino con hojas lineares, esparcidas; nectarios alesnados, encorvados ácia atrás; y flores en espiga laxa.
 Linaria con la flor purpúrea, y mas pequeña.
 Linaria grande, con la flor purpúrea.

750 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Linaria purpurea, major, Linaria mayor, con la flor
odorata. C. B. P. 203. Tourn. purpúrea, y olorosa.
 p. 170.

Linaria altera purpurea. Otra Linaria con la flor
 Dod. pempt. 183. purpúrea.

Cast. Antirrhino purpúreo.

Habita en las faldas del Vesuvio. 24

Tiene el tallo liso, del largo de dos pies, derecho y rollizo; con las ramas que salen de las axilas superiores mas pequeñas y que florecen mas tarde: las hojas entre lanceoladas y lineares, lisas, con tres nervios por debaxo, extendidas y alternas; pero las inferiores en verticilo: los racimos terminales, sencillos, derechos, largos; con los piecitos mas largos que la flor: el caliz menudo: la corola toda de color de violeta, aunque mas pálida por defuera, con el paladar veloso por su margen: el espolon del largo de la corola, encorvado ácia fuera: y las anteras amarillas.

Re- 10. ANTIRRHINUM fo- Antirrhino con hojas li-
 pens. liis linearibus confertis, in- neares, amontonadas, de
ferne quaternis, calycibus quatro en quatro por abaxo;
capsulae equalibus. y cálices iguales á la capsu-
 la.

Linaria angustifolia, flo- Linaria de hoja angosta,
re cinereo, striato. Dill. elth. con la flor cenicienta y es-
 198. t. 163. f. 197. triada.

Cast. Antirrhino rastrero.

Habita en Inglaterra, Francia, Italia: y en Aragon. ☉

Tiene los tallos tendidos y se levantan quando florecen: las flores cerúleas, con el paladar de color amarillo-roxo. *Synops. pl. Aragon. p. 80.*

Mons- 11. ANTIRRHINUM fo- Antirrhino con hojas li-
 pessu- liis linearibus confertis, neares, amontonadas; tallo
 lanum. caule nitido paniculato, pe- lustroso, en panoja; peduncu-
dunculis spicatis nudis. los espigados y desnudos.
 Sauv. monsp. 47.



CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 751

Linaria capillaceo folio, \times Linaria con hoja capilar,
odora. C. B. P. 213. prodr. \times y flor olorosa.
 106. n. 4. Tourn. p. 170.

Linaria odorata, Mons- \times Linaria olorosa, de Mom-
pessulana. Bauh. hist. 3. p. \times peller.
 459.

Cast. Antirrhino de Mompeller.

Habita en Mompeller. \mathcal{Q}

Echa el *espolon de la corola* recto, y mas corto que el ca-
 liz; y las *flores* olorosas. Es muy parecido al *Antirrhino*
rastrero.

Spar-
teum.

12. ANTIRRHINUM fo- \times Antirrhino con hojas ales-
liis subulatis canaliculatis \times nadas, acanaladas, carno-
carneis, inferioribus ter- \times sas, las inferiores de tres en
nis, caule paniculato, corol- \times tres; tallo en panoja; y co-
lisque glaberrimis. Amoen, \times rolas muy lampiñas.
 acad. 4. p. 277.

Cast. Antirrhino como esparto.

Habita en España. \mathcal{Q}

Tiene el *tallo* del largo de un pie, muy lampiño, en pa-
 noja, derecho, algo rígido y apretado; con *ramas* en
 varitas: las *hojas primordiales*, antes que se levante el
 tallo, de tres en tres, oblongas: las *restantes* alternas,
 alesnadas, acanaladas, lampiñas, carnosas y rectas: las
flores racimosas: el *caliz* lampiño: la *corola* de color
 amarillo-roxo, con el paladar lampiño, y una tintura
 rubicunda en la convexidad del mismo paladar que re-
 mata en seno obtuso. Se diferencia del *Antirrhino de*
dos puntos por las *flores* pedunculadas, y tres veces ma-
 yores, como por toda la planta mucho mas grande.

Bi-
puncta
tum.

13. ANTIRRHINUM fo- \times Antirrhino con hojas li-
liis linearibus glabris, in- \times neares, lampiñas, y las in-
ferioribus quaternis, caule \times feriores de quatro en quatro;
erecto paniculato, floribus \times tallo derecho, en panoja; y
spicato-capitatis. \times flores entre en espiga y ca-
 \times bezuela.

Antirrhinum foliis lanceolato-linearibus, floribus in summitate caulis confertis, parvis. Guett. stamp. 2. p. 205? Antirrhino con hojas entre lanceoladas y lineares; flores pequeñas y amontonadas en la sumidad del tallo.

Antirrhinum erectum, foliis linearibus, imis verticillatis, pauciflorum. Sauv. monsp. 165. Antirrhino de pocas flores, levantado, con hojas lineares, y las de abaxo en verticilo.

Linaria lutea, parva, annua. Bauh. hist. 3. p. 357. Linaria annua, pequeña, con la flor amarilla.

Cast. Antirrhino de dos puntos.

Habita entre los sembrados de Italia y España. ☉

Arroja el tallo del largo de un gema; con ramas apretadas y rígidas, y que salen en ángulo recto: las hojas lanceoladas, sin peciolo, planas, extendidas, algo carnosas, casi lisas; y las inferiores de quatro en quatro: las flores casi en espiga, pocas y sentadas: las corolas de color amarillo-roxo, con dos puntos de color leonado en el paladar lampiño: el labio superior dividido en dos partes, muy plegado, lanceolado y derecho.

Triste. 14. ANTIRRHINUM *foliis linearibus sparsis, inferioribus oppositis, nectariis subulatis, floribus subsessilibus.* Syst. veg. 465. Antirrhino con hojas lineares, esparcidas, y las inferiores opuestas; nectarios alesnados; y flores casi sentadas.

Linaria Hispanica, procumbens. Mart. dec. 35. f. 2. Linaria de España, tendida.

Linaria tristis, Hispanica. Dill. elth. 201. t. 264. f. 199. Mill. ic. t. 166. Linaria triste, de España.

Cast. Antirrhino triste.

Habita en la marina de Gibraltar. ☿

Arroja muchos tallos radicales, lampiños y comunmente tendidos: las hojas lineares, algo carnosas, convexas y cubiertas como de un rocío de color garzo: la cabezuela, antes de abrirse las flores, semejante á la del *Antirrhino arvense*, con el caliz y brácteas solamente vellosos; la corola de color como la del *Loto jacobeo*; con

el espolon estriado. Varía á veces en el color ceniciento, amarillo, ó purpúreo.

15. ANTIRRHINUM foliis subquaternis linearibus, caule diffuso, floribus racemosis, calcar recto. Syst. Antirrhino con hojas casi de quatro en quatro, lineares; tallo difuso; flores racimosas; y espolon recto. veg. 465.

Antirrhinum foliis subquaternis linearibus, caule diffuso, floribus subspicatis, nectario recurvato. Roy. Antirrhino con hojas casi de quatro en quatro, lineares; tallo difuso; flores casi en espiga; y nectario encorvado ácia atrás. lugdb. 296.

Linaria pumila, supina, lutea. C. B. P. 213. Tourn. Linaria enana, echada, y con flor amarilla. p. 170.

Linaria Hispanica V. Clus. hist. 1. p. 321. Linaria quinta, de España.

Cast. Linaria echada.

Habita en lugares arenosos de Francia; en Salamanca, y otros lugares de Castilla la vieja, como en el circuito de Barcelona y otras partes de España.

Tiene el espolon redoblado: la hojucla superior del caliz mas larga que en las demas especies: las hojas casi filiformes, del modo que en el Antirrhino como esparto; y los racimos apretados y rígidos.

Ar- 16. ANTIRRHINUM foliis sublinearibus, inferioribus quaternis, calycibus piloso-viscidis, floribus spicatis, caule erecto. Sabb. Antirrhino de hojas casi lineares, las inferiores de quatro en quatro; calices con pelo viscoso; flores en espiga; y tallo derecho. hort. 3. t. 5.

Antirrhinum foliis linearibus, alternis, recurvis, ramis caule brevioribus. Roy. Antirrhino con hojas lineares, alternas, encorvadas ácia atrás; y ramas mas cortas que el tallo. lugdb. 297.

754 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

- Linaria arvensis*, *cærulea*. C. B. P. 213. prodr. 107. Tourn. p. 170. Dill. elth. 199. t. 163. f. 198. *Linaria arvense*, con la flor cerúlea.
- Linaria pumila*, *foliolis carnosis*, *flosculis minimis*, *flavis*. C. B. P. 213. Tourn. p. 170. *Linaria enana*, con hojuelas carnosas; florecitas muy pequeñas y de color amarillo-roxo. α
- Linaria quadrifolia*, *lutea*. C. B. P. 213. Tourn. p. 170. *Linaria* con hojas de quatro en quatro; y flor amarilla. β
- Linaria tetraphylla*, *lutea*. Col. ecphr. 1. p. 299. t. 300. f. 1. *Linaria* con hojuelas de quatro en quatro; y flor amarilla.

Cast. Antirrhino arvense.

Habita entre los sembrados de Inglaterra, Francia, Italia y Alemania: en los circuitos de Madrid: en la Alcarria, Serrania de Cuenca, Aragon, Cataluña y otras partes de España. \odot

Tiene las flores en espiga, menudas y con una bráctea redoblada: el espolon encorvado ácia atrás: y las hojas lampiñas.

Polis-seria num.

17. ANTIRRHINUM *foliis caulinis linearibus alternis*, *radicalibus lanceolatis ternis*, *floribus corymbosis*. Sabb. hort. rom. 3. t. 4. *Antirrhino* con hojas del tallo lineares, alternas, las radicales lanceoladas, de tres en tres; y flores en corimbo.

Antirrhinum foliis ad caulem linearibus, *ad radicem ovatis*, *sæpe ternis*. Sauv. monsp. 166. *Antirrhino* con las hojas del tallo lineares, las de la raíz ovoides, y las mas veces de tres en tres.

Linaria annua, *purpurviolacea*, *calcaribus longis*, *foliis imis rotundióribus*. Tourn. p. 170. Barr. ic. 1162. *Linaria annua*, con la flor de color purpúreo violado; espolones largos; y hojas de abaxo mas redondas.

Linaria cærulea, *calcaribus longis*. Bauh. hist. 3. p. 461. *Linaria cerúlea*, con espolones largos.

Cast.

Cast. Antirrhino peliseriano.

Habita en Francia é Italia: en la Sierra de Miraflores, Bustarviejo, Canencia, Cartuja del Paular de Segovia, Castilla la vieja: montes de Avila y otras muchas partes de España, (1)

Arroja el tallo del largo de un gema, derecho, rollizo, muy lampiño y algo ramoso: las hojas alternas, muy apartadas, casi lineares, algo carnosas, lampiñas, y las radicales ó de mas abaxo de tres en tres, ó de quatro en quatro: las flores pequeñas y en cabezuela casi corimbosa: el caliz derecho, con sus lacinijs apartadas: la corola de color de violeta, con venas azules poco manifiestas: el paladar blanco: y el labio superior mas largo; con el espolon recto, y casi mas largo que la corola.

Varia con el tallo muy ramoso; con las flores sentadas, amarillas; y su espolon blanquecino; y con todas las hojas lineares. Gov. hort. 301.

Saxatile.

18. ANTIRRHINUM fo-
liis lanceolato—linearibus
sparsis villosis, inferioribus
quaternis, caule decumben-
te, floribus spicatis. Amœn.
acad. 4. p. 277.

Antirrhino con hojas entre lanceoladas y lineares, esparcidas, vellosas; las inferiores de quatro en quatro; tallo tendido; y flores en espiga.

Linaria maritima, minima, viscosa, foliis hirsutis, floribus luteis. Moris. hist. 2. p. 499. Tourn. p. 171.

Linaria maritima, muy pequeña, viscosa, de hojas con pelo áspero; y flores amarillas.

Cast. Antirrhino saxátil.

Habita en la marina de España. ♀

Echa los tallos ascendentes: las hojas de mas arriba sin orden, lineares, agudas, con vello viscoso y extendidas por su ápice: las flores en espiga: los cálices lanudos; las corolas de color amarillo-roxo muy subido, con dos puntos de color leonado en el paladar y en la garganta.

756 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBAES,

Visco- 19. ANTIRRHINUM fo- Antirrhino con las hojas
sum. *liis caulinis linearibus al-* del tallo lineares, alternas,
ternis, radicalibus lanceo- las radicales lanceoladas, de
latis quaternis, calycibus quatro en quatro; cálices ve-
villasis cauli approximatis. llosos y acercados al tallo.
Amœn. acad. 4. p. 319.

Cast. Antirrhino viscoso.

Habita en España. ☉

Es planta levantada y de la estatura del *Antirrhino peliseriano*; pero tiene las *flores* de la magnitud de las de la *Linaria*.

Multi- 20. ANTIRRHINUM fo- Antirrhino con hojas de
caule. *liis quinis linearibus carno-* cinco en cinco, lineares,
sis, floribus capitatis. Hort. carnosas; y flores en cabe-
cliff. 324. zuela.

Linaria Sicula, multicaulis, Molluginis folio. Bocc. *Linaria* de Sicilla, con
sic. 38. t. 19. f. 1. Tourn. p. muchos tallos; y hoja como
171. la del Molugo.

Cast. Antirrhino de muchos tallos.

Habita en Sicilia y Oriente. ☉

Posee los tallos como juncos y laxôs: las *hojas* lineares y obtusas.

Glauc- 21. ANTIRRHINUM fo- Antirrhino con hojas de
cum. *liis quaternis subulatis car-* quatro en quatro, alesnadas,
nosis, caulibus erectis, flo- carnosas; tallos derechos; y
ribus spicatis. Amœn. acad. flores en espiga.
4. p. 277.

Linaria maritima, foliis succulentis. Buxb. cent. 4. *Linaria* maritima, con ho-
p. 23. t. 37. jas xugosas.

Linaria foliis carnosis, cinereis. C. B. P. 213. Tourn. *Linaria* con hojas carno-
p. 170. sas, y cenicientas.

Linaria Hispanica IV. *Linaria* quarta, de Espa-
Clus. hist. 1. p. 321. ña.

Cast. Antirrhino de color garzo.

Ha-

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 757

Habita en la Europa austral y Oriente: en los contornos de Madrid y otras partes de España. ☉
Tiene el espolon con estrias de color cerúleo y es muy parecida á la precedente.

Al-
pinum.

22. ANTIRRHINUM fo-
liis quaternis lineari-lan-
ceolatis glaucis, caule dif-
fuso, floribus racemosis, cal-
cari recto. Jacq. austr. t. 58.

Antirrhinum caule pro-
cumbente, rariter spicato,
foliis verticillatis. Hall.
helv. n. 338.

Linaria quadrifolia, supi-
na. C. B. P. 213. Tourn. p.
171.

Linaria III. Stiriaca.
Clus. hist. 1. p. 322.

Linaria cœrulea, repens.
C. B. P. 213. Tourn. p. 170.

Linaria foliis carnosis,
cinereis. C. B. P. 213. Hall.
Tourn. p. 170.

Antirrhino con hojas de
quatro en cuatro, entre li-
neares y lanceoladas, de co-
lor garzo; tallo difuso; flo-
res en racimo y el espolon
recto.

Antirrhino de tallo tendi-
do, con pocas espigas y ho-
jas en verticilo.

Linaria con hojas de qua-
tro en cuatro y echada.

Linaria tercera, de Esti-
ria.

Linaria cerúlea, rastre-
ra. α

Linaria con hojas carno-
sas, y cenicientas. β

Cast. Antirrhino alpino.

Habita en la Suiza, Austria, monte Baldo, Estiria y Pi-
rineos.

Echa las hojas lanceoladas, en verticilo y muy apartadas:
y una lacinia del caliz mas larga.

Una variedad de esta especie con la flor purpúrea, cuya
abertura de la boca no se halla de color amarillo, es la
Linaria pequeña purpúrea, con hojas dispuestas sin
orden. Bauhini hist. 3. p. 460. Hall.

758 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Bi- 23. ANTIRRHINUM fo- Antirrhino con hojas opues-
eorne. *liis oppositis ovato-oblongis* tas, entre aovadas y oblon-
serratis, caule erecto, flori- gas, aserradas; tallo dere-
bus racemosis, capsulis bi- cho; flores racimosas; y cap-
cornibus. Amcen. acad. 6. sulas con dos astitas.
afr. 17.

Antirrhinum foliis copio- Antirrhino con hojas abun-
sis, oblongis, dentatis, cap- dantes, oblongas, dentadas;
sula corniculata, reflexa. capsula con cuernezueros y
Burm. afr. 211. t. 75. f. 3. redoblada.

Cast. Antirrhino de dos cuernezueros.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ☉

Villo- 24. ANTIRRHINUM fo- Antirrhino con todas las
sum. *liis omnibus oppositis ova-* hojas opuestas, aovadas, ve-
tis villosis, caulibus sim- llosas; tallos sencillos; flo-
plicibus, floribus oppositis res opuestas y laterales.
lateralibus.

Antirrhinum saxatile, mi- Antirrhino saxátil, menor,
nus, Origani folio, viscoso con hoja como la del Orega-
& villosa, flore albo amplo. no, viscosa, vellosa; flor
Barr. ic. 597. blanca y ancha.

Linaria Hispanica, Num- Linaria de España, con
mulariæ folio, villosa. To- hoja como la de la Numula-
urn. p. 169. ria, y vellosa.

Cast. Antirrhino vellosa.

Habita en Andalucía, lugar de Cañete la Real, entre cuevas y peñascos. ☿

Posee las *hojas* menudas y mas cortas que los pedunculos: y toda la *planta* se halla cubierta de pelo espeso.

Ori- 25. ANTIRRHINUM fo- Antirrhino con las mas
ganifo- *liis plerisque oppositis,* hojas opuestas, oblongas; y
jum. *oblongis, floribus alternis.* flores alternas.

Antirrhinum foliis oppo- Antirrhino con hojas opues-
sitiis, lanceolatis, floribus tas, lanceoladas; y flores en
laxe racemosis. Roy. lugdb. racimo laxo.

297.

Antirrhinum saxatile, fo-
liis *Serpilli*. C. B. P. 212. X Antirrhino saxátil , con
Prodr. 106. Burs. XII. 8. 9. X hojas como las del Sérpol.

Antirrhinum saxatile,
villosum, *Origani folio*, glu- X Antirrhino saxátil , ve-
tinoso. Barr. ic. 598. X lloso , con hoja como la del
Oregano y glutinosa.

Antirrhinum saxatile,
Alsines folio, unctuosus & X Antirrhino saxátil , con
villosus. Barr. ic. 1102. 1103. X hoja como la de la Alsine,
untuosa y vellosa.

Orontium saxatile, *Thy-*
mi folio, flore rubello. Barr. X Oroncio saxátil , con hoja
ic. 1313. X como la del Tomillo ; y flor
encarnadita.

Cast. Antirrhino con hoja de Oregano.

Habita en los Pirineos y Marsella : en Segovia junto á
nuestra Señora de Fuencisla : en la Alcarria , en los
montes de nuestra Señora de Montserrat , de Leon, Bur-
gos y otras partes de España. ○

Es planta que varía con hojas aovadas y lanceoladas ; sien-
do acaso producida del *Antirrhino menor* , del qual se
distingue por las ramas leñosas ; por todas las hojas
del tallo opuestas , con las florales alternas ; y por las
flores al doble mayores.

Minus. 26. ANTIRRHINUM fo- X Antirrhino con las mas
liis plerisque alternis lan- X hojas alternas , lanceoladas,
ceolatis obtusis, caule ramo- X obtusas ; tallo muy ramoso
sissimo diffuso. Flor. dan. X y difuso.
t. 502.

Antirrhinum viscidum, X Antirrhino viscoso , con las
foliis inferioribus conjuga- X hojas inferiores opuestas de
tis, ellipticis, obtusis, cal- X dos en dos, elípticas, obtusas,
care dimidii floris longitu- X y el espolon del largo de la
dine. Hall. helv. n. 335. X mitad de la flor.

Antirrhinum floribus so-
litariis, foliis sublinearibus, X Antirrhino con flores so-
alternis, obtusis. Scop. car. X litarias ; hojas casi lineares,
ed. 2. 769. X alternas y obtusas.

Antirrhinum arvense, mi- X Antirrhino arvense , me-
nus. C. B. P. 212. X nor.

760 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Linaria arvensis, cærulea, erecta. Tourh. p. 170. X *Linaria arvensis*, levanta-da, con la flor cerúlea.

Linaria arvensis, minima. Riv. monop. t. 85. X *Linaria arvensis*, muy pequeña.

Antirrhinum III. Cam. epit. 922. X Antirrhino tercero.

Cast. Antirrhino menor.

Habita en terrenos cultivados y pedregosos de Europa: en los circuitos de Madrid y otras muchas partes de España. ☉

Tiene solamente los tres pares de las hojas de abaxo opuestos.

Pinna- 27. ANTIRRHINUM fo- X Antirrhino con hojas opues-
tum. *liis oppositis pinnatifidis,* X tas, hendidas al través; ta-
caule erecto, floribus race- X llo derecho; y flores racimo-
mosis. Suppl. p. 280. X sas.

Cast. Antirrhino pinnado ó hendido al través.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

ESPECIES CON HOJAS ALTERNAS.

Dalma- 28. ANTIRRHINUM fo- X Antirrhino con hojas al-
ticum. *liis alternis cordatis am-* X ternas, de figura de corazon
plexicaulibus. Pall. it. 590. X y amplexicaules.

Linaria foliis lanceolatis X *Linaria* con hojas lanceo-
alternis, caule suffruticoso. X ladas, alternas; y tallo su-
Mill. dict. n. 13. X fruticoso.

Linaria latifolia, Dal- X *Linaria* de Dalmacia, con
matica, magno flore. C. B. X hoja ancha y flor grande.
P. 212. prodr. 106. Tourh. X
p. 169. X

Linaria maxima, folio X *Linaria* muy grande, con
Lauri. Bauh. hist. 3. p. 458. X hoja como la del Laurel.
Buxb. cent. 1. p. 95. t. 24. X

Cast. Antirrhino de Dalmacia.

Habita en Creta y Armenia. ☉

Las flores solitarias y con pedunculo salen de las axilas de las hojas.

29. ANTIRRHINUM fo-
liis lanceolatis hirtis alter-
nis, floribus spicatis, folio-
lo calycino supremo maxi-
mo. Loeff. Mill. dict. n. 10.

Antirrhino de hojas lan-
ceoladas, con pelo áspero,
alternas; flores en espiga; y
la hoja suprema del caliz
muy grande.

Antirrhinum foliis hir-
tis, radicalibus quaternis
ovatis, caulinis lanceolatis
alternis, floribus spicatis.
Gou. illustr. 38. R.

Antirrhino de hojas con
pelo áspero, las radicales de
cuatro en cuatro, aovadas,
las del tallo lanceoladas, al-
ternas; y flores en espiga.

Linaria latifolia, villosa,
laciniis calycinis inæquali-
bus, flore majore, pallido,
striato, rictu aureo. Quer. fl.
hisp. tom. 5. p. 356.

Linaria con hoja ancha,
vellosa; lacinias del caliz
desiguales; flor mas gran-
de, pálida, estriada; y la
abertura de la boca de color
de oro.

Cast. Antirrhino con pelo áspero.

Habita en los circuitos de Madrid: en la Alcarria, Man-
cha y otras muchas partes de España. ☉

Tiene algunos tallos sencillos y del largo de un gema,
poco mas ó menos: las hojas lanceoladas y alternas: las
flores en espiga densa, del color y magnitud de las del
Antirrhino Linaria: la hojuela superior del caliz al
doble mayor que las restantes; y las capsulas casi re-
dondas.

Ge-
nisti-
folium.

30. ANTIRRHINUM fo-
liis lanceolatis acuminatis,
panicula virgata flexuosa.
Jacq. austr. t. 244.

Antirrhino con hojas lan-
ceoladas, puntiagudas; pa-
noja en varitas y ondeada.

Linaria Genistæ folio,
glaucos, flore luteo. Herm. par.
app. 9. Dill. elth. 202. Rai.
Suppl. p. 391.

Linaria con hoja como la
de la Ginesta, de color gar-
zo; y flor amarilla.

Linaria flore pallido, ric-
tu aureo. C. B. P. 213. To-
urn. p. 170.

Linaria con la flor pálida,
y la abertura de la boca de
color de oro.

Linaria Pannonica I.
Clus. hist. 1. p. 321.

Linaria de Pannonia, pri-
mera.

Cast. Antirrhino con hoja de Ginesta.

Ha-

762 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Habita en la Siberia. Gmel. en la Austria inferior, Suiza y cerca de Dresdan. 2

Produce los *tallos* en panoja y algo tendidos: las *hojas* alternas, lanceoladas, lampiñas, puntiagudas y enteramente como las de la *Ginesta de tintes*: los *racimos* largos, dispuestos en panoja y ondeados: las *flores* alternas, apartadas y con piecitos de la longitud del caliz: el *caliz* dividido en cinco partes, lampiño, agudo y del largo de la capsula: las *corolas* amarillas, y de la magnitud del *Antirrhino Linaria*.

Juncum.

31. ANTIRRHINUM *foliis linearibus alternis, caule paniculato virgato, floribus racemosis.* Moen. acad. Antirrhino de hojas lineares, alternas; tallo con varitas en panoja; y flores racimosas.

4. p. 277.

Cast. Antirrhino como Junco.

Habita en el monte de Herrera, en el pinar de Losilla cerca de Albarracin y otras partes de Aragon. (C)

Es *planta* de la altura de pie y medio. Echa los *tallos* rollizos, como juncos y lampiños: las *hojas* lineares; las *inferiores* casi opuestas, y las *superiores* alternas: las *flores* en racimo: las *lacinias del caliz* casi iguales: las *corolas* con el espolon corto; el *labio superior* blanco, con estrias cerúleas y el inferior de color amarillo pálido. *Sinops. pl. Aragon. p. 80.*

Linaria.

32. ANTIRRHINUM *foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis.* Mat. Antirrhino con hojas entre lanceoladas y lineares, amontonadas; tallo derecho; espigas terminales, sentadas; y flores apiñadas.

med. p. 178.

Antirrhinum foliis lanceolato-linearibus sparsis, calycis laciniis capsula dimidio brevioribus. Guett. Antirrhino con hojas entre lanceoladas y lineares, esparcidas; y lacinias del caliz la mitad mas cortas que la capsula.

stamp. 2. p. 203.

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 763

Linaria vulgaris, lutea, X Linaria vulgar, con la flor
flore majore. C. B. P. 212. X amarilla, y mas grande.
 Riv. t. 83. Tourn. p. 170.
 Knorr. del. hort. 2. t. L. 6.
Linaria prima. Dod. Linaria primera.
 pempt. 183. Osyris.
 Osyris. Fuchs. hist. 543. X
 Cam. epit. 390.

Cast. Antirrhino Linaria.

Habita entre cascajales de Europa. ¶

Tiene el paladar vellosos y de color amarillo-roxo.

Vease la *Linaria amarilla montana* con hoja como la de
 la *Ginesta de tintes.* C. B. P. 213. Tourn. p. 170. co-
 gida por *Bursero* en el monte de San Bernardo por la
 parte que mira al Valle agosto, que parece variedad
 de esta especie, por tener solamente las flores la mitad
 mas pequeñas.

La *Peloria Amæn.* acad. 1. p. 55. t. 3. es prole hibrida
 de la *Linaria* y de su misma calidad constante, con
 raices que se multiplican sumamente; pero muy diversa
 en el caracter de su fructificacion. Tiene la corola regu-
 lar, hendida en cinco partes, con cinco cuernecitos, y
 cinco estambres; de suerte que constituiria un género
 propio y distintisimo, si su fruto no abortase siempre.

PROPIED. La yerba es algo amarga, anodina, expelente,
 diuretica y un poco purgante: se usa en la ictericia,
 hidropesia, opthalmia y para suavizar el dolor de las
 almorranas.

Linifolium.

33. ANTIRRHINUM fo- X
liis lanceolatis alternis tri-
nerviis, floribus racemosis,
pedunculis distantibus brac-
tea brevioribus.

Linaria Americana, par-
 vo flore, luteo. C. B. P. 212.
 prodr. 106. X

Antirrhino de hojas lan-
 ceoladas, alternas, con tres
 nervios; flores racimosas; pe-
 dunculos apartados y mas
 cortos que la bractea.

Linaria de America, con
 la flor pequeña y amarilla.

764 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Linaria Constantinopolitana, *Lini sativi folio*, *floribus luteo*. Tourn. cor. 9. Buxb. cent. 1. p. 16. t. 25. f. 2. mala. Linaria de Constantinopla, con hoja como la del Lino sativo; y flor amarilla.

Cast. Antirrhino con hoja de Lino.

Habita en lugares maritimos de Italia. \mathcal{C}

Arroja los tallos rollizos, derechos, lisos, con ramas alternas: las hojas lanceoladas, ó entre angostas y lanceoladas, puntiagudas, alternas, apartadas, lisas y con tres nervios poco manifiestos: el racimo recto y largo: las brácteas lanceoladas y comunmente mas largas que la flor: los pedunculos de la longitud del espolon: los cálices agudos y cortos: las corolas amarillas, vellozas en el paladar; con el espolon recto y del largo de la flor.

Chalepense.

34. ANTIRRHINUM *foliis linearilanceolatis alternis, floribus racemosis, calycibus corolla longioribus, caule erecto*. Roy. lugdb. 296. Antirrhino con hojas entre lineares y lanceoladas, alternas; flores racimosas; cálices mas largos que la corola; y tallo derecho.

Antirrhinum foliis inferioribus quaternis, ceteris alternis, floribus racemosis, calycibus corolla duplo longioribus. Gou. illustr. 38. R. Antirrhino con las hojas inferiores de quatro en quatro, las restantes alternas; flores racimosas; y cálices al doble mas largos que la corola.

Linaria flore albo. Riv. monop. t. 80. f. 2. Linaria con la flor blanca.

Linaria Chalepensis, minor, erecta, flore albo, lineis violaceis. Moris. hist. 3. p. 502. sect. 5. t. 35. f. 9. Linaria de Alepo, menor, derecha; y de flor blanca, con lineas de color de violeta.

Linaria annua, angustifolia, floreculis albis, longis caudatis. Triumph. obs. 87. t. 87. f. 2. Rai. hist. 1884. Linaria annua, de hoja angosta; florecitas blancas, largas y con espolon.

Cast. Antirrhino de Alepo.

Ha-

Habita en Alepo, Italia y Mompeller. ○

35. ANTIRRHINUM fo-
liis ovatis alternis glabris,
pedunculis axillaribus, fruc-
tiferis recurvatis elongatis,
caule procumbente.

Antirrhinum procumbens,
ramosum, foliis alternis,
ovatis, acuminatis, inte-
gerrimis, floribus cordatis,
axillaribus. Allion. cors. 205.

f. 1.

Linaria pusilla, procum-
bens, latifolia, flore palli-
do, rictu luteo. Rai. hist.
755.

Antirrhino con hojas 20-
vadas, alternas, lampiñas;
pedunculos axilares; los que
llevan el fruto encorvados
ácia atrás, alargados; y ta-
llo tendido.

Antirrhino tendido, ra-
moso, con hojas alternas,
aovadas, puntiagudas, ente-
risimas; flores de figura de
corazon y axilares.

Linaria pequeñita, tendi-
da, de hoja ancha; y flor
pálida con la abertura de la
boca amarilla,

Cast. Antirrhino redoblado.

Habita en Berberia. Brander. ○

Echa los tallos filiformes y del largo de un gеме: las ho-
jas alternas, aovadas, con algun peciolo y apartadas:
los pedunculos axilares, solitarios, de una flor, de la
longitud de las hojas, y en acabando de florecer, al do-
ble mas largos y doblados ácia la tierra: el caliz pun-
tiagudo: el espalon de la corola del largo de la flor; y
la capsula globosa.

36. ANTIRRHINUM fo-
liis alternis linearibus re-
motis, floribus paniculatis,
pedunculis folio longioribus
strictis.

Linaria Lusitânica, ma-
ritima, Polygalæ folio. To-
urn. p. 169.

Antirrhino con hojas al-
ternas, lineares, apartadas;
flores en panoja; pedunculos
mas largos que la hoja, apre-
tados y rígidos.

Linaria de Portugal, ma-
ritima, con hoja como la de
la Polygala.

Cast. Antirrhino pedunculado.

Habita en España. Claud. Alstroem.

Tiene los tallos del largo de un gеме, leñosos y muy ra-
mosos: las hojas lanceoladas, lisas y como las del Po-
li-

766 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

ligono avicular.: los pedunculos rigidos y apretados , y tres veces mas largos que las hojas : el caliz liso : las corolas amarillas , y por defuera con estrias cerúleas.

Lago-
podio-
ides.

37. ANTIRRHINUM fo-
liis sparsis mollibus apice
recurvis , spicis ovatis vil-
losis. Suppl. p. 279.

Antirrhino con hojas es-
parcidas , blandas , encorva-
das ácia atrás por su ápice ;
espigas aovadas y vellosas.

Cast. Antirrhino como Lagopo ó sea como pie de Zorro.
Habita en la Siberia.

Produce los tallos herbáceos , casi del largo de un pie , derechos , vellosos , blandos y con ramitas alternas por arriba : las hojas sin orden , entre lanceoladas y lineares , derechas , un poco encorvadas en su ápice , redobladas por la margen , blandas , pálidas y algo tomentosas : las espigas que terminan las ramas , solitarias , aovadas , ú oblongas y con pelillos espesos : los cálices amontonados , iguales y como los del *Lagopo* ; las corolas pequeñas , respecto de las demas especies , y amarillas : el labio superior de color amarillo-roxo ; y el paladar señalado por dentro con dos puntos de color leonado.

ESPECIES CON LAS COROLAS QUE SE ABREN,
ó SIN ESPOLON.

Uni-
labia-
tum.

38. ANTIRRHINUM
ecaudatum , callis duobus ,
foliis alternis pinnatifidis ,
caule paniculato. Suppl. p.
279.

Antirrhino sin espolon ,
con dos callos ; hojas alter-
nas , hendidas al través ; y
tallo en panoja.

Cast. Antirrhino de un labio.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Majus.

39. ANTIRRHINUM co-
rollis ecaudatis , floribus
spicatis , calycibus rotun-
datis. Riv. t. 82. Knorr. del.
I. t. L. 12.

Antirrhino con las corolas
sin espolon ; flores en espi-
ga ; y cálices redondeados.

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 767

Antirrhinum foliis lanceolatis, petiolatis, calycibus brevissimis, racemo terminali. Roy. lugdb. 294. Antirrhino de hojas lanceoladas, con peciolo; cálices cortísimos; y racimo terminal.

Antirrhinum vulgare. Bauh. hist. 3. p. 62. Tourn. p. 168. Antirrhino vulgar.

Antirrhinum majus, alterum, folio longiore (vel rotundiore). C. B. P. 211. Otro Antirrhino mayor, con hoja mas larga (ó mas redonda.)
Antirrhinum. Dod. pempt. 182. Antirrhino.

Antirrhinum luteo flore. C. B. P. 211. Tourn. p. 168. Antirrhino con la flor amarilla.

Antirrhinum latifolium, pallido amplo flore. Bocc. mus. 2. p. 49. t. 41. Antirrhino de hoja ancha, con la flor pálida y tambien ancha.

Cast. Antirrhino mayor. *vulgo*: Becerra.
Habita sobre tapias viejas y cercas: en los contornos de Madrid, Aragon, Cataluña y en otras muchísimas partes de España. ♂
Varia con el tallo recto, difuso y en varitas; y con hojas aovadas, mas anchas, mas angostas y lanceoladas.

Orontium. 40. ANTIRRHINUM *corollis ecaudatis, floribus subspicatis, calycibus digitatis corolla longioribus.* Antirrhino con las corolas sin espolon; flores casi en espiga; cálices divididos como en dedos y mas largos que la corola.
Hort. ups. 176.

Antirrhinum foliis lanceolatis petiolatis, calycibus florem superantibus. Antirrhino de hojas lanceoladas, con peciolo; y cálices mas altos que las flores.
Hort. cliff. 224.

Antirrhinum arvense, majus. C. B. P. 212. Tourn. p. 161. Riv. t. 82. Antirrhino arvense, mayor.

Antirrhinum sylvestre, Phyteuma. Dod. pempt. 182. Antirrhino silvestre, llamado Phyteuma.

Cast. Antirrhino Orontio.
Habita entre los sembrados de Europa: en los circuitos de

768 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

de Madrid : en la Alcarria , Castilla la vieja , Extremadura , Aragon , Cataluña y otras partes de España. ☉
 La capsula quando se abre se parece á un cráneo de mona. Es planta venenosa.

Papilionaceum. 41. ANTIRRHINUM *collis ecaudatis , floribus axillaribus , calycibus papilionaceis , foliis carnosis.* Antirrhino con las corolas sin espolon ; flores axilares, cálices como mariposa; y hojas carnosas.

Cast. Antirrhino papilionaceo.

Habita en la Persia. *Burm.*

Posee las *hojas* alternas, con peciolo corto, aovadas al revés, carnosas, enterisimas, y de la magnitud de las del *Oregano* : las *flores* en las axilas de las hojas, solitarias, con el pedunculo corto y de la magnitud de las mismas hojas : el *caliz* de cinco hojuelas; con la *superior* mas grande, de figura de corazon y casi de la longitud de la flor ; pero las *restantes* casi lanceoladas, y la mitad mas cortas que la corola : la *corola* sin espolon ; con el *labio superior* hendido en dos partes, y las márgenes laterales redobladas ; el *inferior* mas ancho y hendido en tres lacinias casi iguales.

Asarina. 42. ANTIRRHINUM *collis ecaudatis , foliis oppositis cordatis crenatis , caulibus procumbentibus.* Antirrhino con las corolas sin espolon ; hojas opuestas, de figura de corazon, recortadas ; y tallos tendidos.

Hort. cliff. 313.

Asarina. Tourn. p. 171.

Asarina sive saxatilis

Hederula. Lob. ic. 601.

Hedera saxatilis , magno flore. C. B. P. 306.

Asarina Lobelii , flore

Hederæ terrestris. Bauh. hist. 3. app. 856.

Asarina.

Asarina ó Yedra pequeña,

saxátil.

Yedra saxátil, con la flor grande.

Asarina de Lobelio, con

la flor como la de la Yedra terrestre.

Cast. Antirrhino Asarina.

Habita en las peñas vecinas á *Veganío* y en *Ginebra* : en *Monseñ* sobre los muros de la *Hermita* que llaman *Santa Susana* : en las grietas de las peñas de los *Pirineos* de

Ca-

Cataluña, de Vizcaya y otras partes de España. 2
Tiene los tallos postrados y que cuelgan: las hojas con lóbulos obtusos, ó profundamente recortadas y pelosas.

Molle.

43. ANTIRRHINUM *collis ecaudatis, foliis oppositis ovatis tomentosis, caulibus procumbentibus.* Schreb. in nov. Act. A.N.C.

Antirrhino con las corolas sin espolon; hojas opuestas, aovadas, tomentosas; y tallos tendidos.

vol. 3. p. 473.

Antirrhinum Hispanicum, villosum, Origani folio glutinoso. Tourn. p. 168. Barr. ic. 598. (cui perperam calcar).

Antirrhino de España, velloso, con hoja como la del Oregano glutinosa. (La lámina de Barrelier no debe tener espolon.)

Cast. Antirrhino blando.

Habita en Andalucía, Extremadura y otras partes de España. 2

Arroja los tallos postrados y fragiles: las hojas del tallo opuestas y muy blandas: los pedunculos mas largos que el caliz: la corola como la de la Asarina, vellosa, blanca, de color amarillo-roxo en el paladar, y con estrias encarnadas en el labio superior.

ESPECIES BOQUIABIERTAS.

Bel-
lidifo-
lium.

44. ANTIRRHINUM *foliis radicalibus lingulatis dentatis lineatis, caulinis partitis integerrimis.*

Antirrhino de hojas radicales á manera de lenguetas, rayadas, y con dientes; las del tallo partidas y enterisimas.

Antirrhinum foliis imis elliptico-lanceolatis acutidentatis, caulinis capillari- bus trifidis. Hall. helv. n. 342.

Antirrhino con las hojas de abaxo entre elípticas y lanceoladas, agudamente dentadas; las del tallo capilares y hendidas en tres partes.

Antirrhinum foliis radicalibus spathulatis, duplicato-serratis, caulinis digitatis, laciniis lanceolato-linearibus integerrimis, intermedia longiore. Gov. illust. p. 39. R.

Antirrhino con las hojas radicales de en forma de espátula, dos veces aserradas; las del tallo divididas á manera de dedos, con las laciniyas entre lanceoladas y lineares, enterisimas, y la intermedia mas larga.

Antirrhinum foliis radicalibus oblongis, serratis, corollis calcaratis patulis. Roy. lugdb. 295.

Antirrhino de hojas radicales oblongas, aserradas; corolas con espolon y abiertas.

Linaria Bellidis folio. C. B. P. 212. prodr. 106, t. 106. Tourn. p. 169.

Linaria con hoja como la de la Margarita.

Linaria odorata. Dod. pempt. 184.

Linaria olorosa.

Linaria Lusitanica, Bellidis folio, ampliore & villosa. Tourn. p. 169. ex Gov. R.

Linaria de Portugal, con hoja como la de la Margarita, mas ancha y vellosa.

Cast. Antirrhino con hoja como la de la Margarita.

Habita en Mompeller: en el circuito de Madrid, en los Barrancos del carbon mas arriba del Real Sitio del Pardo: en la Alcarria y Serrania de Cuenca: montes de Avila, Sierra-morena, Aragon y Catalufia; pero la variedad α en Galicia cerca de la Ciudad de Lugo; y asimismo en los contornos de Orense. ♂

Produce el tallo derecho, yerto y con muchas ramas sencillas en la sumidad: muchos tallitos mas cortos, que salen de la raiz: las hojas radicales en forma de lengua, obtusas, con dientes, rayadas y lampifias: las del tallo partidas en tres, cinco, ó siete laciniyas lineares y enterisimas: las espigas terminales y rectas: las bractees con una flor, lineares y mas largas: las flores de color que tira á cerúleo, inclinadas, menudas, hendidas en cinco laciniyas de las quales dos se hallan levantadas, y las tres inclinadas: el paladar ó la convexidad poco formada y que no cierra la garganta: el espolon redoblado y menudo: las anteras redobladas, y de color entre negro y cerúleo.

lina-
rse.

45. ANTIRRHINUM fo-
liis linearibus alternis, corollis caudatis hiantibus, labio inferiore explanato.

Antirrhino de hojas lineares, alternas; corolas con espolon, abiertas; y el labio superior aplanado.

Antirrhinum caule simplicissimo, longissimo, foliis caulinis linearibus, stolonum procumbentium lanceolatis minimis. Gron.virg.

Antirrhino con el tallo muy sencillo, larguísimo; hojas del tallo lineares; las de los renuevos tendidas lanceoladas y muy pequeñas.

67. Cast. Antirrhino del Canadá.

Habita en la Virginia y Canadá. ☉

Echa la raíz fibrosa: el tallo derecho, filiforme, del largo de un pie y algo ramoso: las hojas alternas, apartadas, lineares y lampiñas: el racimo terminal con flores claras, alternas y con piecicito: el caliz dividido en cinco partes y agudo: la corola con el labio superior corto y redoblado; el inferior grande, abierto, que cuelga; y el espolon alesnado.

Linaria-
rioides

46. ANTIRRHINUM fo-
liis lineari-lanceolatis ternis, caule erecto racemosa.

Antirrhino con hojas entre lineares y lanceoladas, de tres en tres; tallo derecho y racimoso.

Cast. Antirrhino como Linaria.

Habita en la Europa austral.

Es muy semejante al Antirrhino Linaria; pero tiene los tallos mas angostos: las hojas de tres en tres: las flores racimosas, y que se las asemejan mucho; aunque el labio superior de la corola es blanquecino y no amarillo-roxo: en lo restante convienen.

Aphyllum.

47. ANTIRRHINUM sca-
po aphylo capillari. Suppl.

Antirrhino con el escapo sin hojas y capilar.

p. 280.

Cast. Antirrhino sin hojas.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Es muy singular esta planta; de manera que parece no serlo, pues ni tiene tampoco hojas radicales. Es semejante al Esplacno sin hojas, y apenas mayor que él.

899. Género HEMIMERIS. *Suppl. p. 45.*

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de una pieza, casi partido hasta su base en cinco hojuelas lanceoladas y persistentes.
- COR.** de un *petalo*, en forma de rueda, algo desigual; cada *lacinia* con un hoyuelo néctarífero en medio; la *una* mayor y de figura de corazón; las *ultimas* obtusas, mas pequeñas y opuestas á la mayor.
- ESTAMB.** *Filamentos* dos, ó quatro, colocados en la base del petalo mayor; los *dos* horizontales; y los otros *dos* mas pequeños é inclinados: con las *anteras* en forma de corazón y unidas.
- PIST.** *Germen* dentro de la flor: *estilo* filiforme, y puesto entre las *anteras*: con el *estigma* sencillo.
- PERIC.** *Capsula* aovada, y de dos celdillas, con la una de ellas mas gibosa.
- SEM.** muchas, transparentes y casi globosas.

ESPECIES.

1. HEMIMERIS *diandra*, X Hemimeris con dos estam-
 Sabu- *foliis oppositis pinnatifidis*, X bres; hojas opuestas, hendi-
 losa. *caule prostrato.* *Suppl. p. 280.* X das al través; y tallo prostra-
 do.

Cast. Hemimeris sabulosa ó sea que se cria en tierra arenisca.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

2. HEMIMERIS *didyna-* X Hemimeris de quatro es-
 Diffu- *ma, foliis alternis opposi-* X tambres con los dos mas
 sa. *tisque pinnatifidis, caule* X cortos; unas hojas alternas,
patulo. *Suppl. p. 280.* X y otras opuestas, hendidas al
 través; y tallo extendido.

Cast. Hemimeris difusa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Acaso es variedad de la antecedente?

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 773

Mon-
tana.

3. HEMIMERIS *diandra*, X Hemimeris con dos estam-
foliis oppositis ovatis ser- X bres; hojas opuestas, aova-
ratis, caule erecto. Suppl. p. X das, aserradas; y tallo le-
280. X vantado.

Cast. Hemimeris montana.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

900. Género CYMBARIA. *Amm. ruth. I.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio derecho, persistente, con dos dientes opues-
tos mas recios y mas extendidos; los restantes dere-
chos y lineares.

COR. de un *petalo*, boquiabierta: *tubo* oblongo, ventri-
coso: el *labio superior* dividido en dos partes, redo-
blado y obtuso: el *inferior* hendido en tres lacinias y
tambien obtuso.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, de la longitud del tubo: con
las *anteras* hendidas en dos partes y que sobresalen.

PIST. *Germen* aovado: *estilo* filiforme, de la longitud de
los estambres y encorvado por su ápice: con el *estig-*
ma obtuso.

PERIC. *Capsula* aovada, de una celdilla y de dos venta-
llas. *Receptáculo* de quatro ángulos.

SEM. muchas, anguladas y lisas.

OBS. Por el *caliz* solo se distingue facilmente de todos los
demas generos de esta clase.

E S P E C I E.

Dau-
rica.

1. CYMBARIA. Gmel. X Cymbaria.
sib. 3. p. 198. n. 8.

Cymbaria daurica, pumi- X *Cymbaria daurica*, enana,
la, incana, Linaria folio, X blanquecina, con hoja co-
magno flore luteo, guttato. X mo la de la *Linaria*; flor
Amm. ruth. 47. t. 1. f. 2. X grande, amarilla y goteada.

Cast. *Cymbaria daurica*.

Habita en los montes abrigados y peñascosos de Dauria.
Es planta toda blanquecina y muy semejante al *Antirrh-*
no. Echa las *ramas* opuestas y estériles: muy pocas flo-
res

776 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

ESTAMB. Filamentos quatro , filiformes y encorvados : un rudimento de otro filamento colocado dentro del par superior de los estambres , corto y á manera de una puntita : con las anteras casi unidas.

PIST. Germen oblongo : estilo corto , sencillo y de la longitud de los estambres : con el estigma hendido en dos lóbulos.

PERIC. Capsula leñosa , oblonga , gibosa , de cinco celdillas , cuadrangular , con dos sulcos en cada lado, puntiaguda , encorvada ácia atrás por su ápice , que se abre en dos partes , y que encierra las simientes como en una nuececita de quatro caxitas.

SEM. muchas , oblongas , y reducidas á baya.

OBS. La Martynia de flor larga tiene el caliz con cinco dientes y posee dos estigmas; la capsula casi sin pico y por su base en cada lado con un dientecito craso. R.

E S P E C I E S .

- | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pe-
rennis | 1. MARTYNIA caule simplici , foliis serratis. | X | Martynia con el tallo sencillo ; y hojas aserradas. |
| | Martynia foliis serratis. | X | Martynia con hojas aserradas. |
| | Hort. cliff. 322. t. 18. | X | |
| | Martynia perennis , folio subrotundo , rugoso , flore cœruleo , radice Dentariæ. | X | Martynia perenne , con hoja casi redonda , rugosa; flor cerúlea ; y raiz como la de la Dentaria. |
| | Ehret. pict. t. 9. f. 2. | X | |

Cast. Martynia perenne.

Habita en Cartagena de America. $\frac{R}{h}$

Echa la raiz como la de la Dentaria y en forma de collar.

- | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Annua | 2. MARTYNIA caule ramoso , foliis integerrimis angulatis. Sabb.hort.2.t.91. | X | Martynia con el tallo ramoso ; hojas enterisimas y anguladas. |
| | Martynia caule ramoso , foliis cordato-ovatis pilosis. | X | Martynia con el tallo ramoso ; hojas entre de figura de corazon y ovadas , y pelosas. |
| | Mill. ic. t. 286. | X | |
| | Martynia caule petiolis que fistulosis , floribus bi-bracteatis. Gou. hort. 303. | X | Martynia con el tallo y peciolos fistulosos ; y flores con dos bracteas. |

Mar-

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 777

Martynia annua, villosa^x *Martynia annua*, vellosa
 & viscosa, folio subrotun- y viscosa, con hoja casi re-
 do, flore magno rubro. donda; flor grande y encar-
 Mart. cent. 42. t. 42. Ehret. nada.
 piét. t. 1. f. 1.

Craniolaria. Loeff. it. 225. ^x *Craneolaria*.

Cast. *Martynia annua*.

Habita en Veracruz de America. ☉

Tiene el caliz exterior de dos hojuelas lanceoladas: el *periantio* ó sea caliz interior de una pieza, aovado, casi de cinco lóbulos, y que se abre por el lado inferior hasta su base: el fruto con el pico largo, encorvado y ganchoso: y el *estigma* que se cierra tocándolo. Turra.

Longi-
flora.

3. MARTYNIA caule^x *Martynia* con el tallo sen-
simplici, foliis orbiculatis cillo; hojas redondas y on-
repandis. Syst. veg. p. 467. ^x deadas por su margen.

Cast. *Martynia* de flor larga.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ☉

Produce el tallo derecho, algo áspero y del largo de dos pies: las hojas opuestas, pecioladas y con tres nervios: las flores axilares, solitarias y con pedunculo corto: en lugar de *estipulas*, en la base de los pedunculos, una glandula ó cupula que recoge un globo que tiene como un estilo corto y un *estigma*: el *periantio* muy pequeño y con cinco dientes: el tubo de la corola muy largo, mas encogido por en medio y giboso en la base de su dorso: el germen dentro de la flor: el estilo del largo del tubo; con dos *estigmas* lineares y revueltos: el *pericarpio* casi sin pico, con un dientecito craso en ambas partes de su base; y las semillas pequeñas. Royen.

903. Género TORENIA. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, tubuloso, angulado, persistente y hendido en dos labios: el superior con tres puntas; y el inferior mas angosto y enterisimo.

COR. de un petalo, de dos labios: el superior entero: el in-

778 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

inferior hendido en tres lacinias ; con la *intermedia* mas larga.

ESTAMB. *Filamentos* quatro : los *dos superiores* sencillos : los *dos inferiores* divididos en dos ramitos : con el *inferior* mas corto y sin antera : las *anteras* mellizas y contiguas por pares.

PIST. *Germen* oblongo : *estilo* filiforme y mas grueso por arriba : con el *estigma* hendido en dos partes y agudo.

PERIC. *Capsula* oblonga , y de dos celdillas.

SEM. muchas.

ESPECIE.

Asia-
tica.

1. TORENIA. Amoenit. X Torenia.
acad. 3. p. 25. Osb. it. 210.

Euphrasia affinis, pusilla X Planta pequenita , pareci-
planta. Pluk. amalth. 85. t. X da á la Eufrasia.
373. f. 2.

Asarinae foliis & facie, X Planta con hojas y traza
capsula bivalvi lignosa. X como las de la Asarina ; cap-
Pluk. amalth. 19. t. 360. X sula de dos ventallas y leño-
f. 3 ? X sa.

Kakapu. Rheed. mal. 9. X Kakapu.
p. 103. t. 53. X

Cast. Torenia de Asia.

Habita en la India. *Toren.*

Varia con *hojas* lampiñas y vellosas ; y con *flores* mas grandes ó mas pequenias.

904. Género BESLERIA. Plum. 5.

Jacq. amer. 187.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , dividido en cinco partes, puntiagudo , derecho , laxo y con sus ápices redoblados.

COR. de un *petalo*, boquiabierta : *tubo* del largo del caliz, algo rollizo , giboso por una parte en su ápice y base : *borde* hendido en cinco lacinias casi redondas ; de las qua-

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 779

quales la *infima* es muy grande y las *dos superiores* menos divididas.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, dentro del tubo de la corola, de los quales *dos* son poco mas cortos: con las *anteras* oblongas, mellizas y que cuelgan por una y otra parte.

PIST. *Germen* globoso, sentado en un cuerpo glanduloso y persistente que le abraza, y de hechura de corazon hasta la convexidad de la corola: *estilo* alesnado y derecho: con el *estigma* hendido en dos partes y obtuso.

PERIC. *Baya* casi globosa y de una celdilla.

SEM. numerosas, redondas, muy pequeñas y anidadas.

ESPECIES.

Melittifolia.

1. BESLERIA *pedunculis ramosis, foliis ovatis.* Besleria con pedunculos ramosos; y hojas aovadas.
Besleria Melissa Tragi Besleria con hoja como la
folio. Plum. gen. 29. ic. 48. de la Melisa de Trago.

Cast. Besleria con hoja de Melitide.
 Habita en America.

Lutea.

2. BESLERIA *pedunculis simplicibus confertis, foliis lanceolatis.* Jacq. amer. 187. Besleria con pedunculos sencillos, amontonados; y hojas lanceoladas.
Besleria Virgæ aureæ foliis, flore luteo, minor. Besleria mas pequeña, con hojas como las de la Virgaurea; y flor amarilla.
Besleria Virgæ aureæ foliis, flore luteo, major. Besleria mas grande, con hojas como las de la Virgaurea; y flor amarilla. α
 Plum. gen. 29.

Cast. Besleria de flor amarilla.
 Habita en la America.

Cristata.

3. BESLERIA *pedunculis simplicibus solitariis, calycibus serrato-cristatis.* Syst. veg. 468. Besleria con pedunculos sencillos, solitarios; y cálices entre aserrados y en forma de cresta.

Bes-

780 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Besleria pedunculis simplicibus, solitariis, involucris pentaphyllis propriis. Besleria con pedunculos sencillos, solitarios; é involucros propios de cinco ho-
Jacq. amer. 188. t. 119. juelas.

Besleria scandens, cristata, fructu nigro. Plum.gen. Besleria trepadora, con crestas, y fruto negro.
29. ic. 50.

Cart. Besleria crestada.

Habita en la America.

Arroja la raíz rastrera: el tallo que trepa echando raíces: las hojas aovadas, aserradas y con peciolo: los pedunculos laterales, de una flor y terminados con un involucro de cinco hojuelas, de figura de corazon, dentadas y sin piecicito: el caliz coccineo: la corola de color amarillo roxo, con pelo áspero por defuera: y los estambres y pistilos enredados. Acaso es especie de *Martynia* ó de distinto género?

905. Género SCROPHULARIA. * *Tourn. t. 74.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, persistente, hendido en cinco laciniás, mas cortas que la corola y redondeadas.

COR. de un *petalo*, desigual: tubo globoso, grande, é inflado: *borde* muy pequeño, partido en cinco laciniás; con las *dos superiores* mayores, derechas; las *dos laterales* extendidas y la *tercera* de mas abaxo redoblada.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, lineares, declinados, de la longitud de la corola, y de ellos los *dos* mas tardíos: con las *anteras* mellizas.

PIST. *Germen* aovado: *estilo* sencillo, de la longitud y direccion de los estambres: con el *estigma* sencillo.

PERIC. *Capsula* casi redonda, puntiaguda, de dos celdillas y dos ventallas; que se abre por su ápice, y con el *diseptimento* formado de las márgenes dobladas de las ventallas.

SEM. muchas y pequeñas. *Receptáculo* casi redondo y partido en ambas celdillas.

OBS.

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 781

OBS. En la garganta de la corola debaxo de la lacinia superior del borde, se halla otra pequeña lacinia que se parece á un pequeño labio, la qual no es comun á todas las especies.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 166.

La flor es de un petalo, anomala, abierta por todas partes y globosa, cortada como en dos labios, con dos hojuelas debaxo del superior. Del caliz sale el pistilo, que pasa á fruto ó capsula redonda y puntiaguda, que se abre en dos partes mediante una entretela y divide en dos celdillas, llena de simientes pequeñas y fixadas al receptáculo.

ESPECIES.

1. SCROPHULARIA fo-
liis cordatis serratis acutis
basi rotundatis, caule ob-
tusangulo. Hort. ups. 177.

Escrofularia con hojas de figura de corazon, aserradas, agudas, redondeadas por su base; y tallo obtusangulo.

Escrofularia con hojas de hechura de corazon, opuestas; y racimo terminal.

Scrophularia Marilandica, longo profunde serrato
Urticæ folio. Rai. Suppl. p. 396.

Escrofularia de Marilandia, con hoja como la de la Ortiga, larga, y profundamente aserrada.

Cast. Escrofularia de Marilandia.

Habita en la Virginia. 24

Es muy semejante á la especie siguiente, aunque al doble mas alta. Tiene las hojas de figura de corazon por su base; y sin los tres nervios que concurren detrás de ella.

2. SCROPHULARIA fo-
liis cordatis trinervatis,
caule obtusangulo. Mat. med.
179. Gunn. noru. n. 732. t.
4. f. 1. 2.

Escrofularia de hojas de figura de corazon, con tres nervios que concurren ó se unen detrás en su base; y tallo obtusangulo.

Scro-

Mari-
landi-
a.

No
dosa.

782 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Scrophularia caule qua- X Escrofularia con el tallo
drangulo , paniculato , fo- X quadrangulo , en panoja; ho-
liis cordatis , oblongis. Hall. X jas de figura de corazon y
 helv. n. 326. X oblongas.

Scrophularia foliis cor- X Escrofularia con hojas de
datis basi transversis , cau- X figura de corazon , torcidas
le & ramis spica nuda pa- X ó atravesadas por su base ;
niculata terminatis. Crantz. X tallo y ramas terminados con
 austr. p. 325. X espiga desnuda y en panoja.

Scrophularia nodosa , fæ- X Escrofularia nodosa y fé-
tida. C. B. P. 235. Tourn. X tida.
 p. 166.

Scrophularia. Cam. epit. X Escrofularia.
 866. Riv. t. 106, Dod.pemp. X
 50. X

Cást. Escrofularia nudosa.

Habita en lugares húmedos de Europa : en Bustarviejo,
 Canencia , Avila , Alcarria , Aragon y Cataluña. 26
Varia con *hojas* de tres en tres ; y *flores* de color verde.
Haller.

PROPIED. *La raiz fétida y amarga es anodina , repelente ,*
sudorifica , carminativa y excelente para matar las
lombrices : se usa en las escrofulas , varices del ano ,
úlceras , sarna y angina.

Aqua-
 tica.

3. *SCROPHULARIA fo-* X Escrofularia con hojas de
liis cordatis petiolatis de- X figura de corazon , peciola-
currentibus obtusis , caule X das , escurridas , obtusas; ta-
membranis angulato , race- X llo angulado con membra-
mis terminalibus. Mat. med. X nas; y racimos terminales.
 179. Flor. dan. t. 507. Sabb.
 hort. 2. t. 89.

Scrophularia caule qua- X Escrofularia con el tallo
drangulo , alato , panicula- X quadrangular , alado , en pa-
to , foliis ovato-lanceolatis. X noja ; y hojas entre aovadas
 Hall. helv. n. 325. X y lanceoladas.

Scrophularia aquatica , X Escrofularia mayor , aqua-
major. C. B. P. 225. Tourn. X tica..... con las membra-
 p. 166. *caule fimbriato.* Loes. X nas del tallo hendidas en
 prus. 248. t. 75. X huecos.

Scro-

CON II. MÁS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 783

Scrophularia femina. X Escrofularia femenina.
 Dod. pempt. 50. X
Betonica aquatilis. Dod. X Betonica aquatica.
 pempt. 50. X

Cast. Escrofularia aquatica.

Habita en lugares húmedos de Inglaterra, Suiza y Francia; en los circuitos de Madrid, Aragon, Cataluña y es frecuente en España á las orillas de los riachuelos. ♂

PROPIED. Es menos fétida que la antecedente. Las hojas son sudorificas, carminativas, y corrigen el olor fætidioso y retortijones de vientre que causa el sèn, añadiendolas á su infusion ó cocimiento.

Auri-
ulata.

4. SCROPHULARIA fo- X Escrofularia con hojas de
liis cordatis subtus tomen- X figura de corazon, tomento-
tosis basi appendiculatis, X sas por debaxo, con apendi-
racemis terminalibus, X ces en su base; y racimos
 terminales.

Betonica aquatica, Sep- X Betonica aquatica, de los
triontialium. X del Septentrion.

Cast. Escrofularia con orejillas.

Habita en Aragon y otras partes de España.

Su estatura es como la de la *Escrofularia nudosa*. Tiene el tallo de quatro lados, con ramas opuestas en forma de aspa y sin pelos: las hojas de figura de corazon, dos veces aserradas, obtusas, opacas, desnudas con dos hojuelas aovadas en su base, casi de tres en rama y sencillas en las ramas mas pequeñas: las corolas de color purpúreo-triste, con un labio revuelto de color livido que tira á verde.

Scoro-
donia.

5. SCROPHULARIA fo- X Escrofularia con hojas de
liis cordatis duplicato ser- X figura de corazon, dos veces
ratis, racemo composito fo- X aserradas; racimo compues-
liis interstincto. Gmel. Sib. X to é interrumpido con hojas.

3. p. 195.

Scrophularia Melissa fo-
lio. Tourn. p. 166.

Escrofularia con hoja como la de la Melisa ó sea Torongil.

Scro-

784 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Scrophularia Scorodonæ Escrofularia con hoja como la de la Escorodonia.
folio. Pluk. alm. 338. t. 59.
 f. 5. Rai. hist. 776. Moris.
 hist. 2. p. 482. sect. 5. t. 35.
 f. 6.

Cast. Escrofularia Escorodonia.

Habita en la Isla Jersea de Inglaterra, en la Siberia, Portugal y Extremadura.

Es semejante á la *Escrofularia nudosa*; pero posee el tallo muy peloso: las hojas obtusamente aserradas; y el racimo con hojas interpuestas.

Betonice-folia.

6. SCROPHULARIA *foliis cordatis oblongis dentatis, dentibus integerrimis, baseos profundioribus.* Escrofularia con hojas de figura de corazon, oblongas, con dientes enterisimos, y los de la base mas profundos.

Scrophularia Betonice folio. Tourn. p. 166. Escrofularia con hoja como la de la Betonica,

Cast. Escrofularia con hoja de Betonica.

Habita en Portugal y Extremadura. 26

Produce el tallo del largo de dos pies, derecho, de quatro lados, algo vellosos, y por su base de color que tira á purpúreo: las hojas opuestas, con peciolo, casi de figura de corazon, oblongas, ó tres veces mas largas que anchas, rugosas, algo vellosas por debaxo, con dientes muy agudos y mas profundos en la base: los peciolos mas cortos que las hojas: la panoja terminal y algo foliosa: la corola de color triste que tira á purpúreo; con el labio pequeño de color que tira á verde: y las anteras de amarillo-roxo muy subido,

Orientalis.

7. SCROPHULARIA *foliis lanceolatis serratis petiolatis, caulinis ternis, ramis oppositis.* Pall. it. 3. p. 655. Escrofularia de hojas lanceoladas, aserradas, con peciolo; las del tallo de tres en tres; y las de las ramas opuestas,

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 785

Scrophularia foliis lanceolato-linearibus acute serratis, inferne incisus, racemo composito. Roy. lugdb. 249. Escrofularia con hojas entre lanceoladas y lineares, agudamente aserradas; y racimo compuesto.

Scrophularia Orientalis, foliis Cannabinis. Tourn. cor. 9. Escrofularia Oriental, con hojas como las del Cañamo.

Cast. Escrofularia Oriental.

Habita en Oriente. 4

Echa el racimo compuesto de tres ó quatro pedunculos ahorquillados: y las hojas del tallo que varian de tres en tres, ó de quatro en quatro.

Frutescens.

8. SCROPHULARIA foliis subcarnosis sessilibus levibus apice recurvis. Escrofularia con hojas algo carnosas, sentadas, lisas y por su ápice encorvadas ácia atrás.

Scrophularia foliis lanceolatis, obtusis, serrato-dentatis, pedunculis bifidis. Roy. lugdb. 294. Escrofularia con hojas lanceoladas, obtusas, entre aserradas y dentadas; y pedunculos hendidos en dos partes.

Scrophularia Lusitanica, frutescens, Verbenacæ foliis. Tourn. p. 167. Rai. Sup. pl. p. 396. Escrofularia de Portugal, frutescente, con hojas como las de la Verbenaca.

Scrophularia peregrina, frutescens, foliis Teucris crassiusculis. Herm. lugdb. 545. t. 547. Escrofularia peregrina, frutescente, con hojas como las del Teucro y algo crasas.

Cast. Escrofularia frutescente.

Habita en Portugal, Extremadura y otras partes de España. h

Produce el tallo de quatro ángulos, agudos, con ramas por debaxo puestas en forma de aspa: las hojas sin peciolo, aovadas, con dientes, casi carnosas, relucientes, lampiñas, pequeñas y opuestas: las inferiores aovadas al revés, y las superiores oblongas y por su remate encorvadas ácia atrás: el racimo terminal y folioso; con bracteas enterisimas: los pedunculos opuestos, hendidos en tres partes y del largo de las bracteas: las co-

786 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

rolas pequeñas, de color entre negro y purpúreo; con las *laciniás laterales* blancas, y la *de mas abaxo* menuda.

Ver-nalis.

9. SCROPHULARIA fo- X Escrofularia con hojas de
liis cordatis, caulinis ter- X figura de corazon, las del
nis, pedunculis axillaribus X tallo de tres en tres; pedun-
solitariis bifidis. Oed. dan. X culos axilares, solitarios y
t. 411. X hendidos en dos partes.

Scrophularia foliis longe X Escrofularia de hojas con
petiolatis, cordatis, sub- X peciolo largo, de figura de
hirsutis, petiolis in alis ra- X corazon, con algun pelo ás-
mosis. Hall. helv. n. 327. X pero; piececitos (*de las flo-
res*) en las axilas y ramo-
sos.

Scrophularia flore luteo. X Escrofularia con la flor
C. B. P. 236. prodr. 112. t. X amarilla.
112. Riv. t. 107. Tourn. p.
166. X

Scrophularia montana, X Escrofularia montana, muy
maxima, latifolia. Barr. ic. X grande, y de hoja ancha.
273. X

Scrophularia lutea, mag- X Escrofularia grande, con
na, amplis foliis. Bauh. hist. X hojas anchas; y flor amari-
p. 422. X lla.

Lamium Pannonicum II. X Lamio segundo, exótico,
exoricum. Clus. hist. 2. p. 38. X de Pannonia.

Cast. Escrofularia de primavera.

Habita en Italia, Suiza, y Austria. ♂

Tiene las *hojas* y *tallo* con pelo áspero: las *corolas* aova-
das y de color amarillo-roxo.

Posee el *tallo* fistuloso, del largo de un codo y erizado:
las *hojas* dos veces aserradas: los *pedunculos* del largo
de ellas, comprimidos y de tres ó quatro flores: las *co-
rolas* globosas y casi cerradas. Tiene el *olor* fétido. *Gov.
hort. p. 304.*

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 787

10. SCROPHULARIA fo-
liis glabris, inferioribus
ternato-pinnatis obtusis, su-
perioribus simplicibus, pe-
dunculis subtrifloris axilla-
ribus.

Escrofularia con hojas lam-
piñas, las inferiores entre de
tres en rama y pinnadas, ob-
tusas, las superiores sencil-
llas; pedunculos de tres ó
cuatro flores, y axilares.

Scrophularia Sambucifo-
lia, flore rubro-luteo, vario,
pulchro, Pluk, alm. 338. t.
313. f. 6.

Escrofularia con hoja co-
mo la del Saúco; flor de
color entre roxo y amarillo,
vário y hermoso.

Scrophularia subrotundo,
crasso, nigrigante folio, flo-
re luteo-pallido, capsula
turgida. Bocc. mus. 2. p. 65.
t. 60, Tourn. p. 167.

Escrofularia con hoja casi
redonda, gruesa, negruzca;
flor amarilla-pálida; y cap-
sula hinchada.

Cast. Escrofularia de tres en rama.
Habita en Africa y Córcega. ♂

Sam-
buci-
folia.

11. SCROPHULARIA fo-
liis interrupte-pinnatis cor-
datis inæqualibus, racemo
terminali, pedunculis axil-
laribus geminis dichoto-
mis,

Escrofularia de hojas in-
terruptamente pinnadas,
con hojuelas de figura de co-
razon, desiguales; racimo
terminal; pedunculos axila-
res, mellizos y ahorquilla-
dos.

Scrophularia foliis diffor-
mibus, pedunculis axillari-
bus, aggregatis. Roy. lug-
db. 202.

Escrofularia con hojas dis-
formes; pedunculos axila-
res y agregados.

Scrophularia Sambucifo-
lia. Alp. exot. 203. t. 202.
Mill. dict. n. 231.

Escrofularia con hoja co-
mo la del Saúco.

Scrophularia Hispanica,
Sambuci folio, glabro. To-
urn. p. 166.

Escrofularia de España,
con hoja como la del Saúco y
lampiña.

Scrophularia foliis laci-
niatis, C. B. P. 236. prodr.
112.

Escrofularia con hojas la-
ciniadas. α

788 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

β *Scrophularia Sambucifolia*, capsulis maximis. Morris. hist. 2. p. 483. sect. 5. t. 8. f. 6. Escrofularia con hojas como las del Saúco; y capsulas muy grandes. β

α *Scrophularia Lusitanica*, maximo flore, foliis dissectis. Rai. Suppl. p. 396. Escrofularia de Portugal, con la flor muy grande; y hojas cortadas. α

Cast. Escrofularia con hoja de Saúco.

Habita en Oriente y Portugal: en Andalucía, Extremadura y otras partes de España. \mathcal{U}

Arroja el tallo derecho, de quatro lados formados de los peciolos escurridos: las hojas pinnadas, con cinco ó siete hojuelas, á mas de otras menudas alternadamente opuestas, de figura de corazon, rugosas, por encima lampiñas, aserradas, y con la impar mas grande: el racimo terminal, compuesto de pedunculos axilares, mellizos, muy cortos y casi ahorquillados; con las flores grandes, de color que tira á purpúreo; y el labio inferior á verde.

Ca. 12. SCROPHULARIA *foliis pinnatis, racemo terminali nudo, pedunculis bifidis*. Sabb. hort. 2. t. 90. Escrofularia con hojas pinnadas; racimo terminal, desnudo; y pedunculos hendidos en dos partes.

Scrophularia foliis inferioribus pinnatis, summis integris, duplicato-serratis, racemis axillaribus. Mill. dict. n. 9. Escrofularia con las hojas inferiores pinnadas, las de mas arriba enteras, dos veces aserradas; y los racimos axilares.

Scrophularia foliis pinnatis, pinnis lobatis, circum-serratis, caule paniculato. Hall. helv. n. 328. Escrofularia de hojas pinnadas, con hojuelas hendidas en lóbulos, aserradas al rededor; y tallo en panoja.

Scrophularia Ruta canina dicta, vulgaris. C. B. P. 236. Tourn. p. 167. Escrofularia vulgar, llamada Ruda perruna.

Ruta canina. Clus. hist. 2. p. 209. Lob. ic. 2. p. 55. Ruda perruna.

Cast. Escrofularia perruna.

Habita en Suiza, Narbona é Italia: en los circuitos de Ma-

CON IL. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 789

Madrid: en Aragon, Cataluña, las dos Castillas y otras muchas partes de España. ☉

Tiene las flores sentadas; la primera axilar y las restantes alternas.

Lu-
cida.

13. SCROPHULARIA fo-
liis inferioribus bipinnatis
subcarnosis glaberrimis, ra-
cemis bipartitis.

*Scrophularia foliis Fili-
cis modo laciniatis, seu Ru-
ta canina latifolia.* C. B. P.
236. Tourn. p. 167.

Scrophularia saxatilis,
*lucida, Laserpitii Massi-
liensis folio.* Bocc. mus. 2.
p. 166. t. 117. Tourn. p. 167.

Scrophularia glauco folio,
in amplas lacinias diviso.
Tourn. cor. 9. it. 1. p. 84.
t. 85.

Scrophularia Cretica I.
Clus. hist. 2. p. 209.

Escrofularia con las hojas inferiores dos veces pinna-
das, algo carnosas, muy lampiñas; y racimos dividi-
das en dos partes.

Escrofularia con hojas la-
ciniadas al modo que las del
Helecho, ó Ruda perruna
de hoja ancha.

Escrofularia saxátil, lus-
trosa, con hoja como la del
Laserpicio de Marsella.

Escrofularia con hoja de
color garzo, y dividida en
lacinias anchas.

Escrofularia Cretica, pri-
mera.

Cast. Escrofularia lustrosa.

Habita en Oriente, Creta, Nápoles y en los muros de
Otranto de Calabria. ¶

Tiene el tallo rollizo, recto y verde: las hojas semejantes
á las de la *Escrofularia perruna*; pero algo carnosas:
el racimo rígido y derecho: las corolas pálidas, con el
labio superior encarnado.

Mill. dict. n. 10. tiene por distinta especie la *Escrofula-
ria* con hojas laciniadas al modo que las del Helecho,
C. B. y la llama *Escrofularia* (con hoja de Helecho) de
hojas pinnadas, ó con hojuelas agudamente dentadas;
y racimos terminales. R.

Chi-
nensis

14. SCROPHULARIA fo-
liis ovato-oblongis serratis
pubescentibus.

Escrofularia con hojas en-
tre aovadas y oblongas, aser-
radas y vellosas.

Cast.

790 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Cast. Escrofularia de la China.

Habita en la China.

Produce el tallo derecho , de quatro sulcos , obtuso , algo veloso , del largo de dos pies y con ramas opuestas en forma de aspa : las hojas tambien opuestas , pecioladas , entre aovadas y oblongas , ó entre lanceoladas y oblongas , obtusamente aserradas , algo vellosas , blandas , y de figura de las del *Tanaceto Balsamita* : los racimos terminales , larguissimos y sencillos ; con una bractea debaxo de cada piececito , de figura de corazon , corta y agudamente aserrada : las flores solitarias : y las capsulas comprimidas.

Corci-
nea.

15. SCROPHULARIA fo- X Escrofularia con hojas de
liis quaternis ovatis , flori- X quatro en quatro , aovadas ;
bus verticillatis spicatis . X flores verticiladas y en es-
Roy. lugdb. 294. X piga.

Scrophularia flore cocci- X Escrofularia con la flor
neo , foliis Urticæ , quater- X coccinea ; hojas como las de
nis , caulem ambientibus . X la Ortiga , de quatro en qua-
Houst. mss. X tro y que rodean el tallo.

Cast. Escrofularia coccinea.

Habita en Veracruz.

Pere-
grina.

16. SCROPHULARIA fo- X Escrofularia con hojas de
liis cordatis lineatis lucidis , X figura de corazon , rayadas ,
pedunculis axillaribus biflo- X lustrosas ; pedunculos axila-
ris , caule sexangulari . X res , de dos flores ; y tallo
X con seis ángulos.

Scrophularia foliis cor- X Escrofularia con hojas de
datis , superioribus alternis , X figura de corazon , las supe-
pedunculis axillaribus biflo- X riores alternas ; pedunculos
ris . Sp. pl. 3. p. 866. X axilares y de dos flores.

Scrophularia Urticæ folio . X Escrofularia con hoja co-
C. B. P. 236. Tourn. p. 166. X mo la de la Ortiga.

Scrophularia peregrina . X Escrofularia peregrina.
Cam. hort. 157. t. 43. X

Cast. Escrofularia peregrina.

Habita en Italia : en los contornos de Madrid : en Catalu-
fia , Alcarria y otras partes de España. ○

Tie-

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 791

Tiene el tallo de color entre negro y purpúreo, con quatro hasta seis ángulos agudos: los pedunculos de dos hasta cinco flores: y la corola purpúrea.

Meridionalis.

17. SCROPHULARIA fo-
liis oblongo-ovatis serratis
glabris, pedunculis unifloris. Suppl. p. 280.

Escrofularia con hojas entre oblongas y aovadas, aserradas, lampiñas; y pedunculos de una flor.

Cast. Escrofularia meridional.

Habita en la nueva Granada. D. Mutis.

Echa el tallo de quatro ángulos, herbáceo y con ramas opuestas: las hojas tambien opuestas, con peciolo, aovadas, ó algo oblongas, lisas, igualmente aserradas y mas largas que los peciolos: los racimos terminales y solitarios: las bracteas como si fuesen hojas, pero mas pequeñas, apartadas, comunmente enterisimas: las inferiores opuestas, y las superiores alternas: los pedunculos de una flor, mas largos que ella y sin hojuelas: las corolas aovadas y de la magnitud de la Escrofularia con hoja de Saúco.

906. Género CELSIA.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio partido en cinco lacinias, lanceoladas, obtusas, del largo de la corola, y persistentes.

COR. de un petalo, en forma de rueda: tubo cortísimo: borde plano, desigual, medio hendido en cinco lacinias casi redondas, de las cuales las dos superiores son mas pequeñas, y la infima mas grande.

ESTAMB. Filamentos quatro, capilares, é inclinados ácia las lacinias mas pequeñas de la corola, de los cuales los dos mas largos son mas cortos que la corola, y lanudos ácia fuera: con las anteras casi redondas y pequeñas.

PIST. Germen algo redondo: estilo filiforme, de la longitud de los estambres: con el estigma obtuso.

PERIC. Capsula casi redonda, comprimida por su ápice, puntiaguda, sentada en el caliz y de dos celdillas.

SEM.

792 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

SEM. muchas, pequeñas y anguladas. *Receptáculos* solitarios y emiséricos.

ESPECIES.

- Orientalis. 1. *CELSIA foliis bipinnatis*, Hort. ups. 179. t. 1. Celsia con hojas dos veces pinnadas.
Verbascum Orientale, *Sophia folio*, Tourn. cor. 8. Verbasco Oriental, con hoja como la de la Sofia.
 Buxb. cent. 5. p. 17.
Blattaria Orientalis, *Agrimoniae folio*, Buxb. cent. 1. p. 14. t. 20. Blattaria Oriental, con hoja como la de la Agrimonia.

Cast. Celsia Oriental.

Habita en Capadocia y Armenia. ○

- Arcturus. 2. *CELSIA foliis radicalibus lyrato-pinnatis, pedunculis flore longioribus*, Syst. vég. p. 469. Celsia con las hojas radicales entre de hechura de lira y pinnadas; y pedunculos mas largos que la flor.
Verbascum (arcturus) foliis lyrato-pinnatis, Sp. pl. 3. p. 254. Verbasco (arcturo) con hojas entre de hechura de lira y pinnadas.
Verbascum humile, Creticum, laciniatum, C. B. P. 240. Verbasco de Creta, baxo, y laciniado.
Verbascum Brassicae folio, Col. ephr. 2. p. 81. t. 82. Verbasco con hoja como la de la Berza.
Verbascum sylvestre, Creticum, Alp. exot. 123. t. 122. Verbasco silvestre, de Creta.

Cast. Celsia arcturo.

Habita en Creta.

Aunque los autores describen esta planta con las *hojas* alternas, advirtió *Linneo* que en su exemplar se hallaban opuestas; las *infimas* pinnadas ó casi de hechura de lira; con las *hojuelas laterales* menudas: y las *superiores* sencillas: las *florales* sin peciolo, de figura de corazon, entre aserradas y dentadas: el *racimo* terminal y largo: los *pedunculos* solitarios, de una flor, y mas largos que

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 793

que las hojas florales: las corolas de color amarillo-rojo: y quatro filamentos con pelo de color purpúreo.

3. *CELSIA foliis inferioribus lyratis, superioribus ovatis amplexicaulibus.* Syst. veg. p. 469.

Blattaria perennis, Cretica, incana, foliis binis conjugatim positis. Moris. hist. 2. p. 488.

Celsia con las hojas inferiores liradas, las superiores aovadas y que abrazan el tallo.

Blataria de Creta, perenne, blanquecina, con hojas acompañadas de dos en dos.

Cast. Celsia de Creta.

Habita en Creta.

Posee las hojas entre pinnadas y de hechura de lira, y alternas: las superiores sencillas, de figura de corazon y aserrados: quatro filamentos; los dos superiores pelosos; los inferiores lisos; y con las anteras mas grandes: las corolas de color amarillo-rojo, con dos manchas ferrugineas en el fondo. Syst. pl. vol. 3. p. 151.

Celsia (Cretica) foliis radicalibus lyratis, caulibus subcordatis amplexicaulibus, floribus subsessilibus. Suppl. p. 281.

Verbascum foliis radicalibus ovatis petiolatis, caulibus oblongis sessilibus serratis subtus tomentosis. Mill. ic. p. 182. t. 273.

Blattaria perennis, Cretica, incana, foliis binis conjugatim positis, uno majore extremum claudente. Moris. hist. 2. part. 2. p. 488. 489. Tourn. p. 148.

Verbascum foliis subrotundis, flore Blattariae. C. B. P. 240. Tourn.

Celsia (de Creta) con las hojas radicales liradas, las del tallo casi de figura de corazon, amplexicaules; y flores casi sentadas.

Verbascos de hojas radicales aovadas, con peciolo; las del tallo oblongas, sin peciolo, aserradas y por debaxo tomentosas.

Blataria de Creta, perenne, blanquecina, con hojas acompañadas de dos en dos, y la mayor que cierra el extremo.

Verbascos con hojas casi redondas; y flor como la de la Blataria.

Ha.

794 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Habita en la India y en Creta. ♂

Echa el tallo del largo de dos pies , herbáceo , sencillo , derecho , rollizo y vellosos : las *hojas radicales del primer año* , y las *infimas del tallo* pecioladas , y de hechura de lira , con cinco hojuelas ; la *impar* mayor y de figura de corazon : las *hojas* del tallo sentadas , amplexicaules , alternas , sencillas , entre de figura de corazon y aovadas , rugosas , aserradas y por debaxo vellosas : el *racimo* terminal , derecho , vellosos , y de la longitud del tallo : las *flores* casi sentadas : las *bracteas* de figura de corazon , puntiagudas , agudamente aserradas , una en cada flor y del largo de ella : el *caliz* de cinco hojuelas , aovadas , agudas , aserradas , y por fuera vellosas : la *corola* grande , mayor que la de la *Blataria* , en forma de rueda , hendida en cinco partes , de color amarillo-roxo muy subido , y señaladas con una mancha de color ferrugineo en la base del borde de las lacinias superiores : quatro *filamentos* ; los dos *superiores* cortísimos , de color entre negro y purpúreo , y por arriba con pelo amarillo : las *anteras* en forma de ríñon ; las dos *inferiores* pálidas , declinadas , lisas , de la longitud de la corola , y las otras *dos* lineares : el *estilo* filiforme , y declinado entre los estambres inferiores.

907. Género DIGITALIS. * *Tourn. t. 73.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* partido en cinco lacinias casi redondas , agudas y persistentes ; con la *superior* mas angosta que las demas.

COR. de un *petalo* , en forma de campana : *tubo* grande , abierto y ventricoso ácia abaxo , con su base cilindrícea y estrechada : *borde* pequeño , hendido en quatro lacinias ; con la *superior* mas extendida , escorada ; y la *infima* mas grande.

ESTAMB. *Filamentos* quatro , alesnados , insertos en la base de la corola , declinados y de ellos los *dos* mas largos : con las *anteras* divididas en dos lacinias y puntiagudas por una parte.

PIST.

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 795

PIST. *Germen* puntiagudo: *estilo* sencillo, y de la direccion de los estambres: con el *estigma* agudo.

PERIC. *Capsula* aovada, del largo del caliz, puntiaguda, de dos celdillas, y de dos ventallas que se abren en dos partes.

SEM. muchas y pequeñas.

OBS. Se hallan especies en las cuales las *lacinias* de la *corola* son agudas y mas manifiestas; y el *labio superior* é *inferior* agudos y que sobresalen mas.

CARACT. GÉNÉR. DE TOURN. p. 165.

La *flor* es de un petalo, anomala, tubulosa, abierta en ambas partes y casi de dos labios: de cuyo caliz sale el pistilo, que pasa á fruto ó capsula entre redonda y puntiaguda, que se abre en dos partes y divide en dos celdillas llenas de simientes pequeñas.

ESPECIES.

- | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pur-
purca. | 1. DIGITALIS <i>calycinis</i>
<i>foliolis ovatis acutis, corol-
lis obtusis, labio superiore
intero.</i> Flor. dan. t. 74.
<i>Digitalis purpurea, fo-
lio aspero.</i> C. B. P. 243.
Knorr. del. 1. t. F. 10.
<i>Digitalis purpurea.</i> Bauh.
hist. 2. p. 812. Dod. pempt.
169. Tourn. p. 165. Riv. t.
104. | Dedalera con las hojuelas
del caliz aovadas, agudas;
corolas obtusas y el labio su-
perior entero.
Dedalera con la flor pur-
púrea; y hoja áspera.
Dedalera con la flor pur-
púrea.
Dedalera con la flor blan-
ca; y hoja áspera. α |
| α | <i>Digitalis alba, folio ás-
pero.</i> C. B. P. 229. Knorr.
del. 1. t. F. 9. | |

Cast. Dedalera purpúrea. *vulgo*: Gualdaperra.

Habita en la Europa austral: en Miraflores de la Sierra: en la Alcarria, Aragon, Cataluña y otras muchas partes de España. ♂

Tiene las *hojas* rugosas; y el *vientre* de la *corola* salpicado por dentro de manchas como oxetes.

796 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Minor. 2. *DIGITALIS corollis obtusis, labio superiore subbilobo, foliis levibus.* Dedalera de corolas obtusas, con el labio superior casi hendido en dos lóbulos; y hojas lisas.

Cast. Dedalera menor.

Habita en España. ¶

Echa el tallo liso y la mitad mas corto que el de la precedente: las hojas sin peciolo, lanceoladas, sin arrugas, lisas y casi enterisimas: los pedunculos vellosos: las flores muy semejantes á las de la *Dedalera purpúrea* en la figura, magnitud y color; pero tienen muchos puntitos en el paladar, y carecen de arco pálido: el labio superior hendido en dos lóbulos mas profundos; el inferior muy obtuso; con los lóbulos laterales redoblados: y las anteras señaladas con puntitos de color ferrugineo.

Tapsi. 3. *DIGITALIS foliis decurrentibus.* Dedalera con hojas escurridas.

Digitalis Hispanica, purpurea, minor. Tourn. p. 165. Dedalera de España, menor, con la flor purpúrea.

Digitalis Verbasci folio, purpurea, minor, perennis, Hispanica. Barr. ic. 1185. Dedalera menor, de España, perenne, con hoja como la del Verbasco; y flor purpúrea.

Digitalis angusto Verbasci folio, montana. Bocc. mus. 2. p. 107. t. 85. Dedalera montana, con hoja como la del Verbasco y angosta.

Cast. Dedalera tapsi.

Habita en la Alcarria: montes de Burgos, de Asturias y otras partes de España. ¶

Su traza es como la de la *Dedalera purpúrea*. Tiene las hojas con tomento, venosas, aserradas; las inferiores entre lanceoladas y aovadas; las superiores anchas, lanceoladas y redobladas por los lados que se escurren: el racimo y flores como de la *Dedalera purpúrea*: la corola pálida en su garganta, con puntitos de color de sangre: el borde hendido en quatro lóbulos; el superior indiviso; y el inferior mas largo y pestafioso. Acaso proviene esta especie de la *Dedalera purpúrea* y del *Verbasco tapsi*?

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 797

4. *DIGITALIS calycinis* Dedalera con las hojuelas
foliolis lanceolatis, corollis del caliz lanceoladas; coro-
acutis, labio superiore bifi- las agudas; y el labio supe-
do. Jacq. hort. t. 105. rior hendido en dos partes.
Digitalis foliis calycinis Dedalera con las hojas del
lanceolatis, galea bifida, flo- caliz lanceoladas; capacete
ribus immaculatis. Hall. hendido en dos partes; y
 helv. n. 332. flores sin manchas.
Digitalis flore minore, Dedalera con la flor mas
subluteo, angustiore folio. pequeña, algo amarilla; y
 Bauh. hist. 2. p. 814. hoja mas angosta.
Digitalis major, lutea seu Dedalera mayor, con la
pallida, parvo flore. C. B. P. flor amarilla ó pálida, y pe-
 244. Tourn. p. 165. Sabb. queña.
 hort. 2. t. 88.
Digitalis lutea, minore Dedalera con la flor ama-
flore. Moris. hist. 2. p. 479. rilla y mas pequeña.
 sect. 5. t. 8. f. 5. Riv. t. 105.

Cast. Dedalera amarilla.

Habita en tierras areniskas de Francia é Italia: en los montes de Avila, de Aragon, Cataluña y otras muchas partes de España. 4

Tiene la espiga inclinada desde su principio.

- Am- 5. *DIGITALIS corolla-* Dedalera con el labio de
 bigua. *rum labio emarginato, fo-* las corolas escotado; y ho-
liis subtrus pubescentibus. jas vellosas por debaxo.
 Murray. prodr. 62.
Digitalis calycinis folio- Dedalera con las hojuelas
lis lanceolatis, corollis ga- del caliz lanceoladas; el ca-
lea emarginata, foliis sub- pacete de las corolas escota-
trus pubescentibus. Suppl. do; y hojas por debaxo ve-
 P. 282. llosas.
Digitalis foliis calycinis Dedalera con las hojas del
lanceolatis, galea incisa, fau- caliz lanceoladas; capacete
cibus maculosis. Hall. helv. cortado; y gargantas man-
 n. 331. chadas.
Digitalis Ochroleuca. Dedalera con la flor entre
 Jacq. austr. 1. t. 57. R. amarilla y blanca.

798 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Digitalis lutea, *magno flore*. C. B. P. 244. Tourn. p. 165. Dedalera con la flor amarilla, y grande.

Digitalis lutea, *flore majore*, *folio latiore*. Bauh. hist. 2. p. 813. Dedalera con la flor amarilla, mas grande; y hoja mas ancha.

Cast. Dedalera ambigua.

Habita en Austria, Suiza y Alemania. ¶

Se diferencia de la *Dedalera amarilla* por las corolas mucho mas grandes.

Ferruginea.

6. *DIGITALIS calycinis foliolis ovatis obtusis patentibus*, *corollae labio inferiore barbato*. Sabb. hort. 2. t. 86. Dedalera con las hojuelas del caliz aovadas, obtusas, extendidas; y el labio inferior de la corola barbado.

Digitalis angustifolia, *flore ferrugineo*. C. B. P. 244. Tourn. p. 166. Dedalera con hoja angosta; y flor de color ferrugineo.

Digitalis latifolia, *flore ferrugineo*. Moris. hist. 2. p. 478. sect. 5. t. 8. f. 2. 3. Tourn. p. 166. Dedalera con hoja ancha; y flor de color ferrugineo.

Digitalis lutea, *non ramosa*, *Scorzoneræ folio*. Buxb. cent. 5. p. 25. t. 49. Dedalera que no es ramosa, con flor amarilla; y hoja como la de la Escorzonera.

Digitalis ferruginea, *folio angustiore*. Bauh. hist. 2. p. 813. Dedalera con la flor de color ferrugineo; y hoja mas angosta.

Cast. Dedalera ferruginea.

Habita en Italia y Constantinopla: en la dehesa y términos del lugar de Somosierra: en los montes de Asturias, de la Alcarria, de Leon y otras partes de España. ¶

Produce el tallo apretado y rígido, liso y que llega á la altura de seis pies: las *hojas* sin peciolo, lanceoladas, lisas, rayadas y enterisimas; el *racimo* que sale de cada una de las axilas superiores y derecho: las *bracteas* entre lineares y lanceoladas, y redobladas: los *piececitos* muy cortos y solitarios: las *tres hojuelas su-*

pe-

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 799

periores del caliz acercadas: la corola ventricosa, gibosa por debaxo, poco mas larga que el caliz, vellosa y por dentro de color que tira á amarillo; con las dos lacinias superiores desfiguradas; las laterales agudas; la infima mas larga y barbada: los estambres ondeados y sin rudimento de otro: y el estilo de la longitud de la flor.

7. DIGITALIS foliis linearibus lanceolatis integerrimis glabris basi adnatis. X Dedalera con hojas entre lineares y lanceoladas, enteras, lampiñas, y pegadas ó arrimadas por su base. Jacq. hort. t. 91.

Digitalis Hispanica, angustifolia, flore nigricante. X Dedalera de España, con hoja angosta; y flor negruzca. Tourn. p. 166.

Digitalis angustifolia, Hispanica. Bocc. mus. p. 136. X Dedalera de España, con hoja angosta. t. 98.

Cast. Dedalera obscura.

Habita en la Alcarria: en el Señorío de Molina: en Brihuega, Serrania de Cuenca, Aragon, Cataluña y otras partes de España. ¶

Echa el tallo sufruticoso y leñoso; con pocas ramas y opuestas: las hojas angostas, lanceoladas, casi pegadas por su base, lampiñas, amontonadas donde no florece; pero alternas en las ramas que florecen: los racimos terminales: las bracteas lanceoladas: el caliz con hojuelas aovadas, algo agudas y extendidas: las corolas cabizbaxas, obtusas, de color que tira á amarillo-roxo por dentro, y su fondo como en redecilla de color rubio, y por defuera de color pálido-rubio señaladamente en el dorso: el labio superior medio hendido en dos partes, encorvadas ácia atrás; y el inferior partido en tres lacinias; con la del medio un poco mas larga.

8. DIGITALIS calycinis X Dedalera con las hojuelas Canariensis foliolis lanceolatis, corollis bilabiatis acutis, caule fruticoso. Mill. dict. n. 6. & ic. X del caliz lanceoladas; corollas de dos labios, agudas; y tallo fruticoso. t. 120.

Ges-

800 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Gesneria foliis lanceolatis serratis, pedunculo terminali laxe spicato. Hort. cliff. 318. Gesneria con hojas lanceoladas, aserradas; pedunculo terminal, y en espiga laxâ.

Digitalis Acanthoides, Canariensis, frutescens, flore aureo. Comm. hort. 2. p. 15. t. 53; Dedalera de Canarias, frutescente, parecida al Acanto, con la flor de color de oro.

Digitalis affinis Canariensis, Solidaginis acutis foliis, leviter pilosis, flore aureo cucullato. Pluk. alm. 40. t. 325. f. 2. Planta de Canarias, semejante á la Dedalera, con hojas como las del Solidago, ligeramente pelosas; flor como cucurucho y de color de oro.

Cast. Dedalera de Canarias.

Habita en las Canarias. \hbar

Scep-
trum. 9. DIGITALIS fruticosa, *foliis oblongis spathulatis serratis, spicis terminalibus ovatis pedunculatis comma bractearum terminatis, calycinis foliolis subulatis, corollis quadrifidis.* Suppl. p. 282. Dedalera fruticosa, de hojas oblongas, en forma de espátula, aserradas; espigas terminales, aovadas, con pedunculo, terminadas en un penacho de bracteas; hojuelas del caliz alesnadas; y corolas hendidas en quatro partes.

Cast. Dedalera cetro.

Habita en la Isia de la Madera entre las selvas sombrías de Riveyra de Tria. *Masson.* \hbar

Es planta hermosísima. Produce las ramas con pelo áspero: las hojas acercadas, casi del largo de un pie, sin peciolo, ensanchadas gradualmente desde su base en figura oblonga, aserradas en el medio, puntiagudas, lampiñas por encima, blanquecinas y con pelo áspero por debaxo: el pedunculo que termina la rama solitario, rollizo, derecho, del largo de un palmo ó mas, poroso por dentro y terminado en una espiga aovada, con flores inclinadas: las bracteas lineares, mas largas que las flores, y que antes de abrirse éstas forman un penacho; las laciniás del caliz alesnadas y con pelo áspero: la

CON IL MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 801

corola casi de la magnitud de la *Dehalera ferruginea*, gibosa por debaxo; con el *borde* hendido en quatro partes, y el *labio* obtuso.

908. Género BIGNONIA. * *Tourn. t. 72.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, derecho, en forma de cubilete y hendido en cinco partes.

COR. de un *petalo*, á manera de campana: *tubo* muy pequeño, del largo del caliz: *garganta* larguísima, ventricosa por debaxo, entre oblonga y de figura de campana: *borde* partido en cinco lacinias, las *dos superiores* redobladas; y las *inferiores* extendidas.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, alesnados, mas cortos que la corola, de los quales *dos* son mas largos que los otros dos: con las *anteras* redobladas, oblongas y como duplicadas.

PIST. *Germen* oblongo: *estilo* filiforme, de la figura y direccion de los estambres: con el *estigma* en cabezuela.

PERIC. *Siliqua* de dos celdillas, y de dos ventallas.

SEM. muchas, apañadas, comprimidas y ribeteadas por ambas partes con una membrana.

OBS. La *Bignonia Catalpa* goza solamente de dos estambres perfectos, y de tres rudimentos de estambres muy pequeños; con el *caliz* de cinco hojuelas.

La *figura de la Siliqua* se halla indeterminada en este género, Las *semillas* siempre son aladas ó ribeteadas, aunque algunas por un lado solamente.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 164.

La *flor* es de un *petalo*, anomala, tubulosa, abierta por ambas partes y casi de dos labios: de cuyo caliz sale el pistilo, que pasa á fruto ó *siliqua*, mediante su entrete-
la, dividida en dos celdillas, y llenas de simientes comprimidas y aladas en ambas partes.

E S P E C I E S.

- Ca-
talpa. **1. BIGNONIA foliis simplicibus cordatis ternis, caule erecto, floribus diandris.** Bignonia con hojas sencillas, de figura de corazon, de tres en tres; tallo derecho; y flores de dos estambres.
Jacq. amer. 25.
- Bignonia arborea, foliis ovatis verticillato-ternatis, siliqua gracili longissima.* Bignonia arborea, con hojas aovadas, de tres en tres en verticilo; siliqua enxada, delgada y muy larga.
Brown. jam. 264.
- Bignonia arborescens, folio singulari, undulato, siliquis longissimis & angustissimis.* Bignonia arborescente, con hoja de una en una, ondeada; siliquis larguissimas y muy angostas.
Plum. sp. 5. ic. 57.
Tourn. p. 164.
- Bignonia Urucu foliis, flore sordide albo, intus maculis purpureis & luteis adpersa, siliqua longissima & angustissima.* Bignonia con hojas como las del Urucu; flor de color blanco sordido, salpicada por dentro de manchas purpúreas y amarillas; siliqua larguissima y muy angosta.
Catesb. car. 1. p. 49. t. 29.
- Kawara Fisagi.* Koempf. Kawara Fisagi.
jap. 841. t. 842.
- Cambulu.* Rheed. mal. 1. Cambulu.
p. 75. t. 41.
- Cast. Bignonia Catalpa.
Habita en el Japon y en la Carolina. \bar{h}
Es arbol levantado y sin zarcillos. Echa las hojas de tres en tres, de figura de corazon ú aovadas: las flores de dos estambres que llevan antera; y otros dos castrados ó sin ella.
- Sem-
pervi-
rens. **2. BIGNONIA foliis simplicibus lanceolatis, caule volubili.** Bignonia con hojas sencillas, lanceoladas; y tallo voluble.

Bignonia foliis ovato-lanceolatis, conjugatis, integerrimis. Roy. lugdb. 291. Bignonia con hojas entreovadas y lanceoladas, conjugadas (1) y enterisimas.

Gelseminum seu Jasminum luteum, odoratum, Virginianum, scandens, sempervirens. Catesb. car. 1. P. 53. t. 53. Rai. hist. 1769. Jazmin de Virginia, trepador, siempreverde, con la flor amarilla y olorosa.

Syringa volubilis, Virginiana, Myrti majoris folio, alato semine, floribus odoratis, luteis. Pluk. alm. 359. t. 112. f. 5. Syringa voluble, de Virginia, con hoja como la del Mirto mayor; semilla alada; flores olorosas y de color amarillo,

Cast. Bignonia siempreverde.

Habita en la Virginia.

Lleva las hojas opuestas; y las siliquas de figura de corazón y sencillas.

Un-
guis.

3. BIGNONIA *foliis conjugatis, cirrho brevissimo, arcuato tripartito.* Bignonia con hojas de dos hojuelas opuestas; zarcillo cortísimo, arqueado y dividido en tres partes.

Bignonia Americana, capreolis aduncis donata, siliqua longissima. Tourn. p. 164. Bignonia de America, con zarcillos ganchosos; y siliqua larguísima.

Clematis quadrifolia, flore Digitalis luteo, clavicularis aduncis. Plum. amer. 80. t. 94. Clematide con quatro hojuelas (hojuelas de dos en dos); flor como la de la Dedalera amarilla; y zarcillos ganchosos.

Clematis Myrsinites, amplioribus foliis, Americana. Pluk. alm. 109. t. 163. f. 2. Clematide Mirsinite, de America, con hojas mas anchas.

Cast. Bignonia de zarcillos como uñas.

Habita en la Isla de Santo Domingo y de la Barbada.

Eee 2

BIG-

(1) Por hoja conjugada entendemos aquella que solamente tiene dos hojuelas y opuestas; á la qual algunas veces hemos llamado tambien hoja apareada, ó de dos hojuelas opuestas.

804 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Æqui-
noc-
cialis.

4. *BIGNONIA foliis conjugatis cirrhosis, foliolis ovato-lanceolatis, pedunculis bifloris, siliquis linearibus.* Sabb. hort. 2. t. 85.

Bignonia Americana, bifolia, scandens, siliquis latis & longioribus, semine lato. Plum. sp. 5. ic. 55. f. 1. Tourn. p. 164.

Cast. *Bignonia equinoccial.*
Habita en la Cayena.

Bignonia de hojas conjugadas, con zarcillo; hojuelas entre aovadas y lanceoladas; pedunculos de dos flores; y siliquis lineares.

Bignonia Americana, trepadora; con hojas conjugadas; siliquis anchas y mas largas; y semilla ancha.

Paniculata.

5. *BIGNONIA foliis conjugatis cirrhosis, foliolis cordato-ovatis, floribus racemosis, pedunculis trifloris.* Jacq. amer. 183. t. 116.

Bignonia Americana, bifolia, scandens, flore violaceo odoro, fructu ovato, duro. Plum. sp. 5. ic. 56. f. 1. Tourn. p. 164.

Cast. *Bignonia* de panoja.
Habita en la America mas caliente.

Tiene el caliz con dos bordes; el exterior plano, blanco, y hendido casi en cinco partes; el interior derecho y angosto; y la corola purpúrea.

Bignonia de hojas conjugadas, con zarcillo; hojuelas entre de figura de corazon y aovadas; flores racimosas; y pedunculos de tres flores.

Bignonia de America, trepadora, con hojas conjugadas; flor violada, olorosa; fruto aovado y duro.

Crucifera.

6. *BIGNONIA foliis conjugatis cirrhosis, foliolis cordatis, caule muricato.* Hort. cliff. 317.

Bignonia scandens, flore atro-flavo, minori, subtus albicante. Gron. virg. 73.

Bignonia de hojas conjugadas, con zarcillo; hojuelas de figura de corazon; y tallo con puntitas rígidas.

Bignonia trepadora, con la flor entre negra y amarilla-roxa, mas pequeña y blanquecina por debaxo.

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 805

Bignonia scandens, bifolia & trifolia, ligno cruce signato. Plum. ic. 48. t. 58. Bignonia trepadora, con hojuelas de dos en dos y de tres en tres, y el leño señalado con una cruz.

Pseudo-Apocynum, folliculis maximis, obtusis, seminibus amplissimis, alis membranaceis. Moris. hist. 3. p. 672. sect. 15. t. 3. f. 16. Falso-Apocino con foli-culos muy grandes, obtusos; y semillas muy anchas, con alas membranosas.

Cast. Bignonia que lleva cruces.

Habita en la Virginia y America mas Austral.

El tallo es voluble; áspero, y cortado transversalmente manifiesta una cruz.

Ca-preola ta.

7. BIGNONIA foliis conjugatis cirrhosis, foliolis cordato-lanceolatis, foliis imis simplicibus. Hort. cliff.

Bignonia de hojas conjugadas, con zarcillos; hojuelas entre de figura de corazon y lanceoladas; y las hojas de mas abaxo sencillas.

317.

Bignonia Americana, ca-preolis donata, siliqua brevior. Tourn. p. 164. Breyn. ic. 33. t. 25. Duham. arb. 1. p. 104. t. 40.

Bignonia de America, con zarcillos; y siliqua mas corta.

Clematis tetraphylla, Americana. Bocc. sic. 31. t. 15. f. 31. Zann. hist. 74. t. 2. Rai. hist. 1329.

Clematide de America, con quatro hojuelas.

Cast. Bignonia de zarcillos.

Habita en la America.

Posee los pedunculos de una flor y amontonados: los cálices en forma de campana y enteros.

Pubes-cens.

8. BIGNONIA foliis conjugatis cirrhosis, foliolis cordato-ovatis, subtus pubescentibus. Mill. dict. n. 4.†

Bignonia de hojas conjugadas, con zarcillo; hojuelas entre de figura de corazon y aovadas, y por debaxo vellosas.

Cast. Bignonia vellosa.

Ha-

806 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Habita en Campeche. h

Tiene las flores amarillas.

Tri-phylla. 9. *BIGNONIA foliis ternatis glabris, foliolis ovatis acuminatis, caule fruticoso erecto.* Mill. dict. n. 14. X Bignonia con hojas de tres en rama, lampiñas; hojuelas aovadas, puntiagudas; tallo fruticoso y derecho. X

Cast. Bignonia de tres en rama.

Habita en Veracruz. h

Posee las flores blancas.

Penta-phylla. 10. *BIGNONIA foliis digitatis, foliolis integerrimis obovatis.* Hort. cliff. 497. X Bignonia de hojas divididas como en dedos, con las hojuelas enterisimas y aovadas al revés. X

Bignonia Americana, arborescens, pentaphylla, flore roseo, major (& minor) siliquis planis. Plum. sp. 5. Tourn. p. 165. Catesb. cat. 1. p. 37. t. 37. Brown. jam. 263. n. 1. X Bignonia de America, arborescente, mayor (ó menor), con cinco hojuelas; flor como rosa; y siliquis planas. X

Guari pariba. Marcg. bras. 108. t. 118. X

Guari pariba.

Guari pariba.

Cast. Bignonia de cinco hojuelas.

Habita en campos húmedos y en las riberas de la Jamaica y tierra de los Caribes. h

Leuco-xylon. 11. *BIGNONIA foliis digitatis, foliolis integerrimis ovatis acuminatis.* X Bignonia de hojas divididas como en dedos; hojuelas enterisimas, aovadas y puntiagudas. X

Bignonia foliis imis digitatis, superioribus simplicibus seu ternatis, caule erecto arboreo. Mill. dict. n. 10. X Bignonia con las hojas de mas abaxo divididas como en dedos, las superiores sencillas, ó de tres en rama; tallo derecho y arboreo. X

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 807

Leucoxyton arbor siliquosa, quinifolius, floribus Nerii, alato semine. Pluk. alm. 215. t. 200. f. 4.
 Arbol de madera blanca, siliquoso, con hojuelas de cinco en cinco; flores como las de la Adelfa; y semilla alada.

Cast. Bignonia de madera blanca.
 Habita en la America. \bar{h}

Radiata.

12. BIGNONIA *foliis digitatis, foliolis pinnatifidis.*
 Bignonia con hojas divididas como en dedos; y hojuelas hendidas al través.

Bignonia flore luteo, foliis radiatis & elegantissime dissectis. Few. peru. 1. p. 731. t. 22. Roy. lugdb. 289.
 Bignonia con la flor amarilla; hojas radiadas, y hermosísimamente cortadas.

Cast. Bignonia radiada.
 Habita en el Perú.

Radi-cans.

13. BIGNONIA *foliis pinnatis, foliolis incis, caule geniculis radicatis.*
 Bignonia de hojas pinna-das; hojuelas cortadas; y tallo con nudos arraygados.
 Mill. ic. t. 65. Sabb. hort. 2. t. 84.

Pseudo-Apocinum Hederaceum, Americanum, tubuloso flore, phæniceo, Fraxini folio. Moris. hist. 3. p. 612. sect. 15. t. 3. f. 1.
 Falso-Apocino de America, como Yedra, con la flor tubulosa, de color de datil; y hoja como la del Fresno.

Bignonia Americana, Fraxini folio, flore amplo, phæniceo. Tourn. p. 164.
 Bignonia de America, con hoja como la del Fresno; flor ancha y de color de datil.
Gelseminum hederaceum, Indicum. Corn. can. 102. t. 103.
 Jazmin de Indias, como Yedra.

Bignonia Fraxini foliis, coccineo flore, minore. Castesb. car. 1. p. 65. t. 65.
 Bignonia con hojas como las del Fresno; flor de color coccineo, y mas pequeña.

Cast. Bignonia que se arrayga. *vulgo*: Jazmin de Virginia.
 Ha-

808 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,
Habita en America. h

- Stans. 14. *BIGNONIA foliis pinnatis, foliolis serratis, caule erecto firmo, floribus racemosis.* X Bignonia de hojas pinna-
 das, con hojuelas aserradas; tallo derecho, firme; y flores racimosas.
- Bignonia Americana, arbor, flore luteo, Fraxini folio.* Plum. sp. 5. ic. 54. To- X Bignonia de America, ar-
 bol, con la flor amarilla; y hoja como la del Fresno.
- Bignonia fruticosa, foliis pinnatis, ovatis, floribus luteis.* Brow. jam. 264. X Bignonia fruticosa, con
 hojas pinnadas; hojuelas aovadas; y flores amarillas.

Cast. Bignonia tiesa.
Habita en la America. h

- Peru- 15. *BIGNONIA foliis de-* X Bignonia de hojas decom-
 viana. *compositis, foliolis incisis, geniculis cirrhosis.* Hort. X y nudos con zarcillos.
 cliff. 317.
- Clematis Peruana, Digtalis flore, folio Fraxini.* X Clematide del Perú, con
 Pluk. alm. 108. t. 162. f. 4? la flor como la de la Deda-
 lera; y hoja parecida á la del
 Fresno.

Cast. Bignonia del Perú.
Habita en el Perú. h

- Indica 16. *BIGNONIA foliis bi-* X Bignonia de hojas dos ve-
 pinnatis, foliolis integerri- ces pinnadas; hojuelas en-
 mis ovatis acuminatis. Syst. terisimas, aovadas y pun-
 veg. p. 472. tiagudas.
- Arbor siliquosa, Malabarica, cordato folio, fructu maximo, oblongo, plano.* Rai. hist. 1741. X Arbol siliquoso, de Ma-
 labár, con hoja de figura de corazon; fruto muy grande, oblongo y plano.
- Palega Paianelli.* Rheed. X Palega Paianeli.
 malab. 1. p. 77. t. 43.

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 809

* *Arbol siliquosa, Malabarica, folio majore, mucronato, fructu maximo, oblongo, plano. Rai. hist.* Arbol siliquoso, de Malabár, con hoja mayor, terminada en punta rigida; fruto muy grande, oblongo y plano. α

1741.

Paianelli. Rheed. mal. 1.

Paianeli.

p. 79. t. 45.

Bignonia arbor Indica, foliis oblongis. Tourn. p. Bignonia arbol de las Indias, con hojas oblongas.

165.

Cast. Bignonia de Indias.

Habita en las Indias.

17. *BIGNONIA foliis bipinnatis, foliolis lanceolatis integris. Mill. dict. n. 11.*

Bignonia de hojas dos veces pinnadas, con hojuelas lanceoladas y enteras.

Arbor Guajaci, latiore folio, Bignoniae flore, caeruleo, fructu duro, in duas partes dissiliente, seminibus alatis imbricatim positis. Catesb. car. 1. p. 42. t. 42.

Arbol de Guayaco, con hoja mas ancha; flor como la de la Bignonia, cerúlea; fruto duro que se abre en dos partes; semillas aladas, y puestas unas sobre parte de otras.

Cast. Bignonia cerúlea.

Habita en la Carolina. \bar{h}

18. *BIGNONIA foliis pinnatis cum impari, foliolis ovatis integerrimis acuminatis pubescentibus, comrollis barbatis semipentandris (subpentandris). Suppl.*

Bignonia de hojas pinnadas con impar; hojuelas aovadas, enterisimas, puntiagudas, vellosas; corolas barbadas y casi de cinco estambres.

p. 282.

Padri. Rheed. mal. vol. 6.

Padri.

p. 47. t. 26.

Cast. Bignonia como Chelone.

Habita en las Indias. *Kanig. \bar{h}*

Es arbol grande, con su corteza blanquecina-cenicienta. Tiene las hojas extendidas, pinnadas en impar, pe-

810 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

pecioladas y con cinco pares de hojuelas poco mas ó menos, opuestas, entre aovadas y oblongas, puntiagudas, enterisimas, vellosas en ambas partes y con peciolo cortos: la *panoja* terminal, con piececitos opuestos y ahorquillados: las *flores* solitarias y que salen de la horquilladura; el *caliz* con vello blanco: el *borde de la corola* casi arqueado, con pelo áspero y roxo, hendido en cinco lacinias; las *dos superiores* redobladas, divididas en dos partes, crespas y con dienteitos, de color amarillo-roxo, y señaladas con puntitos de color de sangre; las *inferiores* rizadas por su margen, ondeadas en el disco blanco, con venas roxas y pelo rígido: la *garganta* tambien con pelo rígido: quatro *filamentos* de los quales los *dos* son mas cortos, con un rudimento de otro filamento (*quinto*) inserto en el tubo de la flor, escurrido y estéril: las *anteras* divididas en dos partes: la *siliqua* linear, estriada, plana y encorvada.

Las flores recientes, metidas en el agua, la comunican un olor agradable, y con ella los Indios rocian los templos por la mañana, para corregir el ayre mohoso. *Suppl. p. 283.*

Spa- thacea	19. BIGNONIA <i>foliis impari pinnatis, foliolis ovatis hirtis, calyce monophyllo spathaceo, corolla hypocrateriformi.</i> <i>Suppl. p. 283.</i>	Bignonia de hojas pinnadas en impar; hojuelas aovadas, con pelo áspero; caliz de una pieza, como espata; y corola en forma de salvilla.
	<i>Lignum Equinum.</i> Rumph. amb. vol. 3. p. 73. t. 46.	Leño de Caballo.
	<i>Nurpongelion.</i> Rheed. mal. vol. 6. p. 53. t. 29.	Nurpongelion.

Cast. Bignonia con espata.

Habita en las selvas cerca de las aguas de Java, Malabár y Zeylan. *König. fl.*

Llamase *Leño de caballo* porque de él se forman caballos y otras cosas con que se divierten los niños. Es *arbol* grande, y produce las *hojas* esparcidas, las mas veces opuestas, pinnadas en impar, con tres pares de *hojuelas*

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 811

las aovadas, ó casi de figura de corazon, enterisimas y con pelo áspero: las flores en la sumidad del tallo, axilares y con pedunculo: el caliz de una pieza, que se abre longitudinalmente por el lado superior, oblongo, algo correoso, lampiño y que se cae al abrirse la flor: la corola en forma de salvilla y blanca: el borde de plano, con cinco pliegues, ondeado por su margen y con dientes desiguales: quatro estambres, con un rudimento de otro: la siliqua linear, encorvada, plana, con estrias y algunas eminencias: las semillas lineares, ondeadas y aladas por su ápice.

La estructura de la flor es diversa de la de la *Bigonia*, bien que conviene con ella en los estambres y semillas.

909. Género CITHAREXYLUM. B. Jussieu.

Jacq. 117.

CAR. GEN. NAT.

- CAL. Periantio de una pieza, á manera de campana, con cinco dientes, agudo y persistente.
- COR. de un petalo, entre de figura de embudo y de rueda: tubo al doble mas largo que el periantio y por arriba mas grueso: borde de dos labios y partido en cinco lacinias, por encima vellosas, oblongas, truncadas, planas y muy extendidas.
- ESTAMB. Filamentos quatro, con un rudimento de otro que sale del medio del tubo, filiformes, de los quales los dos son poco mas largos: con las anteras oblongas, mellizas y derechas.
- PIST. Germen casi redondo: estilo filiforme, de la longitud de los estambres: con el estigma en cabezuela obtusa.
- PERIC. Baya casi redonda, algo comprimida y de una celdilla.
- SEM. dos, aovadas, de dos caxitas, por una parte convexas, por la otra cóncavas y escotadas en su ápice.
- OBS. Se halla especie con el caliz truncado.

ESPECIES.

Cine-
teum.

1. CITHAREXYLUM X Citharexylo de ramas ro-
ramis teretibus, calycibus X llizas; y cálices con dientes.
dentatis. Jacq. amer. 185.
t. 118.

Citharexylum arbor Lau- X Citharexylo arbol de Ame-
rifolia, Americana, folio- X rica, con hoja como la del
rum venis late candicanti- X Laurel, y venas de las hojas
bis. Pluk. alm. 108. t. 162. X de color blanco lustroso-ale-
f. 1. X gre.

Jasminum arborescens, X Jazmin arborescente, ra-
racemosum, foliis Lauri. X cimoso, con hojas como las
Plum. ic. 157. f. 1. X del Laurel.

Cast. Citharexylo ceniciento.

Habita en la America Meridional. $\frac{h}{2}$

Citharexylo es lo mismo que leño de que se fabrican Ci-
taras, Bandurrias, &c.

Es planta parasitica, trepadora y que tiene la corteza ce-
nicienta.

Cau-
datum

2. CITHAREXYLUM X Citharexylo con ramas ro-
ramis teretibus, calycibus X llizas; y cálices truncados.
truncatis.

Citharexylon fruticosum, X Citharexylo fruticoso, con
foliis subellipticis, petiolis X hojas casi elipticas; peciolo
pedatis, calycibus trunca- X afianzados en un pie; cálices
tis, spicis terminalibus lon- X truncados; espigas termina-
gioribus. Brown. jam. 265. X les y mas largas.
t. 28. f. 2. X

Cast. Citharexylo de cola.

Habita en la Jamaica. $\frac{h}{2}$

Tiene las hojas aovadas al revés.

Qua-
dra-
ngulare.

3. CITHAREXYLUM X Citharexylo con ramas de
ramis tetragonis. Syst. veg. X quatro lados.
472. Jacq. amer. 186, hort.
t. 22. X

Cast. Citharexylo quadrangular.

Habita en la Martinica. $\frac{h}{2}$

910. Género HALLERIA. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, plano, extendido, muy obtuso, persistente, y hendido en tres lacinias, con la superior al doble mas ancha.

COR. de un *petalo*, boquiabierto: *tubo* doblado, algo redondo por su base, con su garganta ventricosa: *borde* obliquo, derecho, hendido en quatro lacinias; la *de arriba* un poco mas larga, obtusa, escotada; las *laterales* mas cortas, mas anchas y mas agudas; la *infima* muy corta, delgadissima y muy aguda.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, setáceos, rectos, insertos en el tubo, mas largos que la corola, de los quales los *dos* son mas largos; con las *anteras* casi redondas y mellizas.

PIST. *Germen* baxo de la flor, aovado, y que remata en un *estilo* mas largo que los estambres: con el *estigma* sencillo.

PERIC. *Baya* casi redonda, y de dos celdillas.

SEM. pequeñas, planas, algo redondas y aladas. *Fabric.*

ESPECIE.

Lu-
cida.

I. HALLERIA. Hort. x
cliff. 323. Fabric. helmst. x
389.

Halleria foliis ovatis, x
longitudinaliter serratis. x
Roy. lugdb. 289.

Lonicera foliis lucidis, x
acuminatis, dentatis, fruc- x
tu rotundo. Burm. afr. 244. x
t. 89. f. 3.

* *Halleria foliis lanceola-* x
to-ovatis, superne serratis. x
Roy. lugdb. 289.

Halleria.

Halleria con hojas aova-
das, y longitudinalmente
aserradas.

Lonicera con hojas lustro-
sas, puntiagudas, dentadas;
y fruto redondo.

Halleria con hojas entre
lanceoladas y aovadas, y por
arriba aserradas. *

814 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Lonicera folio acuto, ser- X *Lonicera* con hoja aguda,
rato, flore pendulo, fructu X aserrada ; flor pendula ; y
oblongo. Burm. afr. 243. t. X fruto oblongo.
 89. f. 1. X

Cast. Halleria lustrosa.

Habita en Etiopia,

911. Género CRESCENTIA. Cujete. Plum. 16.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , corto , que se cae quando las demas partes de la flor , partido en dos lacinias casi redondas , cóncavas , obtusas é iguales.

COR. de un *petalo*, desigual: *tubo* giboso, encorvado, y con eminencias : *borde* derecho , hendido en cinco lacinias desiguales , sinuosas y con dientes.

ESTAMB. *Filamentos* quatro , aleshados , del largo de la corola , extendidos , de los cuales los *dos* son poco mas cortos : con las *anteras* echadas , obtusas y mellizas.

PIST. *Germen* aovado y con piececito : *estilo* filiforme , del largo de la corola : con el *estigma* en cabezuela,

PERIC. *Baya* oval , dura , y de una celdilla.

SEM. muchas , casi de figura de corazon , anidadas , y de dos caxitas.

E SPECIES.

Cuje-
 te. — 1. CRESCENTIA *foliis* X *Crescencia* con hojas en-
suneato-lanceolatis. Loeff. it. X tre de figura de cuña y lan-
 225. Jacq. amer. t. 111. X ceoladas.

Cujete foliis oblongis & X *Cujete* con hojas oblongas
angustis , magno fructu X y angostas ; fruto grande y
ovato. Plum. gen. 23. ic. 109. X aovado.

Arbor Americana cucur- X *Arbol* de America que lle-
bitifera , folio longo , mu- X va calabazas , con hoja lar-
cronato , fructu oblongo. X ga , que remata en punta rí-
 Comm. hort. 1. p. 137. t. 71. X gida ; y fruto oblongo.

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 815

- α *Cujete angustifolia, fructu* Cujete de hoja angosta ;
tu minori, globoso, aovato. Plum. gen. 23. fruto menor, globoso, ú aovado. α
- β *Cujete minima, fructu* Cujete muy pequeña, con
duro. Plum. gen. 23. el fruto duro. β

Cast. *Crescencia* Cujete.

Habita en la America mas caliente. h

Es arbol que produce las ramas sencillas, larguissimas y horizontales: el fruto de varias figuras y diferente magnitud en distintos individuos.

Cu-
cubi-
lina.

2. CRESCENTIA *foliis lanceolato-ovatis.* Crescencia con hojas entre lanceoladas y aovadas.
Cujete latifolia, fructu putamine fragili. Plum. gen. 23. ic. 109. Cujete de hoja ancha, y fruto con su cascara fragil.

Cucurbitifera arbor, subrotundis foliis confertis, fructu ovali. Pluk. alm. 124. t. 171. f. 2. Arbol que lleva calabazas, con hojas casi redondas, amontonadas; y fruto oval.

Cast. *Crescencia* que lleva calabazas.

Habita en la America mas caliente. h

912. Género GMELINA. † *Michelia.* Amm. act. petr. rom. 8.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, muy pequeño, casi globoso, con quatro dientes y persistente.

COR. de un *petalo*, á manera de campana, abierta: *borde* hendido en quatro lacinias; la *superior* mas ancha y arqueada: la *infima* y *laterales* obtusas, mas pequeñas, extendidas y redondeadas.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, de los quales *dos* son mas gruesos; los otros *dos* encorvados y ascendentes: con *dos anteras* mas gruesas, divididas en dos partes; y las otras *dos* mas pequeñas y sencillas.

PIST. *Germen* algo redondo: *estilo* de la longitud de los estambres mas pequeños: con el *estigma* sencillo.

PE-

816 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

PERIC. *Drupa* globosa , y de una celdilla.

SEM. *Nuez* aovada , lisa y de dos caxitas.

ESPECIE.

Asia-
tica.

1. GMElina. Flor. Zeyl. X Gmelina.

230.

Michelia spinosa , *floribus luteis*. Amm. act. petrop. flores amarillas.

8. p. 218. t. 18.

Lycium Maderaspatanum, Licio de Madraspatan, parecido á la planta que Alpino reputó por Indigo, con *Indici Alpino putati æmulum* , *foliis minoribus* & hojas mayores y menores, *majoribus bijugis* & *grandioribus* , *aculeis horridum*. apareadas de dos en dos ; y Pluk. alm. 234. t. 305. f. 3. horrido con agujiones mas & t. 97. f. 2. grandes.

Jambusa sylvestris , *parvifolia*. Rumph. amb. 1. t. 40. Jambusa silvestre , con hoja pequeña.

p. 129.

Cast. Gmelina de Asia.

Habita en la India. *fl*

Es arbol con ramas rollizas , apretadas y rígidas. Echa las *hojas* opuestas , con peciolo , aovadas , tomentosas por debaxo , y las mas veces con un lóbulo en ambos lados , mas agudo y corto : las *espinas* axilares , opuestas , horizontales , vellosas por su ápice y del largo de los peciolos : las *flores* con pedunculo y que salen del remate de las ramitas tiernas.

913. Género PETREA. † *Houst. Act. Ang.*

Jacq. amer. 180.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , á manera de campana : *borde* abierto , muy grande , de color , persistente , partido en cinco lacinias , oblongas , obtusas ; y su *garganta* cerrada con cinco escâmas dobles y truncadas.

COR,

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 817

COR. de un *petalo*, en forma de rueda, desigual y mas pequeña que el caliz: *tubo* cortisimo: *borde* plano, hendido en cinco lacinias, redondeadas, casi iguales, muy extendidas y la del medio mas grande y de diverso color.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, recogidos dentro del tubo de la corola, ascendentes, de los quales *dos* son mas cortos: con las *anteras* ovales y derechas.

PIST. *Germen* aovado: *estilo* sencillo, de la longitud de los estambres: con el *estigma* obtuso.

PERIC. *Capsula* aovada al revés, plana por su ápice, de una celdilla, recogida en el fondo del caliz y con una membrana delgada.

SEM. una sola y carnosa.

ESPECIE.

1. PETREA. Hort. cliff. \times Petrea.

319. Jacq. amer. 180. t. 114. \times

Cast. Petrea voluble.

Habita en la America. \hbar

Tiene los cálices de color violado: las corolas cerúleas, y trepa sobre los árboles.

Murió de viruelas el célebre Petreo el año de 1742, de edad de treinta y dos años, despues de haber empezado la *Flora de Indias*, obra esplendidisima.

914. Género PREMNA.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, en forma de campana, persistente, casi hendido en dos lóbulos; y la *lacinia superior* escotada.

COR. de un *petalo*, irregular, tubulosa, obtusa por su boca, y hendida en quatro lacinias: las *dos superiores* derechas, mas cortas, y las *restantes* extendidas.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, derechos, mediocres: los dos *inferiores* mas cortos: con las *anteras* casi redondas.

PIST. *Germen* algo redondo; *estilo* cilindrico, y mas corto: con el *estigma* hendido en dos partes.

TOM. IV.

FF

PE-

818 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

PERIC. *Baya* casi globosa , y de quatro celdillas.
(*Drupa*, Kœnig.)

SEM. solitarias , oseas , por una parte redondeadas y por la otra anguladas.

ESPECIES.

In-
tegrifolia.

1. PREMNA *foliis integerrimis.* Premna con hojas enterisimas.

Cornutia corymbosa. Burm. Cornutia corimbosa.
ind. 133. t. 41. f. 1.

Folium hircinum. Rumph. Hoja de macho cabrío,
amb. 3. p. 208. t. 134. (*por su olor*).

Cast. Premna de hoja entera.

Habita en la India Oriental. $\frac{f}{2}$

Es *arbuscúto* muy semejante á la especie siguiente , y acaso mera variedad de ella ?

Tiene las *hojas* aovadas , ó entre de figura de corazon y aovadas , obtusas y enterisimas. Varía tal vez con las *hojas* agudas , entre lanceoladas y aovadas.

Serratifolia.

2. PREMNA *foliis serratis.* Premna con hojas aserradas.

Cornutioides. Flor. zeyl. 416. Planta como la Cornutia.

Cast. Premna con hoja aserrada.

Habita en la India Oriental. $\frac{f}{2}$

Echa las *ramas* rollizas y de color que tira á purpúreo ; con *cicatrices* truncadas y ribeteadas , que restan de la caída de las hojas ; las *hojas* opuestas , con peciolo , aovadas , obtusas , lisas , aserradas ; pero enterisimas ácia la base ; las *estipulas* casi lanceoladas y que se caen facilmente : las *cimas* terminales , primeramente con *ramas* opuestas en forma de aspa , y despues ahorquilladas : las *bracteas* opuestas , colocadas en las ramificaciones , lineares y menudas ; con las *flores* de la magnitud de las del *Viburno*.

915. Género LANTANA, * Camara. Plum, 2. Dill.

elsh. 56, 57, Myrobatindum, *Vaill. A. G.* 1722.

Spielmannia. medic. in act. pal. vol. 3.

phys. p. 196. t. 15.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, cortísimo, que se cierra, tubuloso, y con quatro dientes desfigurados.

COR. de un *petalo*, casi igual: tubo cilindráceo, delgado, mas largo que el caliz, y un poco obliquo; borde plano, obtuso y hendido en quatro partes desiguales.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, muy menudos, puestos en medio del tubo de la corola, delgadísimos, de los quales *dos* se hallan un poco mas arriba: con las *anteras* casi redondas,

PIST. *Germen* algo redondo: *estilo* filiforme, de la longitud de los estambres: con el *estigma* refracto, agudo, y á manera de gancho vuelto ácia abaxo, y pegado como obliquamente al ápice del estilo.

PERIC. *Drupa* casi redonda, y de una celdilla,

SEM. Nuez entre redonda y piramidal, y de dos celdillas, *Almendras* otras tantas, y oblongas.

OBS. El *carácter esencial* consiste en la figura del *estigma*.

La Camara de Plum, tiene el involucro de muchas hojuelas. El receptáculo de las fructificaciones comun y oblongo recoge las flores sentadas y de ordinario muy desiguales.

La Lantana de Africa carece de involucro; pero tiene las flores mas regulares, con el borde hendido en cinco partes, casi iguales, y su base globosa: el caliz partido en cinco lacinijs aleshadas, y la nuez globosa, con dos celdillas.

Posee la nuez con tres celdillas, de las quales las dos superiores cerradas contienen las simientes; y la tercera inferior abierta, se halla rellena de la pulpa de la drupa y de una especie de harina, *Med. in. act. palat.* vol. 3. *phys.* 220. t. 16. R.

820 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

La Spielmannia Medic. &c. que tiene Linneo por la Lantana Africana, se diferencia por no tener los dos estambres mas largos que los otros dos y por otros atributos, segun el Medic. in act. palat. &c. R.

E S P E C I E S.

- Mista. 1. *LANTANA foliis oppositis acuminatis, floribus capitatis, involucris longitudine florum.* Syst. veg. 472. Lantana con hojas opuestas, puntiagudas; flores en cabezuela; é involucros de la longitud de ellas.
- Camara Lamii albi folio, flore misto.* Dill. elth. 64. t. 56. f. 64. Camara con hoja como la del Lamio blanco; y flor de varios colores.
- Viburnum Americanum, Urtice foliis.* Comm. hort. 1. p. 51. t. 78. Viburno de America, con hojas como las de la Ortiga.

Cast. Lantana mixta ó con flor de varios colores.
Habita en America. \bar{h}

- Tri-folia. 2. *LANTANA foliis ternis, caule inermi, spicis oblongis imbricatis.* Lantana con hojas de tres en tres; tallo inerme; espigas oblongas y apañadas.
- Camara trifolia, purpurascente flore.* Plum. gen. 32. ic. 70. Camara con hojas de tres en tres; y flor de color que tira á purpúreo.
- Myrobatindum spicatum, Viburni foliis ex adverso ternis.* Vaill. act. 1722. p. 277. Mirobatindo espigado, con hojas como las del Viburno y opuestas de tres en tres.

Cast. Lantana con hojas de tres en tres.
Habita en la America mas caliente.
Acaso es variedad de la siguiente?

- Annua 3. *LANTANA foliis oppositis, caule inermi, spicis oblongis.* Hort. ups. 180. Lantana con hojas opuestas; tallo inerme; y espigas oblongas.

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 821

Lantana (trifolia) foliis ternis, spicis oblongis, imbricatis, floribus carneo-violaceis, fauce flava. Med. in act. palat. vol. 3. phys. p. 222? R. *Lantana (de tres hojas)* con hojas de tres en tres; espigas oblongas, apifadas; flores de color entre de carne y violado; y garganta amarilla-roxa.

Periclymenum rectum, humilium, Salviae folio, rugosiore, flore purpureo, fructu oblongo, esculento, purpureo. Sloan. jam. 164. hist. 2. p. 82. t. 195. Rai. dendr. 30. *Periclymeno recto*, mas baxo, con hoja como la de la Salvia, mas rugosa; flor purpúrea; fruto oblongo, comestible y purpúreo.

Cast. *Lantana annua.*

Habita en la America mas caliente. ☉

Produce el tallo erizado, de quatro lados, con estrias y casi leñoso: las *hojas* opuestas, de figura de corazon, ásperas, con peciolo, y que tambien varían de tres en tres: las *espigas* emisféricas, opuestas, separadas por medio de brácteas lanceoladas, mas cortas, y que despues se alargan gradualmente: las *corolas* encarnadas, de color amarillo roxo en su garganta y que no se muda: y las *bayas* purpúreas.

Ca-
mara. 4. LANTANA *foliis oppositis, caule inermi ramoso, floribus capitato-umbellatis aphyllis.* *Lantana* con hojas opuestas; tallo inermes, ramoso; flores entre en cabezuela y umbela, y sin hojas (ó brácteas).

Lantana (Camara) foliis ellipticis, non multum rugosis, parumque asperis, ramis junioribus aculeatis, calore floris è citrino in rosaceum mutabile. Med. act. palm. vol. 3. phys. p. 228. *Lantana (Camara)* con hojas elípticas, no muy rugosas y un poco ásperas; ramas mas tiernas con agujones; y el color de la flor que se muda de cetrino á el de rosa.

Camara Melistae folio, flore variabili. Diil. elth. 64. t. 56. f. 55. *Camara* con hoja como la de la Melisa ó sea Torongil, y flor que varia de colores.

822 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Camara alia, flore variegato, non spinosa. Plum. gen. 32. ic. 71. f. 1. Otra Camara, sin espinas; y con la flor de varios colores.

Viburnum Americanum, non spinosum, Melissaefoliis, floribus coccineis. Pluk. alm. 385. t. 114. f. 4. Viburno de America, sin espinas, con hojas como las del Torongil; y flores de color coccineo.

Cast. Lantana Camara.

Habita en la America mas caliente. $\frac{h}{2}$

Las flores de color amarillo-roxo, se vuelven poco á poco de color leonado.

Involucrata

5. LANTANA *foliis oppositis, ternisque cuneato-obovatis obtusis lineatis tomentosis, capitulis squarrosis.* Syst. veg. p. 474. Lantana con hojas opuestas, y de tres en tres, de figura entre de cuña y aovadas al revés, obtusas, rayadas, tomentosas; y cabezuelas desparramadas.

Lantana foliis oppositis, caule inermi, floribus capitato-umbellatis, involucri-foliosis. Amoen. acad. 4. p. 319. Lantana de hojas opuestas; tallo inerme; flores entre en cabezuela y umbela, y con involucro folioso.

Lantana caule inermi, lignoso, foliis oppositis, orbiculatis, leviter crenatis, spicis foliosis, floribus carneis mutabilibus. Medic. in act. palat. vol. 3. phys. p. 223. 273. t. 16. R. Lantana de tallo inerme, leñoso; hojas opuestas, redondas, ligeramente recortadas; espigas foliosas ó con bracteas; flores de color de carne, y que se les muda.

Camara arborescens, Salviaefolio. Plum. gen. 32. ic. 71. f. 2. Camara arborescente, con hoja como la de la Salvia.

Viburnum Americanum, odoratum, folio parvo, orbiculato, floribus & baccis folio interceptis. Pluk. alm. 386. t. 114. f. 5. Herm. parad. 384. Viburno de America, oloroso, con hoja pequeña y redonda; flores y bayas entreveradas con hojas.

Cast. Lantana con involucro.

Ha.

Habita en la America Meridional. \bar{h}

Tiene las *bracteas* aovadas y puestas entre las florecitas : las *hojas* muy rugosas y tomentosas.

El color de la garganta es amarillo-roxo , y despues se muda en blanco. *Medic. loc. cit.*

Odo-
rata. 6. LANTANA *foliis oppositis ternisque lanceolato-ellipticis, caule inerme.* Syst. veg. p. 474.

Lantana con hojas opuestas y de tres en tres , entre lanceoladas y elipticas ; y tallo inerme.

Lantana aromatica, foliis ternis oppositisque subsessilibus, capitulis conicis in umbellam coactis. Roy. mss.

Lantana aromatica , con hojas de tres en tres y opuestas , casi sentadas ; cabezuelas cónicas y apretadas en umbela.

Viburnum Salviae folio, floribus albis. Herm. prodr. 384.

Viburno con hoja como la de la Salvia ; y flores blancas.

Cast. Lantana olorosa.

Habita:.....

Posee las *bracteas* lanceoladas : las *hojas* muy rugosas y algo tomentosas.

Acu-
leata.

7. LANTANA *foliis oppositis, caule aculeato ramoso, spicis hemisphericis.*

Lantana de hojas opuestas ; tallo con agujones , ramoso ; y espigas emisféricas.

Lantana caule quadrato & aculeato, floribus è colore citrino in croceum sese mutantibus. Medic. act. palat. vol. 3. phys. p. 321.

Lantana de tallo cuadrado y con agujones ; y flores que de color cetrino se mudan al de azafran.

Myrobatindum Viburni folium, spinosum, floribus coccineis. Vaill. act. 1722. p. 276.

Myrobatindo espinoso, con hoja como la del Viburno ; y flores de color coccineo.

Viburnum Americanum, odoratum, Urtice foliis latioribus, spinosum, floribus miniatis. Pluk. alm. 385. t. 233. f. 5.

Viburno de America , oloroso , espinoso , con hojas como las de la Ortiga , mas anchas ; y flores con puntitos encarnados.

Cast.

824 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Cast. Lantana con agujones.

Habita en la America mas caliente. *h*

Es *arbuscito* alto y erizado, con ángulos y agujones cortísimos, redoblados y esparcidos. Echa las *hojas* aovadas, agudas por su base, con peciolo, puntiagudas y ásperas: las *espigas* de dos en dos, emisféricas, opuestas y entreveradas con *bracteas* pequeñas, que se caen facilmente: las *flores* de color amarillo-roxo; pero siendo mas crecidas se vuelven de color coccineo.

Salvi-
folia.

8. LANTANA *foliis oppositis, subsessilibus, floribus racemosis*. Mill. dict. n. 11. Lantana con hojas opuestas, casi sentadas; y flores en racimo.

Frutex Africanus, foliis conjugatis Salviae angustis, floribus hirsutis. Herm. afr. 10. Arbusto Africano, de hojas como las de la Salvia, mas angostas, opuestas de dos en dos; y flores con pelo áspero.

Cast. Lantana con hoja de Salvia.

Habita en Etiopia. *h*

Tiene *dos estipulas* casi aovadas: las *hojas* lanceoladas, rugosas, con venas, y tomentosas: la *panoja* aovada y terminal: las *corolas* tambien tomentosas, de color de sangre por dentro; y el *borde* cortísimo.

Afri-
cana.

9. LANTANA ? *foliis alternis sessilibus, floribus solitariis*. Hort. cliff. 320. Lantana ? con hojas alternas, sentadas; y flores solitarias.

Spielmannia (Jasminum) foliis alternis, sessilibus, decurrentibus, floribus sessilibus. Medic. in act. palat. vol. 3. phys. p. 198. R. *Spielmannia (Jasmin)* con hojas alternas, sin peciolo, escurridas; y flores sentadas.

Jasminum Africanum, Ilicis folio, flore solitario, ex alis foliorum proveniente. Comm. rar. 6. t. 6. Jazmin de Africa, con hoja como la del Acebo; y flor solitaria, que proviene de las axilas de las hojas.

Cast. Lantana Africana.

Habita en Etiopia. *h*

Esta especie perfeccionó el fruto en *Lipsik*, en el Jardin de

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 825

de *Ludwigio* ; y *Schreber* observó en ella el *caliz* dividido en cinco lacinias alesnadas , y persistente : la *dru- pa* insipida , globosa , casi aguda y partida por medio de un sulco : la *nuez* globosa y de dos caxitas.

El Médico citado en dichas *actas* advierte , que tiene la *corola* como la del *Jazmin* : quatro *estambres* con sus *an- teras* ; y que la figura de la *nuez* y toda la *traza* de su in- florescencia persuaden , que esta especie debe separarse del género *Lantana* , con cuyas especies solamente conviene por la estructura ganchosa del *estigma*. Advierte tambien que constituyen la esencia de este nuevo género las *quatro anteras* que no pertenecen á la Clase *Dydinamia* : la *gar- ganta* cerrada con pelillos : el *estigma* ganchoso ; y la *nuez* dividida , mediante su disepimento , en dos partes emisféricas é iguales. R.

916. Género CORNUTIA. * Plum. 17. Agnanthus.

Vaill. Act. Gall. 1722.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , casi redondo , muy pequeño , tubuloso , con cinco dientes y persistente.

COR. de un *petalo* , boquiabierta : *tubo* cilindráceo , mu- cho mas largo que el *caliz* : *borde* hendido en quatro lacinias ; la *superior* derecha y casi redonda : las *la- terales* distantes ; y la *inferior* algo redonda y en- tera.

ESTAMB. *Filamentos* quatro , de los quales los *dos* sobresa- len fuera del tubo de la *corola* : con las *anteras* sen- cillas é inclinadas.

PIST. *Germen* casi redondo : *estilo* larguísimo y dividido en dos partes : con el *estigma* gruesecito.

PERIC. *Baya* globosa , y prendida por su base en el *caliz*.

SEM. una sola , y en forma de riñon.

ESPECIE.

Pyra- midata

I. CORNUTIA. Hort. cliff. X
X Cornutia.

319.

Cor-

326 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Cornutia flore pyramida- X *Cornutia* con la flor de fi-
zo, foliis incanis. Plum.gen. X gura piramidal; y hojas blan-
 32. ic. 106. f. 1. X quecinas.

Agnanthus Viburni folio. X Agnanto con hoja como la
 Vaill. act. 1722. p. 273. X del Viburno.

Cast. *Cornutia* piramidal.

Habita en Campeche y tierra de los Caribes. †

Tiene las ramas de quatro caras, con ángulos agudos : las
 hojas entre elípticas y aovadas, y enterisimas.

917. Género LOESELIA. † Royenia. *Houst. A. A.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, tubuloso, hendido en qua-
 tro partes, agudo, corto y persistente.

COR. de un *petalo*, desigual : *tubo* de la longitud del ca-
 liz : *borde* partido en cinco lacinias, todas inclinadas
 al lado inferior, entre aovadas y lanceoladas, é igua-
 les en la magnitud.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, del largo de la corola, de los
 quales los dos son mas cortos, todos opuestos á las
 lacinias del petalo y doblados ácia la parte contraria
 de la corola : con las *anteras* sencillas.

PIST. *Germen* aovado : *estilo* sencillo, y de la direccion
 de los estambres : con el *estigma* gruesecito.

PERIC. *Capsula* aovada, y de tres celdillas.

SEM. muchas, y anguladas.

ESPECIE.

Ci- 1. LOESELIA. Roy. lugdb. X *Loeselia*.
 liata. 299.

Royena foliis acute den- X *Royena* con hojas aguda-
tatis, & veluti spinosis, flo- X mente dentadas y como es-
re luteo. Houst. mss. X pinosas ; y flor amarilla.

Cast. *Loeselia*.

Habita en Veracruz.

918. Género CAPRARIA.

CAR. GEN. NAT.

- CAL. *Periantio* de una pieza , oblongo , y partido en cinco laciniás lineares , derechas , apartadas , persistentes y mas cortas que la corola.
- COR. de un *petalo* , en forma de campana , casi igual , y hendida en cinco laciniás oblongas , agudas ; y las *dos superiores* mas levantadas.
- ESTAMB. *Filamentos* quatro , alessnados , insertos en la base de la corola , la mitad mas cortos que ella , de los quales los *dos inferiores* son poco mas cortos : con las *anteras* de figura de corazon.
- PIST. *Germen* cónico : *estilo* filiforme , mas largo que los estambres : con el *estigma* de hechura de corazon , de dos ventallas é igual.
- PERIC. *Capsula* entre oblonga y cónica , comprimida por su ápice , de dos celdillas y dos ventallas : con el *disepimento* contrario ó transversal.
- SEM. muchas , y casi redondas.

ESPECIES.

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. CAPRARIA <i>foliis alternis , floribus geminis</i> .
Jacq. amer. 182. t. 115.
<i>Capraria Curassavica</i> .
Herm. parad. 110. t. 110.
<i>Gratiolæ affinis , frutescens , Americana , foliis Agerati , seu Veronicæ erectæ majoris</i> . Comm. hort. 1. p. 79. t. 40.
<i>Lysimachie Peruviane affinis , Americana , procumbens , Ononidis vernæ frutescentis folio singulari glabro</i> . Pluk. alm. 237. t. 98. f. 4.</p> | <p>Capraria con hojas alternas ; y flores mellizas.</p> <p>Capraria de Curasao.</p> <p>Planta de America , frutescente , semejante á la Gratiola , con hojas como las del Agerato , ó de la Veronica mayor levantada.</p> <p>Planta de America , tendida , semejante á la Lisimachia del Perú , con hoja de una en una , lampiña , parecida á la del Ononide de primavera frutescente.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cast.

828 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Cast. Capraria de dos flores.

Habita en Curasao : y en Grecia , *Wheler. h*

Vease la *Capraria peruviana*, con hoja como la del *Agerato*, sin peciolos. *Fewil peruv. 1. p. 764. t. 84.*

Duran-
tifolia.

2. *CAPRARIA foliis ternis dentatis, floribus solitariis, ramis alternis.* Amoen. acad. 5. p. 399.

Phelipea erecta, foliis sessilibus, angustis, auritis, ad apicem serratis, oppositis seu verticillatis, floribus singularibus, alaribus. Brown. jam. 269.

Veronica caule hexangulati, foliis Satureia, ternis, serratis. Sloan. jam. 81. hist. 1. p. 196. t. 124. f. 2.

Capraria con hojas de tres en tres, dentadas; flores solitarias; y ramas alternas.

Phelipea levantada, de hojas sin peciolo, angostas, con orejillas, aserradas en su ápice, opuestas ó en verticilos; flores de una en una y axilares.

Veronica con el tallo de seis ángulos; hojas como las de la Axedrea, de tres en tres y aserradas.

Cast. Capraria con hojas como las de la *Duranta*.

Habita en lugares inundados de la *Jamaica*.

Cris-
tacea.

3. *CAPRARIA repens, foliis oppositis obovatis subpetiolatis crenatis.* Burm. ind. 133.

Caranasi minus. Rumph. amb. 5. p. 491. t. 170. f. 3.

Capraria rastrera, de hojas opuestas, aovadas, con peciolo corto, y recortadas.

Caranasi menor.

Cast. Capraria costrosa.

Habita en *Amboina* y en la *China*.

Es muy semejante á la *Lindernia Pixidaria*, ó acaso es especie de *Lindernia*?

Lan-
ceola-
ta.

4. *CAPRARIA foliis oppositis lanceolatis, corymbi terminali composito.* Suppl. p. 284.

Capraria con hojas opuestas, lanceoladas; corimbo terminal y compuesto.

Cast. Capraria lanceolada.

Ha-

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

5. *CAPRARIA foliis alternis ovatis undulatis, racemis secundis*. Suppl. p. 284. *Capraria* con hojas alternas, aovadas, ondeadas; y racimos ladeados.

Cast. *Capraria* ondeada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

919. Género *LINDERNIA*. † *Allioni*.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* partido en cinco hojuelas, lineares, agudas, iguales y persistentes.

COR. de un *petalo*, boquiabierto y de dos labios: el superior cortísimo, cóncavo y escotado: el inferior derecho y hendido en tres lacinias; con la del medio algo mas grande.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, dos mas cortos, los de mas arriba sencillos y los dos inferiores ascendentes, con un diente terminal y recto: las *anteras* mellizas, y las inferiores casi laterales.

PIST. *Germen* aovado; *estilo* filiforme: con el *estigma* escotado.

PERIC. *Capsula* oval, de una celdilla y dos ventallas.

SEM. numerosas: y *receptáculo* cilindrico.

ESPECIE.

1. *LINDERNIA foliis sessilibus integerrimis, pedunculis solitariis*. Syst. veg. *Lindernia* con hojas sentadas, enterisimas; y pedunculos solitarios.

P. 475.

Lindernia. Allion. stirp. *Lindernia*.

aliqu. 178. t. 5.

Pixidaria repens, annua, flosculis monopetalis unilabiatis. Linder. alsat. i. p. 152. *Pixidaria* rastrera, annua, con florecitas de un petalo y de un labio.

t. 1. & 2. p. 267.

830 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Capraria Gratioloides. Sp. \times *Capraria* parecida á la
pl. 3. p. 876. \times Graciola.

Gratiola floribus pedunculatis, foliis ovatis crenatis. Gron. virg. 129. \times Graciola de flores con pedunculo ; hojas aovadas y recortadas.

Ruellia pedunculis solitariis, unifloris, longitudine foliorum. Gron. virg. 73. \times Ruelia con pedunculos solitarios, de una flor y del largo de las hojas,

Cast. *Lindernia Pixídaria*.

Habita en lugares pantanosos, esponjosos é inundados de la Virginia, Alsacia y Piamonte. \odot

Tiene las flores de color purpúreo claro.

920. Género SELAGO. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, pequeño, persistente, hendido en quatro lacínias, y la inferior mas grande.

COR. de un *petalo*: tubo muy pequeño, filiforme y apenas horadado: *borde* extendido, casi igual, partido en cinco lacínias; las dos superiores mas pequeñas; y la *infima* mayor.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, capilares, del largo de la corola, é insertos en ella, de los cuales los dos superiores son mas largos: con las *anteras* sencillas.

PIST. *Germen* casi redondo: *estilo* sencillo, de la longitud de los estambres: con el *estigma* tambien sencillo y agudo.

PERIC. ninguno: la *corola* envuelve la semilla,

SEM. una sola, ó dos, casi redondas.

OBS. *El Selago* de muchas espigas tiene el fruto que se divide en dos partes; y el *Selago* como *Rapunculo* posee el caliz partido en quatro lacínias; y las dos exteriores mas grandes. R.

ESPECIES.

1. SELAGO *corymbo multiplici, floribus disjunctis, foliis filiformibus fasciculatis*, Berg. cap. 156.

Camphorata Africana, umbellata, frutescens. Com. hort. 2. p. 79. t. 40. Rai. Suppl. p. 130.

Millefolio affinis Madraspatana, Camphoratae foliis radiatim nascentibus. Moris. hist. 3. p. 39. Rai. Suppl. p. 219.

Selago con muchos corimbos; flores apartadas ó separadas; hojas filiformes y en hacecillo.

Alcanforada de Africa, frutescente, y en umbela.

Planta de Madraspatan, parecida al Milenrama, con hojas como las de la Alcanforada y puestas en radios.

Cast. Selago corimboso.
Habita en Etiopia, ¶

2. SELAGO *corymbo spicis fasciculatis, foliis filiformibus aggregatis*.

Valeriana Africana, fruticans, foliis Ericæ. Comm. hort. 2. p. 221. t. 111?

Selago con el corimbo de espigas en hacecillo; hojas filiformes y agregadas.

Valeriana de Africa, fruticosa, con hojas como las del Brezo.

Cast. Selago de muchas espigas.
Habita en los campos arenosos del Cabo de Buena-esperanza. ¶

Arroja el tallo derecho, liso, ramoso y del largo de medio pie: en cada una de las yemas muchas hojas en hacecillo, lineares, algo rígidas, desnudas, al doble mas crasas y la mitad mas cortas que las del *Selago corimboso*: el corimbo terminal como en aquel: el caliz pequeño y erizado: las corolas semejantes á las del expresado y blancas: los frutos aovados y que se parten en dos semillas.

Ra-
puncu-
loides. 3. SELAGO *spicis corym-* X Selago con espigas en co-
bosis, foliis dentatis. Amœ X rimbo; y hojas dentadas.
nit. acad. 4. p. 319. & 6. X
afr. 20.

Rapunculus foliis angus- X Rapunculo con hojas muy
tissimis, dentatis, floribus X angostas, dentadas; y flores
umbellatis. Burm. afr. 113. X en umbela.
t. 42. f. 1. X

Cast. Selago como Rapunculo.

Habita en Etiopia. Burm. ¶

Tiene el *borde de la corola* partido en quatro lacinias; y las dos exteriores mas grandes.

Spuria 4. SELAGO *spicis corym-* X Selago de espigas en co-
bosis, foliis linearibus den- X rimbo; hojas lineares, y con
ticulatis. X dientecitos.

Melampyrum Africanum, X Melampiro de Africa, es-
spicatum, foliis angustis- X pigado, con hojas muy an-
simis. Burm. afr. 115. t. 42. X gostas.
f. 3. X

Cast. Selago espurio.

Habita en Etiopia. ¶

Produce el *tallo* sufruticoso: las *hojas* lineares, alternas y amontonadas: la *espiga* entre aovada y oblonga, obtusa, y estrechamente apifada; con *bracteas* oblongas y membranosas: las *corolas* de color de violeta, hendidas en cinco partes, con el tubo filiforme y largo: dos *estambres* que sobresalen: el *estilo* en cabezuela: y la *capsula* de seis ventallas.

Fasci-
culata. 5. SELAGO *corymbo mul-* X Selago con muchos corim-
tiplici, foliis obovatis gla- X bos; hojas aovadas al revés,
bris serratis. X lampiñas y aserradas.

Cast. Selago en hacecillo.

Habita en los montes del Cabo de Buena-esperanza. ¶

Arroja el *tallo* muy sencillo, derecho, liso, y de la altura de dos pies: las *hojas* alternas, aovadas al revés, oblongas, lisas, agudamente aserradas, enterisimas por su base y ligeramente escurridas: el *corimbo* terminal,
mul-

multiplicado y denso: el *caliz* con cinco dientes, alesnados, y de la longitud de la mitad del tubo de la corola: *ésta* purpúrea y de la estatura del *Selago corimboso*; con el *estigma* obtuso.

Coc-
ciner.

6. SELAGO *spicis corymbosis, foliis inferioribus linearibus integerrimis, superioribus lanceolato-subulatis subdentatis*. Amœn. acad. 6. afr. 21. Selago de espigas en corimbo; hojas inferiores lineares, enterisimas, las superiores entre lanceoladas y alesnadas y con algun diente.

Cast. Selago coccineo.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Capi-
tata.

7. SELAGO *capitulo terminali, foliis fasciculatis linearibus carnosis glabris*. Berg. cap. 157. Selago con la cabezuela terminal; hojas en hacecillo, lineares, carnosas y lampifias.

Cast. Selago de cabezuela.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. \bar{h}
Echa el tallo sufruticoso, derecho y veloso: las hojas en hacecillo, obtusas, lampifias y mas crasas que las del *Selago corimboso*: la *cabezuela* casi aovada, densa, solitaria y apiñada con bracteas y flores: las *bracteas* rombeas, membranosas y de la longitud de las mismas flores.

Lychni-
dea.

8. SELAGO *spica terminali, foliis subpetiolatis lanceolatis obtusiusculis serratis subtomentosis*. Amœn. acad. 6. afr. 19. Berg. cap. 158. Selago de espiga terminal; hojas con peciolo corto, lanceoladas, algo obtusas, aserradas y casi tomentosas.

Lychnidea villosa, foliis oblongis, dentatis, floribus spicatis. Burm. afr. 13. t. 49. f. 4. Planta parecida á la *Lychnidea*, vellosa, con hojas oblongas, dentadas; y flores en espiga.

Cast. Selago como *Lychnidea*.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

834 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Fruticosa. 9. SELAGO *capitulis subtrotundis terminalibus, foliis sparsis linearibus obtusis integerrimis, caule fruticoso.* Selago con cabezuelas, casi redondas, terminales; hojas esparcidas, lineares, obtusas, enterisimas; y tallo fruticoso.

Cast. Selago fruticoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. $\frac{f}{h}$

Es arbusto alto, con ramas desiguales. Tiene las hojas lineares, obtusas, pequeñas, desiguales, enterisimas, sin orden, amontonadas y desnudas: las cabezuelas casi redondas, terminales y sentadas.

Divariata. 10. SELAGO *foliis filiformi-linearibus fasciculatis glabris, capitulis terminalibus.* Suppl. p. 284. Selago con hojas entre filiformes y lineares, en hacecillo, lampiñas; y cabezuelas terminales.

Cast. Selago desparramado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Canescens. 11. SELAGO *foliis filiformibus fasciculatis glabris, spicis terminalibus.* Suppl. p. 284. Selago con hojas filiformes, en hacecillo, lampiñas; y espigas terminales.

Cast. Selago que encanece.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Geniculata. 12. SELAGO *foliis linearibus fasciculatis glabris margine reflexo, spicis terminalibus.* Suppl. p. 284. Selago de hojas lineares, en hacecillo, lampiñas, con su margen redoblada; y espigas terminales.

Cast. Selago con nudos.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Las ramas de esta especie se hallan mas extendidas y apartadas.

Tri-
quetra

13. SELAGO *foliis triquetris imbricatis recurvato-reflexis glabris, spicis terminalibus*. Suppl. p. 284. Selago con hojas de tres caras, apañadas, entre encorvadas ácia atrás y redobladas, lampiñas; y espigas terminales.

Cast. Selago de tres caras.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Hispida.

14. SELAGO *foliis linearibus sparsis reflexis hispidis, spicis terminalibus*. Suppl. p. 284. Selago con hojas lineares, sin orden, redobladas, con pelo rígido; y espigas terminales.

Cast. Selago erizado.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Polygaloides.

15. SELAGO *foliis linearibus glabris margine reflexo, spicis terminalibus bracteis calycibusque carinatis, laminis scabris*. Suppl. p. 284. Selago de hojas lineares, lampiñas, con su margen redoblada; espigas terminales; bracteas y cálices aquilados; y láminas (ó bracteas) ásperas.

Cast. Selago como polygala.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza.
Su traza es como la de la Polygala, con hojas largas, lineares; y espigas pendulas.

Cinerea.

16. SELAGO *foliis linearibus fasciculatis glabris margine reflexo, corymbo composito*. Suppl. p. 285. Selago de hojas lineares, en hacecillo, lampiñas, con su margen redoblada; y corimbo compuesto.

Cast. Selago ceniciento.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza.
Es muy semejante al Selago corimboso y acaso variedad de él.

Rotundifolia.

17. SELAGO *foliis ovatis glabris obtusis, corymbo composito*. Suppl. p. 285. Selago con hojas aovadas, lampiñas, obtusas; y corimbo compuesto.

Ggg 2

Cast.

836 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Cast. Selago de hoja redonda.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

- Ci- 18. SELAGO *foliis ova-* X Selago con hojas aovadas,
liata. *tis ciliatis acutis, floribus* X pestañosas, agudas; y flores
spicatis. Suppl. p. 285. X en espiga.

Cast. Selago pestañoso.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

- Verbe- 19. SELAGO *foliis oblon-* X Selago con hojas oblon-
nacea. *gis glabris, spicis fascicu-* X gas, lampiñas; espigas en
latis, caule tetragono rec- X hacecillo; tallo de cuatro
tangulo. Suppl. p. 285. X lados y rectangulo.

Cast. Selago como Verbena.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

- Hirta. 20. SELAGO *hirta, fo-* X Selago con pelo rígido;
liis obovatis, spicis longis- X hojas aovadas al revés; y es-
simis. Suppl. p. 285. X pigas larguissimas.

Cast. Selago con pelo rígido.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

El célebre *Doct. Thunberg* comunicó á *Linneo* todas las especies que llevamos citadas del *Suplemento*.

921. Género MANULEA.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* partido en cinco hojuelas, lineares, derechas, iguales y persistentes.

COR. de un *petalo*, irregular: tubo cilindrico, casi mas ancho que la garganta: *borde* extendido, partido en cinco lacinias alesnadas; con las *cuatro superiores* mas unidas por su base; y la *infima* redoblada.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, cortisimos: con las *dos anteriores superiores* puestas en la garganta; las *dos inferiores* algo oblongas y colocadas dentro del tubo.

PIST. *Germen* dentro de la flor y casi redondo: *estilo* filiforme, del largo de los estambres inferiores: con el *estigma* sencillo.

PR-

PERIC. Capsula aovada, de la longitud del caliz, de dos celdillas y dos ventallas.
SEM. muchas.

ESPECIES.

1. MANULEA *foliis nudis, caulibus subaphyllis, pedicellis alternis unifloris.* Manulea con hojas desnudas; tallos casi sin ellas; piecitos alternos y de una flor.

Nemia Cheiranthus. Berg. Nemia Alheli.
cap. 160.

Lobelia Cheiranthus. Sp. Lobelia Alheli.
pl. 3. 1319.

Cheiranthus Africana, Alheli de Africa, con flor
flore luteo. Comm. hort. 2. amarilla.
p. 83. t. 42.

Cast. Manulea Alheli.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ☉

Su estatura es como la de la *Eufrasia*. Produce el tallo del largo de un palmo, y desde su base hasta la mitad con muchos ramos ó tallitos derechos, rollizos y ásperos: las *hojas* alternas, entre aovadas al revés y oblongas, sin peciolo, aserradas; y pequeñas en las ramas superiores: los *racimos* terminales, derechos y mas largos que la planta: las *bracteas* lineares y mas cortas que el caliz: los *pedunculos* tambien mas cortos que él; y las *corolas* de color amarillo subido.

To-
mento
sa. 2. MANULEA *foliis tomentosis, caulibus foliosis, pedunculis multifloris.* Manulea con hojas tomentosas; tallos foliosos; y pedunculos de muchas flores.

Selago (tomentosa) racemis ramosis, foliis obovatis crenatis tomentosis, caule prostrato. Sp. pl. 3. p. 877. Selago (tomentoso) con racimos ramosos; hojas aovadas al revés, recortadas, tomentosas; y tallo postrado.
Amoen. acad. 6. afr. 22.

Planta. Pluk. phyt. t. 319. f. 2. Planta.

Cast. Manulea tomentosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ☉ Royen.

Echa

Echa muchos tallos ascendentes, rollizos, foliosos, con pelillos ó tomento blanquecino; y ramas alternas: las hojas opuestas, algo pecioladas, aovadas al revés ó lanceoladas, con aserraduras obtusas, y tomento espeso en ambas partes: la panoja terminal, estrecha, de figura aovada y ultimamente oblonga: los peduncululos axilares y terminales, sin hojuelas; con bracteas lineates y sentadas entre las flores: las corolas de color amarillo muy subido; el tubo filiforme; el borde horizontal, casi regular y partido en cinco lacinias revueltas por los lados: la capsula casi oblonga, comprimida, aguda, de dos sulcos, de dos celdillas, de dos ventallas y con muchas simientes.

Toda la planta, á excepcion de la corola, es muy tomentosa.

El Selago como *Lychnide* es muy parecido á esta especie y acaso de su mismo género.

Micro-
phylla. 3. MANULEA foliis ova-
tis fasciculatis glabris in-
tegris. Suppl. p. 285. X
Manulea con hojas aova-
das, en hacecillo, lampifias
y enteras.

Cast. Manulea de hoja pequeña.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Coe-
rulea. 4. MANULEA foliis li-
nearibus oppositis tomento-
sis dentatis, floribus race-
mosis. Suppl. p. 285. X
Manulea con hojas linea-
res, opuestas, tomentosas,
dentadas; y flores en raci-
mo.

Cast. Manulea cerúlea.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Cunei-
folia. 5. MANULEA foliis ellip-
tico-ovatis glabris dentatis,
spicis oblongis. Suppl. p. 285. X
Manulea con hojas entre
elípticas y aovadas, lampi-
fias, dentadas; y espigas
oblongas.

Cast. Manulea con hoja de cuña.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Capil-
ris.

6. MANULEA *foliis caulinis obovatis glabris dentatis, ramis linearibus, spicis ovatis*. Suppl. p. 285. Manulea con las hojas del tallo aovadas al revés, lampiñas, dentadas; ramas lineares; y espigas aovadas.

Cast. Manulea capilar.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Inte-
grifo-
lia.

7. MANULEA *foliis ovatis sparsis glabris integris*. Suppl. p. 285. Manulea con hojas aovadas, esparcidas, lampiñas y enteras.

Cast. Manulea de hoja entera.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Here-
rophyl-
la.

8. MANULEA *foliis linearibus sparsis villosis integris dentatisve*. Suppl. p. 285. Manulea con hojas lineares, esparcidas, vellosas, enteras, ó dentadas.

Cast. Manulea de hojas varias.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Plan-
taginis

9. MANULEA *foliis ovatis subdentatis integrisque glabris, capitulis ovatis, ramis diffusis*. Suppl. p. 286. Manulea de hojas aovadas, con algun diente, y enteras, lampiñas; cabezuelas aovadas; y ramas difusas.

Cast. Manulea de Llantén.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Esta especie se asemeja al Llantén.

Capit-
tata.

10. MANULEA *foliis ovatis serratis villosis, capitulis globosis, ramis diffusis*. Suppl. p. 286. Manulea con hojas aovadas, aserradas, vellosas; cabezuelas globosas; y ramas difusas.

Cast. Manulea de cabezuela.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

840 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Antirrhinoi-
das. 11. MANULEA *foliis* X Manulea con hojas aova-
ovatis dentatis glabris, flo- X das, dentadas, lampiñas; y
ribus alternis. Suppl. p. X flores alternas.
286. X

Cast. Manulea como Antirrhino.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Thyr-
siflora. 12. MANULEA *foliis* X Manulea con hojas aova-
obovatis tomentosis denta- X das al revés, tomentosas,
tis, corymbo terminali elon- X dentadas; corimbo terminal,
gato composito. Suppl. p. X alargado y compuesto.
286. X

Cast. Manulea de corimbo ó panoja aovada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Co-
rymbo-
sa. 13. MANULEA *foliis* X Manulea con hojas oblon-
oblongis dentatis glabris, X gas, dentadas, lampiñas; y
corymbo fastigiato. Suppl. p. X corimbo levantado en rami-
286. X llete horizontal.

Cast. Manulea corimbosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Tiene el tallo desnudo.

Altis-
sima. 14. MANULEA *foliis* X Manulea con hojas lan-
lanceolatis subdentatis vil- X ceoladas, algo dentadas, ve-
losis, spica ovata. Suppl. p. X llosas; y espiga aovada.
286. X

Cast. Manulea altísima.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

Posee el tallo desnudo; y las hojas solamente radicales.

Rubra. 15. MANULEA *foliis* X Manulea con hojas lan-
lanceolatis villosis serratis, X ceoladas, vellosas, aserra-
floribus racemosis remotis. X das; flores racimosas y apar-
Suppl. p. 286. X tadas.

Nemia rubra. Berg. cap. X Nemia roxa.

p. 161. X

Cast. Manulea roxa.

Ha-

Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

16. MANULEA *foliis ovatis cuneiformibus serratis argenteo-punctatis, floribus axillaribus.* Suppl. p. 286. Manulea de hojas aovadas al revés, en forma de cuña, aserradas, con puntitos de color de plata; y flores axilares.

Cast. Manulea de color de plata.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza.

17. MANULEA *foliis ovatis inciso-pinnatifidis, pinnis dentatis.* Suppl. p. 286. Manulea de hojas aovadas, entre cortadas y hendidas al través; y sus hojuelas dentadas.

Cast. Manulea hendida al través.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza.
Todas las especies citadas del *Suplemento* fueron comunicadas á *Linneo* por el *Doct. Thunberg*.

922. Género HEBENSTREITIA.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, tubuloso, membranáceo, escotado y que se abre por debaxo longitudinalmente.

COR. de un *petalo*, y de un *labio*: tubo cilindrico, mas largo que el caliz y que se abre hasta la mitad por el lado inferior: *borde* ascendente, algo plano y hendido en quatro lacinias casi iguales.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, de los quales los *dos primeros* sobresalen, colocados debaxo de la garganta en la margen de la corola; los *dos mas tardios* interiores é inferiores redoblados ácia los lados: con las *anteras* de figura de media luna, comprimidas y truncadas ácia fuera.

PIST. *Germen* muy pequeño: *estilo* filiforme, ondeado, redoblado ácia la hendedura de la corola: con el *estigma* sencillo.

PERIC. *Capsula* oblonga, y que se abre en dos partes.

SEM.

842 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

SEM. dos, oblongas, por una parte convexás, con tres sulcos y por la otra planas.

Periantio tubo de dos labios, persistente; y el *inferior* mas largo: *corola* tubulosa, que remata en un labio ascendente, mas ancho ácia fuera y hendido en quatro partes: *filamentos* quatro, cortísimos, é insertos en la base del labio: *germen* oblongo: *capsula* de una celdilla y con dos simientes. *Wernich.*

ESPECIES.

- Den-
tata.
- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. <i>HEBENSTREITIA fo-</i>
<i>liis linearibus dentatis, spi-</i>
<i>cis levibus.</i> Burm. afr. 109.
t. 41. f. 1.</p> | <p>Hebenstreicia con hojas li-
neares, dentadas; y espigas
lisas.</p> |
| <p><i>Hebenstreitia foliis li-</i>
<i>neari-subularis rare denta-</i>
<i>tis, calycibus bivalvibus</i>
<i>glabris.</i> Berg. cap. 153.</p> | <p>Hebenstreicia de hojas en-
tre lineares y alesnadas, con
dientes claros; cálices de
dos ventallas y lampiños.</p> |
| <p><i>Valerianella Africana,</i>
<i>foliis angustis, flore macu-</i>
<i>la rubicante notato.</i> Comm.
hort. 2. p. 247. t. 109.</p> | <p>Valerianela Africana, de
hojas angostas; y flor señalada
con una mancha de color
que tira á bermejo.</p> |
| <p><i>Pedicularis foliis angus-</i>
<i>tissimis, dentatis, floribus</i>
<i>spicatis.</i> Burm. afr. 114.
t. 42. f. 2.</p> | <p>Pedicular con hojas muy
angostas, dentadas; y flores
en espiga.</p> |

Cast. Hebenstreicia dentada.

Habita en Etiopia.

Produce el *tallo* derecho, del largo de un pie; con *ra-*
mas sencillas y ascendentes, puestas en la raiz y deba-
xo de la espiga: las *hojas* entre alternas y esparci-
das, lineares, algo erizadas, con algun diente, derechas,
saliendo de cada axila abundantes hojuelas que casi se
reducen á ramas: la *espiga* terminal, sentada, oblonga
y estéril por debaxo; con *bracteas* lisas, alesnadas, api-
ñadas en diez órdenes longitudinales, y con una flor en
cada una; y la misma *espiga* formada de verticilos con
cinco flores alternas: la *corola* blanca; pero roxa en el
dorso de su garganta; siendo singular por los *estam-*
bres colocados en la misma margen de su hendedura,

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 843

y por tener los de abaxo encorvados ácia atrás. Las flores no huelen por la mañana; pero al medio dia arrojan el olor nauseoso; y por la tarde muy suave.

Ci-
ata.

2. HEBENSTREITIA fo-
liis linearibus dentatis, calycibus trivalvis ciliatis. Hebenstreicia con hojas lineares, dentadas; calices de tres ventallas y pestañosos.

Berg. cap. 154.

Ranunculus foliis inferioribus multifidis, superioribus simplicibus dentatis, floribus spicatis. Ranunculo con las hojas inferiores hendidas en muchas partes, las superiores sencillas, dentadas; y flores en espiga.

Cast. Hebenstreicia pestañosa.
Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ☉

Inte-
grita.

3. HEBENSTREITIA fo-
liis linearibus integerrimis. Hebenstreicia con hojas lineares y enterisimas.

Hort. cliff. 497. Roy. lugdb. 300.

Cast. Hebenstreicia con hojas enterisimas.
Habita en Etiopia.
Parece variedad de la Hebenstreicia pestañosa y ambas son muy semejantes á la Hebenstreicia dentada.

Cor-
data.

4. HEBENSTREITIA fo-
liis subcarnosis cordatis, sessilibus. Hebenstreicia con hojas algo carnosas, de figura de corazon y sentadas.

Cast. Hebenstreicia de figura de corazon.
Habita:::
Echa el tallo sufruticoso, derecho, blanquecino, un poco liso y por arriba ramoso: las hojas alternas ú opuestas, sentadas ó casi amplexicaules, de hechura de corazon, obtusas, algo recortadas, carnosas y por debaxo gibosas: la espiga terminal y sentada: las corolas blancas y en la garganta encarnadas; con las anteras comprimidas y amarillas, como en la Hebenstreicia dentada.

844 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Erino-
ides. 5. HEBENSTREITIA fo-
liis oblongis serratis pilo-
sis, bracteis integris hispi-
dis. Suppl. p. 286.

Hebenstreicia con hojas
oblongas, aserradas, pelosas;
bracteas enteras y erizadas.

Cast. Hebenstreicia como Erino.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Fruti-
cosa. 6. HEBENSTREITIA fo-
liis lanceolatis dentatis gla-
bris, bracteis integris, cau-
le fruticoso. Suppl. p. 287.

Hebenstreicia de hojas
lanceoladas, con dientes,
lampiñas; bracteas enteras;
y tallo fruticoso.

Cast. Hebenstreicia fruticosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

923. Género ERINUS. † Ageratum.

Tourn. r. 422.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de cinco hojuelas, lanceoladas, derechas, casi iguales y persistentes.

COR. de un *petalo*, desigual: *tubo* entre aovado y cilindrico, de la longitud del caliz y redoblado: *borde* plano, partido en cinco lacinias iguales, y de hechura de corazon al revés.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, cortísimos, puestos dentro del tubo de la corola, de los cuales los *dos opuestos* son poco mas largos: con las *anteras* pequeñas.

PIST. *Germen* casi aovado: *estilo* cortísimo: con el *estigma* en cabezuela.

PERIC. *Capsula* aovada, envuelta con el caliz, de dos *cel-
dillas* y que se abre en dos partes.

SEM. numerosas, y pequeñas.

CARACT. GENER. DE TOURN.

AGERATUM. p. 651.

La *flor* es de un *petalo*, personada, por debaxo tabulosa, y por arriba dividida como en dos *labios*, de los cuales el superior se halla hendido en dos partes, y el infe-

ferior en tres: el pistilo pasa á fruto oblongo, membranoso, dividido en dos celdillas y lleno de simientes delgadas, fixadas á la placenta ó receptáculo.

ESPECIES.

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Al-
pinus.</p> <p>I. ERINUS <i>floribus racemosis, foliis spathulatis.</i>
Hall. helv. n. 302.
<i>Ageratum serratum, alpinum.</i> C. B. P. 221.
<i>Ageratum serratum, alpinum, glabrum, flore purpurascente.</i> Tourn. p. 651.
<i>Ageratum purpureum.</i>
Dalech. hist. 1184.
" <i>Ageratum minus, saxatile, flore albo.</i> Barr. rar. 23.
t. 1192.</p> | <p>X Erino con flores en racimo; y hojas á manera de espatula.
X Agerato alpino, con hojas aserradas.
X Agerato alpino, lampiño, con hojas aserradas; y flor de color que tira á purpúreo.
X Agerato con la flor purpúrea.
X Agerato menor, saxátil; con la flor blanca."</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cast. Erino de los Alpes.

Habita en los Alpes de Suiza: en Mompellér y Pirineos: en Aragon: y en las peñas de Ntra. Sra. de Montserrat y otras partes de España. 2

Tiene las *hojas* radicales amontonadas en cespel, todas entre lineares y de figura de espatula, vellosas y con algunas aserraduras en ambas partes de su ápice: muchos *tallos* muy sencillos, del largo de un palmo, rollizos, vellosos, derechos, con hojas alternas y apartadas: los *tallos laterales* estériles y echados: el *racimo* terminal, sencillo, derecho y del largo del tallo: las *flores* alternas y separadas por medio de hojas mas pequeñas: el *caliz* á manera de campana, persistente, partido en cinco lacinias oblongas y derechas: la *corola* en forma de embudo; el *tubo* redoblado: el *borde* igual (pero, con el calor, vuelto irregular) con sus *lacinias* de figura de corazon al revés, ú oblongas, é iguales: quatro *estambres* dentro del tubo: el *germen* casi redondo: el *estilo* cortísimo: el *estigma* en cabezuela, con dos orejillas casi redondas y opuestas.

846 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

- Afri- 2. ERINUS *floribus la-* Erino de flores laterales,
 canus- *teralibus sessilibus, foliis* sentadas; hojas lanceoladas
lanceolatis subdentatis. y con algun diente.
Buchnera foliis obtusis Buchnera con hojas obtu-
serratis. Hort. cliff. 501. sas y aserradas.
Lychnidea villosa, foliis Planta como Lychnide ve-
ex alis floriferis, florum llosa, con hojas de las axilas
petalis cordatis. Burm. afr. que llevan las flores; y pe-
 139. t. 50. f. 1. talos de figura de corazon.
Buchnera foliis acutis Buchnera con hojas agu-
dentatis. Hort. cliff. 501. das y dentadas.

Cast. Erino de Africa.

Habita en Etiopia.

La figura que trae *Burman* tiene las flores con pedunculo.

- Ca- 3. ERINUS *floribus spi-* Erino con flores en espiga;
 pensis- *catis, foliis linearibus den-* ga; hojas lineares y denta-
tatis. das.
Lichnidea villosa, foliis Planta como Lychnide
oblongis, dentatis, florum vellosa, con hojas oblongas,
spicatis. Burm. afr. 138. dentadas; y flores en espiga.
 t. 49. f. 4.

Cast. Erino de Cabo de Buena-esperanza.

Habita en parages arenosos del Cabo de Buena-esperanza. ¶

Arroja el tallo derecho, rollizo, veloso, y del largo de dos pies; las hojas alternas (las inferiores opuestas), sin peciolo, lineares, dentadas, vellosas y apartadas: la espiga terminal, oblonga, apifada; con bracteas mas anchas, entre aovadas y lanceoladas y dentadas: el caliz sentado, de la longitud de las bracteas, con cinco dientes, dividido en dos partes, derecho, obtuso y por abaxo mas ancho; la corola de color amarillo-roxo y muy olorosa: el tubo filiforme y tres veces mas largo que el caliz: el borde partido en cinco lóbulos, medio hendidos en dos partes, aovados al revés é iguales: dos anteras puestas en la boca del tubo: y las otras dos debaxo de la garganta: el germen dentro de la flor: el estilo filiforme y del largo del tubo.

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 847

Peru-
riatus. 4. ERINUS foliis lanceo-
lato-ovatis serratis. Erino con hojas entre lan-
ceoladas y aovadas y aserra-
das.

Lichnidea Veronicæ folio,
flore coccineo. Few. peruv. 3. Planta como Lychnide,
p. 25. f. 3. con hoja semejante á la de la
Veronica; y flor coccinea.

Cast. Erino del Perú.

Habita en el Perú y Cabo de Buena-esperanza.

Laci-
niatus. 5. ERINUS foliis laci-
niatis. Erino con hojas lacinia-
das.

Lychnidea Verbeneæ te-
nuifolio. Few. peruv. 3. p. Planta como la Lychnide,
35. t. 25. con hoja como la de la Ver-
bena de hoja delgada.

Cast. Erino laciniado.

Habita en el Perú.

Mari-
tinus. 6. ERINUS foliis lanceo-
latis integerrimis glabris, Erino con hojas lanceola-
lymbi laciniis semibifidis. das, enterisimas, lampiñas;
Suppl. p. 287. y las lacinias del borde me-
dio hendidas en dos partes.

Cast. Erino maritimo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Lych-
nidea. 7. ERINUS foliis lanceo-
latis serratis, lymbi laci-
niis semibifidis. Suppl. p. Erino con hojas lanceola-
287. das, aserradas; y lacinias
del borde medio hendidas en
dos partes.

Selago Lychnidea, Syst. Selago como Lychnide.
veg. ed. 13. p. 476.

Cast. Erino como Lychnide.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Tristis 8. ERINUS foliis oblon-
gis incisís dentatis, lymbi Erino de hojas oblongas,
laciniis emarginatis. Suppl. cortadas, con dientes; y las
p. 287. lacinias del borde escotadas.

Cast. Erino triste.

Ha-

848 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Hábita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*
 Tiene las flores de color triste y de olor suave.

924. Género BUCHNERA. † *Hort. cliff.* 501.

CAR. GEN. NAT.

- CAL. *Periantio* de una pieza , con cinco dientes desfigurados , áspero y persistente.
 COR. de un *petalo* : tubo larguísimo , filiforme , arqueado: borde plano , corto , hendido en cinco lacinias : las dos superiores cortísimas , redobladas ; y las tres inferiores de figura de corazón y casi iguales.
 ESTAMB. *Filamentos* cuatro , cortísimos , puestos en la garganta de la corola , de los cuales los dos superiores sobresalen por defuera : con las *anteras* oblongas y obtusas.
 PIST. *Germen* entre aovado y oblongo : *estilo* filiforme , del largo del tubo : con el *estigma* obtuso.
 PERIC. *Capsula* entre aovada y oblonga , puntiaguda , cubierta , de dos celdillas y que se abre por su ápice en dos partes.
 SEM. numerosas , y anguladas.
 OBS. *El caliz y la corola varían en su figura , y los estambres en su insercion.* R.

ESPECIES.

- Ameri- I. BUCHNERA *foliis den-* X Buchnera de hojas denta-
 cana. *tatis , lanceolatis trinerviis,* X das , lanceoladas y con tres
Syst. veg. p. 477. X nervios.
Buchnera foliis dentatis X Buchnera con hojas den-
oppositis , florum tubo lavi. X tadas , opuestas ; y tubo de
Sp. pl. 3. p. 879. X las flores liso.
Cortusæ seu Verbasci spe- X Especie de Cortusa ó de
cies , caule non ramoso , flo- X Verbasco , con el tallo que
ribus violaceis. Gron. virg. X no es ramoso ; y flores de
 74- X color violado,

Cast. Buchnera Americana.

Hábita en la Virginia y Canadá.

Echa la espiga con flores apartadas : el tallo apenas ramo-

so : dos estambres puestos en la garganta : y los otros dos en medio del tubo. Es yerba que quando se seca se vuelve negra.

Cer-
nua.

2. BUCHNERA *foliis cuneatis quinque-dentatis glabris, floribus spicatis, caule fruticoso.* Buchnera de hojas en forma de cuña, con cinco dientes, lampiñas; flores en espiga; y tallo fruticoso.

Cast. Buchnera cabizbaxa.

Habita en los montes del Cabo de Buena-esperanza. $\frac{h}{2}$
Produce el tallo fruticoso, del largo de medio pie, de color que tira á purpúreo; con las ramas en su extremo, y casi articulado por las cicatrices que restan de las hojas que se caen: las hojas opuestas, las mas veces de tres en tres, sentadas, en forma de cuña, de cinco dientes, con dos aserraduras agudas, en ambas partes de su ápice, lisas y no mas cortas que los artículos: las espigas terminales, solitarias y oblongas: las flores sentadas y derechas: la bractea linear, aguda, mas corta que el caliz y con dos cerdas laterales mas cortas: el caliz tubuloso, oblongo, medio hendido en cinco lacinias iguales, y unidas por medio de una membrana: la corola blanca: el tubo filiforme, dos veces mas largo que el caliz y encorvado ácia atrás: las anteras puestas debaxo de la garganta y las dos mas abaxo: el estigma encerrado, redoblado y gruesecito.

Æthio-
pica.

3. BUCHNERA *foliis tri-dentatis, floribus pedunculatis, caule fruticuloso.* Buchnera de hojas con tres dientes; flores pedunculadas; y tallo algo fruticoso.

Cast. Buchnera de Etiopia.

Habita en campos arenosos del Cabo de Buena-esperanza. $\frac{h}{2}$

Arroja el tallo del largo de medio pie, muy ramoso; con las ramas apenas manifestamente vellosas: las hojas opuestas, sin peciolo, lanceoladas, de la magnitud del *Polygono avicular*, algo lisas, y las mas veces con un diente en ambas partes debaxo del ápice: las flores ácia los remates de las ramas, laterales, opuestas y con pedunculo; los pedunculos de una flor, mas largos que las

850 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

las hojas y derechos : el *caliz* de una pieza , con cinco dientes y algo erizado : la *corola* de color amarillo ; con el *tubo* al doble mas largo que los cálices : la *capsula* de dos celdillas , entre aovada y oblonga , y apenas mas larga que el caliz.

OBS. La *Buchnera del Cabo de Buena-esperanza* se diferencia por el *tallo* veloso y viscoso , y en ser ramoso solamente por arriba ; por las *hojas* con dos dientes apartados en ambas partes ; y por la *raiz* annua.

Canadensis

4. BUCHNERA *foliis laciniatis* , *caule dichotomo* , Buchnera con hojas laciniadas ; y tallo ahorquillado.

Cast. Buchnera del Canadá.

Habita en la Virginia y Canadá. ☞

Tiene el *tallo* del largo de un pie , quadrangular , derecho y ahorquillado : las *hojas* opuestas , con peciolo , laciniadas , semejantes á las de la *Verbena officinal* ; cortadas , dentadas y lisas por encima : cada *espiga* que sale de la axila de la horquilladura , con pedunculo , originada de un corimbo , alargada y con flores esparcidas desigualmente ; y los *cálices* del largo de la mitad del tubo de la corola.

Capensis

5. BUCHNERA *foliis dentatis linearibus alternis* , *calycibus pubescentibus* , Buchnera con hojas dentadas , lineares , alternas ; y cálices vellosos.

Lychnidea villosa , *foliis angustis dentibus* , *floribus umbellatis* , Burm. afr. 191. t. 50. f. 2. Planta como *Lychnide villosa* , de hojas con dientes angostos ; y flores en umbela.

Cast. Buchnera del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. ⊙

Es *planta* del largo de un palmo , ramosa por arriba , con las *flores* en espigas terminales ; y se parece al *Rhinanto africano*.

Asiatica.

6. BUCHNERA *foliis integerrimis linearibus* , *calycibus scabris* . Syst. veg. 478. Buchnera con hojas entegerrimas , lineares ; y cálices ásperos.

Cast.



Cast. Buchnera de Asia.

Habita en Zeylan y en la China.

Tiene la corola con el borde hendido en dos lacinias : la una derecha , hendida en otras tres ; y la otra extendida , ancha y de figura de corazon.

Cor-
difolia.

7. BUCHNERA caule tetragono, foliis oppositis cordatis trinerviis serratis, racemis terminalibus subspicatis. Suppl. p. 287. Buchnera con el tallo de quatro lados ; hojas opuestas, de hechura de corazon , con tres nervios , aserradas ; racimos terminales y casi en espiga.

Cast. Buchnera con hoja de figura de corazon.

Habita en Tanschaur y rara vez en las márgenes de sus huertas. Kœnig.

Siguiendo el dictamen de este famoso autor , reduxo Linneo esta especie á este género , aunque es muy diversa por su traza ; y mas bien semejante á las especies de Verbena.

Gran-
diflora.

8. BUCHNERA scabra, foliis oppositis sessilibus oblongis integris, pedunculis axillaribus unifloris dichyphyllis, calyce infundibuliformi. Suppl. p. 287. Buchnera áspera , de hojas opuestas, sentadas, oblongas , enteras ; pedunculos axilares, de una flor , con dos hojuelas ; y caliz en forma de embudo.

Cast. Buchnera de flor grande.

Habita en la America Meridional. Mutis.

Es planta hermosísima. Tiene el tallo derecho , lampiño y muy sencillo : las hojas sin peciolo , oblongas , con cinco nervios , enteras , y ásperas en ambas partes : los pedunculos en la sumidad del tallo , axilares , solitarios, mas cortos que las hojas, de una flor , y con bracteas en medio , de dos en dos , opuestas , entre lineares y lanceoladas : el caliz cilindrico , en forma de embudo , largo , con cinco dientes , y la mitad mas corto que el tubo de la corola : éste del largo de quatro dedos , gradualmente ensanchado en un borde plano , grande , y hendido en cinco lóbulos redondeados.

No vió Linneo el fruto de esta especie ; y por tanto

852 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

no se halló bastante persuadido á que fuese de este género.

No es muy semejante de las especies del género *Gerardia*; y seca se vuelve negra del mismo modo que la *Gerardia negruzca*.

Cu-
neifo-
lia. 9. *BUCHNERA foliis cu-* X
neiformibus glabris apice X
septem-dentatis. Suppl. p. X
288. X
ma de cufia , lampiñas , y
con siete dientes en su ápice.

Cast. Buchnera con hojas en forma de cufia.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Pinn a-
tifida. 10. *BUCHNERA foliis* X
pinnatifidis glabris. Suppl. X
p. 288. X
Buchnera con hojas hen-
didas al través y lampiñas.

Cast. Buchnera hendida al través.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

925. Género BROWALLIA. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , tubuloso , corto , persistente y con cinco dientecitos algo desiguales.

COR. de un *petalo* , en forma de embudo : *tubo* cilíndrico , al doble mas largo que el caliz ; *borde* plano , igual , hendido en cinco lacinias redondeadas y escotadas : la de mas arriba algo mas grande , y constituye el labio superior ; y las quatro restantes iguales.

ESTAMB. *Filamentos* quatro , puestos en la garganta de la corola : los *dos superiores* cortísimos : los *inferiores* mas anchos , mas altos , de color , redoblados y que cierran la garganta de la corola : con las *anteras* sencillas , encorvadas , y arrimadas entre sí ; las de mas adentro mellizas ; las de mas afuera que se abren por su apice en un agujerito ; y que tambien cierran la garganta de la corola.

PIST. *Germen* ovado , y que termina en seno obtuso ; es-

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 853

tilo filiforme, del largo del tubo de la corola: con el *estigma* craso y hendido en quatro lóbulos.

PERIC. *Capsula* aovada, obtusa, de una celdilla, cubierta y que se abre por su ápice en quatro partes.

SEM. numerosas, y pequeñas. *Receptáculo* algo rollizo y comprimido.

ESPECIES.

De-
missa. 1. BROWALLIA *pedun-* X *Browalia* con pedunculos
culis unifloris. Hort. cliff. X de una flor.
318. t. 17. Sabb. hort. 2. t. X
100. X

Cast. *Browalia* descaecida.

Habita en la America austral y en Panamá. ☉

Elata. 2. BROWALLIA *pedun-* X *Browalia* con pedunculos
culis unifloris multifloris- X de una flor, y otros de
que. Mill. dict. n. 2. X muchas flores.

Cast. *Browalia* muy levantada.

Habita en el Perú. ☉

Es muy semejante á la *Browalia descaecida*; pero tiene el tallo al doble mayor, rígido, del grueso de medio dedo y algo fruticoso: las *ramas inferiores* casi del largo del mismo tallo: las *hojas florales* un poco lampiñas: unos *pedunculos* con una flor; y otros con tres, cinco y aun mas; y la *corola* de color entre cerúleo y violado subido.

Alienata. 3. BROWALLIA? *foliis* X *Browalia* con las hojas su-
superioribus oppositis, sta- X periores opuestas; y dos es-
minibus duobus longitudine X tambres del largo de la co-
corollae. Syst. veg. 478. † X rola.

Browallia foliis lanceola- X *Browalia* de hojas lanceo-
tis petiolatis longis, caule X ladas, con peciolo, largas;
ramoso, radice annua. Mill. X tallo ramoso; y raiz annua.
ic. 68. X

Cast. *Browalia* enagenada.

Habita: ☉

No

854 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

No vió *Linneo* esta especie, ni la puso en las especies *plantarum*; y la ha sacado solamente de la figura de *Mi-ller*, quien tambien la omitió en su último diccionario.

926. Género LINNÆA. * *Aut. cl. Gronovio.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* doble.

El del *fruto* puesto debaxo, de quatro hojuelas: *dos* de las quales se hallan opuestas, muy pequeñas y agudas; las *dos* restantes elípticas, cóncavas, derechas, erizadas, arrimadas entre sí, que abrazan el germen y persistentes.

El de la *flor* puesto encima, de una pieza, dividido en cinco partes, derechas, angostas, agudas é iguales.

COR. de un *petalo*, cónica inversa, medio hendida en cinco lacinias, obtusas, casi iguales y al doble mayores que el caliz de la flor.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, alesnados, insertos en el fondo de la corola, de los quales los *dos* son muy pequeños: y los *dos próximos* mas largos y más cortos que la corola: con las *anteras* comprimidas y rodaderas.

PIST. *Germen* casi redondo, baxo de la flor: *estilo* filiforme, recto, del largo de la corola y declinado: con el *estigma* globoso.

PERIC. *Baya* acorchada, aovada, que se cae facilmente, de tres celdillas, cubierta con el periantio del fruto erizado y glutinoso.

SEM. de dos en dos y casi redondas.

OBS. *La corola en forma de campana.* Syst. veg.

E S P E C I E.

- Bo- 1. LINNÆA *floribus* ge-
realis. *minatis.* Fl. lapp. 250. t. 12. X Linnea con flores melli-
f. 4. Fl. suec. 522. 562. t. 1. X zas.
Oed. dan. t. 3. Mat. med. X
180. X
Serpillifolia. Buxb. act. 2. X Planta con hojas como las
p. 346. t. 21. X del Sèropol.

Cam-

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 855

Campanula Serpillifolia. X Campanula con hojas co-
 C. B. P. 93. prodr. 35. Bauh. X mo las del Sérpol.
 hist. 2. p. 816. Tourn. 112.
 act. ups. 1720. p. 96. t. 1. X
Nummularia Noruegica, X Numularia de Noruega,
 flore purpureo. Kyll. act. X con la flor purpúrea.
 dan. 2. p. 346. f. C. X

Cast. Linnea boreal.

Habita en las selvas antiguas, musgosas, estériles y som-
 brias de Suecia, Siberia, Suiza, Rusia y Canadá. $\frac{h}{2}$
 Es planta siempre verde; con bayas secas, de tres celdillas
 y simientes mellizas.

PROPIED. Es algo amarga y astringente: diurética y ad-
 mirable en el reumatismo y en la sarna.

927. Género SIBTHORPIA. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, cónico inverso, abierto,
 partido en cinco hojuelas aovadas y persistentes.

COR. de un petalo, abierta, igual, del largo del caliz y
 dividida en cinco lacinias redondeadas.

ESTAMB. Filamentos quatro, capilares, y los dos acerca-
 dos: con las anteras entre de figura de corazon y
 oblongas.

PIST. Germen casi redondo, comprimido: estilo cilindri-
 co, mas grueso que los filamentos y del largo de la
 flor: con el estigma sencillo, en cabezuela y deprimi-
 do.

PERIC. Capsula comprimida, redonda, con dos bultos, y
 lados agudos, de dos ventallas, y dos celdillas, me-
 diante su disepimento transversal.

SEM. algunas, entre casi redondas y oblongas, por una
 parte convexas, y por la otra planas.

E S P E C I E S.

- Euro- I. SIBTHORPIA *foliis* X Sibthorpiá de hojas entre
 pua. *reniformi-subpeltatis cre-* X de figura de riñon y casi
natis. Amoen. acad. 3. p. 22. X abroqueladas, y recortadas.
 Loeß. it. 150.
- Chryso-splenium Cornu-* X Chryso-splenio de Cornu-
biense. Pet. herb. t. 6. f. 11. X bia.
- Alsine spuria, pusilla,* X Alsine espuria, pequenita,
repens, foliis Saxifragia X rastrera, con hojas como las
aureæ. Ray. angl. 3. p. 352. X de la Saxifragia de color de
 Pluk. alm. 23. t. 7. f. 6. X oro.

Cast. Sibthorpiá de Europa.

Habita en las márgenes de los rios de Cornubia y Debi-
 ona: en Portugal al pie de las murallas y montecillos
 siempre húmedos. ♀ ⊙

Echa la *raiz* alguna vez perenne con toda la planta: los
tallos numerosos, del largo de un pie, filiformes, la-
 xôs, pelosos, tendidos y que las mas veces arrojan raí-
 ces cerca de los peciolos: las *hojas* alternas, semejantes
 á las del *Chryso-splenio*, entre de figura de corazon y re-
 dondas, horizontales, hendidas en siete lóbulos; con
 los *laterales* mas pequeños, obtusos, del diametro de
 un guisante, y salpicados de cerditas sencillas de color
 de agua: los *peciolos* cortos y ascendentes: los *pedun-*
culos axilares, derechos, solitarios y del largo de la
flor; pero inclinados despues de haber florecido: el *caliz*
 dividido en cinco partes y con pelo áspero: la *corola*
 comunmente hendida en cinco lacinias, pequeña, de
 color que tira á purpúreo y su fondo purpúreo: y siem-
 pre con quatro *estambres* iguales.

Advierte *Loeßling* que la *flor* es sumamente pequeña,
 y que apenas se puede exâminar sin el auxîlio del micros-
 copio; por lo que es dificultoso tambien averiguar el nú-
 mero de los estambres, sin embargo de que, habiendo reco-
 nocido algunas, halló siempre quatro *estambres*, aunque
 los *dos* apenas eran notablemente mas largos.

De lo dicho se infiere claramente, que esta especie per-
 tenece mas bien á la Clase *Tetrandria* que á la *Didyna-*
mia. *Loeßl.*

Evol-
vulo a-
ca.

2. *SIBTHORPIA foliis* \times Sibthorpia con hojas en
reniformibus integerrimis. \times forma de ríñon y enterísi-
Suppl. p. 288. \times mas.

Cast. Sibthorpia como Evolvulo.

Habita en la Nueva Granada. Doct. Mutis.

Su traza es como la de la *Falkia* ó de un *Convolvulo me-*
nor; pero las flores son del género *Sibthorpia*, del qual
juzga *Linneo* ser esta especie, aunque las flores se esca-
pan de la vista.

Tiene los tallos herbáceos, postrados, rastreros y ro-
llizos: las hojas alternas, con peciolo, en forma de ríñon,
escotadas, enterísimas, y por debaxo algo tomentosas: las
flores axilares de la figura y magnitud de las de la *Sib-*
thorpia de Europa.

928. Género LIMOSELLA. * Plantaginella.

Dill. gen. 6.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, hendido en cinco partes,
derecho, agudo y persistente.

COR. de un petalo, en forma de campana, derecha, igual,
pequeña, hendida en cinco lacinias agudas y exten-
didas.

ESTAMB. Filamentos quatro, derechos, de los quales los
dos acercados á un mismo lado son mas cortos que la
corola: con las anteras sencillas.

PIST. Germen oblongo y obtuso: estilo sencillo, del largo
de los estambres y declinado: con el estigma glo-
boso.

PERIC. Capsula aovada, medio envuelta con el caliz, de
una celdilla y de dos ventallas.

SEM. muchas, y ovaes. Receptáculo aovado y muy gran-
de.

E S P E C I E S.

1. LIMOSELLA *foliis* \times Limosela con hojas lan-
 lanceolatis. Flor. dan. t. 69. \times ceoladas.

Aqua-
tica.

Li-

358 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Limosella foliis longe petiolatis, sive spathulatis. Crantz. austr. p. 353. Limosela de hojas con peciolo largo, ó en forma de espatula.

Limosella annua. Lind. alsat. 156. t. 5. Limosela annua.

Plantaginella. Hall. gen. 23. t. 6. f. 2. Plantaginela.

Plantaginella palustris. C. B. P. 100. Moris. hist. 3. p. 605. sect. 15. t. 2. f. 1. Plantaginela palustre.

Spergula perpusilla, lanceolatis foliis. Loes. pruss. 261. t. 81. Espergula muy pequeña, con hojas lanceoladas.

Alsine palustris, repens, foliis lanceolatis. Pluk. alm. 20. t. 74. f. 4. Alsine palustre, rastrera, con hojas lanceoladas.

Alsine palustris exigua, foliolis lanceolatis. Mentz. pug. 2. t. 7. f. 6. Alsine palustre, pequeña, con hojuelas lanceoladas.

Cast. Limosela aquatica.

Habita en lugares inundados de la Europa Septentrional. ☉ ♃

Dian- 2. LIMOSELLA *foliis sublinearibus.* Limosela con hojas casi lineares.

Cast. Limosela de dos estambres.

Habita en las playas del Cabo de Buena-esperanza. Kænig. Toda su traza es como la de la *Limosela aquatica*; pero quatro veces menor. Produce los *vástagos* rastreros como los de la antecedente, pero cortos: las *hojas radicales* lineares, muy poco ensanchadas por el medio y obtusas: las *flores* de dos estambres: los *escapos* capilares, con una flor y del largo de las hojas.

929. Género VANDELLIA. *Auct. cl. Brown.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , tubuloso , persistente , partido en quatro lacinias casi aovadas , iguales y la de mas arriba algo hendida en dos partes.

COR. de un *petalo* , boquiabierta : *tubo* de la longitud del caliz : *borde* pequeño ; con el *labio superior* aovado , entero ; y el *inferior* ensanchado y hendido en dos lóbulos.

ESTAMB. *Filamentos* quatro ; *dos* que salen del disco del labio inferior , arqueados por arriba ; y los *otros dos* que salen de la garganta y mas altos : con las *anteras* aovadas y unidas en pares.

PIST. *Germen* oblongo : *estilo* filiforme , de la longitud de los estambres : con dos *estigmas* aovados , membranosos y redoblados.

PERIC. *Capsula* oblonga , y de una celdilla.

SEM. muchas.

ESPECIE.

I. VANDELLIA.

X
X
X

Vandelia.

Cast. Vandelia difusa.

Habita en la Isla de Sto. Tomé. *D. Brown.*

Echa el *tallo* herbáceo , de quatro lados , con *ramas* opuestas en forma de aspa : las *hojas* aovadas , sin peciolo , recortadas y algo obtusas : las *flores* axilares , opuestas y solitarias : y su *traza* es como la de la *Veronica* con *hoja de Sérpol.*

930. Género STEMODIA. *Stemodiaca. Brown.*

t. 22. f. 2. Jacq. amer. 181.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , persistente , dividido en cinco partes , derechas é iguales.

COR. de un *petalo* , irregular : *tubo* del largo del caliz :
bor

860 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

borde casi de dos labios y derecho: el *labio superior* aovado y entero; el *inferior* partido en tres lacinias redondeadas é iguales.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, casi iguales, de la longitud del tubo, y todos hendidos en dos lacinias: con ocho *anteras* colocadas cada una en cada lacinia de los filamentos.

PIST. *Germen* algo obtuso: *estilo* sencillo, de la longitud de los estambres: con el *estigma* un poco obtuso.

PERIC. *Capsula* oblonga, aovada, de dos celdillas y dos ventallas.

SEM. numerosas, y globosas.

ESPECIE.

Mari-
tima.

1. **STEMODIA.** Amœn. X Estemodia.
acad. 5. p. 399. Jacq. amer. X
181. t. 174. f. 66. X

Stemodiaca maritima, X Estemodiaca maritima,
odorata, foliis minoribus, X olorosa, de hojas mas pe-
sessilibus, denticulatis, has- X queñas, sin peciolo, en for-
tatis, floribus solitariis ala- X ma de alabarda, con dien-
ribus. Brown. jam. 261. t. 22. X tecitos; flores solitarias y
f. 2. X axilares.

Scordium maritimum, fru- X Escordio maritimo, fruti-
ticosum, procumbens. Sloan. X coso, tendido.
jam. 66. hist. 1. p. 175. t. X
110. f. 2. X

Cast. Estemodia maritima.

Habita en la Jamaica.

931. Género OBOLARIA. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. ninguno; sino que lo sean dos bracteas.

COR. de un *petalo*, desigual: *tubo* á manera de campana, ventricoso, todo abierto: *borde* extendido, hendido en quatro lacinias, mas cortas que el tubo, hendidas en otras dos y laciniadas con alguna desigualdad.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, alesnados, que salen de las di-

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 86r

divisiones de la corola; y los próximos un poco mas largos: con las anteras pequeñas.

PIST. Germen aovado y comprimido: estilo casi cilindrico, de la longitud de los estambres: con el estigma hendido en dos partes, gruesecito y persistente.

PERIC. Capsula casi aovada, comprimida, ventricosa, de una celdilla, de dos ventallas, y con el disepimento contrario.

SEM. numerosas, pequeñas, y á manera de harina.

ESPECIE.

I. OBOLARIA. Hort. cliff. X Obolaria.

323. Gron. virg. 74.

Orobanche Virginiana, Orobanca de Virginia, radice coralloide, summo con la raiz como coral; y caule foliis subrotundis. hojas redondas en la sumidad del tallo.

Moris. hist. 3. p. 504. sect.

12. t. 16. f. 23. Pluk. alm.

273. t. 209. f. 6. Rai. Suppl.

p. 595.

Cast. Obolaria de Virginia.

Habita en la Virginia.

Tiene las hojas de mas arriba purpúreas por defuera: y las flores de color roxo-pálido.

932. Género OROBANCHE. † Tourn. t. 81.

Aphyllon. Mich. 25.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, hendido en cinco partes, derecho, de color y persistente.

COR. de un petalo, boquiabierta: tubo inclinado, ancho y ventricoso: borde extendido: el labio superior concavo, abierto y escotado; el inferior redoblado con su margen desigual, y hendido en tres laciniás casi iguales.

ESTAMB. Filamentos quatro, alesnados, recogidos debaxo del labio superior, de los cuales dos son mas largos; con

862 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

con las *anteras* derechas , arimadas entre sí y mas cortas que el borde.

Nectario una glandula , colocada en la base del germen.

PIST. *Germen* oblongo : *estilo* sencillo , de la longitud y direccion de los estambres : con el *estigma* medio hendido en dos partes , obtuso , gruesecito é inclinado.

PERIC. *Capsula* entre aovada y oblonga , puntiaguda , de una celdilla , y dos ventallas.

SEM. numerosas , y muy pequeñas. *Receptáculos* quatro lineares , laterales y pegados.

Obs. *Se hallan especies con las lacinias del estigma escotadas ; y el caliz y corola diversos.*

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 175.

La flor es de un petalo , anomala , personada y dividida en dos labios, de los cuales el superior es á manera de capacete , y el inferior dividido en tres partes. El pistilo pasa á fruto de una capsula (y una celdilla) que se abre en dos partes como si fuesen quillas y lleno de simientes menudisimas,

ESPECIES.

- Lævis. I. OROBANCHE *caule simplicissimo lævi, staminibus exertis.* Orobanca con el tallo muy sencillo , liso ; y estambres que salen fuera.
- Orobanche caule simplici, stipulis ternatis calyce quinquesido.* Hall. helv. n. 294. Orobanca con el tallo sencillo ; estipulas de tres en rama ; y caliz hendido en cinco lacinias.
- Orobanche caule simplici, cœruleo, bracteis brevibus.* Sauw. monsp. 4. Orobanca con el tallo sencillo , de color cerúleo ; y bractéas cortas.
- Orobanche majore flore.* C. B. P. 88. Moris. hist. 3. Orobanca con la flor mas grande.
- Orobanche magna, purpurea, Monspeulana.* Bauh. hist. 2. p. 782. Orobanca grande , purpúrea , de Mompeller.

Cast.

Cast. Orobanca lisa.

Habita en Mompellér, Suiza, Alemania y Austria: en Cataluña y otras partes de España.

Major.

2. OROBANCHE caule simplicissimo pubescente, staminibus subexertis. Loeffl. it. 151. Sabb. hort. 3. t. 11.

Orobanche caule simplici, stipula unica, calyce quadrifido. Hall. helv. n. 245.

Orobanche caule simplici, bracteis longioribus. Sauv. monsp. 5.

Orobanche major, Caryophyllum olens. C. B. P. 87. t. 176.

Orobanche I. Clus. hist. 1. p. 270. Riv. monop. t. 88.

Cast. Orobanca mayor, vulgo: Yerba Tora, Catalan. Frare.

Habita en campos y prados de Europa: en los circuitos de Madrid, en Aragon, Cataluña y otras muchas partes de España. ☉

Es planta parasitica ó que nace sobre las raices de otras plantas; especialmente sobre las de aquellas que producen las flores papilionaceas, como las habas y guisantes &c. á las quales ahoga causando sumo perjuicio á los cosecheros de estos granos.

Vease la Monografia de Orobanche escrita por Michel.

Americana.

3. OROBANCHE caule simplicissimo folio imbricato, corollis recurvatis, staminibus exertis.

Orobanca con el tallo muy sencillo, y cubierto de hojas que cogen unas parte de otras; corolas encorvadas ácia atrás; y estambres que salen fuera.

Cast. Orobanca de America.

Ha-

864 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Habita en la Carolina sobre las raíces de los árboles y arbustos. *¶ Garden.*

Produce los tallos muy sencillos, casi del grueso de un dedo, del largo de un gemo, rollizos, de color, xugosos, todos cubiertos con *hojas* que cogen unas parte de otras, entre aovadas y lanceoladas, sin peciolo, puntiagudas, derechas, de color y que se marchitan: la *espiga* sentada, terminal, de la longitud del tallo, y apiñada con flores y frutos: las *bracteas* solitarias, lanceoladas y apenas del largo de la corola: las *flores* casi sentadas: el *caliz* de una pieza, ventricoso y entero por su margen: la *corola* tubulosa y encorvada; con el *borde* mas angosto y boquiabierto: el *labio superior* mas largo; y el *inferior* dividido en dos partes y derecho. Toda la *planta* con la fructificacion es amarilla; y varía con las *hojas* obtusas.

Cer
nua. 4. OROBANCHE caule *simplicissimo*, corollis re-
curvatis, bracteis ovatis, corolla brevioribus, caule nudiusculo. Loeffl. it. 2. p. 152.

Orobanca con el tallo muy sencillo; corolas encorvadas ácia atrás; bracteas aovadas, mas cortas que la corola; y tallo algo desnudo ó con pocas hojas.

Cast. Orobanca cabizbaxa.

Habita en la Siberia: en el Real Sitio de Aranjuez sobre las raíces de la *Artemisia campestre de olor de carlina*, y en otros parages estériles de España.

Ra-
mosa. 5. OROBANCHE caule *ramoso*, corollis quinquefidis.

Orobanca con el tallo ramoso; y corolas hendidas en cinco lacinias.

Orobanche ramosa, floribus purpurascens. C. B. P. 88. Tourn. pt 176.

Orobanca ramosa, con flores de color que tira á purpúreo.

Orobanche minor, purpureis floribus, sive ramosa.

Orobanca menor, con flores purpúreas, ó ramosa.

Bauh. hist. 2. p. 781.

Orobanche III. Clus. hist. 1. p. 271.

Orobanca tercera.

Orobanche. Cam. epit. 311.

Goett. mem. 1746. t. 9.

Orobanca.

Cast.

Cast. Orobanca ramosa.

Habita en Europa : en Catalufia cerca de la Villa y rio de Tordera. ○

La flor varia con el color purpúreo , cerúleo ó blanco.

6. OROBANCHE caule ramoso , corollis quadridentatis.

Orobanche caule ramoso, floribus distantibus. Gron. virg. 168.

Orobanche minor, Virginiana, lignosior, per totum caulem floribus minoribus onusta. Moris. hist. 3. p. 502. sect. 12. t. 16. f. 9, Rai. Suppl. p. 595.

Orobanca de tallo ramoso ; y corolas con quatro dientes.

Orobanca con el tallo ramoso ; y flores apartadas.

Orobanca menor , de Virginia , mas leñosa y cargada por todo el tallo de flores mas pequeñas.

Cast. Orobanca de Virginia.

Habita en la Virginia.

7. OROBANCHE caule unifloro , calyce nudo.

Orobanche aut Helleborinae affinis , Marilandica , caule nudo , unico in summitate flore. Rai. Suppl. p. 595.

Gentiana minor , aurea, flore simplici , amplo , deflexo , pallide flavescente . Pluk. mant. 89. t. 348. f. 3.

Aphyllon. Michel. 25.

Orobanca con el tallo de una flor ; y caliz desnudo.

Orobanca ó planta parecida á la Heleborina , de Marilandia ; con el tallo desnudo ; y una sola flor en su remate.

Genciana menor , de color de oro , con la flor sencilla , ancha , inclinada y de color que tira á amarillo-roxo pálido.

Planta sin hojas,

Cast. Orobanca de una flor.

Habita en la Virginia.

Tiene una vayna como espata : la flor de color pálido cerúleo y cabizbaxa.

Virgiana.

Uniflora.

866 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Ægineua. 8. OROBANCHE *caule unifloro, flore subspathaceo.* Orobanca con el tallo de una flor casi como espata.

Æginetia. Sp. pl. i. p. 632. Egineta.

Tsiam-Cumulu. Rheed. mal. 11. p. 97. t. 47. Tsiam-Cumulu.

Cast. Orobanca Egineta.

Habita en Malabár.

Posee los tallos muy sencillos, apretados y rígidos, rollizos, señalados con tres líneas y de una flor, con una espata que la cubre: y carece de hojas.

Purpurca. 9. OROBANCHE *caule simplici ramosoque, corollis quadrifidis, staminibus calcaratis.* Orobanca de tallo sencillo y ramoso; corolas hendidas en quatro partes; y estambres con espolon.

Cast. Orobanca purpúrea.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

Su color es entre purpúreo y roxo. Tiene las flores grandes; y secándose se vuelve negra.

933. Género HYOBANCHE. †

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de siete hojuelas, lineares, puntiagudas, derechas y de la longitud de la corola.

COR. de un petalo, boquiabierta: con el labio superior arqueado y escotado: sin alguno inferior.

ESTAMB. Filamentos quatro, los dos mas cortos, insertos en la base de la corola y mediocres: con las anteras aovadas, inclinadas, y que se abren por el lado superior.

PIST. Germen aovado: estilo filiforme, encorvado por su ápice: con el estigma encrasado, obtuso y escotado.

PERIC. Capsula casi redonda, y de dos celdillas.

SEM. numerosas, y pequeñas.

E S P E C I E .

Sanguinea

1. HYOBANCHE, X Hyobanca,
Orobanche Mauritanica, X Orobancha de Mauritania,
flore purpureo. Pet.gaz. t.37. X con la flor purpúrea.
 f. 4. X

Cast. Hyobanca sanguinea.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza sobre las raices de varias plantas.

Toda su estatura es de *Orobancha*; pero de color de sangre.

Tiene el tallo del largo de medio pie, muy sencillo, leñoso y con hojas ó escamas densamente apiñadas, aovadas, convexas por defuera, lampiñas y obtusas: la espiga terminal, vellosa, de la longitud del tallo; pero tres veces mas ancha, con bracteas y flores apiñadas: las bracteas entre aovadas y oblongas, del largo del tubo de la flor y con pelo áspero por defuera: las flores solitarias y sentadas,

934. Género DODARTIA. * Tourn. t. 478.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, á manera de campana, con cinco dientes y diez ángulos, tubuloso, casi igual, plano y persistente.

COR. de un petalo, boquiabierta: tubo cilindráceo, inclinado y mucho mas largo que el caliz: labio superior pequeño, escotado y ascendente: el inferior extendido, mas ancho, al doble mas largo, obtuso y hendido en tres lacinias: con la intermedia mas angosta.

ESTAMB. Filamentos quatro, que suben ácia el labio superior y mas cortos que él: con las aneras pequeñas, casi redondas y mellizas.

PIST. Germen algo redondo: estilo alesnado, y de la longitud de la corola: con el estigma comprimido, oblongo, obtuso y hendido en dos laminitas arrimadas entre sí.

PERIC. Capsula globosa, y de dos celdillas.

SEM. numerosas, y muy pequeñas. Receptáculo convexo y pegado al disepimento.

La flor es de un petalo , anomala , personada , tubulosa , y dividida en dos labios ; de los quales el superior se halla hendido en dos partes , y el inferior en tres. Del caliz sale el pistilo , que pasa á fruto ó capsula casi redonda, dividida en dos celdillas y llena de simientes pequeñas.

ESPECIES.

Orientalis. 1. DODARTIA foliis linearibus integerrimis glabris. Mill. dict. n. 1. & ic. t. 27. Dodarcia con hojas lineares , enterisimas , y lampiñas.

Dodartia Orientalis , flore purpurascente . Tourn. cor. 47. it. 3. p. 208. t. 208. Dodarcia Oriental , con la flor de color que tira á purpúreo.

Cast. Dodarcia Oriental.

Habita en el monte Ararat , y en la Tartaria. ¶

Tiene la raiz rastrera : las flores alternas , racimosas , casi sentadas, y de color entre negro y purpúreo.

Indica. 2. DODARTIA foliis ovatis serratis villosis. Dodarcia con hojas aovadas , aserradas y vellosas.

Cast. Dodarcia de las Indias.

Habita en la India.

Arroja los tallos algo rollizos, vellosos y con pocas ramas: las hojas aovadas, con peciolo , obtusamente aserradas, vellosas y poco mas anchas de una pulgada : el racimo terminal , con hojas mas pequeñas : las flores opuestas, ladeadas y casi sin piecenco : el caliz obtuso y velloso: la corola de color amarillo-roxo ; con el labio exterior recto y corto.

935. Género LIPPIA. † *Houst. A. A.*

Jacq. amer. 176.

CAR. GEN. NAT.

- CAL. *Periantio* encima del germen, de dos hojuelas, apartadas, puntiagudas, aquilladas, derechas y persistentes.
- COR. de un *petalo*, desigual: *borde* hendido en quatro lacinias redondeadas; la *inferior* y *superior* mayores, y ésta derecha.
- ESTAMB. *Filamentos* quatro, mas cortos que la corola, de los quales dos son mas largos: con las *anteras* sencillas.
- PIST. *Germen* aovado, entre comprimido y plano: *estilo* filiforme, de la direccion y longitud de los estambres: con el *estigma* obliquo.
- PERIC. *Capsula* de dos ventallas, de una celdilla, comprimida, derecha, y coronada con el caliz á manera de escama.
- SEM. solitarias y oblongas.
- OBS. 1.^a Tiene muchas flores y frutos recogidos en cabezuela.
- OBS. 2.^a *Periantio casi redondo*, comprimido, membranoso en ambas márgenes, con quatro dientes y persistente. *Wegnisch.*

ESPECIES.

- Americana. 1. LIPPIA *capitulis pyramidatis*. X Lippia con cabezuelas en piramide.
- Lippia arborescens, foliis conjugatis oblongis.* X Lippia arborescente, con hojas conjugadas y oblongas.
- Mill. dict. n. 1. R. X

Cast. Lippia de America.

Habita en Vera-Cruz. †

Es *arbusto* que arroja los tallos rollizos, pálidos y comprimidos en sus nudos: las *hojas* entre lanceoladas y aovadas, desde la mitad aserradas, con peciolo, ásperas y opuestas: los *pedunculos* axilares, opuestos y muy

870 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

muy cortos : las *cabezuelas* apiñadas con innumerables escamas vueltas ácia atrás , de quatro lados , aovadas y de la magnitud de un guisante , con sus florecitas colocadas entre cada una de las escamas.

Hemis- 2. LIPPIA *capitulis he-* X Lippia con las cabezuelas
pne. *misphericis.* Jacq. amer. 176. X emisféricas.
ca. t. 179. f. 100. X

Cast. Lippia emisférica.

Habita en la America Meridional. *h*

Ovata. 3. LIPPIA *capitulis ova-* X Lippia con las cabezuelas
tis, foliis linearibus inte- X aovadas ; hojas lineares y
gerrimis. Burm. prodr. 17. X enterisimas.

Cast. Lippia aovada.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Es mata del largo de un pie , postrada , salpicada á trechos de nuditos en forma de guisantes , y con ramas rollizas. Echa las *hojas* esparcidas , lineares , algo xugosas y lisas : muchas *hojuelas* que salen de cada axila , mas pequeñas y alguna vez de tres en rama : las *piñas* terminales , aovadas y apiñadas con *bracteas* membranosas , aovadas , lampiñas , redobladas por su ápice y mas largas que el caliz tubuloso y de cinco dientes contenido en cada una de ellas : la *corola* en forma de embudo , hendida en cinco partes , y de color entre negro y purpúreo : los *estambres* puestos dentro del tubo de la corola : el *germen* unico : el *estilo* filiforme ; con el *estigma* sencillo.

Los que tengan ocasion de ver esta planta viva podrán asegurarse mas de su género.

Hir- 4. LIPPIA *hirsuta, foliis* X Lippia con pelo áspero ;
suta. *oblongis latis rugosis ser-* X hojas oblongas , anchas , ru-
ratis subtus tomentosis, pa- X gosás , aserradas , tomento-
niculis axillaribus , capitu- X sas por debaxo ; panojas axi-
lis ovatis. Suppl. p. 288. X lares ; y cabezuelas aovadas.

Cast. Lippia con pelo áspero.

Habita en la America. *Mutis.*

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 871

Produce el *tallo* de quatro lados y con pelo blanco: las *bojas* opuestas, pecioladas, oblongas, largas, aserradas, rugosas, pelosas por encima, y con tomento blanco por debaxo: muchos *pedunculos*, axilares, alargados en panoja y que se dividen en ramas: los *piececitos* terminados en cabezuelas aovadas, sostenidas con dos brácteas: las *flores* menudas y blancas.

936. Género SESAMUM. *

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, derecho, igual, cortísimo, persistente y partido en cinco lacinias, lanceoladas, con la de arriba mas corta.

COR. de un *petalo*, en forma de campana: *tubo* casi redondo y casi del largo del caliz: la *garganta* inflada, abierta, muy grande y declinada: *borde* hendido en cinco lacinias, de las cuales *quatro* se hallan extendidas, casi iguales, y la *quinta* de abaxo poco mas larga, aovada y recta.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, que salen del tubo, mas cortos que la corola, ascendentes, setáceos, de los cuales *dos interiores* son mas cortos; con un *rudimento* de quinto filamento: y las *anteras* oblongas, agudas y derechas.

PIST. *Germen* aovado, con pelo áspero: *estilo* filiforme, ascendente y poco mas largo que los estambres: con el *estigma* lanceolado y partido en dos laminitas paralelas.

PERIC. *Capsula* oblonga, de quatro lados poco manifiestos, comprimida, puntiaguda y de quatro celdillas.

SEM. muchas, y casi aovadas.

ESPECIES.

Oriental.

- I. SESAMUM *foliis ovato-oblongis integris*. Hort. cliff. 318. Mat. med. 180. Sesamo con hojas entre aovadas y oblongas, y enteras.
- Sesamum pedunculo inter duas glandulas*. Roy. lugdb. 262. Gron. orient. 76. Sesamo con el pedunculo puesto entre dos glandulas.

Se-

872 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

- Sesamum veterum*. C. B. X Sesamo de los antiguos.
 P. 27. X
Digitalis Orientalis, Sesamum dicta. Tourn. 165. X Dedalera Oriental, llama-
 da Sesamo. X
 Burm. Zeyl. 87. t. 38. f. 1. X
Sesamum. Bauh. hist. 2. X Sesamo.
 896. Dod. pempt. 532. X
Schit-elu. Rheed. mal. 9. X Schit-elu.
 p. 105. t. 54. X

Cast. Sesamo Oriental. *vulgo*: alegría.

Habita en Zeylan y Malabár: y se siembra con abundancia en varias partes de Andalucía. ○

Produce el tallo derecho, rollizo y peloso, con pocas ramas que salen de abaxo: las *hojas* opuestas, con peciolo, entre oblongas y aovadas, enterísimas, venosas y salpicadas de pelillos: las *flores* axilares y solitarias; con el *pedunculo* cortísimo, en cuya base se hallan dos *bracteas* lineares, cortas, y dentro de ellas una glándula, amarilla y horadada: el *caliz* dividido en cinco partes, casi igual y que se abre: la *corola* como la de la *Dedalera*, blanca, obtusa, con cinco lóbulos poco formados; y los *inferiores* mas extendidos y redondeados: quatro *estambres* de los quales los *dos* se hallan mas arriba y entre ellos un rudimento de filamento sin antera.

- Indi-
cum. 2. SESAMUM *foliis inferioribus trifidis*. Roy. X Sesamo con las hojas infe-
 lugdb. 292. X riores hendidas en tres par-
Sesamum Indicum. Rumph. X Sesamo de Indias.
 amb. 5. p. 204. t. 76. f. 1. X
Sesamum alterum, foliis trifidis, Orientale, semine obscuro. Pluk. alm. 344. t. X Otro Sesamo Oriental,
 109. f. 4. X con hojas hendidas en tres
 partes; y semilla obscura.
Digitalis Orientalis, altera, semine obscuro. Tourn. X Otra Dedalera Oriental,
 p. 165. X con la semilla obscura.

Cast. Sesamo de Indias.

Habita en la India. ○

937. Género MIMULUS. * Cynorrhynchium. Mich.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza, oblongo, prismático, de cinco ángulos y cinco pliegues, con cinco dientes, igual y persistente.

COR. de un *petalo*, boquiabierto: *tubo* de la longitud del caliz: *borde* de dos labios; el *superior* derecho, hendido en dos partes, redondeado y redoblado por sus lados; el *inferior* mas ancho, hendido en tres lacinias redondeadas: con la *intermedia* mas pequeña: el *paladar* convexo, hendido en dos partes y alargado desde la base del labio.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, filiformes, puestos dentro de la garganta y los dos mas cortos: con las *anteras* entre hendidas en dos partes, y de figura de risón.

PIST. *Germen* cónico: *estilo* filiforme, de la longitud de los estambres: con el *estigma* aovado, hendido en dos lacinias y comprimido.

PERIC. *Capsula* oval, de dos celdillas y cubierta.

SEM. muchas, y pequeñas.

ESPECIES.

Rin-
gens.

1. MIMULUS *erectus*, X Mimulo derecho, con ho-
foliis oblongis linearibus X jas oblongas, lineares y sen-
sessilibus. Hort. ups. 176. X tadas.

t. 2.
Euphrasia Floridana, Ly- X Eufrasia mas ramosa, de
simachie glabrae siliquosa X la Florida, con hojas como
foliis, quadrato caule, ramo- X las de la Lisimaquia lampi-
sior. Pluk. amalth. 83. t. 393. X ña siliquosa; y tallo qua-
drado.

f. 3.
Digitalis perfoliata, gla- X Dedalera perfoliada, lam-
bra, flore violaceo, minore. X piña, con la flor mas peque-
Moris. hist. 2. p. 479. sect. 5. X ña y de color de violeta.
t. 8. f. 6. Rai. hist. 769. X

Cast. Mimulo boquiabierto.

Habita en la Virginia y Canadá. 24

874 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

- L. u-
teus. 2. *MIMULUS repens*, fo-
liis ovatis. † Mimulo rastrero, con ho-
jas aovadas.
Gratiola foliis subrotun- Graciola con hojas casi re-
dis, nervosis, floribus luteis. dondas, nerviosas; y flores
Fewil. peruv. 2. p. 745. amarillas.
t. 34.

Cast. Mimulo amarillo.
Habita en el Perú.

938. Género RUELLIA. * *Plum.* 2. *Dill.*
elth. 248. 249.

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de una pieza, persistente, partido en cinco lacinias lineares, agudas, rectas y persistentes.
COR. de un *petalo*, irregular, abierta por su cuello inclinado: *borde* extendido, obtuso, hendido en cinco lacinias; con las *dos superiores* mas redobladas.
ESTAMB. *Filamentos* quatro, puestos en lo ancho del tubo, y acercados por pares: con las *anteras* apenas mas largas que el tubo.
PIST. *Germen* casi redondo: *estilo* filiforme, de la longitud de los estambres: con el *stigma* agudo, hendido en dos lacinias; y la *inferior* vuelta ácia dentro.
PERIC. *Capsula* rolliza, puntiaguda en ambas partes, del largo del caliz, de dos celdillas, de dos ventallas y que se abre elásticamente por sus uñas.
SEM. algunas, casi redondas y comprimidas.

ESPECIES.

- Ble-
chum. 1. *RUELLIA foliis ova-* Ruelia con hojas aovadas,
tis integerrimis, spicis ova- enterisimas; espigas aovadas;
tis, bracteis interioribus bracteas interiores mellizas;
geminis, floribus binis ses- flores de dos en dos y senta-
silibus. Amoen. acad. 4. p. das.
400.
Barleria pyramidata, flo- Barleria piramidal, con la
re cæruleo. Plum. gen. 31. flor cerúlea.
ic. 42. f. 3.

Ble-

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 875

Blechnum foliis oblongo-ovatis, spicis crassis, foliatis, conico-quadratis, subhirsutis. Brown. jam. 261. Blecho de hojas entre oblongas y aovadas; espigas crasas, foliosas, entre cónicas y cuadradas, y con algun pelo áspero.

Brunella elatior, flore albo. Sloan. jam. 65. hist. 1. p. 173. t. 109. f. 1. Brunela mas levantada, con la flor blanca.

Cast. Ruelia Blecho.

Habita en la America meridional. ¶

Echa los tallos postrados, ahorquillados, lisos y casi de quatro lados: las hojas opuestas, aovadas, algo vello-sas, enterisimas y con dientes desfigurados: los peciolo-s pestañosos: las espigas laxas, de quatro lados, forma-das de hojas florales de figura de corazon; con dos bracteas lanceoladas y cortas dentro de cada una, y dentro de éstas, dos flores sentadas, puestas una enfren-te de la otra.

Stre-pens.

2. *RUELLIA foliis petiolatis, pedunculis trifloris brevibus.* Ruelia con hojas peciola-das; pedunculos de tres flo-res y cortos.

Ruellia foliis petiolatis, floribus verticillatis subsessilibus. Hort. ups. 178. Ruelia de hojas con pecio-lo; flores en verticilo y casi sentadas.

Ruellia strepens, capitulis comosis. Dill. elth. 300. t. 249. f. 321. Sabb. hort. 2. t. 92. Ruelia ruidosa (ó que abre las capsulas con estrepito), de cabezuela con penacho.

Cast. Ruelia ruidosa.

Habita en la Virginia y Carolina. ¶

Tiene los tallos de quatro ángulos verdes: las hojas con pecioio, entre lanceoladas y aovadas, obtusamente aserradas, muy venosas, y con muy pocas pestañas: los pedunculos opuestos, laterales, cortos y de tres flo-res: dos bracteas opuestas, y otras dos debaxo de cada flor lateral: el caliz partido en cinco lacinias lanceola-das: la corola pálida, con el paladar que tira á color cerúleo: y los filamentos unidos por su base mediante una membrana.

RUEL-

876 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Clan-
de sti-
na.

3. *RUELLIA foliis petio-
latis , pedunculis longis
subdivisis nudis.* Hort. ups. Ruelia con hojas peciola-
das; pedunculos largos, sub-
divididos y desnudos.
179. Gov. illustr. 39.

*Ruellia capsulis tereti-
bus.* Dill. elth. 328. t. 248. Ruelia con las capsulas
rollizas.
f. 320.

Cast. Ruelia clandestina.

Habita en la Isla de la Barbada.

Habiendo florecido en el jardin de Mompellér , el primer año de haberse sembrado , produjo en las flores primordiales las *corolas* mas pequeñas que el caliz , y en las restantes mas largas que él. Gov.

Pani-
culata.

4. *RUELLIA foliis inte-
gerrimis , pedunculis dichotomis
lateralibus , calycibus sessilibus ,
lacinia suprema majore.* Ruelia con hojas enterisimas ;
pedunculos ahorquillados , laterales ;
cálices sentados , y su lacinia de mas
arriba mayor.

*Ruellia pedunculis multifloris
dichotomis folio longioribus.* Hort. cliff. 313. Ruelia con pedunculos de
muchas flores , ahorquillados ,
y mas largos que la hoja.

*Speculum Veneris , majus ,
impatiens.* Sloan. jam. Espejo de Venus , mayor ,
que abre la capsula con impetu.
59. hist. 1. p. 158. t. 100.
f. 2. Ray. Suppl. p. 389.

Cast. Ruelia en panoja.

Habita en la Jamaica. ¶

Es planta del largo de tres pies , con ramas derechas. Pósee las *hojas* algo ásperas ; las del *tallo* mayores y que se caen quando florece ; y las de las *ramas* que dexan la base del peciolo truncada , reduciendose á espina : los *pedunculos* opuestos , ahorquillados y del largo de los peciolos : las *bráctees* lanceoladas y tan largas como los pedunculos : las *corolas* de color que tira á purpúreo , y de dos labios ; con el *superior* hendido en dos partes ; y el *inferior* en tres iguales.

Tuberosa.

5. *RUPELLIA foliis ovatis crenatis, pedunculis unifloris.*

Ruelia con hojas aovadas, recortadas; y pedunculos de una flor.

Ruellia capsulis angulosis. Dill. elth. 328.

Ruelia con capsulas angulosas.

Ruellia humilis, flore caeruleo, Asphodeli radice. Plum. gen. 12.

Ruelia baxa, con la flor cerúlea; y raiz como la del Asfodelo.

Gentianella flore caeruleo, integro vasculo seminali ex humidi contactu impatiente.

Gencianela de flor cerúlea; y capsula entera, que al contacto de la humedad se abre con impetu.

Sloan. jam. 52. hist. 1. p. 149. t. 95. f. 1. Ray. Suppl. p. 370.

Cast. Ruelia tuberosa.

Habita en la Jamaica. 2

Tentaculata.

6. *RUPELLIA foliis obovatis, verticillis obvallatis spinis inermibus bifurcatis.* Amoen. acad. 4. p. 320.

Ruelia con hojas aovadas al revés; verticilos cercados de espinas que no punzan y ahorquilladas.

Euphrasia Acinos. Pluk. phyt. t. 279. f. 7.

Eufrasia Acinos.

Cast. Ruelia con tientos.

Habita en la India.

Ciliata.

7. *RUPELLIA foliis dentatis ciliatis, floribus oppositis.*

Ruelia con hojas dentadas, pestañosas; y flores opuestas.

Ruellia Persica. Burm. ind. 135. t. 42. f. 1.

Ruelia de Persia.

Cast. Ruelia pestañosa.

Habita en la India.

Arroja el tallo vellosos: las hojas opuestas, casi sin peciolo, lanceoladas, con dos ó tres dientes en ambas partes, puntiagudos y pestañosos: las flores axilares, sentadas y opuestas: el caliz con ángulos pestañosos y dientes cortos. No vió Linneo el fruto.

878 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Biflora 8. RUELLIA *floribus geminis sessilibus.* X Ruelia con flores mellizas y sentadas.
Ruellia minore folio, floribus gemellis. Dill. eith. X Ruelia con hoja mas pequeña, y flores mellizas,
 331. X

Cast. Ruelia de dos flores,
 Habita en la Carolina,

Crispa 9. RUELLIA *foliis subcrenatis lanceolato-ovatis, capitulis ovatis foliosis hispida, caule repente.* Osb. it. 240. X Ruelia con hojas algo recortadas, entre lanceoladas y aovadas; cabezuelas aovadas, foliosas, con pelo rígido; y tallo rastrero.
Adhatoda luzanensis, spica plana. Pet. gaz. t. 73. f. 6? X Adhatoda luzanense, con la espiga plana,

Cast. Ruelia rizada.
 Habita en la India. Osbeck. 2

Produce la raíz leñosa y rastrera: los tallos tambien rastreros, del largo de un dedo, muy sencillos, articulados y algo rollizos: las hojas entre lanceoladas y aovadas, crespas y recortadas, con peciolo corto, y salpicadas de pelos por su margen redoblada y ondeada: las cabezuelas puestas en los nudos, laterales, solitarias, aovadas, apinadas con hojas tambien aovadas, puntiagudas, ásperas, pelosas, dentro de las cuales se hallan las flores: el caliz partido en cinco lacinias, con pelo áspero y lineares: y la corola de color amarillo.

Re-panda. 10. RUELLIA *foliis lanceolatis obtuse dentatis petiolatis, caule repente.* X Ruelia de hojas lanceoladas, con dientes obtusos, pecioladas; y tallo rastrero.
 Burm. ind. t. 40. f. 2. X
Prunella Molucca. Rumph. X Prunela Moluca,
 amb. 6. p. 30. t. 13. f. B. X

Cast. Ruelia con hojas ondeadas por su margen,
 Habita en Java.

Es yerba rastrera que tiene los tallos herbáceos, filiformes, articulados y lisos: las hojas opuestas, con peciolo,

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 879

lo, lanceoladas, obtusas, lampiñas, con dientes desiguales y tambien obtusos: las *espigas* axilares, pedunculadas, con flores opuestas; las *bracteas* lineares, mas cortas; y los *calices* con aristas pelosas.

Rin-
gens.

11. RUELLIA *foliis oblongis integerrimis, floribus solitariis sessilibus, caule procumbente*. Osb. it. 229. Upudali. Rheed. mal. 10. p. 125. t. 64. Ruelia con hojas oblongas, enterisimas; flores solitarias, sentadas; y tallo tendido. Upudali.

Cast. Ruelia boquiabierta.
Habita en la India.

Tiene las *hojas* lanceoladas, y algo obtusas; dos *bracteas* sentadas, y mas cortas que el caliz.

Anti-
poda.

12. RUELLIA *foliis mucronato-serratis, caule repente, floribus subspicatis, terminalibus, quinis ternisve*. Fl. zeyl. 235. Ruelia con hojas terminadas en punta rígida y aserradas; tallo rastrero; flores casi en espiga, terminales, de cinco en cinco, ó de tres en tres.

Gentianella utriusque Indiae, impatiens, foliis Agerati, Snopgrass Barbadosibus. Pluk. mant. 167. t. 186. f. 2. Gencianela de ambas Indias, que abre la capsula impetuosamente, con hojas como las del Agerato; á la qual los de la Barbada llaman Snopgrass.

Peetianga pulpani. Rheed. mal. 9. p. 115. t. 59. Peetianga pulpani.

Cast. Ruelia Antipoda.
Habita en las Indias. ☉

Posee el *caliz* hendido en quatro partes: la *corola* en quatro lóbulos desiguales: la *capsula* de dos celdillas y de dos ventallas: y muchas *simientes* oblongas. Kænig.

- Re-
pens. 13. *RUELLIA foliis lanceolatis acuminatis integerrimis, floribus sessilibus, bracteis petiolatis calyce longioribus, caule repente.* Ruelia de hojas lanceoladas, puntiagudas, enterisimas; flores sentadas; bracteas con peciolo, mas largas que el caliz; y tallo rastre-
Burm. ind. 135. t. 41. f. 1. ro.

Cast. Ruelia rastretera.

Habita en la India.

Echa los tallos del largo de un palmo, herbáceos y rastreiros: las flores laterales, sentadas y solitarias: las bracteas de dos en dos, elípticas, con peciolo y mas largas que el caliz.

- Lit-
ralis. 14. *RUELLIA fruticosa, cana, foliis cuneiformibus serratis retusis glabris, floribus axillaribus solitariis subsessilibus.* Ruelia fruticosa, cana, con hojas en forma de cuña, aserradas, que terminan en seno obtuso, lampiñas; flores axilares, solitarias y casi sentadas.
Suppl. p. 289.

Cast. Ruelia de playas.

Habita cerca de Sadrass, en las playas del mar inundadas de agua marina. *Kœnig.* h

Es planta fruticosa, muy ramosa y deprimida, con ramas de quatro lados, articuladas y blanquecinas. Tiene las hojas en hacecillo en los renuevos, pequeñas, con peciolo corto, rígidas, en forma de cuña, algo carnosas, punteadas, polvoreadas con harina blanquecina y sus aserraduras apartadas: el caliz de cinco ángulos, tubuloso, hendido en cinco lacinias, estriadas, agudas y blancas: la corola tubulosa; con el borde á manera de campana, angulado, venoso, y hendido en cinco lacinias desiguales: los dos estambres mayores señalados por su base con un dientecito: la capsula entre linear y oblonga, y mas larga que el caliz.

- Di-
for-
mis. 15. *RUELLIA diffusa, hirsuta, foliis linearibus dentato-sinuatis integris, floribus verticillatis axillaribus.* Ruelia difusa, con pelo áspero; hojas lineares, entre dentadas y sinuosas, enteras; flores en verticilo y axilares.
Suppl. p. 289.

Nir-

Nir-Schulli. Rheed. mal. X Nir-Schulli,
v. 2. p. 89. t. 46. forte hu- X
jus varietas. X

Cast. *Ruelia* disforme.

Habita en la India.

Tiene las *hojas* lanceoladas , angostas , enteras , unas aserradas , y otras con dientes profundos y agudos.

Balsa- 16. *RUELLIA erecta glabra*, X *Ruelia* derecha , lampiña,
mica. *bra, foliis petiolatis lanceo-* X de hojas con peciolo, lanceo-
latis serratis, verticillis X ladas , aserradas ; y vertici-
sessilibus. Suppl. p. 289. X los sentados.

Cast. *Ruelia* balsámica.

Habita y es muy vulgar entre los arrozales de Indias , y particularmente despues de la siega. *Kænig*.

Produce los *tallos* deréchos , de quatro lados , lampiños , articulados , carnosos y de color : las *hojas* extendidas , entre lanceoladas y oblongas , lampiñas , glutinosas y con aserraduras muy delgadas : las *bracteas* enterisimas y las mas veces pestañosas : quatro *lacinijs del caliz* lanceoladas ; y la *quinta superior* mas ancha : la *corola* boquiabierta y amarilla : las *anteras* de color que tira á cerúleo : y el *estilo* con pelo rígido.

Es *planta* que en la India despide el olor fuerte de *Trementina*.

Uligi- 17. *RUELLIA diffusa*, X *Ruelia* difusa , con pelo
nosa. *hirsuta, foliis sessilibus* X áspero; hojas sentadas, oblon-
oblongis integris, spicis ter- X gas , enteras ; espigas termi-
minalibus tetragonis. Suppl. X nales y de quatro lados.
p. 290. X

Cast. *Ruelia* de sumideros.

Habita y es muy vulgar entre los arrozales de Tranquebar. *Kænig*.

Es *planta* pequeña y que florece en los meses de Enero y Febrero.

882 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Filosa. 18. *RUELLIA foliis oppositis ovatis integris ciliatis, floribus terminalibus solitariis.* Suppl. p. 290. X Ruelia con hojas opuestas, aovadas, enteras, pestañosas; flores terminales y solitarias.

Cast. Ruelia pelosa.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza, *Thunb.*

De-
pressa 19. *RUELLIA foliis oppositis petiolatis obovatis integris, caule arte depresso.* Suppl. p. 290. X Ruelia con hojas opuestas, pecioladas, aovadas al revés; y tallo estrechamente deprimido,

Cast. Ruelia deprimida.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza, *Thunb.*

Tiene el tallo apretado fuertemente á la tierra.

939. Género BARLERIA, † *Plum.* 31.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* persistente, partido en quatro hojuelas, con las *dos opuestas* mayores.

COR. de un *petalo*, en forma de embudo, casi igual, hendida en cinco lacinias, con la quinta mas profunda.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, filiformes, los *dos* cortísimos y capilares: con las *anteras superiores* oblongas; y las *inferiores* marchitas.

PIST. *Germen* aovado: *estilo* filiforme, de la longitud de los estambres: con el *estigma* hendido en dos partes.

PERIC. *Capsula* del largo del caliz, aguda, entre comprimida y quadrangular, de dos celdillas? de dos ventallas, sin uñas, y que se abre elásticamente.

SEM. dos, comprimidas y casi redondas.

ESPECIES.

Longi-
folia. 1. *BARLERIA spinis verticillorum senis, foliis ensiformibus longissimis scabris.* Amœn. acad. 4. p. 320. X Barleria con las espinas de los verticilos de seis en seis; hojas en forma de espada, larguissimas y ásperas.

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 883

Anchusa angustifolia, X Ancusa de hojas angostas;
verticillis longis aculeis ar- X y verticilos armados con
matis, Pluk. alm. 30. t. 133. X agujijones largos,
 f. 4. X

Cast. Barleria de hoja larga.

Habita en la India.

Tiene tres espinas en ambas partes del tallo, y del largo de los verticilos.

Sola-
nifolia. 2. BARLERIA *spinis* X Barleria con espinas axi-
axillaribus, foliis lanceola- X lares; hojas lanceoladas y
tis denticulatis. † X con dientecitos.

Barleria spinis axillari- X Barleria con espinas axi-
bus, foliis lanceolatis inte- X lares; hojas lanceoladas, en-
gerrimis, floribus verticil- X terisimas; flores en verticilo
latis sessilibus. Mill. dict. X y sentadas.

n. 3.

Barleria aculeata, Solani X Barleria con agujijones;
folio, angustiore, flore cæ- X hoja como la del Solano, mas
ruleo. Plum. gen. 31. ic 43. X angosta; y flor cerúlea,
 f. 2. X

Cast. Barleria con hoja de Solano.

Habita en la America austral.

Hys-
tix. 3. BARLERIA *spinis* X Barleria con espinas axi-
axillaribus geminis simpli- X lares, mellizas, sencillas;
cibus, foliis integerrimis X hojas enterisimas, entre lan-
lanceolato-ovatis. X ceoladas y aovadas.

Lycium Indicum, spinis X Licio de Indias, con es-
quaternis ad foliorum sin- X pinas de quatro en quatro
gulorum exortum. Seb. mus. X colocadas en el origen de ca-
 I. p. 21. t. 13. f. 1. X da una de las hojas.

Melampyro cognata, Ma- X Planta parecida al Me-
deraspatana, spinis horri- X lampiro, de Madraspatan,
da. Pluk. alm. 243. t. 119. X horrida por sus espinas.
 f. 5. X

Hystrix frutex. Rumph. X Arbusto llamado Erizo.
 amb. 7. p. 22. t. 13. X

Cast. Barleria erizo.

384 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Habita en la India. D. Royen. \mathcal{H}

Debe distinguirse con cuidado de la *Barleria prionitide*, por el *tallo* en varita y no firme; por las *ramas* casi de quatro lados y no rollizas; por las *hojas* en ambas partes lampiñas y no vellosas por debaxo: por las *espinas* axilares, de dos en dos, sencillas, sin piececito, horizontales y no derechas, ni compuestas de quatro en quatro, ni sostenidas por un mismo pie.

Prio-
nitis.

4. BARLERIA *spinis axillaribus pedatis quaternis, foliis integerrimis lanceolato-ovatis.* Barleria con espinas axilares de quatro en quatro, sostenidas en un mismo pie dividido; hojas enterisimas, entre lanceoladas y aovadas.

Coletta-veetla. Rheed. mal. 9. p. 77. t. 41.

Coletta-Veetla.

Cast. Barleria Prionitide.

Habita en la India. \mathcal{H}

Tiene quatro *espinas* sostenidas en un mismo pie: el *tallo* rollizo: y las *hojas* vellosas por debaxo.

Buxi-
folia.

5. BARLERIA *spinis axillaribus oppositis solitariis, foliis subrotundis integerrimis.* Barleria con espinas axilares, opuestas, solitarias; hojas casi redondas y enterisimas.

Barleria Americana, spinosissima, frutescens, Buxifolio parvo. Amm. herb. 104. Barleria Americana, muy espinosa, frutescente, con hoja como la del Box y pequeña.

Caraschulli. Rheed. mal. 2. p. 91. t. 47.

Caraschulli.

Cast. Barleria con hoja de Box.

Habita en las Indias.

Cris-
tata.

6. BARLERIA *foliis oblongis integerrimis, calycis foliolis duobus latioribus ciliatis, duobusque linearibus acutis.* Osb. it. 225. t. 8. Barleria con hojas oblongas, enterisimas; dos hojuelas del caliz mas anchas, pestañosas; y dos lineares y agudas.

Melampyro cognata, Ma-
deraspatis quam ipse parecida al Melampiro, la
habui. Moris. hist. 3. p. 429. qual recibió de Indias el mis-
 sect. 11. t. 23. f. 7. mo Morison.

Cast. Barleria crestada.

Habita en la India. \bar{h}

Posee el tallo rollizo : las hojas oblongas y aovadas, agu-
 das en ambas partes y enterisimas : las flores axilares y
 sentadas : el caliz partido en quatro hojuelas , dos aova-
 das, puntiagudas, entre aserradas y espinosas , y dos al-
 ternadamente mas cortas , lineares , agudas , enterisi-
 mas y extendidas : la corola cerúlea, de un petalo, dere-
 cha , en forma de embudo , abierta , hendida en cinco
 lóbulos aovados , casi iguales , y el quinto dividido mas
 profundamente : quatro estambres , dos de los cuales
 mas largos que el tubo de la corola ; con las anteras
 oblongas ; y dos cortísimos , puestos en el fondo de la
 misma corola ; con las anteras marchitas : el germen ao-
 vado : el estilo filiforme, de la longitud de los estambres
 mas largos ; con el estigma obtuso : la capsula tan
 larga como el caliz , comprimida , aguda , de dos cel-
 dillas y de dos ventallas en forma de navecilla , con su
 diseipimento longitudinal , y una espina elástica en una
 margen : y ultimamente dos simientes comprimidas en
 cada celdilla.

Coc-
 sinea. 7. BARLERIA *inermis*, Barleria inerme , de hojas
foliis ovatis denticulatis pe- aovadas , con dientecitos y
tiolatis. pecioladas.
Barleria Solani folio, flo- Barleria con hoja como la
re coccineo. Plum. gen. 31. del Solano ; y flor coccinea.
 ic. 43. f. 1.

Cast. Barleria coccinea.

Habita en la America meridional.

Nocti-
hora.

8. *BARLERIA spinis axillaribus ramosis, foliis lanceolatis integerrimis cuspidatis, bracteis ovatis scariosis, tubo elongato.* Suppl. p. 290. Barleria con espinas axilares, ramosas; hojas lanceoladas, enterisimas, con puntas; bracteas aovadas, escariosas ó membranosas; y tubo alargado.

Cast. Barleria que florece de noche.

Habita en los sitios áridos de Tanschaur. *Kænig.*

Echa las *espinas* ramosas: las *hojas* lanceoladas y que rematan en punta rígida: las *bracteas* lampiñas: las *flores* de color cerúleo y semejantes á las de la *Barleria con hoja de Box*, pero mas largas.

Pun-
gens.

9. *BARLERIA foliis ovatis acutis pungentibus, bracteis ciliatis, spina nulla.* Suppl. p. 290. Barleria con hojas aovadas, agudas y que punzan; bracteas pestafiosas y sin espinas.

Cast. Barleria que punza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Longi-
fiora.

10. *BARLERIA inermis, foliis ovatis sericeis, bracteis cordatis scariosis, corollis longissimis.* Suppl. p. 290. Barleria inerme, de hojas aovadas, con vello como sericeas; bracteas de figura de corazón, escariosas; y corolas muy largas.

Cast. Barleria de flores largas.

Habita en el monte de Santo Tomé, de Malabár. *Kænig. f.*

Tiene el *tallo* sufruticoso: las *ramas* rollizas, con vello como seda y las mas veces opuestas: las *hojas* tambien opuestas, pecioladas, exáctamente aovadas, enterisimas, y muy blandas con vello como seda: las *flores* terminales: las *bracteas* de dos en dos, ó de dos ventallas, de figura de corazón, paralelas, en redecilla, escariosas, algo obtusas, sentadas, casi de la magnitud de las hojas: con otras quatro *bracteas* baxo de ellas, puestas en cruz, lineares, del largo de las hojas, extendidas y con vello como seda: las *corolas* largas: el *tubo* filiforme, abierto y hendido en cinco laciniás.

946. Género MILLINGTONIA. *Suppl. p. 45.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , en forma de campana y corto , con la margen ó ribete redoblado y de cinco dientes.

COR. de un *petalo* , regular : *tubo* larguísimo , filiforme : con el *borde* partido en quatro lacinias , oblongas y enteras.

ESTAMB. *Filamentos* quatro , puestos en el lado superior de la corola , mas cortos que el borde de ella , convergentes por pares con las anteras , de los cuales *dos* son mas cortos y filiformes: las *anteras* divididas en dos partes y que se abrazan : la *exterior* oblonga , recta , obtusa y que se abre longitudinalmente : la *menor* que sale de la base de la mayor , alesnada y encorvada.

PIST. *Germen* linear : *estilo* filiforme , mas largo que los estambres y la flor : *estigma* aovado , de dos ventallas , iguales , aovadas , planas y algo abiertas.

PERIC. Acaso es siliqua ?

SEM......

E S P E C I E .

Hor- tensis.	I. MILLINGTONIA. Sup- pl. p. 291.	X X X X X	Milingtonia.
	<i>Oviæ affinis</i> . Koenig. lit.		Planta parecida á la Ovie- da.

Cast. Milingtonia hortense.

Habita.....: Se cultiva en los jardines de Tanschaur donde la observó *Koenig* , pero siempre sin fruto.

Es *arbol* grande y muy hermoso. Tiene las *hojas* compuestas y dos veces pinnadas : las *hojas inferiores* alargadas y pinnadas en impar : las *hojuelas* aovadas , puntiagudas , enterisimas , venosas , y lampiñas en ambas partes: la *panoja* terminal , grande , lampiña , con flores opuestas : la *corola* larguísima , blanca , muy olorosa y semejante á la de la *Oviæ* : las *anteras* de una en una , con un diente encorvado que sale del lado exterior de ella.

Gé-

941. Género DURANTA. Castorea. Plum. 17.

Ellisia. Brow. 29. f. 11.

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de una pieza , tubuloso , algo truncado y hendido en cinco partes.
- COR.** de un *petalo* : tubo mas largo que el caliz , algo encorvado : *borde* extendido , partido en cinco lacinias casi iguales y redondeadas.
- ESTAMB.** *Filamentos* quatro , con los dos mas largos dentro del tubo : y las *anteras* casi redondas.
- PIST.** *Germen* debaxo de la flor , casi redondo : *estilo* filiforme , del largo de los estambres : con el *estigma* gruesecito.
- PERIC.** *Baya* un poco redonda , y cubierta con el caliz.
- SEM.** *Almendras* quatro , y de dos celdillas.

E S P E C I E S.

- Plu-
mieri. 1. DURANTA *calycibus* } Duranta con los cálices
frutescentibus contortis. } retorcidos en el fruto (por
} su extremo).
- Duranta calycibus in* } Duranta con los cálices
fructu contortis. Jacq. amer. } retorcidos en el fruto (por
186. t. 176. f. 76. } su extremo).
- Duranta spinosa.* Sp. pl. } Duranta espinosa.
1. p. 637.
- Castorea repens* , *spinosa.* } Castorea rastrea, espino-
Plum. gen. 30. ic. 79. } sa.
- α *Duranta inermis.* Sp. pl. } Duranta inerme. α
1. p. 637.
- Castorea racemosa* , *flore* } Castorea rracimosa , con la
cæruleo , *fructu croceo.* Plum. } flor cerúlea ; y fruto de co-
gen. 30. ic. 79. } lor de azafran.

Cast. Duranta de Plumier.

Habita en la America meridional. *h*

- Ellisia. 2. DURANTA *calycibus frutescentibus rectis.* Duranta con los cálices rectos en el fruto (por su extremo).
- Duranta in fructu rectis.* Duranta con los cálices en el fruto rectos.
- Jacq. amer. 187. t. 176. f. 77.
- Ellisia acuta.* Amoen. acad. Ellisia aguda.
5. p. 400. Loeff. it. 194.
- Ellisia frutescens, quandoque spinosa, foliis ovatis utrinque acutis, ad apicem serratis, spicis alaribus.* Brow. jam. 262. t. 29. f. 1. Ellisia frutescente, algunas veces espinosa, con hojas aovadas, agudas en ambas partes, aserradas por su ápice; y espigas axilares.

Cast. Duranta de Elisio.
Habita en la Jamaica. $\frac{h}{2}$

- Mutisi. 3. DURANTA *foliis ellipticis integerrimis.* Suppl. Duranta con hojas elípticas y enterisimas.
- pl. p. 291.

Cast. Duranta de Mutis.
Habita en la America meridional. Mutis. $\frac{h}{2}$
Solo se diferencia por las hojas, de la *Duranta de Plumier* y de la de *Elisio*.
Todas las especies de *Duranta* tienen espinas sobre las axilas y son tan semejantes en la inflorescencia, estructura y color de la flor, que facilmente creeria *Linneo* fuesen todas de una misma especie. Suppl. p. 291.

942. Género OVIEDA. † Valdia. Plum. 24.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, hendido en cinco partes, de figura de campana, agudo, derecho, algo ancho, corto y persistente.

COR. de un petalo, boquiabierto: tubo larguísimo, angosto, y casi cilindrico: borde corto y hendido en tres lóbulos casi iguales.

890 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

ESTAMB. *Filamentos* quatro , mas largos que la corola : con las *anteras* casi redondas.

PIST. *Germen* debaxo de la flor , globoso : *estilo* filiforme, de la longitud de los estambres : con el *estigma* hendido en dos partes agudas.

PERIC. *Baya* globosa , metida dentro del caliz mas crecido en forma de campana y derecho.

SEM. dos , y aovadas.

ESPECIES.

Spi-
nosa. 1. OVIEDA *foliis ovali-* X Ovieda con las hojas ova-
bus dentatis. X les y dentadas.
Valdia Cardui folio, fruc X Valdia con hoja de cardo;
tu subcæruleo. Plum. gen. X y fruto casi cerúleo.
14. ic. 256. X

Cast. Ovieda espinosa.

Habita en la America meridional. \bar{h}

Posee las *hojas* opuestas , con peciolo , oblongas y dentadas ; y las *flores* en corimbo.

Mitis. 2. OVIEDA *foliis lanceo-* X Ovieda con hojas lanceo-
latis subrepandis. Burm. X ladas y algo ondeadas por
ind. t. 43. f. 1. X su margen.

Cast. Ovieda sin espinas.

Habita en Java. \bar{h}

Es *arbusculo* que tiene las *hojas* opuestas , con peciolo, lam-pifias y muy largas : los *corimbos* ahorquillados : y el *tubo* de la corola larguísimo.

943. Género VOLKAMERIA. * Duglassia.

Houst. A. A.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , cónico inverso , hendido en cinco lacinias casi iguales y agudas.

COR. de un *petalo* , boquiabierta : *tubo* cilindráceo , al doble mas largo que el caliz : *borde* casi igual , plano , partido en cinco lacinias , dobladas ácia un lado y que

que se abren mayormente por el lado superior-
ESTAMB. *Filamentos* quatro, filiformes, larguissimos, pues-
 tos en el lado de la corola que se abre, ó inclinados
 al lado opuesto: con las *anteras* sencillas.

PIST. *Germen* de quatro lados: *estilo* filiforme, casi del
 largo de los estambres: con el *estigma* hendido en
 dos lacinias, la una aguda y la otra poco manifiesta.

PERIC. *Baya* ó *Drupa* casi redonda, de dos celdillas, y
 con quatro sulcos.

SEM. *Nuez* solitaria, de dos celdillas y asulcada.

ESPECIES.

- 1. VOLKAMERIA spinis** *spinis* Volkameria con espinas
petiolorum rudimentis. Jacq. en los principios de los pe-
 amer. 185. t. 117. ciolos.
- Clerodendrum fruticosum,* Clerodendro fruticoso, es-
spinosum, foliis inferiori- pinoso, con las hojas infe-
bus confertis, superioribus riores amontonadas y las su-
oppositis, pedunculis tri- periores opuestas; peduncu-
partitis, trifloris, alaribus. los divididos en tres partes,
 Brow. jam. 262. t. 20. f. 2. de tres flores y axilares.
- Duglassia spinosa, Li-* Duglasia espinosa, con
gustri folio. Amm. herb. hoja como la del Aligustre.
 576.
- Ligustrum aculeatum,* Aligustre con agujijones,
fructu testiculato. Plum. sp. y fruto como testiculo.
 17. ic. 164. f. 1.
- Paliuro affinis, Ligustri* Planta parecida al Paliu-
folia, spinosa, flore mono- ro, espinosa, con hoja como
petalo, difformi. Sloan. jam. la del Aligustre; flor de un
 137. hist. 2. p. 137. t. 166. petalo, y disforme.
 f. 2. 3. Rai. dendr. 95.

Cast. Volkameria con agujijones.

Habita en las Islas de la Jamaica y Barbada. $\frac{1}{2}$

- 2. VOLKAMERIA ramis** *ramis* Volkameria con ramas.
inermibus. Fl. Zeyl. 231. inermes.
- Jasminum litoreum.* Rum- Jazmin de playas.
 ph. amb. 5. p. 86. t. 46.

892 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Jasmini flore, frutex *Filippensis*, foliis floribusque fere ternis. Pet. gaz. t. 42. f. 7.

Arbusto de las Filipinas, con flor como la del Jazmin; hojas y flores casi de tres en tres.

Nir-Notsiit. Rheed. mal. 5. p. 97. t. 49. E. Burm.

Nir-Notsiit.

Cast. *Volkameria inerme*.

Habita en la India. ♀

Ser-rata.

3. VOLKAMERIA *foliis lato-lanceolatis seratis subsessilibus*.

Volkameria con hojas entre anchas y lanceoladas, aserradas, y casi sin peciolo.

Cast. *Volkameria aserrada*.

Habita en la India. ♀

Produce las ramas algo rollizas : las hojas casi pecioladas, entre anchas y lanceoladas, desnudas en ambas partes y aserradas : la panoja con ramitas opuestas en forma de aspa : las bayas compuestas de quatro : los cálices en forma de campana , indivisos y apenas con diente alguno.

Scandens.

4. VOLKAMERIA *foliis petiolatis cordatis ovatis integerrimis, panicula corimbosa terminali, ramulis dichotomis*. Suppl. p. 292.

Volkameria con hojas pecioladas, de figura de corazon, aovadas, enterisimas; panoja corimbosa terminal; y ramitas ahorquilladas.

Cast. *Volkameria trepadora*.

Habita en varias selvas de Zeylan , cerca del grande rio Monesi-Moti-Kandel. *König*.

Es arbol que trepa , con ramas muy largas , ondeadas , de quatro lados y tomentosas por su remate. Echa las hojas grandes , muy lampifias , opuestas , obtusas , entre de figura de corazon y aovadas : la panoja corimbosa , terminal y tomentosa : las flores no tan largas como las de la *Volkameria inerme* : los cálices obtusos y tomentosos : la capsula oblonga y cónica.

Trepa sobre los árboles mas altos y los corona con sus flores de color de nieve.

944. Género CLERODENDRUM. † *Burm. Zeyl.* 29.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , en forma de campana , partido en cinco lacinias , entre aovadas y agudas , mas anchas que el tubo de la corola y persistentes.

COR. de un *petalo* , irregular : *tubo* delgado y largo : *borde* partido en cinco lacinias iguales , con las superiores mas profundamente separadas.

ESTAMB. *Filamentos* quatro , filiformes, mucho mas largos que la corola , puestos entre las lacinias de la corola mas abiertas , de los cuales los *dos* son mas cortos : con las *anteras* sencillas.

PIST. *Germen* casi redondo : *estilo* de la figura , longitud y direccion de los estambres : con el *estigma* sencillo.

PERIC. *Drupa* (*Baya*) casi redonda , puesta sobre el caliz grande.

SEM. una sola , y casi redonda.

E S P E C I E S .

I. CLERODENDRUM

foliis cordatis tomentosis . Clerodendro con hojas de figura de corazon y tomentosas.

Fl. Zeyl. 232. *Burm. ind.* 137.

Petasites agrestis . Rum-

ph. amb. 4. p. 108. t. 49.

Peragu. *Rheed. mal.* 2.

p. 41. t. 25. *Kai. hist.* 1571.

Clerodendrum folio lato

& *acuminato* . *Burm. zeyl.* 66.

t. 29.

Clerodendro con hojas de figura de corazon y tomentosas.

Petasite agreste.

Peragu.

Clerodendro con hoja ancha y puntiaguda.

Cast. Clerodendro desventurado,

Habita en la India. $\frac{h}{2}$

Los muchachos de Indias creen puerilmente que el dia en que cortan alguna flor de este arbol , han de quebrar tambien en sus casas algun vaso ú otro utensilio.

Infor-
tu a-
tum.

α

894 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Fortu- 2. CLERODENDRUM X Clerodendro con hojas lan-
 natum. *foliis lanceolatis integerrimis*. Amœn. acad. 4. p. 320. X
 Osb. it. 228. t. 11. Burm. X
 ind. 137. X

Cast. Clerodendro dichoso.
 Habita en la India. h

Ca- 3. CLERODENDRUM X Clerodendro de hojas ova-
 la mi- *foliis ovalibus subdentatis nudis*. X les, con algun diente y des-
 tosun. *nudis*. X nudas.
Volkameria alternifolia. X Volkameria con hojas al-
 Burm. ind. 137. t. 44. X ternas.

Cast. Clerodendro calamitoso.
 Habita en Java. D. Baster. h

Echa las *hojas* opuestas, pecioladas, aovadas ú ova-
 les, entre aserradas y casi con dientes, y desnudas por am-
 bas partes: la *panoja* con ramas opuestas en forma de
 aspa: y las *flores* un poco mas pequeñas que las de las
 otras especies de su mismo género,

Pa- 4. CLERODENDRUM X Clerodendro con hojas
 nicula- *foliis lobatis serratis, pan-* X hendidas en lóbulos, aserra-
 tum. *nicula amplissima*. X das; y panoja muy ancha.
Volkameria multiflora. X Volkameria de muchas flo-
 Burm. ind. 137. t. 45. f. 1. X res.

Cast. Clerodendro en panoja.
 Habita en la India. h

Posee el *tallo* asurcado en quatro partes; las *hojas* opues-
 tas, de figura de corazon, hendidas en tres ó cinco ló-
 bulos y aserradas: la *panoja* muy extendida; con *ra-*
mas dos veces ahorquilladas y despues ramosas.

Phlo- 5. CLERODENDRUM X Clerodendro con hojas ao-
 mis. *foliis ovatis serratis canis*. X vadas, aserradas y canas,
 Suppl. p. 292. X

Cast. Clerodendro como Phlomis.
 Habita en la India. Kœnig. h

Es *arbus*to cano, y produce las *hojas* pecioladas, opues-
 tas,

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 895

tas , pequeñas , exáctamente aovadas , vellosas y canas con algunas aserraduras en medio ; las *panojas* en la sumidad de las ramas axilares , solitarias , opuestas , de pocas flores , ahorquilladas y que unidas constituyen una grande panoja : las *bracteas* de dos en dos en toda la horquilladura , aovadas y enteras : el *caliz* hendido hasta la mitad , con sus lacinias alesnadas y extendidas : el *tubo* blanco , delgado y enxuto.

945. Género THUNBERGIA. *Suppl. p. 46.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* doble :

El *exterior* de dos hojuelas , aovadas , obtusas , con cinco nervios y casi de la longitud del tubo.

El *interior* de una pieza , partido casi en doce lacinias alesnadas y tres veces mas cortas que el periantio exterior.

COR. de una pieza , á manera de campana : *tubo* gradualmente ensanchado : *borde* hendido en cinco lacinias iguales , aovadas , muy obtusas y al doble mas cortas que el tubo.

ESTAMB. *Filamentos* quatro , insertos en el tubo , y los dos mas cortos : con las *anteras* aovadas.

PIST. *Germen* dentro de la flor : *estilo* filiforme , y mas corto que el tubo : con el *estigma* hendido en dos lóbulos.

PERIC. *Capsula* globosa , con pico , de dos celdillas , y que se abre longitudinalmente.

SEM. de dos en dos en cada celdilla , en forma de riñon , algo rugosas y convexás.

ESPECIE.

Ca-
pensis. I. THUNBERGIA. Sup-^X_X_X Thunbergia.
pl. p. 292.

Cast. Thunbergia del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Es *planta* tan semejante á las especies de *Barleria* que nadie creeria fuese diversa , sino atendiese al caliz doble.

896 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

ble. Echa el *tallo* de quatro lados, difuso y con pelo áspero: las *hojas* opuestas con el pecioio muy corto, aovadas, enterisimas, obtusas, de cinco nervios, venosas, lampiñas por encima, con pelo áspero por debaxo y derechas: los *pedunculos* de la longitud de las hojas ó mas largos, solitarios y de una flor: las *bracteas* de dos en dos, aovadas, con pelo áspero y del largo del tubo: el *caliz* que se engrandece en el fruto: la *corola* amarilla; y la *capsula* lampiña, alesnada y dividida en dos partes.

946. Género CASTILLEJA. *Suppl. p. 47. Mutis.*

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de una pieza, tubuloso, angostado en el lado de la parte superior, que se abre longitudinalmente y de color.
- COR.** de un *petalo*, boquiabierto: *labio superior* mas largo, acanalado, como si fuese hoja y apoyado con el caliz; *labio inferior* con dos glandulas tubulosas, hendidas en tres partes y muy menudas.
- ESTAMB.** *Filamentos* quatro, los *dos* mas largos y de la longitud de la corola: con dos *anteras* en cada filamento; y la *una* de ellas mas alta.
- PIST.** *Germen* dentro de la flor, y oblongo: *estilo* filiforme, igual á la corola: con el *estigma* obtuso.
- PERIC.** *Capsula* entre aovada y oblonga, comprimida, de dos celdillas, y con el *diseamiento* contrario.
- SEM.** numerosisimas y muy pequeñas.

ESPECIES.

Fissi-
folia.

1. CASTILLEJA *foliis linearibus integris apice trifidis, floribus racemosis interaspersis bracteis trifidis.* *Suppl. p. 293.*

Icon. Mutis. amer. vol. 1. t. 11.

Castilleja de hojas lineares, enteras, hendidas en tres partes por su ápice; flores racimosas, con bracteas interpuestas, hendidas tambien en tres partes.

La figura que dió Mutis.

Cast.

Cast. Castilleja con hoja hendida.

Habita en la nueva Granada. Mutis. *fl*

Arroja el tallo herbáceo ó sufruticoso, del largo de tres pies, derecho, algo rollizo y un poco ramoso: las hojas alternas, sin peciolo, extendidas, lineares, y con tres nervios, del largo de una pulgada y hendidas por el ápice en tres hasta siete partes: los rudimentos de las ramitas con hojas en hacecillo que salen de las axilas: ninguna *estipula*: el racimo terminal, con piecitos solitarios y de una flor: el caliz con orejillas y que sostiene á manera de una quilla al capacete de la corola: el labio inferior de la corola con dos glandulas (ó formado de dos glandulas?) hendidas en tres partes, tubulosas y menudas: y ocho anteras en quatro filamentos.

Inte-
rifo-
lia. 2. CASTILLEJA *foliis* } Castilleja con hojas entre
linearis-subulatis integerrimis, bracteisque indivisis. } lineares y alesnadas, enteri-
 Suppl. p. 293. } simas; y bracteas indivisas.
 Icon. Mutis. amer. vol. 1. } La figura que dió Mutis,
 t. 12. }

Cast. Castilleja con hojas enteras.

Habita en la America meridional. Mutis.

Es muy parecida á la primera especie; pero mas pequeña y con el racimo mas alargado. Acaso es variedad de ella?

947. Género VITEX. * Tourn. t. 373.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza, tubuloso, cilindráceo, cortísimo y con cinco dientes.

COR. de un petalo, boquiabierto: tubo cilindráceo, delgado: bord: plano, de dos labios; el superior hendido en tres lacinias; con la del medio mas ancha: el inferior hendido en otras tres, y la del medio mas grande.

ESTAMB. Filamentos quatro, capilares, poco mas largos que

898 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

que el tubo , de los cuales *dos* son mas cortos : con las *anteras* versátiles.

PIST. *Germen* casi redondo : *estilo* filiforme , del largo del tubo : con dos *estigmas* alesnados y extendidos.

PERIC. *Baya* globosa , y de quatro celdillas.

SEM. solitarias , y aovadas.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 603.

La *flor* es de un petalo , casi de dos labios , tubulosa por debaxo ; de cuyo caliz sale el pistilo , que pasa á fruto casi esférico , dividido en quatro celdillas y lleno de simientes oblongas.

E S P E C I E S .

Agnus castus

1. VITEX *foliis digitatis serratis , spicis verticillatis*. Mat. med. 180. Vitex con hojas divididas como en dedos , aserradas ; y espigas en verticilo.

Vitex. Cam. epit. 105. Vitex.

Roy. lugdb. 29 r. Dod. pempt.

774.

Vitex foliis angustioribus , Cannabis modò dispositis. C. B. P. 475. Tournef. Vitex con hojas mas angostas y dispuestas como las del cañamo.

p. 603.

2. Agnus folio non serrato. Agno con hoja enterisima. α

Bauh. hist. 1. p. 205.

Vitex latiore folio. C. B. Vitex con hoja mas ancha.

P. 475. Tourn. p. 603.

Vitex folio serrato. Bauh. Vitex con hoja aserrada.

hist. 1. p. 205.

Cast. Vitex agno casto. vulgo : Sauzgatillo.

Habita en lugares húmedos de Sicilia y Nápoles : de Aragon , Cataluña y otras muchas partes de España. ζ

PROPIED. La semilla es acre y algo astringente : se usa en el histerico y gonorrhœa.

Tri-folia.

2. VITEX *foliis ternatis , quinatisque integerrimis , paniculis dichotomis*. Vitex con unas hojas de tres y otras de cinco en rama , enterisimas ; y panojas aborquilladas.

Vitex trifolia minor, *In-* X *Vitex* menor, de Indias,
ca. Pluk. alm. 390. t. 206. X con hojas de tres en rama.
f. 5. Burm. zeyl. 229. t. 109.
ind. 137.

Vitex foliis ternatis, qui- X *Vitex* de hojas de tres y
natisque, foliolis ovatis acu- X de cinco en rama, con ho-
tis integerrimis, subtus X juelas aovadas, agudas, en-
canescentibus, panicula ra- X terisimas, y por debaxo blan-
chi recta, pedicellis dicho- X quecinas; panoja con su ra-
tomis. Suppl. p. 293. X chis ó receptáculo comun
 recto; y piececitos ahorqui-
 llados.

Piperi similis, fructus X Fruto estriado, semejante
striatus. C. B. P. 412. X á la pimienta.

Lagondium vulgare. Rum- X Lagondio vulgar,
ph. amb. 4. p. 48. t. 18.

Caranosi. Rheed. mal. 2. X Caranosi,
p. 13. t. 10. Rai. hist. 1575. X

Cast. *Vitex* con hoja de tres en rama.

Habita en la India.

Tiene las *hojuelas* aovadas, agudas, enterisimas y por de-
 baxo tomentosas.

Las dos *hojuelas* próximas al peciolo mas pequeñas. *Suppl.*

Ne- 3. *VITEX foliis quinatis* X *Vitex* con hojas de cinco
 gundo. *ternatisque serratis, flori-* X y de tres en rama, aserradas;
bus racemoso-paniculatis. X y flores entre racimosas y en
Osborne. it. 92. Mill. ic. 275. f. X panoja.
1. 2. Burm. ind. 138.

Negundo arbor mas. Bauh. X Arbol masculino llamado
hist. 1. p. 189. X Negundo.

Lagondium littoreum. X Lagondio de playas.

Rumph. amb. 4. p. 50. t. 19.

Bemnosi. Rheed. mal. 2. X Bemnosi.

p. 15. t. 11. Rai. hist. 1575. X

Cast. *Vitex* Negundo.

Habita en la India. *ñ*

Posee tres hasta cinco *hojuelas*, entre aovadas y lanceola-
 das, entre sinuosas y aserradas, desnudas por debaxo
 y venosas.

900 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

**Pinna-
ta.** 4. *VITEX foliis pinnatis* X Vitex con hojas pinnadas,
integerrimis, paniculis tri- X enterisimas; y panojas divi-
chotomis. Burm. ind. 138. X didas en tres pedunculos.
t. 43. f. 2. X

Cast. Vitex pinnado.
Habita en Zeylan.

**Leuco-
xylon.** 5. *VITEX foliis digita-* X Vitex de hojas divididas
tis quinatis, foliolis petio- X como en dedos, de cinco en
latis oblongis integerrimis, X rama, con hojuelas peciola-
paniculis dichotomis, bacca X das, oblongas, enterisimas;
monosperma. Suppl. p. 293. X panojas ahorquilladas; y ba-
ya con una sola semilla. X

Cast. Vitex de madera blanca.
Habita en las vastas selvas de Zeylan. *König.*
Es muy semejante al *Vitex de tres en rama*; pero se di-
ferencia por las *hojas* muy lampiñas en ambas partes;
y por la panoja ahorquillada desde su primera division.

**Altis-
sima.** 6. *VITEX foliis ternatis* X Vitex con hojas de tres en
integerrimis panicula verti- X rama, enterisimas; panoja
cillata, spicis verticillatis, X verticilada; espigas tambien
bacca trisperma. Suppl. p. X verticiladas; y baya de tres
294. X semillas.

Cast. Vitex altísimo.
Habita en las vastas selvas de Zeylan. *König.*
Tiene las *hojuelas* aovadas, aguzadas en ambas partes,
lampiñas por encima y vellosas por debaxo.

**Rotun-
difolia.** 7. *VITEX foliis simplici-* X Vitex con hojas sencillas,
bus obovatis integerrimis, X aovadas al revés, enterisi-
pedunculis axillaribus soli- X mas; pedunculos axilares,
tariis unifloris brevissimis. X solitarios, de una flor y cor-
Suppl. p. 294. X tísimos.

Cast. Vitex con hoja redonda.
Habita en el Japon. *Thunb. f.*
Es *arbol* que en la *traza* y *color* se asemeja al *Vitex agno-*
casto; pero posee las *hojas* casi redondas y del largo de
dos pulgadas.

428. Género AMASONIA. *Suppl. p. 48.*

CAR. GEN. NAT.

- CAL.** *Periantio* de una pieza , á manera de campana , medio hendido en cinco partes , agudo , igual y persistente.
- COR.** de un *petalo* , tubulosa , mas larga (*que el caliz*) : *borde* hendido en cinco lacinias casi iguales , extendidas y pequeñas.
- ESTAMB.** *Filamentos* quatro , inclinados al labio superior , mas largos que la corola , y encorvados por su ápice : con las *anteras* ovales y echadas.
- PIST.** *Germen* aovado , de la figura y direccion de los estambres : con dos *stigmas* agudos.
- PERIC.** ninguno.
- SEM.** *Nuez* aovada y del largo del caliz.

ESPECIE.

Erecta I. AMASONIA. *Suppl. p. X* Amasonia.
294. *X*

Cast. Amasonia levantada.

Habita en Surinam.

Echa el *tallo* herbáceo , del largo de tres pies , muy sencillo y rollizo : las *hojas* alternas , con peciolo , apartadas , entre elípticas y lanceoladas , algo aserradas y ásperas : el *racimo* terminal , sencillo , del largo de un pie , y sus piecitos con tres ó quatro flores : las *bracteas* aovadas , sentadas y poco mas largas que las flores : *éstas* ladeadas , inclinadas y amarillas.

949. Género BONTIA. † Plum. 23.

Dill. elth. 49. f. 57.

CAR. GEN. NAT.

CAL. Periantio de una pieza , persistente , partido en cinco hojuelas , obtusas y derechas.

COR. de un *petalo* , boquiabierto : *tubo* largo y cilindráceo : *borde* abierto : *labio superior* derecho , escotado ; el *inferior* revuelto , medio hendido en tres lacinias y de la magnitud del superior.

ESTAMB. Filamentos quatro , alesnados , inclinados ácia el labio superior , del largo de la corola , y los dos mas altos : con las *ánteras* sencillas.

PIST. Germen aovado : *estilo* sencillo , de la direccion y longitud de los estambres : con el *estigma* hendido en dos partes y obtuso.

PERIC. Drupa aovada , y obliqua por su ápice.

SEM. Nuez oval , de una celdilla y que germina.

ESPECIE.

Daph-
noides

1. BONTIA *foliis alternis* , *pedunculis unifloris*. Boncia con hojas alternas; y pedunculos de una flor.

Bontia arborescens , *Thymeleæ facie*. Plum. gen. 32. Boncia arborescente , con traza como la de la Thymelea.

Bontia Laureolæ facie. Boncia con traza como la de la Laureola.

Olea sylvestris , *Barbadiensis* , *folio angusto pingui* , *leviter crenato*. Pluk. alm. 269. t. 209. f. 3. Rai. dendr. 47. Olivo silvestre, de la Barbada, con hoja angosta, pingue y ligeramente recortada.

Cast. Boncia como Dafne.

Habita en las Islas Antillas.

950. Género AVICENNIA. Jacq. amer. 178. t. 112.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* persistente, partido en cinco hojuelas, casi aovadas, obtusas, cóncavas, derechas y acompañado de tres escamas.

COR. de un *petalo*: tubo en forma de campana y corto: borde de dos labios; el *superior* cuadrado, escotado y plano; el *inferior* hendido en tres lacinias, aovadas al revés, iguales y planas.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, alesnados, derechos, de los cuales los *dos anteriores* son poco mas cortos y redoblados ácia el labio superior: con las *anteras* casi redondas y mellizas.

PIST. *Germen* aovado: *estilo* alesnado, derecho, de la longitud de los estambres: con el *estigma* agudo, hendido en dos lacinias; y la *inferior* inclinada.

PERIC. *Capsula* correosa, que se acerca á la figura de rombo, comprimida, de una celdilla y de dos ventallas.

SEM. una sola, grande, de la figura de la capsula, formada de quatro laminitas carnosas y que germina.

E S P E C I E S.

- ^{To-}
^{mento}
^{ar.} I. AVICENNIA *foliis* X Avicennia con hojas entre
cordato-ovatis, subtus to- X de figura de corazon y aovadas, y por debaxo tomen-
mentos. Mat. med. 181. X vadas, y por debaxo tomen-
Jacq. amer. 178. t. 112. f. 2. X tosas.
Bontia foliis integris, X Boncia con hojas enteras,
oblongis, oppositis, petio- X oblongas, opuestas; peciolo-
lis crassis, brevissimis, X crasos, cortisimos, que casi
subamplexantibus, floribus X abrazan el tallo; y flores en
racemosis. Brown. jam. 263. X racimo.
Mangle Laurocerasi fo- X Mangle con hojas como
liis, flore albo, tetrapetalo. X las del Lauro real; flor blan-
Sloan. jam. 156. hist. 2. p. X ea y de quatro petalos.
66. Rai. dendr. 115.
Anacardium. C. B. P. 511. X Anacardio.

904 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Oepata. Rheed. mal. 4. p. \times *Oepata*.
95. t. 45.

Cast. Avicennia tomentosa. *Farm.* Fructus Anacardii Orientalis.

Habita en las Indias. $\frac{h}{2}$

PROPIED. Las almendras de este fruto son dulces y nutritivas ; pero sus cubiertas muy acres y causticas.

Ni- 2. AVICENNIA *foliis* \times Avicennia con hojas lanceoladas y relucientes en ambas partes.
tida. *lanceolatis utrinque nitidis.* \times *Jacq. amer.* 177. t. 112. f. 1. \times

Cast. Avicennia reluciente.

Habita en las playas del mar de la Martinica. $\frac{h}{2}$

Es admirable quando se quema , por su llama y color. Tiene los *cotiledones* duplicados, con los *interiores* pelosos y la *flor* blanca. Vease la otra disertacion de las plantas de *Surinam* , p. 18. año 1776.

951. Género COLUMNEA. † *Plum.* 33. Achimenes.

Brown. 30. f. 3.

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* de una pieza , algo hinchado por su base , partido en cinco lacinias derechas , lanceoladas y persistentes.

COR. de un *petalo* , boquiabierta y vellosa : *tubo* largo , giboso por encima de su base : *borde* de dos labios ; el *superior* recto y escotado ; el *inferior* partido en tres lacinias : las *laterales* lanceoladas : la *intermedia* mas larga , separada mas profundamente y tambien lanceolada.

ESTAMB. *Filamentos* quatro , de los cuales *dos* son mas largos , recogidos debaxo del labio superior : con las *anteras* sencillas y unidas en forma de una corollilla.

PIST. *Germen* aovado : *estilo* filiforme , de la longitud del labio superior : con el *estigma* hendido en dos partes y obtuso.

PERIC. *Capsula* aovada , y de dos celdillas.

SEM.

SEM. numerosas, pequeñas y echadas en el receptáculo muy grande.

OBS. El labio superior de la corola arqueado y entero.
Syst. veg. p. 484.

ESPECIES.

Scandens.

1. COLUMNEA *corollis hirsutissimis*. Columnnea de corolas con muchísimo pelo áspero.

Columnnea scandens, phænoscœo flore, fructu albo. Columnnea trepadora, con la flor reluciente; y el fruto blanco.
Plum. gen. 28. ic. 89. f. 1.

Achimenes major, herbaeca, hirsuta, oblique asurgens, foliis ovatis, crenatis oppositis alternis minoribus, floribus geminatis ad alas alternas. Brown. jam. 270. Achimenes mayor, herbácea, con pelo áspero, que se levanta obliquamente, con hojas aovadas, recortadas, opuestas y alternadamente menores; flores mellizas y colocadas en las axilas alternas.

Rapunculus fruticosus, foliis oblongis, integris, villosis, ex adverso sitis, flore purpureo, villosus. Rapunculo fruticoso, con hojas oblongas, enteras, vellosas, opuestas; flor purpúrea y vellosa.
Sloan. jam. 58. hist. 1. p. 157. t. 100. f. 1.

* *Columnnea scandens, flore lutescente, fructu albo.* Columnnea trepadora, con la flor de color que tira á amarillo; y fruto blanco. α
Plum. gen. 28.

Cast. Columnnea trepadora.

Habita en las selvas de la Martinica.

Tiene el tallo vellosos: las hojas aovadas, también vellosas, aserradas y con peciolo.

Longifolia.

2. COLUMNEA *foliis lanceolatis, longissimis, subserratis, glabris.* Columnnea con hojas lanceoladas, larguísimas, algo aserradas y lampiñas.

Babel-Tsiuli. Rheed. mal. 9. p. 169. t. 87. Babel-Tsiuli.

Cast. Columnnea de hoja larga.

Ha-

906 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Habita en la India.

Produce el *tallo* herbáceo : las *hojas* opuestas , sin peciolo , lanceoladas , larguissimas , algo aserradas y lampiñas en ambas partes : los *racimos* terminales , alargados , rectos y con flores opuestas : el *caliz* de cinco hojuelas , aovado , derecho y persistente : la *corola* de un petalo , irregular ; con el *labio superior* mas oblongo ; y el *inferior* hendido en tres lacinias : las *anteras* partidas por su base en lóbulos apartados , unidas y opuestas en forma de cruz : el *germen* aovado : el *estilo* de la longitud de los estambres : con el *estigma* gruesecito y hendido en dos partes : la *capsula* casi aovada , de dos celdillas y dos ventallas : y el *receptáculo* de las semillas globoso , en el qual se hallan metidas muchas.

Sospecha *Linneo* que este género convenga con el de *Achimenes* de *Brown*.

952. Género ACANTHUS. * *Tourn. t. 80.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* con tres pares de hojuelas que alternan , desiguales y persistentes.

COR. de un *petalo* , y desigual : *tubo* cortísimo y cerrado con pelo ; *labio superior* ninguno ; *labio inferior* muy grande , plano , recto , muy ancho , hendido en tres lóbulos , obtuso y de la longitud del labio superior del *caliz*.

ESTAMB. *Filamentos* quatro , alesnados y mas cortos que la *corola* , los *dos superiores* poco mas largos , encorvados ácia atrás y por su *ápice* ácia dentro : con las *anteras* oblongas , comprimidas , obtusas , laterales , paralelas y por delante vellosas.

PIST. *Germen* cónico : *estilo* filiforme y de la longitud de los estambres : con dos *estigmas* agudos y laterales.

PERIC. *Capsula* casi aovada , con una puntita , de dos celdillas , y su *disepimento* lateral.

SEM. una ú otra , carnosa y gibosa.

CARAC. GENER. DE TOURN. p. 176.

La flor es de un petalo, anomala; cuya parte anterior se divide en tres, y la posterior remata en un anillo, con los estambres que ocupan el lugar del labio superior, y que sostienen las anteras ó ápices semejantes á un cepillo. Del caliz sale el pistilo, que pasa á fruto en forma de bellota, envuelto en el caliz; dividido en dos celdillas mediante su entretela, y lleno de simientes comunmente gibosas.

ESPECIES.

- Mollis.
- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. ACANTHUS foliis sinuatis inermibus. Mat. med. 181. Sabb. hort. 3. t. 13. | Acanto con hojas sinuosas é inermes ó sin espinas. |
| <i>Acanthus sativus seu mollis, Virgilii. C. B. P. 383. Tourn. p. 176.</i> | Acanto sativo ó blando, de Virgilio. |
| <i>Carduus Acanthus sive Branca-ursina. Bauh. hist. 3. p. 75.</i> | Cardo Acanto ó Branca-ursina. |
| <i>Acanthus sativus. Dod. pempt. 719.</i> | Acanto sativo. |

Cast. Acanto blando. vulgo: Branca-ursina ó Giganta. Farm. Branca-ursina. Habita en Italia y Sicilia: en Cataluña, Aragon, Valencia, Andalucía, Galicia y otras partes de España. \mathcal{L} PROPIED. La yerba es glutinosa, emoliente, paregorica, demulcente: y se usa en las quemaduras.

- Spinosis.
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2. ACANTHUS foliis pinnatis spinosis. Sabb. hort. 3. t. 14. | Acanto con hojas pinnadas y espinosas. |
| <i>Acanthus aculeatus. C.B. P. 383. Tourn. p. 176.</i> | Acanto con agujones. |
| <i>Carduus Acanthus sive Branca-ursina spinosa. Bauh. hist. 3. p. 75.</i> | Cardo Acanto ó Branca-ursina espinosa. |

Acan-

908 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Acanthus sylvestris. Dod. X Acanto silvestre.
pempt. 719. X

Cast. Acanto espinoso.

Habita en lugares húmedos de Italia: en la plana de Vic de Cataluña y otras partes de España. 2

Dios- 3. ACANTHUS *foliis lanceolatis integerrimis margine spinosis*. Gron. virg. X Acanto con hojas lanceoladas, enterisimas y por su margen espinosas.
coridis 192. †

Acanthus Dioscoridis vel sativus. Rauv. it. 285. Mo- X Acanto de Dioscorides, ó
ris. hist. 3. p. 604. Rai. X sativo.
Suppl. p. 636. X

Cast. Acanto de Dioscorides.

Habita en el monte Libano.

Illici- 4. ACANTHUS *foliis repandis dentato-spinosis, caule fruticoso aculeato*. X Acanto de hojas ondeadas por su margen, entre dentadas y espinosas; tallo fruticoso y con agujones.
folius. Osb. it. 92.

Acanthus Malabaricus, Agrifolii folio. Pet. sicc. 10. X Acanto de Malabár, con hoja como la del Acebo.
gaz. t. 94. f. 15.

Frutex Indicus, spinosus, foliis Agrifolii, siliqua geminata brevi. Rai. hist. X Arbusto de Indias, espinoso, con hojas como las del Acebo; siliqua melliza y
1766. Pluk. phyt. t. 261. f. 1. X corta.

Aquifolium Indicum. X Acebo de Indias.
Rumph. amb. 6. p. 163. t. 71.

Paina-Schylli. Rheed. X Paina-Schylli.
mal. 2. p. 93. t. 48. X

Cast. Acanto con hoja de Acebo.

Habita en parages cenagosos, salados y maritimos de la India. 2

Posee el caliz de seis hojuelas apiñadas.

5. ACANTHUS *foliis quaternis, floribus axillaribus, calycibus ciliatis.* X Acanto con hojas de quatro en quatro; flores axilares; y cálices pestañosos.
 Syst. veg. 485.
Acanthus ciliaris. Burm. X Acanto pestañoso.
 ind. 130. t. 42. f. 2.

Cast. Acanto de Madraspatan.

Habita en la India.

Echa el tallo herbáceo y ahorquillado: las *hojas* de quatro en quatro, elípticas y sin espinas: el *caliz exterior* apifinado, con quatro pares de hojuelas entre aovadas y en forma de cufia, y pestañosas: el *interior* con quatro hojuelas, dos de las cuales exteriores lanceoladas, mas largas que las restantes, y las dos interiores mas pequeñas y lineares: y la *capsula* de color roxo.

6. ACANTHUS *foliis sinuato-dentatis spinosis, spica florum radicali.* X Acanto con hojas entre sinuosas y dentadas, espinosas; y espiga de las flores radical.
 Suppl. X
 P. 294.

Cast. Acanto con hoja de Cardo.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Sparrman.

Es planta del largo de un palmo. Arroja el tallo cortísimo, tanto que casi no le tiene: muchas *hojas* casi radicales, sinuosas como las del *Cardo*; con *lacinas* terminadas en una espina tomentosa ó desnuda: las *espigas* radicales, oblongas, del largo de las hojas ó poco mas y apifinadas; con *bráctees* nerviosas, rígidas y de seis espinas: los *cálices* sin espinas y membranosos.

7. ACANTHUS *foliis oblongis integris, caule herbaceo procumbente.* X Acanto con hojas oblongas, enteras; tallo herbáceo y tendido.
 Suppl. X
 P. 294.

Cast. Acanto con hoja entera.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. Thunb.

910 FLORES HERMAF. DE IV. ESTAMBRES,

Pro-
cu m-
bens. 8. ACANTHUS *foliis* X Acanto con hojas oblon-
oblongis serrato--ciliatis , X gas , entre aserradas y pes-
caule procumbente frutico- X tañosas ; tallo tendido y fru-
so. Suppl. p. 294. X ticoso.

Cast. Acanto tendido.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Fur-
catus. 9. ACANTHUS *foliis* X Acanto de hojas oblongas,
oblongis dentato-spinosis , X entre dentadas y espinosas ;
caule fruticoso , bracteis X tallo fruticoso ; y bracteas
spina trifurcata terminatis. X terminadas con una espina
Suppl. p. 295. X dividida en tres.

Cast. Acanto ahorquillado.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *Thunb.*

Ca-
pensis 10. ACANTHUS *foliis* X Acanto con hojas oblon-
oblongis dentatis spinosis , X gas, dentadas y espinosas ;
caule fruticoso erecto, brac- X tallo futicoso , derecho ; y
teis spina simplici termina- X bracteas terminadas en una
tis. Suppl. p. 295. X espina sencilla.

Cast. Acanto del Cabo de Buena-esperanza.

Habita en el Cabo de Buena-esperanza. *h*

Echa las *ramas* fruticasas , rollizas , opuestas y cenicien-
tas : las *hojas* tambien opuestas , casi lanceoladas , sin
peciolo , rígidas , del largo de media pulgada , con dos
espinas en ambos lados , á mas de la terminal : las *hojas*
axillares mas blandas , mas largas , pecioladas y tambien
espinosas : las *espigas* terminales , solitarias y sentadas :
la *bractea* semejante á la hoja ; pero con muchas espi-
nas en una y otra parte : el *caliz* liso , de dos ventallas
y la superior mas larga : la *corola* con un solo labio y
hendido en tres lacinias.

953. Género PEDALIUM. † *Dav. Royen.*

CAR. GEN. NAT.

CAL. *Periantio* pequeño , partido en cinco lacinias ; la *de mas arriba* cortísima ; y las *de abaxo* mas largas.

COR. de un *petalo* , casi boquiabierta : *tubo* de tres lados con su vientre plano : *borde* ancho , obliquo , hendi- do en cinco lacinias redondeadas ; las *de mas arriba* mas pequeñas ; y la *de abaxo* mas ancha.

ESTAMB. *Filamentos* quatro , mas cortos que el tubo , y los *dos* mas largos : con las *anteras* unidas en forma de cruz y mellizas.

PIST. *Germen* cónico : *estilo* del largo de los estambres : con dos *estigmas* iguales.

PERIC. *Nuez* en redecilla , corchosa , de quatro lados , con los quatro ángulos espinosos ácia su base , de dos cel- dillas , y su *disepimento* contrario.

SEM. dos , oblongas y vestidas con un arilo ó telilla.

Carácter descrito segun la flor viva por el famoso Rottboell in collect. soc. med. Hafn. 2.

p. 255.

CAL. y COR. como en la descripción de *Linneo*.

ESTAMB. *Filamentos* quatro , cercados en su base con pe- los que llevan glandulas , doblados ácia dentro , mas pequeños que el tubo de la corola , de los cuales *dos* son poco mas cortos : con las *anteras* de figura de corazon , mellizas , y su ápice glanduloso de color de naranja : un *rudimento* de otro filamento puesto en- tre los dos estambres mas cortos : con su *antera* sen- cilla , muy pequeña , de color tambien de naranja.

El *estigma* hendido en dos lacinias ; la *superior* redo- blada por su margen y ápice ; y la *inferior* revuelta. Floreció en el jardin de Hafnia en el verano del año 1772. R.

E S P E C I E .

Murex	1. PEDALIUM.	X	Pedalio.
	<i>Murex</i> . Flor. Zeyl. 440.	X	Abrojo.
	Burm. ind. 139. t. 45. f. 2.	X	
	<i>Hyoscyamus maritimus</i> ,	X	Veleño marítimo, de fru-
	<i>fructu tribuli, aculeato, mo-</i>	X	to como el del Abrojo, con
	<i>nospermis, seu dispermis.</i>	X	aguijones; y una ó dos semi-
	Herm. Zeyl. 42.	X	llas.
	<i>Kaku-taly</i> . Rheed. mal.	X	<i>Kaku-taly</i> .
	10. t. 72.	X	

Cast. Pedalio Abrojo.

Habita en Zeylan y Malabár. Roy. ☉

Tiene el tallo sencillo: las hojas opuestas, aovadas al revés, obtusas, con dientes; truncadas, desnudas y sus peciolos glandulosos en ambas partes: las flores axilares, solitarias, pequeñas; y el fruto inclinado.

Despide el olor de almizcle muy fuerte, quando florece. Rottboell.

954. Género MELIANTHUS. * *Tourn. t. 245.*

Herm. lugdb. 415.

C A R. G E N. N A T.

CAL. *Periantio* grande, de color, desigual y partido en cinco lacinias; las dos superiores oblongas y derechas; la de mas abaxo cortísima, en forma de zurrón y gibosa ácia abaxo; las intermedias opuestas, mas adentro y lanceoladas.

COR. *Petalos* quatro, entre lanceolados y lineares, redoblados por sus ápices, paralelos y extendidos, vueltos ácia fuera, como que constituyen un labio superior, y unidos en medio por sus lados.

Nectario de una pieza, puesto dentro de la lacinia infima del caliz, y pegado á ella con el receptáculo; cortísimo, comprimido por sus lados, cortado en su margen y que por su dorso mira ácia abaxo.

ESTAMB. *Filamentos* quatro, alesnados, derechos, de la longitud del caliz, de los quales los dos inferiores son

CON II. MAS CORTOS Y SEM. CUBIERT. 913

son poco mas cortos : con las *anteras* entre de figura de corazon y oblongas , y de quatro celdillas por la parte anterior.

PIST. *Germen* de quatro lados , giboso y con quatro dientes : *estilo* derecho , alesnado , de la longitud y direccion de los estambres : con el *estigma* hendido en quatro lacinias , y la de mas arriba mayor.

PERIC. *Capsula* medio hendida en quatro partes , de quatro ángulos , agudos y apartados , que se abre entre ellos ; con las celdillas infladas , y los disepimentos en el centro abiertos para receptáculo de las semillas.

SEM. de quatro en quatro , casi globosas y pegadas en el centro de la capsula.

Sigue el carácter de Wernisch. pag. 145.

CAL. *Periantio* grande , de cinco hojuelas ; las *quatro* derechos ; y la *infima* en forma de zurrón y cortísima : *cor.* de quatro *petalos* , lanceolados , extendidos por su extremo , que casi constituyen el labio inferior y opuestos á quatro lacinias del caliz : *nectario* cóncavo , corto y pegado á la hojuela de mas abaxo del caliz : *estambres* quatro , desiguales : *germen* de quatro lados y quatro dientes : *estigma* hendido en quatro partes y desigual : *capsula* de quatro lados hendida en quatro partes , de quatro celdillas y con quatro simientes.

CARACT. GENER. DE TOURN. p. 430.

La *flor* es de muchos *petalos* , anomala , esto es , que consta de quatro *petalos* , puestos unas veces á manera de abanico y otras en forma de cono. Del caliz cortado en muchas partes desiguales , sale el pistilo que pasa á fruto semejante á una vexiga de quatro lados , dividido en quatro celdillas y lleno de simientes casi redondas.

ESPECIES.

Major. 1. MELIANTHUS *stipulis solitariis petiolo adnatis*. Hort. cliff. 492. Melianto con estipulas solitarias y pegadas sobre del peciolo.
Melanthus Africanus. Melianto de Africa.
 Herm. lugdb. 414. t. 415.
 Tourn. p. 431.

Cast. Melianto mayor.

Habita en parages húmedos de Etiopia. ♀

Sacudida esta planta mientras florece, destila cierta lluvia nectarifera. Vino á Europa el año 1672 remitida por *Hermann* á *Tomás Bartolino*.

Minor. 2. MELIANTHUS *stipulis geminis distinctis*. Hort. cliff. 492. Melianto con estipulas de dos en dos y separadas.
Melanthus Africanus minor, foetidus. Comm. rar. Melianto Africano, menor, y fétido.
 4. t. 4.
Melanthus Americanus minor. Tourn. p. 431. Melianto Americano, menor.

Cast. Melianto menor.

Habita en Etiopia. ♀

Esta especie se diferencia de la precedente por tener dos *estipulas* separadas en cada lado de la axila de las hojas, sin que se hallen pegadas ó unidas sobre del peciolo.





